Gartenschönheit

Gartenschönheit

eine Zeitschrift mit Bildern

für Garten- und Blumenfreund · für Liebhaber und Fachmann

7. Jahr 1926

in Gemeinschaft mit Karl Foerster und Camillo Schneider

herausgegeben von · Oskar Kühl

Verlag der Gartenschönheit G.m.b.H. Berlin-Westend

BUCH- UND KUNSTDRUCKEREI W. SOMMER, BERLIN-SCHÖNEBERG

Inhalt

Textbeiträge

Gustav Allinger / Aus englischen Gärten 70
J. Anlauf / Kunstdünger für Alpenrosen und Koniferen 54
Friedrich Bauer / Iris susiana . . . 122
Peter Behrens / Körtings Garten . . 281
A. Berger / Stiefkinder der Kakteenfreunde: Rhipsalis 68
Rudolf Bergfeld / Haus und Garten . . 125
— Von malerischer Gartengestaltung . 235
— Ein vielgestaltiger Hausgarten . . 299
F. Bucherer / Erziehung durch Gartenarbeit 263
O. Burchard / Schöne Echium-Arten der Kanaren 264
Siegfried Decker / Dahlien in Brasilien 214, 242, 262
Paul Dobe / Die gelappte Kapuzinerkresse 20
August Endell / Frühlingsbäume . . . 57
Anni Eppstein / Herbst in Palästinas Gärten 233
Hedwig Fischmann / Wielands Gartenidylle 261
Karl Foerster / Immergrünes Bodenleben im Winter 1
— Immergrüne Zwerglaubgehölze . . 42
— Eine Staudenrabatte 53
— Pflanze und Reise 64
— Die Zukunft des deutschen Waldes . 85
— Gartenumgang mit Frühlingsblumen 93
— Orientalischer Mohn 141
— Veronika im Garten 176
Gartengang Mitte Juni 186
— Paeonien-Ausstellung in Boskoop . 195
— Dauerbeobachtung 204
— Hochsommerflor im Steingarten . . 208
— Winterharte Gartenchrysanthemum . 286
— Verpflanzung des Staudenrittersporns 305
— Haltbarkeitsbeobachtung an abgeschnittenen Dahlien 306
— Reise nach Korsika 321
— Eine Gefahr für den Weltgarten . . 331
F. Frimmel / Ueber die Grundlagen der Farbenzüchtung 18, 36
H. Gehringer / Frühjahrsarbeiten auf dem Balkon 81
— Balkonarbeiten im April 108
— Balkonarbeiten im Mai 138
— Neue großblumige Canna 139
— Balkonpflege im September . . . 250
— Tagetes und Zinnien 259
— Gruppenbegonien 276
— Balkonschmuck im Winter 330
M. Geier / Stecklingsvermehrung bei Einjahrspflanzen 306
— Harnstoffdüngung bei Dahlien . . 330
— Dahlien unter Glas 330
Henry B. Goodwin / Abfall und Dünger 136
— Eine neue Ampelpflanze 220
Rudolf Gründer / Die Erikenzucht in Gefahr 279
— Karl Schönes Dahliengarten . . . 307
Clara Heller / Blumentreue 83
J. Hempelmann / Koniferen von auffallendem Wuchs 62
William Herfrich / Das Verpflanzen größerer Kakteen 51
Hans Heyneck / Großblumige Chrysanthemen 12
Grete Höcker / Erfahrungen in der Balkonpflanzung 192
Th. Hoog jr. / Narzissen 60
— Eremurus 132
— Dahlien in Holland 230
Murray Hornibrook / Picea excelsa echinaeformis 76
C. R. Jelitto / Primel-Erfahrungen 133, 162
— Zur Unterpflanzung von Gehölzen . 220

C. R. Jelitto
— Für den Heidegarten 249
— Für Moorbeete 276
H. Jensen / Picea excelsa Ohlendorffii 74
Paul Kache / Die Nadelhölzer im Hausgarten 10, 38
— Winterschutz der immergrünen Laubhölzer 21
— Aussaat und Anzucht der Einjahrsblumen 80
— Anzucht von Blütengewächsen . . . 107
— Rosenpflege im Sommer . . . 135, 163
— Blütengehölze des Juni 152
— Catalpen 205
— Schmuckvolle Blattformen 237
— Schöne Fruchtgehölze 253
— Immergrüne Topf- und Kübelpflanzen im Winter 328
G. Karge / Orchideenpflege im Zimmer 24
H. Kayser / Das Gartenbad 243
Hermann Koch / Ein Gartentheater . . 271
Hugo Koch / Ein alter Schloßgarten . . 183
Wilhelm Korff / Mistelzauber 37
Berthold Körting / Zwei Gärten . . . 197
— Mein eigener Garten 284
Johannes Köster / Blütennotizen 165, 194, 222, 250, 278, 306
Wilhelm Kriechbaum / Anbau von Primelsamen 54
— Aus dem Pruhonitzer Versuchsgarten 110
— Sortenwirrnis in Staudenkatalogen . 193
— Die Rankrose Marietta Silva Tarouca 222
Paul Landau / Vom Gartenglück der Renaissance 100
— Naturgefühl und Garten 148
— Neue Wege der Blumenmalerei . . 316
Fritz Lemperg / Temperaturbeobachtungen im Garten 190
Georg Lenz / Der Blumenmaler Jan van Huysum 29
— Keramische Gartenplastiken . . . 127
Lewin-Funcke / Gartenplastik 9
Dr. Liebnitz / Kakteen am Fenster . . 138
Franz Lipp / Garteneindrücke aus Amerika 34
Harry Maaß / Gartenselbsthilfe . . . 91
— Ziegelsteinplastik 131
J. Horace McFarland / Neue Klasse amerikanischer Rosen 180
— Amerikanische Rosengärten im Jahre 1926 279
Karl Micksch / Das Färben lebender Blumen 247
— Blumenzucht an Bord eines großen Ozeandampfers 303
Leberecht Migge / Neue Gartentechnik 245, 273
Árpád Mühle / Bougainvilleen-Erinnerungen 320
Wilhelm Mütze / Die Gartenbohne . . 274
— Pflanze und Licht 303
— Der Ursprung der Rose Gruß an Teplitz 331
M. Noack / Der Grauschimmel (Botrytis cinerea) 109
V. Nohl / Die Palmen auf der Mainau . 5
E. Nußbaumer / Iris der Gruppen Regelia und Oncocyclus 120
F. v. Oheimb / Gartennotizen 9
— Die alte krumme Birke 9
— Rosa Moyesii 10
— Schlinger 172
— Cosmeen 312
H. Fr. Pohlenz / Ein umgestalteter Hausgarten 325
Kurt Pöthig / Das Gartentheater . . . 97
— Schattenrabatte 137
— Einjahrsblumengarten 169

Kurt Pöthig
— Steine im Garten 217, 301
Oscar Reuther / Indische Gartenkunst 266
W. v. Roeder / Weiße Kakteen . . . 318
Richard Rothe / Amerikanische Gärten 240
Heinrich Sandkuhl / Gartenecke . . . 19
W. Schacht / Wildblumenschönheit . . 146
— Im Burggarten zu Rothenburg . . . 212
Herbert Graf Schaffgotsch / Tieflandkultur der Alpenpflanzen . . . 23, 50
J. Scherer / Oncidium sphacelatum . . 329
Camillo Schneider / Der Botanische Garten zu Edinburgh 14
— Ein Besuch in Saffron Walden . . . 40
— Treppenstudien 103
— Neue Frühlingsprimeln 104
— Der Gartenberater 105
— Japanische Miniaturgärten 108
— Dresdens Gartenbau-Ausstellung . 113
— Neue Rhododendron-Wildarten . . 123
— Wildrosenschönheit 150
— Ein kalifornisches Gartenparadies . 154
— Von der Dresdener Jubiläums-Gartenbau-Ausstellung. Zwei Pläne Gustav Allingers 159
— Neue Blumenvasen 165
— Studienfahrt nach Köln 167
— Ein Heckengarten 181
— Einjahrsblumen 202
— Laubengänge 215
— In Ronsdorf 221
— Dresden im Zeichen der Rose . . . 223
— Die Einteilung der Dahlien 225
— Dresdens Gartenschau: ein Rückblick 290
— Eine Ampelpflanze des Warmhauses 304
— Buntblättrige Schraubenbäume . . 305
— Borkeschönheit im Winter 313
Despina Streit / Attischer Frühling . . 73
Heinrich Teuscher / Aus dem Morton Arboretum 206
Robert Türke / Rosenstudien 54
— Erfahrungen mit Lutea-Kreuzungen 110
A. J. van Laren / Pflanzen und Gärten in Algerien 129, 158
B. Voigtländer / Der Forstgarten von Tharandt 45
— Unkraut-Vertilgung 82
— Wegebau 277
K. Volkersz / Hyacinthen 88
Karl Wagner / Das Recht im Garten 149, 251
— Vogelschutz und Winterfütterung . 289
Erich Wibiral / Schuttwurzler 164
Heinz Wichmann / Ein Rosensondergarten 309
H. Wiepking-Jürgensmann / Zwei kleine Gärten 256
Gurney Wilson / Cattleyen-Hybriden . 5
— Populäre Orchideen / III. Herbstblühende Cattleyen 304
Erich Wocke / Frühjahrsarbeiten im Park 78
— Herbstliche Wiesenpracht im schlesischen Vorgebirge 234
Gustav Schwantes / Stammlose Mesembryanthemen 31, 66
J. Schweizer / Eine Teichbepflanzung . 47
Wilhelm Seidl / Vergießen und Vergiftung 278
Franz Söhns / Fremdes in unseren Pflanzennamen 298
Alexander Steffen / Arbeiten im Erdmagazin 22
— Gartengeräte 49, 77, 106, 161, 189, 327
— — Die Schaufel 49
— — Der Rechen und sein Gebrauch . 77
— — Die Düngergabel 106
— — Die Grabegabel und ihr Gebrauch 106
— — Der Spaten und sein Gebrauch 161, 189
— — Die Hacke und ihr Gebrauch . . 327

Sachregiſter

Abfall und Dünger 136
Abies: die Arten Europas und des Mittelmeergebietes 55
Abutilon hybridum maximum-Formen . 294
Acer palmatum-Formen 26
Aconitum autumnale 205
— Napellus-Formen 205
— pyramidale 204
Actinidia sinensis 173
Adonis amurensis 26
Algerien: Pflanzen und Gärten . 127, 158
Alnus-Blattformen 238
Alpenpflanzen: Tieflandkultur . . . 23, 50
Alyssum: Blütennotizen 166
American Rose Annual 140
Amerikanische Rosengärten 279
Ampelpflanze 82
Anacrinum Howardii 83
Andromeda: immergrüne 42
Anemonen im Frühling 94
Anzucht von Blütengewächsen 107
Arabis:weißrandige 26
Georg Arends in Ronsdorf 221
Aristolochia Sipho 172
Arnold Arboretum-Expedition nach Nordwestchina 27
Aronia: schönfruchtende 255
Astilbe pumila chinensis 210
Attischer Frühling 73
Aubrietia: Blütennotizen 166, 194
Aubrietien in Ronsdorf 221
Ausstellungen: Jubiläums-Gartenbau-Ausstellung in Dresden 28, 111, 113, 159, 187, 223, 290
— Paeonienausstellung in Boskoop . . 195
L. H. Bailey / Enumeration of the Eubati 56
Balkon: Frühjahrsarbeiten 81
— Arbeiten im April 108
— im Mai 138
Balkonpflanzung 192
Balkonpflege im September 250
Balkonschmuck im Winter 330
William Bateson's Tod 84
Begoniensorten für Gruppen 277
Bepflanzungspläne 53, 81, 137, 191, 219
Alwin Berger / Die Entwicklungslinien der Kakteen 112
Hans Freiherr von Berlepsch / Der gesamte Vogelschutz 112
Berberis: immergrüne 42
— schönfruchtende 253
Birke: die alte krumme 9
Blattformen: schmuckvolle 237
Blume im Gefäß 193
Blumen: das Färben lebender 247
Blumengartenbuch: Finnisches 196
Blumenmalerei: Jan van Huysum . . . 29
— neue Wege 316
Blumentreue 83
Blumenvasen: neue von Körting . . . 165
Blumenzucht an Bord eines Ozeandampfers 303
Blütengehölze des Juni 152
Blütennotizen 76, 165, 194, 222, 250, 278, 306
Blütensträucher des April 99
Borkeschönheit im Winter 313
Bougainvillea-Erinnerungen 390
Brassavola-Hybriden 8
Brombeeren: Nordamerikanische . . . 56
Bücher: neue . . 28, 56, 84, 111, 140, 196, 223, 279, 308, 332
Luther Burbank 195
Campanula kewensis 209
Canna: neue großblumige 139
Cassiope tetragona 249
Catalpen 205
Cattleyen: herbstblühende 304
Cattleyen-Hybriden 5
Chronik 112, 331
Chrysanthemen: großblumige 12
Chrysanthemum indicum: Sortenübersicht 289
Clematis Vitalba 173
Columnea splendens 304
Corylus-Hybriden 251
Cotoneaster: immergrüne 42
— schönfruchtende 254
Cosmeen 312
Cosmea hybrida grandiflora 312
Crassula: Band II von »Die Welt der Pflanze« 56
Crassulaceen aus Mexiko 178
Crinodonna Memoria Corsii 83
Crocus: Blütennotizen 194
Cyclamen europaeum 211
Dahlien: Einteilung 225
— Haltbarkeitsbeobachtung an abgeschnittenen 306
— in Brasilien 214, 242, 262
— in Holland 230
— Harnstoff-Düngung 330
— unter Glas 330
Dahliengesellschaft: Amerikanische 252, 332
Walter Dänhardt / Festschrift der Flora 111
Dauerbeobachtung 204
Delphinium: Blütennotizen 278
— Mehltau 307
— Verpflanzung 305
Dolichos Lablab 275
Doronicum: Blütennotizen 166
Dresden im Zeichen der Rose . . . 223
Dresden: Jubiläums-Gartenbau-Ausstellung 28, 111, 113, 159, 187
Dresdens Gartenschau: ein Rückblick . 290
Deutsche Dendrologische Gesellschaft 55, 167
— — — Finnlandbuch 308
Deutsche Kakteengesellschaft . . 56, 308
Deutzia-Formen 153
Josef Dillmann / Der alte Friedhof in Sachsenhausen 332
Düngergabel 106
Düngung: im Frühjahr 79
W. R. Dykes 27, 331
W. Ebert / Angewandte Pflanzenanatomie und Pflanzenphysiologie . . . 56
Echeveria leucotricha 178
Echium-Arten der Kanaren 264
Edinburgh: botanischer Garten . . . 14
Einjahrsblumen 202
Einjahrsblumen: Aussaat und Anzucht 80
Einjahrsblumengarten 169
— Heinemann 191
Einjahrsblumenrabatte 81
Einjahrspflanzen: Stecklingsvermehrung 306
Elektrisches Licht: Einfluß auf Pflanzenwuchs 27
Fritz Encke / Die Grünanlagen der Stadt Köln 332
C. Engelmann: Gärtnerei 40
Epimedium: Blütennotizen 194
Erdmagazin: Winterarbeiten 22
Eremurus 132
Erikenzucht in Gefahr 279
Adolf Ernst / Die zweckmäßige Verwendung der Blütenstauden 84
Erziehung durch Gartenarbeit 263
Evonymus: immergrüne 43
— schönfruchtende 255
Farbenzüchtung: Grundlagen . . . 18, 36
Feuerdorn-Formen 27
Findlinge 218
Fisole 274
Flora in Dresden: Hundertjahrfeier 28, 83
Forstgarten von Tharandt 45
Frankfurter Palmengarten 55
Freilandkakteen 55
Frühjahrsarbeiten 78
F. Frimmel / Das Pflanzenzüchtungs-Institut zu Eisgrub 332
— auf dem Balkon 81
Frühlingsanemonen 94
Frühlingsbäume 57
Frühlingsblumen 93
Frühlingsprimeln: Neue 104
Ernst Fuhrmann / Die Welt der Pflanze 56
Galax aphylla 276
Gärten:
— Gärten im Altertum 27
— Aus englischen Gärten 70
— Norwegische Gärten 179
— Schloßgarten zu Seerhausen . . . 183
— Zwei Gärten 197
— Garten Redslob 200
— Herbst in Palaestinas Gärten . . . 233
— Amerikanische Gärten 240
— Zwei kleine Gärten von Wiepking . 256
— Wielands Gartenidylle 261
— Körtings Garten 281
Gärten:
— Mein eigener Garten (Körting) . . 284
— Ein umgestalteter Hausgarten . . . 325
Gartenarbeit und Blumenpflege 21, 49, 77, 105, 161, 189, 217, 301, 327
Gartenaufgaben: Alte und neue Lösungen 19, 47, 75, 103, 131, 159, 187, 215, 243, 271, 299, 325
Gartenbad 243
Gartenberater 105
Gartenbohne 274
Gartenecke 19
Gartenchrysanthemum: winterharte . . 286
Garteneindrücke aus Amerika 34
Die Gartenflora 112
Gartengeräte 49, 77, 106, 161, 189, 327
Gartengang Mitte Juni 186
Gartengestaltung: malerische 235
Gartenglück der Renaissance 100
Gartenparadies: ein kalifornisches . . 154
Gartenplastik 9
Gartenplastiken: Jean Gauguin . 127, 128
Gartentechnik: neue 245, 273
Gartenrundschau 27, 55, 83, 139, 167, 195, 251, 279, 307, 331
Gartenselbsthilfe 91
Gartennotizen 9
Gartentheater 97, 271
Gartenumgang mit Frühlingsblumen . 93
Garten und Naturgefühl 148
Gärtnerische Versuchsstation in Friesdorf 167
Jean Gauguin: Gartenplastiken . . . 127
Gehölze:
— niedrige immergrüne Gehölze im Winter 1, 46
— herbstgrüne Gehölze 27
— Schöne Fruchtgehölze 253
Gentiana Farreri 307
— lagodechiana 211
— sino-ornata 307
Gerätewirtschaft 273
Salomon Geßner / Lycas oder die Erfindung der Gärten 326
Unter Glas 304
Glockenblumen-Scheinmohn 308
Goldrautenbeobachtungen 204
H. E. Goodwin / Blumengarten: Rezension 196
Werner Gothein / Die Aufgaben der Keramik in der Gartenarchitektur . . 112
Die Grabegabel und ihr Gebrauch . . 106
Grabmal: das deutsche 196
P. Graebner und Willy Lange / Illustriertes Gartenbaulexikon 223
Gruppenbegonien 276
Gedichte:
— Kenko / Der Wechsel der Jahreszeiten . . . . , 17
— Friedrich Hebbel, Vorfrühling . . 73
— Friedrich Rückert, Vorfrühling . . 73
— Heinrich Heine, Vorfrühling . . . 73
— Adalbert Stifter / Kaktusgestalten . 45
— Petrarca / Der Liebesgarten . . . 101
— Frühlingslieder der Vaganten . . . 129
— Christian Morgenstern / Aphorismen
— Theodor Storm / Sommernacht . . 188
— Lin P'u / Pflaumenblüte 216
— Po Kü I / Frühling am Westsee . . 216
— Ewald von Kleist / Der schöne Garten . . . . , 244
— Goethe / Der Englische Park . . . 272
— C. L. Hirschfeld / Rousseaus Grab . 300
Handwerkliches 305, 330
Harke: Formen 277
Harnstoff-Düngung bei Dahlien . . . 330
R. H. Häßner / Das Schriftwerk des Gärtners 56
Hausgarten: ein vielgestaltiger . . . 299
Haus und Garten 125
Heckengarten 181
Hedera: Zwergformen 43
Heidegarten: zwei Pflanzen 249
Hemerocallis: Blütennotizen 278
William Hertrichs kalifornischer Garten . . . . , 154
Hibiscus Rosa-sinensis 294
Höntsch's Kalender 28
Georg Horthum / Jahrbuch für Tier- und Gartenfreunde 252

Henry E. Huntingdons Garten in San Marino . . . 154
Hyazinthen . . . 88
Hydrangea petiolaris . . . 173
Iberis Weißer Zwerg . . . 26
Ilex: schönfruchtende . . . 255
Otto Illing / Formobstbau . . . 224
Immergrünes Bodenleben im Winter . 1
Immergrüne Topf- und Kübelpflanzen im Winter . . . 328
Immergrüne Zwerglaubgehölze . . . 42
Indische Gartenkunst . . . 266, 295
Iris der Gruppen Regelia und Oncocyclus . . . 120
— germanica-Sorten: Blütennotizen . . 222
— pumila: Blütennotizen . . . 166
6
— Schriften . . . 168
— sibirica Perry's Var. . . . 186
— susiana . . . 122, 234
Iris-Gesellschaft: Amerikanische . . . 332
A. Janson / Das Mistbeet . . . 84
Otto Janson / Nützlinge im Gartenbau 280
Japanische Miniaturgärten . . . 108
— Zierkirschen . . . 251
Jubiläumsgartenbau-Ausstellung Dresden 1926 . . . 28, 111
Juniblüher-Liste . . . 278, 305
Paul Kache / Marktpflanzenzucht . .
— — Allgemeine Grundlagen . . . 84
— — Grünpflanzen und Schnittgrün . 84
Kakteen am Fenster . . . 138
— fürs Freiland . . . 55
— Verpflanzen größerer . . . 51
— Weiße Kakteen . . . 318
Kapuzinerkresse: gelappte . . . 20
Keramische Gartenplastiken . . . 127
Kleinimmergrünen: Liste . . . 46
Alexander Koch / Innendekoration . . 56
— Tausend Ideen zur künstlerischen Ausgestaltung der Wohnung . . . 112
Kölner Anlagen . . . 167
Koniferen von auffallendem Wuchs . . 62
Korsika: Reise nach . . . 321
Körtings Garten . . . 281
Krankenstube der Pflanzen . . . 109
Kuckuckspflanzen . . . 55
Kunstdünger für Alpenrosen und Koniferen . . . 54
Laeliocattleyen . . . 7
Theodor Lange / Allgemeines Gartenbuch . . . 140
Laubgehölze: immergrüne . . . 42
Laubhölzer: Winterschutz immergrüner 21
Leberblümchen im Winter . . . 26
Licht und Pflanze . . . 303

Literatur:
— Aus dem Blumengarten der Literatur 17, 45, 73, 101, 129, 160, 188, 216 244, 300, 326
Max Löbner in Friesdorf . . . 167
Lonicera Caprifolium . . . 172
— immergrüne . . . 44
Lotus peliorrhynchus . . . 82
Lowiara . . . 8
Lutea-Kreuzungen: Erfahrungen . . . 110
Lycium: schönfruchtende . . . 255
Harry Maasz / Kleine und große Gärten 279
C. Maidorn / Betriebsgrundsätze des Marktgemüsebaus . . . 252
Mainau: Palmen . . . 5
Massachusetts Horticultural Society . 332
Mäusekuchen . . . 26
J. Horace McFarland / The Rose in America . . . 280
Meconopsis-Kultur . . . 139
Meconopsis quintuplinervia . . . 308
Mehltau bei Rittersporn . . . 307
Mesembryanthemen: Stammlose . . 31, 66
Leberecht Migge / Deutsche Binnenkolonisation . . . 252
Missouri-Nachtkerze . . . 208
Mistelzauber . . . 37
Mohn: orientalischer . . . 141
Moosbildung im Rasen . . . 79
B. Y. Morrison / Garden Irises . . . 168
Morton Arboretum . . . 206
Lambert Müller / Der Gemüsegarten . 280
Nadelhölzer im Hausgarten . . . 10, 38
Narcissus: Blütennotize n. . . . 194
Narzissen . . . 60
Naturgefühl und Garten . . . 148
Arno Naumann / Bau und Leben der Pflanze . . . 280
Neues aus alles Welt 27, 55, 83, 111, 139 167, 195, 223, 251, 279, 307, 331
Norwegische Gärten . . . 179
Oncidium sphacelatum . . . 329
Orchideenkreuzung: Pollenhaltbarkeit . 27
Orchideen: populäre . . . 304
Orchideenpflege im Zimmer . . . 24
Pachyphytum oviferum . . . 178
Pachysandra procumbens . . . 220
— terminalis . . . 220
Paeonia Wiesbaden . . . 204
Päonien-Ausstellung in Boskoop . . . 195
Päonien-Auswahl . . . 251
Palaestinas Gärten . . . 233
Palmen auf der Mainau . . . 5
Pandanus Veitchii . . . 305
Papaver orientale-Sorten . . . 141
Park- Frühjahrsarbeiten . . . 78
Der Deutsche Park: Bildfolge . . . 168
Parthenocissus tricuspidata . . . 173
Pfingstrosen-Strauß . . . 193
Paul Pfitzer / Edelgladiolen . . . 252
Pflanzenkrankheiten:
— Der Grauschimmel (Botrytis cinerea) 109
Pflanzennamen: Fremdes in unseren . 298
Pflanzen: seltene vor hundert Jahren . 83
Pflanzen und Gärten in Algerien . 129, 158
Pflanze und Licht . . . 303
Pflanze und Reise . . . 64
Phaseolus Mungo . . . 275
— vulgaris . . . 275
Philadelphus-Formen . . . 152
Phlox: Blütennotizen . . . 194
Phlox decussata Antoine Mercier . . 204
— — Fellbacher Porzellan . . . 204
Phlox decussata-Sorten: Blütennotizen 76
Phloxsorten von guter Haltung . . . 204
Phlox subulata: Blütennotizen . . . 166
Phoenix canariensis auf der Mainau . 5
Phyllodoce taxifolia . . . 249
Picea excelsa echinaeformis . . . 76
— — Ohlendorffii . . . 74
Pillnitz: Gärtnerlehranstalt-Bericht . . 140
Plectranthus Oertendahlii . . . 220
Walter Poenicke / Obstbaumschnitt . . 196
Pollenhaltbarkeit bei Orchideen . . . 27
Potentilla Gibson's Scarlet . . . 208
Potinara . . . 8
Primel-Arten für Steingarten und Alpinum . . . 162
— für Staudengarten und Park . . . 133
Primel-Erfahrungen . . . 133, 162
Primelsamen: Anbau . . . 54, 221
Primula Auricula . . . 162
— acaulis und Formen . . . 133
— Beesiana . . . 134
— Blütennotizen . . . 194
— Bulleyana . . . 134
— cortusoides . . . 133
— Clusiana . . . 163
— denticulata . . . 133
— dryadifolia . . . 135
— farinosa . . . 162
— Forrestii . . . 135
— frondosa . . . 162
— hirsuta . . . 162
— japonica . . . 134
— Juliae . . . 133
— longiflora . . . 163
— malacoides Dwarf Eclipse . . . 111
— marginata . . . 162
— minima . . . 163
— pulverulenta . . . 134
— rosea . . . 133
— Sieboldii . . . 134
— sikkimensis . . . 134
— spectabilis . . . 163
— Veitchii . . . 134
— viscosa . . . 162
— Wilsonii . . . 134
— Wulfeniana . . . 163
Pruhonitzer Versuchsgarten . . . 110
Prunus serrulata sachalinensis und P. Lannesiana-Formen . . . 251
Pulmonaria: Blütennotizen . . . 166
I. A. Purpus / Crassulaceen aus Mexiko 178
Pyracantha: harte Formen . . . 27
Pyrethrum-Sorten: Blütennotizen . . 306
Quercus-Blattformen . . . 238
Rankrose Marietta Silva Tarouca . . 222
Der Rechen und sein Gebrauch . . . 77
Recht im Garten . . . 149, 251
Curt Reiter / Die Praxis der Schnittblumengärtnerei . . . 28
Renaissance: Gartenglück . . . 100
Rhipsalis . . . 68
Rhododendron: neue Wildarten . . . 123
Carl Rimann / Die Pflege des Gartens 224
Rittersporn: Mehltau . . . 307
Robinia-Arten . . . 153
Robinia pseudacacia Rozynskiana . . 153
W. von Roeder / Der Kakteenzüchter . 28
Romneya-Arten . . . 251
Ronsdorf . . . 221
Rosa alpina rosea . . . 150
— Beggeriana . . . 150
— carolina . . . 152
— Dingleri . . . 151
— dumetorum . . . 331
— Hardii . . . 223
— Hugonis-Hybride . . . 139
— lutea . . . 151
— lutea-Kreuzungen . . . 110
— Moyesii . . . 9
— pruhoniciana . . . 110
— spec. Korea . . . 110
— virginiana . . . 152
Rose Dr. E. M. Mills . . . 139
— Frau Karl Druschki . . . 83
— Gruß an Teplitz: Ursprung . . . 331
— Mary Wallace . . . 180
— Sarah van Fleet . . . 180
Rosen:
— Nordlandrosen . . . 111
— Rosen für rauchige Industriegegenden . . . 111
— Neue Klasse amerikanischer Rosen . 180
— Schöne alte und neue Rosen . . . 144
— Regenwiderstandsfähige Edelrosen . 307
— Gute neue Rosen . . . 331
Rosengärten: Amerikanische . . . 279
Rosenpflege im Sommer . . . 135, 163
Rosensondergarten . . . 309
Rosenstudien . . . 54
Rothenburg: Burggarten . . . 212
Rousseaus Grab . . . 300
Rümpler / Die Gartenblumen . . . 140
F. Saathoff / Deutscher Gartenkalender 332
Salvia nemorosa superba . . . 210
Sambucus-Blattformen . . . 237
A. W. W. Sand / Bearded Iris . . . 168
Saxifraga decipiens lutescens . . . 221
Saxifraga-Sorten: Auswahl . . . 196
Scabiosa caucasica Schöne von Eisenach 208
Schädlingsbekämpfung . . . 308
— Nachrichten . . . 140
Schattenrabatte . . . 137
Schaufelformen . . . 77
Schlinger . . . 172
Wilhelm Schmid . . . 317
Paul Schmidt / Düngerlehre . . . 196
Schneckenbekämpfung . . . 223, 251
Karl Schönes Dahliengarten . . . 307
Schraubenbäume: buntblättrige . . . 305
Fritz Graf von Schwerin: 70. Geburtstag . . . 167
Schuttwurzler . . . 164
Schutzwirtschaft im Garten . . . 274
Sedum hybridum ochroleucum . . . 205
— spurium . . . 205
Seerhausen . . . 183
Seltenheiten vor hundert Jahren . . . 83
Shortia galacifolia und uniflora . . . 276
Solidago: Zwergformen . . . 211
Sophronitis-Hybriden . . . 8
Sortenwirrnis in Staudenkatalogen . . 193
Der Spaten und sein Gebrauch . . 161, 189
Spätherbstchrysanthemum . . . 65
L. Späth / Gärten, Sport- und Spielplätze 280
Stachyurus praecox . . . 55
Stauden:
— Immergrüne Stauden im Winter 1, 46
— die hundert besten Stauden . . . 83
— Farbenbezeichnung . . . 193
— Sortenwirrnis . . . 194
Staudenpaeonien: wertvolle . . . 251
Staudenrabatte: den ganzen Sommer blühende . . . 53
— eine große englische . . . 219
— Einfassungen . . . 251
Staudenrittersporn: Verpflanzung . . 305
Stecklingsvermehrung bei Einjahrspflanzen . . . 306
Steinbrech-Formen: die besten . . . 196

Steine im Garten 217, 301
Steingarten:
— Im Steingarten zu verwendende Pflanzen 55
— Hochsommerflor im Steingarten . . 208
— Steingarten J. Springer 197
Steingartenpflanzen: die fünfzig besten 111
F. Stellwag / Neuzeitliche Schädlingsbekämpfung 308
Sträucher: zwei selten blühende . . . 55
Sukkulentenkunde: Zeitschrift . . . 252
Sycopsis sinensis 55
Syringa japonica und Verwandte . . . 153
Tagetes und Zinnien 259
Tannen Europas und des Mittelmeergebietes 55
Tannenwedel 209
Tecoma radicans 172
Teichbepflanzung 47
Temperaturbeobachtungen im Garten . 190
Tharandt: Forstgarten 45
Tote des Jahres 331
Trachycarpus excelsa 5
Treppenstudien 103
Trollius: Blütennotizen 166
Tunica saxifraga fl. pl. 210
Robert Türke 331
Unkrautvertilgung 82
Unterpflanzung von Gehölzen 220
Jan van Huysum: Blumenmaler . . . 29
Friedrich Vaupel / Die Kakteen . 84, 140
Veilchen im Frühling 93
Veitch's Wein 173
Vergießen und Vergiftung 278
Veronica: Blütennotizen 306
Via rasa 82
Viola cornuta: Blütennotizen 166
Viscum album 37
Vogelschutz und Winterfütterung . . 289
G. B. Volz / Das Sans, Souci Friedrichs des Großen 280
Vorfrühlingsblumen vom D-Zug-Fenster 64
Wald: die Zukunft des deutschen . . 85
Am Wege 25, 82, 110, 138, 193
Wegebau 277
Weltgarten-Gefahr 331
Aus der Werkstatt der Pflanzenzüchter 54, 110, 221, 274
Vom Werkstoff des Gartens 54, 220, 249, 276
Arthur Wiechula / Wachsende Bäume . 332
Wielands Gartenidylle 261
Wiesenpracht: herbstliche im schlesischen Vorgebirge 234
Wildblumenschönheit 146
Wildpflanzenschutz 331
Wildrose: eine koreanische 110
E. H. Wilson / Aristocrats of the Garden 168
Winterarbeiten 21
Winterjasmin 26
Winterschutz der immergrünen Laubhölzer 21
Wistaria sinensis 172
E. Wocke / Der Steingarten 251
Pflanze in der Wohnung 24, 82, 108, 165, 220
F. Zahn / Unser Garten 56
R. Zander / Führer durch den Botanischen Garten in Halle 56
Zeitschriften 28, 56, 84, 112, 140, 168, 196, 224, 252, 280, 308
Zeitschrift für Sukkulentenkunde . . 56
Ziegelsteinplastik 131
Zimmerpflanzen 24
Zinnia-Sorten 260
Zwergahorn-Nöte 26
Zwergfichten: zwei wertvolle 74
Zwerglaubgehölze: immergrüne . . . 42

Bilder

(Die kursiv gedruckten sind farbig)

Abies pectinata pendula 63
Abutilon hybridum maximum 294
Acer rubrum: Borke 313
Agapanthus umbellatus 197a
Allium karatawiense 174
Allium narcissiflorum und Genista dalmatica 141a
Ampelpflanze des Warmhauses . . . 304
Anemone patens 96
Aronia melanocarpa grandiflora . . . 254
Arundo Donax 322
Asperula odorata 94
Aspidium angulare proliferum 3
Astilbe simplicifolia 210
Aubrietia graeca superba 85a
Avena sempervirens 4
Azalee Kosters Brillant Red . . . 113a
Balkonbepflanzung 192
Begonia crispa 260a
Bepflanzungspläne 92, 137
Berberis buxifolia nana 4
Berberis Vernae 254
Billbergia pyramidalis 36a
Blumenfarben: Entstehung 18, 37
Blumenrabatte in Stuttgart 225a
Blumenstrauß: Wilhelm Schmid . . 316a
Blumensträuße: Wilhelm Schmid . 316, 317
Blumentheater in Wörlitz 169
Blumenvasen: neue von Körting . . . 165
Bougainvillea 320
Brassocattleya Apollo 7
Bruckenthalia spiculifolia 42
Burggarten zu Rothenburg . . . 212, 213
Canna Präsident und Teichmann . . 232a
Cannarabatte: Sanssouci 197a
Carlina acaulis 146
Cassiope tetragona (unteres Bild!) . . 249
Catalpa bignonioides-Blüten 206
Cattleya Mossiae Earl Leofric . . . 6
Celosia argentea-Formen 253a
Cephalocereus polylophus 52
— senilis 318
Cercis canadensis: Borke 315
Cereus hexagonis 52
Chamaecyparis Lawsoniana minima . . 39
Chrysanthemum bei Blitzlicht 65
Chrysanthemum Bengale 13
— indicum Marktbeherrscher 286
— — Princess Juliana 287
— — Schwarzrot 288
— — White Croutts 287
— Luise Pockett 13
— Mrs. Gilbert Drabble 12
Chysis bractescens 24
Circaea lutetiana 209
Clarkia pulchella 203
Columnea splendens 304
Corydalis lutea 94
Cotoneaster Dammeri 29a
Cotoneaster Dielsiana 254
— racemiflora soongarica 253
Crataegus nigra: Borke 313
Cytisus praecox 85a
Dahlie Apfelblüte 225
— Cardua 231
— Electros 230
— Emilie Nagels 228
— Firebrand 232
— Frau Frieda Falkenhagen 230
— Gletscher 229
— Goldene Sonne 229
— Golden King (nicht Orange King) . 232
— Ifield Star 226
— Juweeltje 227
— Kalif 228
— Kätchen von Schwarzatal 226
— Schneekönigin 227
— Secretaris Voors 231
— Trésor Anversois 228
Daphne cenorum major 43
Darwintulpe Rafael 120a
Delphinium Ajacis 203
Dentaria digitata 95
Dianthus alpinus 147
— Snowline 175
— Viceroy 175
Dimorphotheca aurantiaca (nicht Gazania) 204
Dresdens Gartenbau-Ausstellung 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 291, 292, 293
Düngergrube 136
Echeveria leucotricha 178
Echium giganteum 264
— Pininana 265
— simplex 265
Echinocactus Grusonii 52
— scopa candida cristata 319
Edinburgh: Ansichten aus dem botanischen Garten 14, 15, 16
Einjahrsblumengarten . . . 169, 170, 171
Einjahrsblumengarten Heinemann . 169a
Einjahrsblumengarten Heinemann . . 191
Einjahrsblumen im Hamburger Stadtpark 225a
Einjahrsblumenrabatte 81
Eisgrub: Glashauspflanzen-Gruppe 309a
Eremurus in Blüte 132
Erlen in Pillnitz 59
Festuca glauca und punctoria 2
Fisole Herriot Metis 275
Fisole La Brune 275
Fraxinus americana: Borke 314
Gärten:
— Garten Lars Andersen in Brookline Ansichten 34, 35, 36
— Aus englischen Gärten 70, 71
— Norwegische Gärten 179
Gärten:
— Amerikanische Gärten: Lynwood Hall 240, 241
— Garten Redslob . . 198, 199, 200, 201
— Zwei kleine von Wiepking 256, 257, 258, 259
— Körtings Garten 281, 282, 283, 284, 285
— *Szenerie im Garten Körting* . . 281a
— *Heideszenerie im Garten Körting* 281a
— Aus dem englischen Garten in München 309
Gartenarbeit für Mädchen 263
Gartenbad 243
Gartenbauausstellung: Bilder der Dresdener Ausstellung 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 291, 292, 293
Gartenecke 19
Gartengeräte . 49, 77, 106, 161, 273, 274
— Die Schaufel 49
— Der Rechen (die Harke) 78
— Die Düngergabel 106
— Die Grabegabel 106
— Der Spaten 161
— Die Hacke 327
Gartengestaltung: malerische . . 235, 236
Gartenparadies: ein kalifornisches 154, 155, 156, 157
Gartenpläne:
— von Gustav Allinger 159
— Zwei von Wiepking 256, 257
— Indische Gartenpläne 266, 267, 268, 296
— Körtings Garten 281
— Hausgarten: Bergfeld 299
— Hausgarten: Pohlenz 325
Gartenselbsthilfe 91, 92, 93
Gartentheater 97, 98
— im Großen Garten, Dresden . . . 98
— auf der Dresdener Ausstellung . . 187
— H. Koch 271
Gartentechnik: neue . . . 245, 246, 247
Jean Gauguin: Gartenplastiken . 127, 128
Genista dalmatica und Allium narcissiflorum 141a
Gentiana lagodechiana 175
Gleditsia caspica im Winter 29
Gynerium argenteum 321
Hampton Court 71
Hausgarten: ein vielgestaltiger . . . 299
Haus und Garten 126
Heckengarten im Hamburger Stadtpark 181, 182
Hedera Helix albo-marmorata 1
Heidelandschaft mit Wacholder . . . 11
Helianthemum im Rauhreif 43
Helleborus niger praecox in Blüte . . 3
J. Hempelmann: Skizzen zu Koniferen 63, 64
Hibiscus Rosa-sinensis 294
Hippuris vulgaris 209

Hyacinthen:
— Arentine Arentsen 89
— Generaal de Wet 90
— La Grandesse 89
— Roi des Belges 89
Hyde Park-Szenerie 70
Hydrangea petiolaris 172
Iberis umbellata purpurea 203
Ilex verticillata 253
Immergrüne Polsterstauden im Steingarten 29a
Indische Gartenkunst 266, 267, 268, 269, 270, 295, 296, 297
Iris iberica 120
Iris Regeliocyclus-Hybriden Artemis und Baucis 120a
Iris Regeliocyclus Irma 121
— — Ismene 121
— Saari 120
— Sari var. nazarena 120
— susiana 122, 234
Japanischer Garten in Kalifornien . . 157
Japanische Kiefern 1
— Miniaturgärten 108
Juniperus virginiana globosa nana . . 39
Kakteen und Sukkulenten in einem kalifornischen Garten 156
Kakteen: Verpflanzen größerer . . . 52
Kapuzinerkresse: gelappte 20
Knollenbegonien 260a
Laubengänge: Mainau und Nymphenburg 215
Lathyrus im Nelkenhause 40
Laelio-Cattleya Britannia alba . . . 8a
Leucanthemum alpinum 147
Linden in Pillnitz 58
Liquidambar styraciflua: Borke . . . 300
Lotus peliorrhynchus 82
Lycaste Skinneri 25
Lycium chinense 254
Mamillaria plumosa 319
Mesembrianthemum calamiforme . . . 66
— caninum 33
— cigarettiferum 67
— Salmii 31
— supinum 32
— tigrinum 31
— tuberculosum 32
— vespertinum 67
Melittis melissophyllum 147
Milton Wall 72
Mistel 37
Morton Arboretum: Scenerien . . 207, 208
Muscari Heavenly Blue 57a
Narcissus Bird of Paradise 61
— Enchantress 60
— incomparabilis Croesus 60
— incomparabilis Lioba 61
— Johnstoni Queen of Spain 62
Narzisse Golden Spur 57a
Naturtheater in Oybin 98
Nelke Dainty 41
— Eldora 41
— White Pearl 41
Nelkengärtnerei C. Engelmann . . 40, 41
Nelken Gipsy und Spectrum . . . 288a
Nelken von Moll 288a
Nemophila maculata 202
Obstbaumblüte in Dahlem 97
Odontioda Chanticleer 8a
Odontioda Crethus var. Monarch . . . 1a
Odontioda Juno var. Regina 8
Odontioda Thalia 1a
Odontoglossum crispum 25
— Dora 6
Oncidium sphacelatum 329
Ostrya virginiana: Borke 314
Pachyphytum oviferum 178
Pachysandra procumbens 220
— terminalis 44
Palmen auf der Mainau im Schnee . . 5
Pandanus Veitchii 305
Papaver orientale Ethel Swete u. Mme. of Orange 148a
Papaver orientale Ethel Swete 142
Paeonia Mme. Louis Henry 148a
— — Feuerzeichen 142
— — Mm. of Orange 143
— — Prinzeß Viktoria Luise 141
— — Wunderkind 141
— — Württembergia 143
Perowskia atripilicifolia 225
Pfingstrosen-Strauß 193
Phantasiegarten der Frührenaissance . 100
Phoenix-Palmen in Korsika 323
Philadelphus latifolius 152
Phyllodoce taxifolia (oberes Bild!) . . 249
Picea Alcockiana 63
— excelsa nana 38
— — Ohlendorffii 74
— Omorika im Schnee 10
— pungens glauca pendula 63
Pinus densiflora (japanisches Bild) . . 1
Plectranthus Oertendahlii 220
Polypodium vulgare 4
Primel: gefüllte farbige 92a
Primula acaulis und Hepatica triloba 92a
Primula pruhoniciana 104
— Wanda 104
Pruhonitz: Frühlingsszenerie 85
Pruhonitz: Seenzug 88
Prunus yedoensis im Austrieb . . . 57
Pyracantha coccinea: in Frucht . . . 2
Quercus robur pectinata: Blätter . . 238
Queen's Cottage 71
— sessiliflora cucullata: Blätter . . . 239
— — Louettei: Blätter 239
— — heterophylla: Blätter 237
Rhipsalis clavata 69
— conferta 69
— Neves Armandi 68
— pachyptera 68
— Warmingiana 69
Rhododendron cheilanthum 123
— ambiguum 125
— charianthum 124
— impeditum 123
— yanthinum 124
Ribes sanguineum (nicht rubrum) in Blüte 99
Rittersporne und Gladiolen 176a
Robinia pseudacacia Rozynskiana . . 153
Rosa alpina rosea 150
— Beggerinaa 150
— carolina 151
— Dingleri 151
— lutea 150
— virginiana 151
Rose Breeze Hill 181
— British Queen 145
— Dr. E. H. Mills 180
— Heart of Gold 180
— J. G. Glasford 145
— Lyonrose 144
— Rayon d'or 145
— Soleil d'or 144
— Ulrich Brunner Fils 144
Rosengartenplan von Allinger 159
Rosenhof und Leuchtfontäne Dresdener Ausstellung: Plan 187
Rosensondergarten Wichmann 310, 311, 312
Rothenburg: Burggarten 212, 213
Rousseaus Grab 300
Sambucus nigra filifolia: Blätter . . . 238
— — laciniata: Blätter 238
— — latisecta: Blätter 239
Sandstein-Formationen: Rüdersdorfer 301, 301
Santolina pinnata 211
Saxifraga caesia 146
— Elisabethae 96
Schattenrabatte 137
Schloß Sion 71
Wilhelm Schmid: Blumenbilder . 316, 317
Wilhelm Schmid: Blumenbilder . . 316a
Scutellaria baicalensis 210
Seerhausen: Schloßgarten . . 183, 184, 185
Senecio Veitchianus 174
Shortia galacifolia 276
— uniflora 277
Soldanella montana 93
Staudenphlox-Strauß 204a
Staudenrabatte: Plan 53
— eine große englische 219
Steine im Garten . . . 217, 218, 301, 302
Steingarten in Edinburgh 15, 16
— J. Springer 197, 198
Steingartenszenerie 113a, 141a
Strelitzia Reginae: Blütenstand . . . 36a
Tagetes patula-Formen 253a
Tagetes patula nana 260
Tagetes, Verbena venosa, Salvien und Canna: Beete 169a
Tecoma radicans 173
Teichbepflanzung 47
Temperaturbeobachtungen im Garten . 190
Themse-Szenerie 70
Tilia heterophylla: Borke 315
— japonica: Borke 313
Treppenstudien 103
Ulmus glabra pendula in Blüte . . . 99
— racemosa: Borke 314
Jan van Huysum: Tongefäß mit Blumen 30
Verbascum densiflorum-Form 174
Verbenen-Pflanze 202
Veronica repens 176
— rupestris 176
— spicata 176
Viburnum Davidii 44
— Lantana: Austrieb 99
Vinca minor 95
Waldbilder: deutsche 86, 87
Waldhaus 197
Warscewiczella discolor 7
Ziegelsteinplastik 131
Zinnia elegans robusta 260

Bildbeilagen

Januar: Winter im Pruhonitzer Park
Februar: Jan van Huysum: Tongefäß mit Blumen
März: Platane in Eisgrub
April: Im Alpinum zu Pruhonitz
Mai: Glycine, Wistaria multijuga, im Botanischen Garten zu Dahlem
Juni: Kletterrosen und Rittersporn
Juli: Clematis Lasurstern
August: Sommer im Naturgarten (Szene aus Garten B. Körting)
September: Eingang zum Generalife in Granada
Oktober: Herbst in Pruhonitz
November: Auf dem Ehrenfriedhof in Duisburg
Dezember: Aus einem kalifornischen Gartenparadies

Gartenschönheit

eine Zeitschrift mit Bildern

für Garten- und Blumenfreund · für Liebhaber und Fachmann

Januar 1926

in Gemeinschaft mit Karl Foerster und Camillo Schneider
herausgegeben von Oskar Kühl
Verlag der Gartenschönheit G.m.b.H. Berlin-Westend

7. JAHR / HEFT 1 JANUAR 1926

GARTENSCHÖNHEIT

eine Zeitschrift mit Bildern
für Garten- und Blumenfreund
für Liebhaber und Fachmann
in Gemeinschaft mit Karl Foerster
und Camillo Schneider
herausgegeben von Oskar Kühl

Inhalt des Januarheftes:

Seite
Japanische Kiefern im Schnee / Bild 1
Karl Foerster / Immergrünes Bodenleben im Winter / Mit 8 Bildern 1
V. Nohl / Die Palmen auf der Mainau / Mit Bild 5
Gurney Wilson / Cattleyen-Hybriden / Mit 5 Bildern 5
Lewin-Funcke / Gartenplastik 9
F. von Oheimb / Gartennotizen 9
Paul Kache / Die Nadelhölzer im Hausgarten I / Mit 2 Bildern 10
Hans Heyneck / Großblumige Chrysanthemen / Mit 3 Bildern 12
Camillo Schneider / Der Botanische Garten zu Edinburgh / Mit 7 Bildern 14
F. Frimmel / Über die Grundlagen der Farbenzüchtung / Mit Bild 18
Paul Dobe / Gelappte Kapuzinerkresse / Bild 20
Aus dem Blumengarten der Literatur
Wechsel der Jahreszeiten von Bonze Kenko 17
Gartenaufgaben
H. Sandkuhl / Gartenecke / 2 Zeichnungen 19
GARTENARBEIT UND BLUMENPFLEGE
Winterarbeiten / Paul Kache: Winterschutz der immergrünen Laubhölzer / Alexander Steffen: Arbeiten im Erdmagazin 21
Herbert Graf Schaffgotsch / Tieflandkultur der Alpenpflanzen I 23
Die Pflanze in der Wohnung / G. Karge: Orchideenpflege im Zimmer / Mit 3 Bildern 24
Am Wege 26
GARTENRUNDSCHAU
Neues aus aller Welt
Gärten im Altertum / Feuerdorn-Formen / Herbstgrüne Gehölze / Orchideenkreuzung / Einfluß von elektrischem Licht auf Pflanzenwuchs / Arnold-Arboretum-Expedition nach Nordwestchina / Jubiläums-Gartenbau-Ausstellung / Jahrhundertfeier der Flora 27
Neue Bücher
Schnittblumengärtnerei / Gartenkalender / Kakteenzucht 28
Zeitschriften 28

BILDBEILAGE
Winter im Pruhonitzer Park

FARBIGE BILDBEILAGEN
Odontioda Thalia und Crethus
Odontioda Chanticleer / Laeliocattleya Hassallii

Monatlich ein Heft
Bezugspreis für das Vierteljahr
in *Deutschland* 4 G.-M. und 0.75 G.-M. Versandkosten (Postscheckkonto Berlin 76290), im *Ausland* einschließlich Versandkosten: 5.25 Goldmark = 1,25 U. S. A.-$ oder entsprechend in der Landeswährung.
Preis des Einzelheftes
1.50 Goldmark zuzüglich Versandkosten

Verlag der Gartenschönheit G.m.b.H.
Berlin-Westend / Akazien-Allee 14.

Die hier gezeigte Odontioda Thalia, eine Züchtung von Stuart Low, iſt eine wundervoll gefärbte Hybride zweier Odontioden, nämlich Oda. Schroederae und Oda. Lambeauiana.

Bei dieſer Odontioda, die ebenfalls bei Low entſtand, ſpricht ſich die Formenſchönheit der Odontoglossum=Eltern beſonders gut aus. Sie trägt den Namen Oda. Crethus var. Monarch.

Japaniſche Kiefern, Pinus denſiflora

Im Januar

KARL FOERSTER / IMMERGRÜNES BODENLEBEN IM WINTER

WENN der Schnee nach langer ſtarker Kälte verſchwunden iſt, die Erde uns wieder hat und die immergrünen Bodengewächſe unverſehrt ihre kleine Augenmuſik entfalten, fühlen wir uns immer merkwürdig von all der zarten Buntheit und Mannigfaltigkeit dieſes kleinen Winterlebens erfriſcht.

Im reich erfüllten Garten umgibt uns allmählich eine wahre Unendlichkeit kleiner immergrüner Pflanzen. Eigentlich iſt es ein grandioſes Gartenzeitalter, in das wir Günſtlinge und Prügelknaben der Weltgeſchichte gerade hineingeraten ſind: ſelbſt in unſere winterlichen Gärten dringen wahre Fluten neuartiger immergrüner großer und kleiner Schmuckgeſtalten.

Die Beziehung zur immergrünen Winterwelt beſchränkt ſich freilich bei den meiſten auf den Tannenbaum: »Du grünſt nicht nur zur Sommerzeit«.

Neulinge können die tiefe Schätzung immergrünen Bodenlebens, das ja im größten Teil Deutſchlands nur während ſehr begrenzter Zeit vom Schnee zugedeckt liegt, anfangs nicht recht verſtehen, entwickeln ſich aber erfahrungsgemäß meiſt in wenig Jahren zu der gleichen Einſtellung, der es nicht einmal genug iſt, die Pflanzen im Garten oder vom Fenſter aus zu ſehen, ſondern zur Gewohnheit wird, auch in der Wohnung immer Vaſen und Schalen mit dieſem vieltönigen vielgeſtaltigen Leben beſetzt zu halten, das Gartenfremde meiſt dem Winter kaum zutrauen wollen. Wer in ſeinem Gartenleben hierfür keinen Sinn hat, an den ſind auch Unermeßlichkeiten der winterlichen Wildnis-Schönheit verſchwendet. All dieſe neueren Gartendinge wollen etwas von uns; ſie gehören irgendwie zur Entwicklung unſerer Stellung zum Weltſinn des Winters.

Der Marmor des Winters wartet auf den Pygmalion, der ihn ans Herz nimmt und zu geheimnisvollem Leben erweckt; das Naturherz ſo vieler iſt zu klein und zu wenig glühend; ihr Verhältnis zur Winternatur, deren Schönheitsgipfel in milden ſchneeloſen Zeiten liegen, beſteht überwiegend im Warten.

Vor mir ſteht eine Schale mit eigenartig herrlichen Blättern und Blüten der frühen, hochgeſtielten, roſaweißen Schneeroſe, Helleborus altifolius, mit grünen Wedeln des Schildfarns und ein paar Zweigen des ſtachelloſen breitblättrigen Lorbeer-Ilex, wohl der ſchönſten und wichtigſten aller Ilexformen. Die matte Winterſonne verſucht ſich an dem Strauß und der Strauß am Menſchen; eine dunkle kosmiſche Ahnung ſteigt aus dem Anblick auf und erſchließt verborgene Lebensadern und Verwandlungen der Winternatur, Labyrinthe uralter Wechſelbeziehungen zwiſchen Süd und Nord. Winter wird uns allgemach wie ein neuentdecktes Nordland, unterirdiſch mit ſüdlichen Pflanzenkräften der Welt verbunden.

Eine Überblicksliſte über die ſechs Hauptgruppen kleinen und zwergigen immergrünen Lebens der Gärten wird an anderer Stelle gegeben. Hierin werden frühere Aufzählungen ergänzt und bereichert. Zuvor noch einige Eindrücke aus mancherlei Wintertagen und Beobachtungen an den Pflanzen der Bilder.

Mit Recht wird ein großer Unterſchied zwiſchen Immergrün und Wintergrün gemacht, doch iſt die Grenzlinie nicht ſo einfach zu ziehen. Wintergrün bedeutet, daß ſich das grüne Laub gewöhnlich bis Anfang oder Mitte Februar hält, dann unſcheinbar wird oder abfällt. Dieſer Vorgang iſt ſehr ab-

Der winterharte, gelbweißbunte Schmuckepheu Hedera helix albo-marmorata gehört zu den völlig winterfeſten ſeiner Art, deren Gartenzukunft groß iſt. Neue Farbenſchönheiten und Formenvarianten laſſen wechſelſeitig Form und Farbe ſehr viel ſtärker hervortreten.

Pyracantha coccinea in reichlich fruchtender Sorte als Pfeilerbekleidung. Der immergrüne Feuerdorn hat vier große Verdienſte: Immergrün, Blütenſchmuckſtrauch, König der Beerenſchmuckſträucher, Lenkbarkeit der Wuchskräfte durch Schnitt; ſomit guter Wandſchmuckſtrauch.

hängig von der Beſonderheit der klimatiſchen Lage, der Art des Winters und der Eigenart jeweiliger Gartenplätze. Dieſelbe Pflanzenart verhält ſich hierin oft in ihren einzelnen Unterarten ſehr verſchieden. Eine Helianthemumart, etwa lunulatum, ſieht ſchon im Dezember vergilbt aus, während polifolium ein Winterſchmuck iſt und nur bei ſchwerer Kälte welk ausſieht. Die Schneeroſen unſerer Alpen, Helleborus niger, ſind im vollſten Sinne immergrüne Gewächſe, während Helleborus hybridus kleinaſiatiſcher und kaukaſiſcher Herkunft bei rauher Lage und ſchwerem Winter in ſeinem alten Blattwerk gegen Ausgang Winter unanſehnlich werden kann, was natürlich nicht hindert, daß in milden Gegenden ſeine großen winterlichen Blattbüſche ſo ſchön wie kleine Rhododendron wirken können.

Viele Saxifragen aus der Decipiens-Gruppe, die überhaupt mit Vorſicht zu genießen iſt, bieten keinen beſondern Winteranblick, während andere wie leptophylla und Kingi unglaublich ſchönes Winterlaub behalten. Die gewöhnliche Walderdbeere beſitzt oft Ende Winter keinen ſchönen Laubbehang mehr, beſonders nach mehrjährigem Wachstum an gleicher Stelle, während mit der rankenloſen Monatserdbeere weſentliche immergrüne Schmuckwirkungen zu erzielen ſind. Campanula perſicifolia hat keine beſondere wintergrüne Schönheit, während die ihr ſo ähnliche Campanula grandis mit ihren kraftvollen ſternigen Blattſchöpfen den Winter hindurch von hohem Reiz des friſchen Grüns bleibt.

Der blaue Schwingel, Festuca glauca, bei ſpäter Pflanzung froſtempfindlich, ſonſt nie, und F. punctoria, der Libanon-Schwingel, etwas empfindlich gegen alleräußerſte dauernde Dürre, ſonſt unempfindlich, gehören zu den verhältnismäßig wenigen Koſtbarkeiten der immergrünen und ſo ornamentalen Gräſer.

In manchen Winterzeiten bringt jeder Tag in der verwirrenden Fülle des Steingartengrüns neue Eindrücke. Am erſten Tage nach dem Wegſchmelzen des Schnees war das Wetter grau und mild, am folgenden kam das Spiel des Sonnenlichtes dazu, dann gab es am nächſten Tage ein paar Rauhreifſtunden; der Rauhreif verſchwand ſchnell wieder und alles Grün träumte in der Mittagsſonne vom Sommer und von milderen, nicht mehr wetterumdrohten Zeiten. Schon vier Stunden danach lag das ganze Steingartenlabyrinth in fremder unerwarteter Stimmung zart verſchneit unter blaugrauem Himmel. Man kann es nicht im Gedächtnis halten, welche Formenſchönheiten und zierlichen Spitzengewebe, wieviel neue Ausdeutungen aller Linienreize leichter Schneefall all dieſem kleinen Leben hinzubringt. Man ſtaunt vor jeder kleinen Pflanzengeſtalt neu, was ſie mit dem Schnee und der Schnee mit ihr anzufangen wußte. Es bleibt einfach phantaſtiſch, zu welcher unabſehbaren Fülle und Verſchiedenartigkeit kleiner Erlebniſſe das Setzen jeder Pflanzenart im Steingarten den Grundſtein legt. Das war wirklich nicht zu erwarten, daß das immergrüne Tüpfelfarn auf leichten Schneefall mit derartig kleinen komiſchen und köſtlichen Gebärden antworten würde. Die Zwergberberis aus Feuerland, Berberis buxifolia nana, ſieht im Rauhreif rührend aus. Ein Bild kann keinen Eindruck davon geben. Im Laufe des Winters geht ihr Grün allmählich ins Bräunliche über.

Helleborus niger praecox, die frühblühende Schneerose, blüht schon im Anfang Oktober auf, umgeben von Herbstveilchen. Vorläufer- und Nachhut-Arten und Sortenzüchtungen eines Blütengewächses scheinen die Bedeutsamkeit des Hauptfestzuges immer sehr zu unterstreichen.

Im frühesten Vorfrühling wird sie hierdurch ein schöner Farbennachbar des zwergigen Goldlackkrokus. Viele wintergrüne Gewächse ändern fast jeden Monat ihre Farben. Vom kanadischen Teppich-Wachholder könnte man fast jeden Monat ein Bild geben. Der weißbunte Efeu, der hier an einer Steingartenwand kletternd abgebildet ist, kommt auf immer neue Einfälle, an denen sich jedes Blatt beteiligt. Die Verteilung von Gelbweiß und dunklem Grün, durchflossen von dem zarten Geäder haben an jüngeren und älteren Sprossen ganz verschiedenen Charakter. Dieser weißbunte Efeu ist völlig winterfest. Man sollte ihn an Wänden, mit dem rotbraunen, ganz zierlich gefingerten vereinigen. Auch in den oben genannten wintergrünen Schalen spielen ihre kleinen Ranken eine Rolle. Man könnte sein ganzes Leben in Efeu und Wachholder mit ihrem Reichtum an Schmuckformen zubringen und hätte auf Jahrzehnte mit der Klärung dieser Gartenschätze zu tun. Den kleinen Zwergefeu Hedera conglomerata, der ein paar Jahre Zeit zu seiner vollen Schönheitsentwicklung braucht, hat man auch an alle möglichen, verschiedenen Gartenplätze zu setzen, um Begriffe seiner vielen Wirkungsmöglichkeiten zu gewinnen.

Gräser können eigentlich nur bei Rauhreif photographiert werden. Die höhere Schwingelart, Festuca glauca, und die niedrige F. punctoria aus dem Libanon halten sich mit allen Vorteilen und Nachteilen ungefähr die Wage.

Ein noch viel wirksameres und größeres blaues Staudengras ist Avena sempervirens, das hohe feinblättrige Gras, für dessen Pflanzung im Garten es so vielerlei Vorwände und Motive gibt. Es wächst nur zu allererst etwas langsam. Im November sah ich einen ganzen blaugrünen Zedernwald mit den großen blaugrünen Horsten jenes Grases unterpflanzt, dessen Farbenwirkung durch nichts zu ersetzen wäre. Das war an einem Ort auf der geograpischen Höhe von Wien, zwei Stunden von der Norsee entfernt, nämlich in Paris und zwar in dem riesigen japanischen Garten eines Bankiers. In der immergrünen Fülle dieses Gartens ging man zwischen mächtigen Heidekräutern und endloser anderer fremdartiger Üppigkeit im November wie in einem subtropischen Paradiese umher, in das aber die Fenster einiger Pariser Mietskasernen hineinblickten. Dies war der schönste immergrüne winterliche Garten, den ich je sah.

Er befestigte wieder einmal von ganz neuer Seite her so recht das Gefühl in mir, daß eigentlich fast durch ganz Europa hindurch die Pflanzenschönheit der landläufigen Gärten, Parks und Wälder, Alleen und öffentlichen Anlagen, so wie sie heute ist, sich zu der Schönheit und Fülle, die fast überall entfaltet werden könnte, etwa wie Eins zu Tausend verhält.

Mancher könnte vielleicht sagen: Die Welt ist doch so wahnsinnig schön, auch schon so, wie sie ist; nun laßt doch mal erst den Leuten Zeit, die Schönheit dieser Welt richtig zu verdauen. Man kann ja noch nicht einmal mit einem

Aspidium angulare proliferum gehört mit seinen genannten Varietäten zu den auffallendsten Wintergestalten unter allen Farnen. Sehr alte Pflanzen bedecken in üppiger Entfaltung mitunter noch mehr als einen Quadratmeter.

Polypodium vulgare, den immergrünen Tüpfelfarn, braucht man als ſtille ſchlichte Zwiſchenpflanzung neben ſchönſte Pflanzen. Er ward im Spätherbſt photographiert, als immer noch Corydalis lutea blühte, ſieht aber jetzt im Winter durchaus nicht anders aus.

Avena sempervirens, ſeiner nichtwuchernder Strandhafererſatz, iſt mit ſeinen großen blaugrünen Büſchen unerſetzlich auch im Winter. Man ſieht ſich ſchnell und unerklärlich in ſolche Naturgebilde ein, zumal bei ſo wenig Winterunterbrechung ihres Reizes.

kleinen winterkahlen Sauerkirſchbaum fertig werden, der im nächtlichen ſternerhellten, leicht verſchneiten Garten ſteht und ſeine Krone wie ein rätſelhaftes Formen- und Liniengedicht dem Himmel darbietet, als wäre es ein tibetaniſcher Tempelbaum, an dem nur noch die Gebetrollen fehlen. Zugegeben, daß in allen ſchönen Dingen viel mehr Schönheit ſteckt, als wir je herausholen können, ſo trifft es doch auf keinen Fall zu, daß wir durch größere Naturſchönheit verwöhnt, ſchlichtere weniger ausſchöpften. Es gibt im Gegenteil überhaupt gar kein ſtärkeres Mittel, die Freude an der bereits entfalteten Weltſchönheit zu entflammen, als dies Treiben und Streben, die Welt noch tauſendmal ſchöner und reicher zu machen.

Das Tüpfelfarn-Bild ſtellt dieſen kleinen Farntrupp neben einem Horſt Schneeheide dar. Die beiden kleinen immergrünen Pflanzenhorſte ſtehen da ohne einen Handgriff von Pflege an ſehr dürrer, prallſonniger Stelle ſeit acht Jahren.

Die immergrünen Arten der Felſenmiſpel ſind ein außerordentlicher Winterſchmuck, aber keine behält den Reiz roter Beeren zwiſchen dem Immergrün ſo wie Dammeri. Ganz unerſetzlich und hart bis auf die Knochen iſt gleichfalls Cotoneaster congesta, der im Schwarzweißbilde dargeſtellt iſt, wie er mit ſeinen flachen Zweiggeſpinſten eine Steinwand überzogen hat, an der er auch bald ein Jahrzehnt lang ſteht. Von Cotoneaster microphylla ſind Varianten in noch zierlicherer Verzweigung erzogen worden.

Die zwergige feuerländiſche Berberis buxifolia nana gehört zu den vielartigen, ſo wichtigen zwergigen immergrünen Berberis, deren drei bis vier Arten echtes Steingartengut ſind.

Man mag noch ſo lange aufmerkſam mit der Pflanzenwelt der Gärten und Wildniſſe leben, immer wieder ſieht man bekannte Pflanzen an Plätzen in beſtem Wohlſein, an denen man ihr dauerhaftes Gedeihen nicht für möglich gehalten hätte. So hat ſich bei mir Aspidium angulare proliferum, das ich früher für ziemlich ſonnenſcheu hielt, ſeit Jahren in ziemlich prallſonnigen Steinfugen eingeniſtet, in denen es allerdings Spielraum zu tiefem Einwurzeln hat. Das Erforſchen ſolcher unerwarteten Pflanzenkräfte bildet einen ewigen Reiz alles Gärtnerns und Botaniſierens.

Winter im Pruhonitzer Park

V. NOHL / DIE PALMEN AUF DER MAINAU

Palmen und nordiſcher Winter! Jeder Pflanzenfreund muß bei dieſem Anblick von Mitleid erfüllt ſein; dabei iſt der Schnee noch nicht das Schlimmſte, den ſchütteln die Bäume ab, wenn er ihnen zu läſtig wird, aber unſere Winterkälte mit bis zu 16 Grad iſt eine ſtärkere Heimſuchung für dieſe Kinder ſüdlicherer Zonen.

Sechs Winter haben ſie ſchon über ſich ergehen laſſen müſſen, und wenn ſie auch tapfer ausgehalten haben und kräftig weiter treiben, blühen und ihre großen ſtahlblauen Fruchttrauben ausbilden, ſo haben ſie doch von ihrer früheren Schönheit eingebüßt und einen großen Teil ihres früheren mächtigen Blätterſchmuckes verloren.

Sie hatten einmal beſſere Zeiten geſehen; die erſten wurden vor ungefähr 60 Jahren ausgepflanzt. Alljährlich wurde im Herbſt über ſie ein Glashaus mit Heizung gebaut, das im Laufe der Jahre mit ihnen wuchs, bis es zuletzt bei einer Grundfläche von 28 Meter im Geviert eine Höhe von über 12 Meter erreicht hatte. Unter dieſer mächtigen Halle hatten dann noch ein Hain Orangen, verſchiedene andere Palmen, Eucalyptus, empfindlichere Bambuſen, Magnolia grandiflora und anderes im freien Grunde Platz und winterlichen Schutz gefunden. Als nach dem Umſturz die Koſten für den alljährlichen Aufbau dieſes Schutzhauſes zu groß waren, mußte man ſich ſchweren Herzens dazu entſchließen, die Pflanzen ohne Schutz dem Winter preiszugeben. Nur eine große Phoenix canarienſis, ein Prachtſtück von neun Meter Höhe und ebenſolcher Breite, wird noch weiterhin eingedeckt.

Schon im erſten Winter zeigte es ſich, daß die kleinen Phoenix und die prächtigen Chamaerops humilis, die Brahea Roezli und Jubaea spectabilis, der Kälte nicht gewachſen waren; ſie waren erfroren und mußten entfernt werden, ebenſo wie die alten Orangen, deren Stelle jetzt über 60jährige drei Meter hohe Fuchſienbüſche ausfüllen. Die *Trachycarpus (Chamaerops) excelsa*, die bis zu einer Höhe von nahezu zwölf Meter herangewachſen waren, haben bis heute tapfer ausgehalten. Wie lange noch? Einſtweilen dürfen und wollen wir uns noch ihrer freuen und können wir ſtolz ſein auf den Beſitz der weitaus größten Freiland-Palmen in Deutſchland. Ein Blick vom Roſengarten aus auf die dunkeln Cypreſſen, auf die breite raſengeſchmückte Terraſſe und die dahinter hervorragenden Palmen zeigt tatſächlich ein Bild aus dem ſonnigen Italien.

Die Palmen ſind abwechſelnd männliche und weibliche Exemplare; unter letzteren geht der abgefallene Samen oft in dichtem Teppich auf; auch von den Vögeln verſtreuter Samen keimt hier und dort in den Gebüſchen, wo die jungen Pflänzchen einige Jahre gedeihen, bis ſie über die winterliche Laubdecke herausgewachſen, dem Froſt zum Opfer fallen. In der Gärtnerei wurden früher alljährlich eine Anzahl dieſer jungen Chamaerops herangezogen, die nach vier- bis fünfjähriger Topfkultur zu Dekorationszwecken im Garten ausgepflanzt, dann im Herbſt wieder ausgegraben und nach kräftigem Beſchneiden der Wurzeln froſtfrei eingeſchlagen werden. Das ertragen dieſe Chamaerops recht gut, machen dabei feſte Ballen und bilden dichtbelaubte kräftige Pflanzen; die paar Dutzend, die uns nach dem Umſturze geblieben ſind, werden bis heute ebenſo weiter behandelt; die größeren, drei bis vier Meter hohen, kommen über Winter in den Schloßkeller, wo ein Bretterkaſten um den Ballen genagelt und mit Erde eingefüllt wird, und wo ſie im Dunkeln bis Mai aushalten. Andere Palmen laſſen ſich eine ſolche Behandlung aber nicht gefallen, dagegen werden Lorbeer, Phormium und Bambuſen ſo behandelt, wodurch wir die hohen Koſten für die Pflanzenkübel erſparen.

Eine ſehr intereſſante Erſcheinung iſt die rapide Stammbildung bei unſerem großen *Phoenix canarienſis*; nachdem er bis zu ſeinem 55. Jahre den typiſchen ananasähnlichen Strunk bewahrt hatte, ſchiebt er ſeit drei Jahren ſeinen Stamm hoch und zwar um ungefähr 50 Centimeter im Jahr, ſodaß er nun ſchon bis zum Anfang der Wedel eine Höhe von 3,20 Meter erreicht hat, bei einem Durchmeſſer von einem Meter am Fuße und 70 Centimeter am Anfang der Krone; zugleich mit der Stammbildung ging die Größe der Wedel zurück, die früher eine Länge von fünf Meter hatten und jetzt nur noch vier Meter meſſen.

GURNEY WILSON / CATTLEYEN-HYBRIDEN

Es war Dr. John Harris aus Exeter, der Dominy auf die Möglichkeit, Orchideen-Hybriden hervorzubringen, hinwies und ihm die in der Blütenſäule gelegenen reproduktiven Organe erklärte. Dominy, der bei Veitch angeſtellt war, begann 1853 ſein Werk mit Cattleya. Sechs Jahre ſpäter wurde als ſein erſtes Erzeugnis Cattleya-hybrida (C. guttata mit C. Loddigesii) gezeigt. Seit dieſer Zeit hat man ſich ſtändig die Anzucht von Orchideen aus Samen angelegen ſein laſſen. Die Tauſende der beſtehenden Rekorde bezeugen alle das große bisher von vielen Wiſſenſchaftlern und Männern der Praxis durchgeführte Werk. Es dauerte nicht lange, bis Dominy's erſtem Erfolge beſſere Ergebniſſe folgten; mehr Sämlinge wurden von jeder gemachten Kreuzung erzogen, und die Blumen zeigten Vervollkommnung in Bezug auf Größe

Cattleya Mossiae Earl Leofrie

erzeugt, wenn diese mit anderen Blumen gekreuzt wird, die gelbe Petalen und Sepalen haben. Sehr befriedigende Ergebnisse wurden erzielt bei C. Iris (C. aurea mit C. bicolor) und C. Venus (C. aurea mit C. Iris), bei welchen beiden die Blumen gelbe Blütenabschnitte und karmesinpurpurne Lippen haben. In neuerer Zeit sind verschiedene andere Hybriden mit besserem Erfolg erzogen worden, doch es bleibt noch beträchtlich viel zu tun, ehe man wirklich eine große gelbe Blüte erreichen wird.

Mit Rücksicht allein auf die Farbe kann man Cattleyen in drei Gruppen einordnen: erstens solche mit typisch gefärbten Blüten, bei denen alle Abschnitte farbig sind; zweitens solche, bei denen die Sepalen und Petalen ihre Farbe verloren haben und reinweiß sind; drittens solche, bei denen die ganze Blüte reinweiß ist, mit Ausnahme von etwas Gelb in der Röhre oder dem zentralen Teil des Labellum. Hybriden, die zu der ersten dieser Gruppen gehören, wurden bereits besprochen.

Gruppe 2. Fast alle großblumigen Cattleya-Arten haben Varietäten mit weißen Sepalen und Petalen geliefert. Wenn diese mit C. aurea gekreuzt werden, so tragen die sich daraus ergebenden Sämlinge Blumen mit weißen Sepalen und Petalen. Auf diese Weise erhielt man Cattleya

und Bau. Fast alle Hybriden dieser Frühzeit wurden mit Eltern gemacht, die purpurfarbene Blumen tragen. Es finden sich darunter so wohlbekannte Hybriden, wie Cattleya intertexta (C. Mossiae mit C. Warneri), C. Portia (C. Bowringiana mit C. labiata) und C. Enid (C. Mossiae mit C. Warscewiczii). Diese alle wurden bei ihrem ersten Blühen von den Liebhabern der damaligen Zeit für gute Ergebnisse erklärt, und die Pflanzen wurden zu lohnenden Preisen verkauft.

Die schöne Cattleya aurea jedoch, mit ihren gelb gefärbten Petalen und Sepalen und ihrer karmesinpurpurnen Lippe ist immer eine der beliebtesten Pflanzen der Hybridisateure gewesen. Sie wurde mit allen erreichbaren Arten der Gattung gekreuzt, in der Annahme, daß ihre gelben Blütenabschnitte bei den Sämlingen wieder auftreten. Das aber geschah nicht. Die Ergebnisse bewiesen, daß C. aurea mit solchen Arten wie C. labiata und anderen purpurn gefärbten nur purpurfarbene Blumen erzeugt, solche wie Cattleya Hardyana (C. aurea mit C. Warscewiczii) und C. Fabia (C. aurea mit C. labiata), bei welchen beiden die Abschnitte mauvepurpurn sind, aber viel lebhafter, als das Purpur bei labiata und Warscewiczii ist. Dieses Aufleuchten des Purpur ist dem Einfluß des Gelb der C. aurea zuzuschreiben, was auch bei vielen anderen Hybriden beobachtet wurde. Gelb blühende Hybriden von C. aurea werden nur dann

Odontoglossum Dora

Warscewiczella discolor

Fabia durch Kreuzung von C. aurea mit einer Varietät der C. labiata, die weiße Sepalen und Petalen hat, Cattleya Hardyana durch Kreuzung der C. aurea mit C. Warscewiczii (C. gigas) mit weißen Sepalen und Petalen, und als drittes Beispiel dieser Form Cattleya Maggie Raphael alba (C. aurea mit C. Trianae alba). Bei allen diesen Hybriden hat sich das reich gefärbte Labellum der C. aurea vererbt. Wir gehen nun über zur Betrachtung von Hybriden, deren beide Eltern weiße Sepalen und Petalen haben. Zwei wohlbekannte Arten, die diese Variation zeigen, sind C. Mossiae var. Reineckiana und C. Warscewiczii var. F. M. Peyrodt. Die eine wurde mit der anderen gekreuzt, und die daraus hervorgegangenen Sämlinge sind als C. Enid alba eingetragen worden. Sie bringen große Blumen mit weißen Sepalen und Petalen und einer gefärbten Lippe. Verschiedene andere Cattleya-Hybriden mit ähnlichen Kennzeichen sind noch erzogen worden.

Gruppe 3. Varietäten, bei denen die ganze Blüte reinweiß ist, werden von Liebhabern sehr geschätzt. Es ist schade, daß für die Benennung keine Einheitlichkeit angenommen wurde, denn obgleich solche Namen wie Cattleya labiata alba, C. Trianae alba und C. Mendelii alba doch deutlich eine reinweiße Form anzeigen, so fehlt solche Angabe, wenn wir zur weißen Varietät der C. Mossiae kommen, die aus irgend einem unerklärbarem Grunde auch weiterhin als C. Mossiae Wageneri geht. Von diesen Albinoformen der wohlbekannten Arten sind eine ganze Reihe reinweißer Hybriden erzeugt worden. In den meisten Fällen hat ihnen die Hybridennatur eine viel kräftigere Konstitution verliehen, als wir sie bei den Eltern beobachten. Jeder, der versucht, C. Mossiae durch eine Reihe von Jahren hindurch zu ziehen, weiß sehr wohl, daß diese Pflanze zurückgeht und schließlich stirbt. Aber mit den Hybriden ist es nicht so, wie dies durch die Erzeugung von C. Düsseldorfei (C. intermedia mit C. Mossiae) 1906 bewiesen wurde, von der reinweiße Varietäten häufig zu großen Exemplaren erzogen worden sind.

Laeliocattleyen. Wir kommen jetzt zu einer größeren und sehr populären Klasse von Hybriden, die als Laeliocattleyen bekannt sind. Die Gattungen Laelia und Cattleya sind sehr eng verwandt, botanisch unterscheiden sie sich dadurch, daß die erste acht, die zweite nur vier Pollinien hat. Wenn nun auch jeder leicht zugeben wird, daß die Gattung Laelia Arten von geringerem Schmuckwerk enthält, als man sie gemeinhin bei Cattleya findet, so bildet doch Laelia purpurata eine wichtige Ausnahme mit ihren großen Scheinbulben und ihrer mehrblütigen Ähre. Ihre üppige Tracht erklärt, weshalb sie der

Brassocattleya Apollo

Odontioda Juno var. Regina

Brassolaeliocattleya The Baroness (B.-C. Mrs. J. Leeman mit L.-C. Ophir). Brassavola-Hybriden kann man erlangen mit reinweißen Blüten, mit verschiedenen Abtönungen von Gelb und in mauve und purpurnen Färbungen. Für die Kultur dieser eigenartigen Pflanzen braucht man stärkeres Licht, als man gewöhnlich den Cattleyen und Laeliocattleyen gibt, sonst ist die Behandlung die gleiche. In den Vereinigten Staaten ergeben die Brassavola-Hybriden mehr Blumen als bei der Kultur in Europa, und dies ist ganz und gar durch die stärkere Lichtintensität der Atmosphäre bedingt, die während der Herbstmonate vorherrscht, wenn die Pflanzen ihre Scheinbulben ausbilden und ausreifen müssen, um die Erzeugung von Blütenknospen anzuregen.

Vater so vieler älterer Hybriden war, denn ihre Samen keimen willig. Laeliocattleya Dominiana (L. purpurata mit C. aurea) und Laeliocattleya callistoglossa (L. purpurata mit C. Warscewiczii) umfassen zwei der bestbekannten Hybriden dieser Klasse. Es sei hier auf eine Varietät der L. purpurata mit weißen Sepalen und Petalen verwiesen, denn wenn diese mit verschiedenen Cattleyen ähnlichen Charakters gekreuzt wird, so tragen die sich ergebenden Sämlinge ebenfalls weiße Sepalen und Petalen. Als bemerkenswertes Beispiel sei unter anderen Laeliocattleya Canhamiana alba (L. purpurata mit C. Mossiae) erwähnt.

Es gibt noch einen anderen wichtigen Grund, weshalb die Gattung Laelia so häufig gebraucht wird, und zwar wegen der verschiedenen sehr intensiv gefärbten Arten, die sie enthält, obgleich die Blüten verhältnismäßig klein sind. In dieser Hinsicht hat sich L. cinnabarina als von beträchtlichem Werte erwiesen, und hat als Mittel zur Erzeugung vieler Hybriden gedient, die rötliche Blüten bringen. Als Beispiele möchten wir erwähnen Laeliocattleya Charlesworthii (L. cinnabarina mit C. aurea) und L.-C. Hippolita (L. cinnabarina mit C. Mossiae), welche beide äußerst schmuckvoll sind; die aufrechte Ähre trägt mehrere reich gefärbte Blumen. Ein anderer Vertreter der Gattung, von dem viele Hybriden erzogen wurden, ist Laelia tenebrosa; die bestbekannte ist Laeliocattleya luminosa (L. tenebrosa mit C. aurea). Ferner auch Laelia xanthina, deren gelbe Blüten vielfach zur Erzeugung gelbblühender Hybriden verwendet worden sind.

Es ist außerordentlich interessant, zu beobachten, wie häufig Hybridenzüchter gezwungen waren, die kleinblütigen Arten zu gebrauchen, um andere Farben als purpurn zu erhalten. Alle die reich gefärbten Odontioden wurden erzeugt durch die kleinen roten Blumen von Cochlioda Noetzliana. Alle die zahlreichen Sophronitis-Hybriden schimmernder Färbung wurden erzogen von den kleinen Blumen der Sophronitis grandiflora. Viele der Laeliocattleyen ausgesprochener Färbung stammen von Laelia flava mit ihren kleinen gelben Blumen, und auch von L. cinnabarina mit ihren zinnoberroten Blüten. Es scheint eine so leichte Sache, Hybriden einer gesuchten Farbe von diesen kleinblütigen Arten zu erzeugen, aber die Erfahrung lehrt uns, daß es sehr schwierig ist, Hybriden zu erhalten, die die volle Blumengröße von Cattleya besitzen und gleichzeitig die reiche Färbung des Laelia-Elters erben. Je mehr die Blüten der Sämlinge an Größe zunehmen, desto stärker ist die entsprechende Abnahme der Intensität der Farbe. Nur in seltenen Fällen tritt die gewünschte Vereinigung von Größe und reicher Färbung in Erscheinung.

Brassavola-Hybriden: In verhältnismäßig neuer Zeit ist eine sehr populäre Hybridenklasse erzeugt worden durch die Verwendung von Brassavola Digbyana. Das charakteristische Merkmal dieser mittelamerikanischen Art ist die ungewöhnlich große Lippe mit ihrem gefranzten Rande. Viele schöne Hybriden sind unseren Sammlungen hinzugefügt worden, die als Brassocattleyen, Brassolaelien und Brassolaeliocattleyen bekannt sind. Obwohl diese Hybriden in der Färbung etwas mangelhaft sind, so wird diese Schwäche mehr als ausgeglichen durch die große Gestalt der Blüten und ganz besonders durch die hübsch gefranste Lippe. Populäre Beispiele bilden Brassocattleya Mrs. J. Leemann (B. Digbyana mit C. aurea), Brassolaelia Helen (B. Digbyana mit L. tenebrosa) und

Sophronitis-Hybriden: Jeder, der Sophronitis grandiflora in Blüte gesehen hat, wird niemals ihre bezaubernden Eigenschaften vergessen. Obwohl ihre Blüten klein sind, so ist doch die Farbe ein glänzendes Scharlach. Es ist so ganz verschieden von dem irgend einer Cattleya. Durch mehrere Jahre war es mit großen Schwierigkeiten verbunden, Sophronitis-Hybriden aus Samen zu ziehen, und die zahlreichen Pflanzen, die es jetzt gibt, sind fast alle durch Vermehrung der wenigen Originalsämlinge erzeugt worden. Eine der populärsten ist Sophrocattleya Doris, erhalten durch Kreuzung von Sophronitis grandiflora mit Cattleya aurea. Die Blüten sind viel größer als die des Sophronitis-Elter und von einer angenehmen Scharlachfarbe. Außer den Sophrocattleyen gibt es viele Sophrolaelien, ein bekanntes Beispiel ist S.-L. Psyche, die als Eltern S. grandiflora und L. cinnabarina hat. Bei dieser besonderen Hybride ist die Farbe viel intensiver, als man sie gewöhnlich sieht, eine Folge des vereinten Einflusses der roten Farbe, die beide Elternarten besitzen, aber die Blüten sind von Durchschnittsgröße. Es gibt noch eine andere Gruppe in der Vereinigung von S. grandiflora mit verschiedenen Laeliocattleyen. Diese Hybriden sind bekannt als Sophrolaeliocattleyen und die Tatsache, daß etwa 160 verschiedene Kreuzungen eingetragen worden sind, beweist, daß eine beträchtliche Arbeit geleistet wurde, um eine große Blume von scharlach oder roter Farbe zu erzeugen. Die meisten der Sophronitis-Hybriden erzeugen willig junge Triebe von den in früheren Jahren gebildeten Scheinknollen, und lassen sich ziemlich leicht vermehren.

Lowiara: Im Jahre 1912 erschien eine neue Dreigattungshybride in Lowiara insignis. Sie war erzeugt worden durch Kreuzung von Brassolaelia Helen mit Sophronitis grandiflora und war das erste Beispiel einer Hybride, die aus den drei Gattungen Brassavola, Laelia und Sophronitis zusammengesetzt war. Der Name wurde gegeben in Übereinstimmung mit der Regel, daß multigenerischen Hybriden, also solchen, die mehr als drei Gattungen enthalten, ein rein konventioneller Name gegeben werden sollte, bestehend aus dem Namen einer Person, die sich als Forscher oder Züchter von Orchideen ausgezeichnet hat, wobei der Name mit der Endsilbe »ara« enden soll. Lowiara verewigt den Namen von Low, der solange in enger Verbindung mit der Orchideenkunde ist. Zwei andere solcher Hybriden sind seitdem in Lowiara Paul und L. aurata erschienen.

Potinara: Noch eine andere Gruppe multigenerischer Hybriden sei hier erwähnt. Sie sind zusammengesetzt aus den vier Gattungen Brassavola, Cattleya, Laelia und Sophronitis, und für alle diese Hybriden wird der Name Potinara gebraucht zu Ehren von Julien Potin, dem Vizepräsidenten der französischen Gartenbaugesellschaft. Die erste war Potinara Juliettae, eine Kreuzung von Sophrolaeliocattleya Marathon mit Brassocattleya Ena. Fünf andere sind seitdem eingetragen worden.

Es ist zu bedauern, das die Regel für die Benennung multigenerischer Hybriden mit Hilfe der Endung »ara« nicht früher angewendet wurde, denn dies würde so unvernünftig lange Namen wie Brassolaeliocattleya und Sophrolaeliocattleya vermieden haben. *(Uebersetzt C. S.)*

Während die Bilder der erſten Tafel vor allem die Einzelblüte zeigen ſollen, ſehen wir hier eine auffallend ſchöne Riſpe von Odontioda Chanticleer aus den Kulturen von Cowan & Co. Sie gibt uns eine deutliche Vorſtellung von dem Werte dieſer neuen Orchideenformen für die Schnittblumenkultur, wie auch als Schaupflanzen. Sie ſind bei uns noch recht wenig bekannt.

Auch Laeliocattleya Haſſallii alba iſt eine ſehr edle Züchtung, deren Eltern L.-C. Britannia alba und C. gigas Frau Melanie Beyrodt ſind. Die Kreuzung dieſer prächtigen Albino-Formen ergab eine Form mit alabaſterweißen Abſchnitten, deren durchſcheinende Reinheit im Bilde ſchwer wiederzugeben iſt. Die ſattrote Lippe hebt ſich wundervoll ab. Bilder C.S.

LEWIN=FUNCKE / GARTENPLASTIK

MEIN Nachbar ist ein sehr honetter Mann. Wir vertragen uns sehr gut. Aber eines kann ich ihm nicht verzeihen, das sind die Zwerge in seinem Garten. Wenn ich aus meinem Atelier hinausschaue, so sehe ich einen auf der Erde liegen mit der Zipfelmütze auf dem Kopf und der Pfeife im Munde. Daneben stehen und sitzen eine Anzahl anderer, schön bemalt und mit vergnügten Gesichtern. Dazwischen einige Häschen und sogar ein lebensgroßer Storch, der gravitätisch umherstolziert. Da diese ganze Bevölkerung mitten in der Wiese, auch von der Straße aus zu sehen ist, hat Publikus seine helle Freude daran. Und wenn einer inmitten ist, der Menschenkenntnis hat, so weiß er gleich, hier wohnt ein guter Mensch. Nur ich nehme Anstoß daran. Aber das ist wohl nur Futterneid, weil ich Bildhauer bin und weder Zwerge noch Hasen und Störche modelliere. Wenn ich Atelierbesuch bekomme, lenken die Zwerge das Interesse ab. Dann streifen mich mitleidige Blicke, und neulich drückte mir ein Freund im tiefsten Mitgefühl die Hand.
Sonst sieht man leider nur selten eine Plastik in all den schönen Gärten. Mein Nachbar ist so ziemlich der einzige Kunstfreund in unserem Villenort. Wie kommt das nur! Am Geldmangel allein kanns nicht liegen, denn eine kleine Pergola kostet mehr als eine gute Bronze, und ich sehe so viele Pergolen in den Gärten, und zu jedem Grundstück gehört eine Garage, und eine schmucke Chauffeurwohnung, und sonst noch manches Überflüssige.
Dicht in meiner Nähe liegt ein wunderschönes Haus. Breit gelagert in schönem, ruhigem Rhythmus. Mitten die Halle mit tief gehaltenen Fenstern. Stufen führen hinauf, davor liegt groß und in edlem Grün ein gepflegtes Rasenstück. Ich stehe draußen am schmiedeeisernen Gitter. Der Blick wird umschlossen von hohen Thuja, er gleitet über den Rasen zum Haus in seiner schönen Ruhe, ein warmes Gelb in dunklem Grün. Was fehlt noch in dieser Symphonie, was läßt mich nicht glücklich werden? Das Rasenstück schreit nach Plastik, nach der dunklen Bronze auf grauem Stein! Eine kleine, dunkle, leicht bewegte Masse, ein Punkt nur in dem Ganzen. Er fehlt, es ist eine Lücke. Das Bild ist nicht fertig, die Komposition hat ein Loch. Arm sieht der Garten aus, er ist leer. Eine lebensgroße Figur aus dunkler Bronze auf einem grauen Kalkstein inmitten des Rasenstückes würde das Ganze erst zusammenfassen, Halt geben, Distanz geben. Und eine stille Feierlichkeit könnte durch diesen Garten schwingen, die seinen Bewohnern, vielleicht unbewußt, einen neuen Lebensrhythmus geben würde. Wie arm sind doch die Menschen, die so reich sein könnten. Dies ist nur ein Beispiel von vielen. Ich weiß eine ganze Anzahl solcher Rasenstücke, die gut architektonisch angeordnet, doch ohne Haltung, ohne Stil sind, die leer scheinen, weil den Flächen das Herz fehlt. Der Mittelpunkt, von dem der Pulsschlag ausgeht, der dem ganzen Bild erst Leben gibt.
Wißt Ihr, wie schön es ist, am heißen Sommertag in einer schattigen Ecke des Gartens zu sitzen, wenn leise irgendwo ein Bächlein rieselt, ein Wässerchen tropft, wie das leise rinnende Leben in der Natur, in Bienensummen und Blättersäuseln das Menschenherz so ruhig und wunschlos glücklich macht? Durch das dunkle Grün schimmert geheimnisvoll ein zartes Weiß. Ich nehme die Zweige zur Seite: da steht der Lebensspender, der Brunnen in Marmorstein, dessen fließendes Wasser mein Herz erfreute, aus dessen Schale die Tropfen leise fallen. Nun lacht das Auge und labt sich an dem schönen Gebilde, am spiegelnden Wasserfleck, wie mein Ohr sich an der Musik des Wassers erfreute. Wo ist der schöne Brunnen, wo ist der Garten, der solche Schätze birgt? Selten, ach wie gar selten im deutschen Land!
Wißt Ihr, was ein Vogelplanschbecken ist? Nimm irgend einen flachen Zinkkasten, gib etwas Sand hinein und fülle ihn drei bis vier Centimeter hoch mit frischem Wasser. Dann stelle ihn nur auf den Rasen und warte ein wenig. Lange dauert es nicht am warmen Sommertag, dann kommen die Finken und Meisen, die Drosseln und die Zeisige und es beginnt ein lustiges Leben im neuen Freibad. Du weißt garnicht, daß soviel Vögel im Garten sind. Alle wollen baden, und sie zwitschern und hüpfen, daß es eine Lust ist. Rings herum jubiliert es dann in den Zweigen und dankt Dir für das frische Bad mit Vogelkonzert. Hast Du nun immer solch Bad im Garten, dann lieben Dich die Vögel und suchen Wohnung in deinem Garten, weil Du frisches Wasser für sie hast. — Ist das nicht ein köstliches Motiv für einen Bildhauer? Ein Vogelplanschbecken, das den Vögeln Wasser spendet und zugleich ein Kunstwerk ist, ein Schmuck und eine Freude für Mensch und Tier. Wäre das nicht auch schön und zugleich recht vorteilhaft für die armen Stadtmenschen, wenn in unseren öffentlichen Anlagen in den Städten solche Vogelplanschbecken aufgestellt würden? Wie doppelt dankbar ist der Stadtmensch für Vogelsang und Vogelspiel. Und etwas mehr Schmuck, Kunst in der Natur wird wohl auch als Wohltat empfunden werden. Dabei muß ich aber dankbar anerkennen, daß unsere Großstädte wohl erkannt haben, welche Wirkung auf Menschenseelen Skulptur ausübt. Wie eine gute, ernste Plastik gerade im Grünen, in öffentlichen Anlagen aufgestellt, seelische Heilkraft hat. Geht der Großstädter durch grüne Streifen, sieht er Gras und Bäume, so ist er schon in Feierstimmung, wird aufnahmefähig für die sakrale Wirkung der Kunst, die ja besonders stark in der Plastik ist. Da verblaßt der Schmutz und der Streit des Alltags. Wo man es gut mit der Masse meint, sollte man stärker bedenken, daß die Kunst zwar nicht satt, aber doch glücklich macht, und das letztere ist wohl doch das Entscheidende. »Glück« — »glücklich macht« — ja, macht die Kunst glücklich? Ich weiß es wohl, wer taub ist oder schlecht entwickeltes Gehör hat, was ungefähr dasselbe ist, der ist unempfindlich für Musik. Der Blinde schätzt die Malerei nicht, und für die Plastik fehlt den meisten Menschen das Organ. Raumgefühl und Tastsinn (der durch das Auge geht) sind selten entwickelt. Auch die seelische Einstellung für Plastik ist nicht so schnell gewonnen, wie die für Malerei, zu der die Natur, die wohlbekannte, leichter die Einführung gibt. Aber seht Euch nur mal in guter Stunde mit frischen Augen eine Plastik richtig an. Laßt den Blick über Höhen und Tiefen gleiten, fühlt Euch ein in die Melodien der Form, bald wird sie Euch lebendig in der Seele klingen.
Ihr Glücklichen, Ihr Besitzenden, die Ihr Gottes Land in Pacht habt und Euch im Garten eine Stätte des Friedens, der Freude und des heimlichen Glücks schaffen könnt, seht Euch einmal recht um in Eurem Reich! Ein rechter Garten verlangt nach Plastik. Irgend eine Stelle schreit danach. Ist das nicht der Fall, so taugt der Garten nichts. Es ist gar kein Garten, es ist ein eingefriedetes Feld, eine Ansammlung von Sträuchern, Bäumen und Blumen, aber kein Garten, der, richtig empfunden, immer ein heiliger Hain ist. Und in diesem heiligen Hain gebt der Kunst ihr Recht, laßt sie zu Euch sprechen. Bald werdet Ihr spüren, daß sie die Freuden Eures Gartens sammelt, konzentriert und steigert. Dann habt Ihr erst den rechten Garten. Und jede Blume wird schöner blühen.

F. VON OHEIMB / GARTENNOTIZEN

Die alte krumme Birke

UNSERE uralte krumme Birke am Steilhang hat letzthin der unerhörte Sturm wieder gesenkt.
Vor fünf bis sechs Jahren konnte man noch dicht am Hange aufrechten Hauptes unter ihr durchgehen, vor drei Jahren noch die Großen und jetzt vor dem Niederbruch die kleinen Enkel, und nun liegt sie auf diesem Stammteil ganz flach auf den Rasen und erhebt sich dann erst. An der Wurzel ist sie abgefault, also muß sie jetzt im Winter fort.
Sie war ein Wahrzeichen unseres Gartens in nächster Nähe des Hauses. Jeder Gartengast bewunderte den über anderthalb Meter haltenden, seidenweißen Stamm mit seinem kühn geschwungenen Halse, ihre Wurzeln am steilen Abhang standen in dauerndem Kampf mit Stamm und Krone, sie mußten immer fester und weiter nach Halt suchend um sich greifen, je größer und schwerer jene wurde, die in langen langen Zöpfen tief ins Tal herunterhing — eine alte Trauerbirke. So steht und stand sie in einem Lebenskampf von erster Kindheit an, denn der aus der natürlichen Achse heraufgebogene Stamm wirkte als Hebel, sein Gewicht drückte den Wurzelstock hoch. Wie einfach dagegen haben es senkrecht gestellte Genossen gehabt, sie konnten glatt fortwachsen.
Und trotzdem hat sie es zu Jahren gebracht. Bisher hatten ihre Wurzeln noch ihre Pflicht getan, nun aber war es zum Bruch gekommen.
Den Enkeln machte er immer Vergnügen, auf dem wagerechten und später erst aufbiegenden Stamm hinzuklettern und in letzter Steigung bis ans erste tiefe Astloch zu kommen, wo Herr und Frau Kleiber wohnten, denn der Stamm war vielfach hohl. Weiterhin waren verschiedene Nistkästen und Nisturnen angehängt und hatten anderen Federleuten als Kinderstube gedient. Die Kinder daraus waren längst erwachsen und selbständig und unterhielten sich längst anderswo, nur die jungen Wildtauben hoch oben freuten sich bei ihren ersten schwachen

Flugverſuchen des Haltes, des Ausruhens. Und die Eltern, die ſchon wieder an die zweite Ehe dachten.

Wir Menſchen können aber nur klagen. Wie wird uns gerade dieſer alte gute Freund fehlen, der Jeden und Jede immer nickend und rauſchend begrüßte, gleich von des Hauſes Tür her.

Nach langem ſtarren Winter ſtreckte er als erſter ſeine hellbräunlich ſeidenen Blättchen heraus und rief uns trüben beladenen Alten hell-leuchtend und glitzernd und froh zu: Wieder ein Frühling!

Rosa Moyesii

EINE der merkwürdigſten Roſen iſt die weſtchineſiſche Rosa Moyesii, die hier zu einem mächtigen über vier Meter hohen Strauch herangewachſen, äußerſt reich blüht und völlig hart iſt. Sie weicht von allen anderen Roſen durch ſehr zierliche, weit auseinander ſtehende, langgeſtielte Blättchen ab, die ziemlich ſchwach gezähnt, ſehr dunkelgrün dem ganzen Strauch etwas durchſichtig Schleierartiges geben. Dazu die zierlich langen wiegenden Zweige von ſchönem hellgrünen Glanz; man kann ſchon aus der Ferne die edle zarte Fremde in ihr erkennen. Und nun erſt die ganz unwahrſcheinlich gefärbten hohlen, ſechs bis neun Centimeter breiten Blüten! Altes ſchweres Kupfer bis in pompejaniſch Rot, zuletzt in metallblauen Velour übergehend, wird durch einen altgoldig orange leuchtenden Staubgefäßkranz in breiter Regelmäßigkeit unterbrochen und der noch goldigere Blütenſtaub lagert als Goldpuder im ganzen flachen Inneren, ſo daß die ganze Blüte wie überhaucht mit Goldſtaub ausſieht.

Die Blüten ſitzen mit kleineren und größeren Knoſpen vereint in dicken Büſcheln auf kurzen Stielen an faſt jedem fiſchgrätenartig von der Ranke ſenkrecht abgehenden Zweiglein. Die Mitte Auguſt reifenden Hagebutten ſind langgeſtreckte teleſkopiſche Röhren, nach der ſchwarzgrünen Spitze ſich leicht verjüngend, und färben ſich zitronengelb bis zinnoberroſtrot und hängen wie Schoten wippend und ſchwankend an den Spitzen. Auch ſie ſind völlig verſchieden von allen mir bekannten Roſenbutten.

Der Same ſcheint ſehr ſchwer zu keimen, und auch die Steckholzvermehrung iſt nicht ſo leicht, dagegen geht ſie in Veredlungen gut an und die jungen Triebe werden bald ſehr lang. Trotzdem darf man ſie durchaus nicht zu den Rankroſen zählen. In erſter Jugend ſind die Zweige dicht beſtachelt, aber ſpäter verliert ſich die Bewaffnung etwas, trotzdem iſt das Pflücken und Brechen der Zweige oft ein zweifelhaftes Vergnügen und erinnert den Knaben leicht an Heiderösleins Sprödigkeit. Die langgezogenen Blätter mit fünf Blattpaaren erinnern an gewiſſe Schotenſträucher oder Wieſenknopf und Pimpernellen, nur iſt der Ton dunkler, immergrüner.

Jedenfalls macht ſie mir und ſehr vielen unſerer Gartengäſte große Freude und bei ihrem freudigen Wuchern und ſtetig länger werdenden Trieben dürfte ſie ſehr bald ein Prunkſtück des Gartens werden. Sonniger Standort, das iſt wohl die einzige Bedingung, die ſie an ihren Pfleger ſtellt.

PAUL KACHE / DIE NADELHÖLZER IM HAUSGARTEN I

ES iſt, als ob manche Fachleute und ſo viele Gartenbeſitzer nichts wüßten von der Schönheit der immer lebenden, immer grünen Nadelhölzer. Gibt es doch Gärten in großer Zahl, in denen man nichts von Nadelhölzern findet, oder doch nur kleine, nichtsſagende Reſte dieſer ſo großen, formenſchönen und ſtolzen Familie. Man könnte das als ein ſicheres Zeichen auffaſſen, daß dieſe Gartenbeſitzer ſo gar keine Gemeinſchaft mit ihrem Garten haben, nicht mit ihm leben, ihn garnicht verſtehen. Unſere lange Winterzeit mit ihrer oft ſchweren Stimmung von Grau in Grau drängt geradezu nach einer beſonderen Ausgeſtaltung unſerer Gärten. Welch andere Melodie würde durch unſere Gärten klingen, wenn dazu mehr getan würde. Auch der trübſte, nebelumſponnene Spätherbſttag verliert ſeine entmutigende Stimmung, wenn die ſtrebenden Fichten und Tannen ihn zu durchdringen ſcheinen.

Spielt ein Sonnenſtrahl in den unendlich verſchiedenen Formenreizen unſerer Nadelhölzer, weckt er die zart abgeſtuften Farbentöne des Grüns, vergoldet er die oft ſo prachtvollen Bronzetöne des Winters noch feiner, läßt er daß Silberblau mancher Formen aufgleißen, dann bleibt die Gewißheit, daß doch alles noch lebt, nur in anderer Form.

Auch rein praktiſche Momente ſollten dazu führen, Nadelhölzer in wohlüberlegter Weiſe anzupflanzen. Das Vorhandenſein dieſer grünen Weſen im Winter macht den Garten wohnlicher. Sie können gleichſam die Wände des Zimmers darſtellen, denn durch die kahlen Laubgehölze kann jeder Vorübergehende ſchauen, wie durch ein offenes Fenſter. Wie leicht iſt es, eine Pflanzung von Nadelhölzern ſo zu geſtalten, daß ein Stück breiteren Fußpfades, ein ſonniger, ruhiger Sitzplatz, vielleicht ein Spielplatz durch dieſe Pflanzung einen völligen Abſchluß vor dem Auge Fremder erhält. Vielleicht iſt gerade die Offenheit, die in den meiſten Gärten herrſcht, der Grund, daß Garten und Beſitzer im Winterhalbjahr nichts voneinander wiſſen. Die unterlaſſene liebevolle Bearbeitung des Gartens wurde ſo ganz unbewußt der Grund zur Entfremdung zwiſchen Garten und

Wenn der Schnee ihre Form ſo weich umzeichnet, auch dann iſt die Omorikafichte eine der willkommenſten ihrer Art. Dieſe Gruppe ſteht im Pruhonitzer Park. – Bild C. S.

Dieſes hübſche Heidelandſchaft-Motiv iſt nicht irgendwo in der Heide weit draußen entſtanden. Es wurde mitten in der Großſtadt auf dem Sachſenplatz in Berlin-Weſtend künſtlich geſchaffen. – Bild Heydenreich

ſeinem Herrn, der ſein beſter und innimſter Freund ſein ſollte. Schwierigkeiten in der Anpflanzung bieten uns die Nadelhölzer keineswegs, haben wir es doch mit Gewächſen zu tun, die den Bodenverhältniſſen gegenüber ziemlich gleichgültig ſind. Extreme Verhältniſſe laſſen immer noch eine Anpaſſung des Brauchbaren zu. Das, was aber die meiſten Nadelhölzer verlangen: Feuchtigkeit im Boden, kann künſtlich gegeben werden. Auch die Froſthärte der üblichen und bekannten Vertreter iſt ſo ſicher, daß keine Befürchtungen über Winterſchäden beſtehen. Das Hindernis ſelbſt bietet der Menſch ganz allein, mit ſeiner Genügſamkeit, Unwiſſenheit oder Gleichgültigkeit.

Gewiſſe Schwierigkeiten ergeben ſich, wenn man an die Wahl der zu pflanzenden Nadelhölzer geht. Eine richtige Zuſammenſtellung der verſchiedenen Arten und Formen wird vielen Kopfzerbrechen machen, und in ſehr vielen Fällen wird die Löſung nicht allzu glücklich ausfallen. Eine ausreichende Kenntnis der ſpäteren Entwicklung der Pflanzen, ſowie ein perſönliches, ſicheres Gefühl und Empfinden dafür, wie die verſchiedenen Formen zuſammengefaßt werden müſſen, und wie und wo ſie gerade aufzutreten haben, iſt Vorausſetzung für eine glückliche Nadelholzpflanzung. Viele Beiſpiele zeigen uns, daß es damit recht mangelhaft beſtellt iſt, oder doch, daß man die Pflanzung nicht genügend durchdacht hat. Etwaige Fehler ſollten dagegen wiederum kein Grund ſein, von einer Pflanzung abzuſehen, vielmehr ſollten ſie Anlaß geben, den erkannten Übelſtand möglichſt bald abzuſtellen. Man könnte ſagen, daß glücklicherweiſe die meiſten Koniferen ſpäteren Änderungen, Verbeſſerungen ſehr geneigt ſind, da ſie mit wenigen Ausnahmen ſpäteres Verpflanzen willig annehmen.

Jeder Gartengeſtaltung müſſen natürlich gewiſſe Leitgedanken zugrunde liegen. Niemals wird eine Nadelholzpflanzung gut werden, wenn ſie in enger Gemeinſchaft mit Laubhölzern auftritt. Schon das grundverſchiedene Äußere ſpricht gegen die Verbindung dieſer Pflanzenformen. Dann wird der vom Wind gepeitſchte Zweig des Laubbaumes ſolange an die empfindlichen Jungtriebe der Nadelhölzer ſchlagen, bis dieſe kahl ſind und abſterben; zahlreiche Fichten, Tannen und Scheinzypreſſen können als Beiſpiele dienen. Nadelhölzer müſſen für ſich bleiben. Größere oder kleinere Geſellſchaften gleicher oder zuſammen paſſender Formen erhalten nicht nur ſo die natürlichſte Entwicklung, ſondern ergeben auch die allerbeſte Wirkung. Sie mögen in einem Gartenteil beherrſchend auftreten, im andern ganz fehlen. Das wird immer noch beſſer ſein, als wahlloſe, zerſtreute Anpflanzung.

Gleiche oder zuſammen paſſende Wuchsformen ſollen vereint ſein. Die Kiefer bleibt am beſten nur unter ihresgleichen. Sie wird überdies im Hausgarten nur in wenigen Formen auftreten. Fichten und Tannen bilden gute Gemeinſchaften, vertragen ſich recht gut, ſelbſt noch, wenn die locker geſtellten Äſte einer Gruppe ineinandergreifen. Auch die Hemlockstanne mag hierzu geſellt werden. Im Vordergrund, als Übergang zum Raſen, mag ſie ſehr wohl am Platz ſein und vermittelnd wirken. Auch mag man Hemlockstanne und Eibe vereinen. Doch hier ſoll dieſe im Vordergrund ſtehen und den Übergang zum Raſen geben. Allerdings kann es ſich nur um Eiben natürlicher Wuchsform handeln, ungeſchnittene Büſche. Am ſchönſten ſind ſolche, die weniger hoch als breit gehen. Schon in der Baumſchule ſollte man etwas auf ſolche freien Wuchsformen der Eiben achten. Gewöhnlich geſchieht das nicht. Lebensbäume und Scheinzypreſſen zeigen einen ziemlich gleichartigen Wuchs und bilden ſchöne Gruppen. Ihnen kann man wieder im Vordergrund die unten breit ladenden, wuchtigen Thujopsis beigeſellen. Die verſchiedenen Wacholderformen vertragen ſich noch am allererſten mit der Kiefer. Sie werden dort ihren ganzen Zauber entfalten, wo man eine möglichſt natürliche Pflanzweiſe im Charakter der Heideformationen anſtrebt. Lärchen kann man ihrer laubwerfenden Eigenſchaft wegen gelegentlich mit Laubgehölzen vereinen. Und doch wird man nur dort ihre volle Schönheit zur Geltung bringen, wo ſie in loſen Trupps vereint frei in großer Raſenfläche ſtehen, die unteren Äſte der Erde aufliegen, der Spitzenzweig ins Himmelblau hineinſtrebt. So kommt die oft wundervoll breitpyramidale Kronenform zum reſtloſen Ausdruck.

Das wären nur einige Hinweiſe auf die Möglichkeiten der Zuſammenfaſſung. Jeder mag ſie nach Ort und Neigung weiter verfolgen. Sicher wird mancher zu abweichenden Methoden kommen, doch das will nicht viel ſagen im Hinblick auf die verſchiedenen Wuchseigentümlichkeiten, die unſeren vielen Gartenformen eigen ſind. Dabei iſt ſtark ausſchlaggebend, ob es ſich um größere Gärten handelt oder um kleine. Die großzügige Wahl und Pflanzung, die im großen Garten möglich, unter Umſtänden erforderlich iſt, fällt fort im kleinen Garten. Hier muß die Wahl der beſten Formen viel genauer erfolgen, die richtige Pflanze viel treffender am rechten Ort ſtehen. *(Ein Schlußartikel folgt.)*

HANS HEYNECK / GROSSBLUMIGE CHRYSANTHEMEN

Mrs. Gilbert Drabble
Bild C. S.

JEDEN Herbſt und Winter entzückt uns der Formenreichtum der Chryſanthemen. Immer tritt uns darin Neues, Überraſchendes entgegen. Für den Züchter iſt es ſchon zuviel. Er kann nicht mehr jede Form auf Herz und Nieren, Verzeihung, auf Farbe, Blühwilligkeit, Widerſtandskraft, Winterhärte und ſonſtige für ihn wichtige Eigenſchaften prüfen. Die alljährlichen Neuheiten aller Länder kann man auf über vierhundert Sorten ſchätzen. Beſonders produktiv ſind darin England, Frankreich, Auſtralien und Nordamerika. Es iſt für einen deutſchen Züchter jetzt unmöglich, alle Sorten der erſten ausländiſchen Züchterfirmen zu prüfen. Dazu fehlt es ihm nicht nur an Geld, ſondern auch an Zeit und Raum. Holland iſt ja auch in der letzten Zeit mit Neuheiten hervorgetreten und hat eine ganze Reihe hervorragender Sorten auf den Markt gebracht. Von Holland aus hat man verſchiedene Sorten, die ſonſt nicht mehr im Handel ſind, von neuem »lanziert«. Im allgemeinen hat der holländiſche Gärtner nur ein kleines Sortiment; er zieht nur Sorten, auf die er ſich unbedingt verlaſſen kann, die im Herbſt beſtimmt ſeine Arbeit und Mühe in klingenden Lohn umſetzen. So iſt zum Beiſpiel eine der größtblumigen Sorten, die gelbe Mrs. Pulling, ſchon vor Jahren in den deutſchen Gärtnereien geweſen, aber erſt über Holland wurde ihr Wert erkannt, und jetzt war ſie ſozuſagen der Schlager vom Jahre 1924. Man findet ſie nun wieder in jeder Chryſanthemum-Gärtnerei. Das Jahr 1925 ſtand im Zeichen der edlen goldgelben Mme. H. E. Convers, die hier bereits im Farbenbilde (Band I, Seite 204a) gezeigt wurde. Ihren Wert als Handelsſorte entdeckten die Berliner. Bemerkenswert iſt, daß dieſe Sorte in Holland für Schnittblumen nicht gezogen wird. Für 1926 dürfte Miß Edith Cavell die beſte Sorte ſein. Sie wird ſeit einigen Jahren in Holland gezogen, und ich habe ſelten eine ſo vollkommene Sorte geſehen. Sie iſt ſehr wüchſig und geſund und bringt ſehr große ballförmige Blumen von bernſteingelber, auf der Außenſeite warm goldroter Färbung.

Bei gewiſſen alten Sorten ſcheint eine Wachstumsmüdigkeit, ein Nachlaſſen der Blühwilligkeit ſich bemerkbar zu machen, ſo bei der weißen Alice de Monaco und deren gelbem Sport Mme. Buron. Beobachtet man ſo etwas bei irgend einer Sorte, ſo empfiehlt es ſich, neue Pflanzen, ſeien es Mutterpflanzen, ſeien es Jungpflanzen, aus einer anderen Gegend zu beziehen.

Die deutſchen Erfolge in der Heranzucht neuer Sorten ſind nicht groß. Unſer Klima iſt für Samengewinnung zu ungünſtig. Meiner Meinung nach dürfte auch das engliſche Klima hierzu nicht ſehr geeignet ſein und England den Samen ſeiner Neuheiten aus Auſtralien oder von anderen Kolonien beziehen. Wir haben allerdings in Deutſchland eine ganze Reihe ſehr ſchöner und wertvoller Sports bekommen. Ich denke dabei an Sorten wie Ehrendame, Herbſtgold, Frau Helene Hauswaldt, Apfelblüte, Löbner, Berlin und viele andere. Einer der beſten Sports der letzten Jahre iſt die gelbe Queen Mary, genannt Princeß Mary. Man weiß nicht, welcher man den Vorzug geben ſoll, der weißen Queen oder der gelben Princeß.

Neben vielen minderwertigen ſind im Laufe der Zeit auch manche gute Sorten wieder verſchwunden, hinweggefegt vom nachdrängenden Heer der Neuheiten. Einige Sorten allerdings ſind geblieben und auch heute nicht zu entbehren, wie beiſpielsweiſe die ſtrahlenförmige, frühe roſa Rayonnant, die noch immer zu den allerbeſten ihrer Farbe für September zählt. Von ihr bemerkte ich letzten Herbſt unter holländiſchen Schnittblumen einen prächtigen ſchwefelgelben Sport.

Dieſe großblumigen Sorten laſſen ſich auch leicht im Freien großblumig zur Blüte bringen. Zu Rayonnant und ihren Sports könnte man die ſicheren Marg. Desjouis, ballförmig, weiß, und die unverwüſtliche Capitain Julian, ballförmig, goldgelb, nehmen. Dieſe Sorten entfalten ihre großen Blumen im Freien. Allerdings muß man die jungen Pflanzen frühzeitig auspflanzen, genügend hacken, wäſſern und entknoſpen. Leichte Schattendecke iſt ihnen bei Entfaltung der Blumen ſehr willkommen. Leichter Froſt ſchon iſt vernichtend, man kann aber dieſe Sorten ſchon im Auguſt-September im Freien in voller Blüte haben.

Chryſanthemumprobleme ſind vielfache vorhanden. Das Streben nach blaublühenden Sorten, großblumige Gartenchryſanthemen, einfach blühende frühe Freilandchryſanthemen, winterharte Sorten beider Formen, Blühwilligkeit bei Behandlung auf erſte oder zweite Knoſpe und dergleichen mehr. Gerade die einfachen Sorten ſcheinen noch große Möglichkeiten in ſich zu bergen, denn was jetzt vorhanden iſt, blüht mit wenigen Ausnahmen zu ſpät, um für den Garten Wert zu haben.

Im letzten Jahre erlebte ich in meinem kleinen Hausgarten, in dem ich Verſuche über Blühfeſtigkeit und Winterhärte mit den verſchiedenſten Sorten anſtellte, eine hübſche Überraſchung. In einer Nacht gegen Ende Oktober ſchien alles erfroren zu ſein. Tatſächlich hatten auch alle Hauptblüten gelitten, bald aber zeigten und entfalteten ſich überall die Nebenknoſpen, und ich hatte bis zum 11. November im Freien ein herrliches Blühen, das ſeltſam zu den grauen Stimmungen der Novembertage wirkte. Auch ſehr ſpätblühende kleinblumige, wie die Sorten der Baron de Vinols-Raſſe, und einige ſpäte einfache trotzten den Nächten, die faſt immer auf Gefrierpunkt ſanken. Nach dem 11. November vernichtete allerdings ein Froſt von vier Grad alles, nur die neckiſche Märchenelfe konnte es auch dann noch nicht unterlaſſen, ihr liebliches »ich lebe noch« in die Welt zu blühen.

Ich möchte nun einen kurzen Überblick über die beſten neuen großblumigen Sorten geben. Vorher ſeien aber noch einige wenig verbreitete ältere Sorten erwähnt, die es verdienen, nicht in Vergeſſenheit zu geraten. Bei Soleil levant liegt der Reiz der Sorte nicht in der roſa Farbe, ſondern in der entzückenden Strahlenform. Der Name iſt recht treffend gewählt. Mme. Lucien Remy hat recht anmutige, zart mattroſa gefärbte Blumen. Bei Ma Beauté iſt es erſtaunlich, daß dieſe tiefroſa Sorte bisher ſo wenig Beachtung gefunden hat. L. Capitaine Remy bringt ſehr große, etwas flach gebaute Blumen von eigenartig roter Farbe, deren einzelne Petalen ganz ſchmale goldene Streifen haben. Mme. N. Robardey hat in ihrem zarten Elfenbeinton keine Konkurrentin, auch ſie iſt unverdient der Vergeſſenheit anheimgefallen. Mrs. W. Wells iſt tief bernſteingelb gefärbt. Sie gehört zu den leicht gebauten, ſogenannten japaniſchen Sorten. Ich möchte dieſe alte Sorte mit ihrer ſeltſamen Farbe und gefälligen Form nicht miſſen.

Das folgende Sortiment umfaßt nun die nach meiner Auffaſſung wirklich wertvollen großblumigen Sorten. Die Farbenangabe iſt bei Chry-

santhemen sehr schwierig, gerade das zarte, oft nur gehauchte Grau im Weiß macht eine Blume schön, und die Übergänge von Weiß in Rosa sind so wunderschön. Auch der dunkle, fast schwarze Hauch, der über vielen Sorten liegt, läßt sich mit Worten nicht beschreiben. Bei den einzelnen Farben sind die Sorten der Blütezeit nach angeordnet. *Weiß:* Marg. Desjouis, Alice de Monaco, Queen Mary, Mme. Jenkins, Montblanc, Mrs. G. Drabble, Unschuld, Philippe Rivoire. *Gelb:* Capitain Julian, Mme. Buron, Mrs. G. Pulling, Mme. Convers, Helen Williams, Princess Mary, Countess of Granard, Gartendirektor Löbner, Polypheme und Etzolds Goldiana. *Rosa:* Rayonnant, Perle Française, Viviand Morell, Sax Export, Berthe Lachaux und Louise Pockett. *Rot:* Capitain Etiévant, Bengale, Miss Kelley and Mrs. E. J. Brooks, (Farbenbild Band I, Seite 204a). *Braun:* Noble und Miss Edith Cavell.

Bengale

Ein Handelsgärtner muß seine Sorten weise beschränken. Er braucht nur wenige, aber wirklich ertragreiche Sorten. Ein Liebhaber sollte sich keine solche Einschränkung der Herbst- und Winterfreuden auferlegen, eher nach reicher Abwechslung streben. Besonders im Oktober, November kann aus jedem Glashause ein Wundergarten werden.

Die Kultur stellt mancherlei Probleme. Viele großblumige Arten lassen sich mit gutem Erfolge auch mehrtriebig ziehen; viele kleinblumige, selbst von den winterharten, ergeben bei entsprechender Kultur große Blumen. Interessant ist das Verhalten der großblumigen Sorten, wenn sie zu spät vermehrt werden oder wenn sie auf zweite Knospe statt auf der ersten zur Blüte kommen. Dann kann man häufig feststellen, daß sich aus der großen Knospe keine volle Schaublume, wohl aber eine große einfache Blüte entwickelt. Gerade solche einfachen Zufallsblumen werden dem Liebhaber gefallen, infolge ihrer überraschenden Eigenart, während der Handelsgärtner sich weniger freuen und die Sorte im kommenden Jahre bestimmt früher vermehren wird. Ein Beispiel hierfür ist die großblumige Queen Mary. Auf erster Knospe und früh vermehrt wird sie weiß und stark gefüllt, auf zweiter Knospe oder spät vermehrt unregelmäßig rosa und einfach.

Ein besonderes Problem liegt auch in der Hinausschiebung der Blütezeit. Eine Verfrühung dieser anzustreben, halte ich nicht für notwendig. Die Chrysanthemen mit ihrem herben starken Geruch sind typische Herbstblumen, die man nicht früher sehen möchte, ehe die Sense über die Felder gerauscht ist. Wohl aber liegt uns daran, im Winter noch Blumen zu haben. Durch späte Vermehrung, etwa im Juni, läßt sich die Blüte ohne Schwierigkeit bis in den Dezember und Januar verlegen. Noch später würde kaum angebracht sein, denn wer möchte noch Chrysanthemen sehen, wenn sich schon erste leise Anzeichen eines Vorfrühlings bemerkbar machen. Viele Sorten eignen sich indes nicht zur Spätblüte. Einige der dazu geeignetsten sind folgende: Philippe Rivoire, weiß, Helen Williams, gelb, Berthe Lachaux, rosa, René de Ranville, rot.

Schließlich möchte ich noch eines erwähnen. Das Hauptziel aller Chrysanthemumzüchter scheint mir zu sein, die Blumengröße zu erhöhen. Zweifellos hat diese sich von Jahr zu Jahr sehr gesteigert. Aber ist dies Ziel nicht etwas äußerlich? Muß nicht zwischen Form, Farbe und Größe eine gewisse Harmonie walten? Ich habe häufig bei gewissen Riesenblumen das Gefühl, als seien sie überzüchtet, als seien sie nur noch Masse, nicht mehr Blume. Es gilt doch nicht, weißkohlkopfartige Blumen auf festen Stielen zu züchten, sondern mehr Wert auf die so entzückend mannigfache Form der Chrysanthemum-Blüte zu legen. Große Chrysanthemen wirken wohl festlich und feierlich, aber ist es nicht unangenehm, immer feierlich sein zu müssen?

Luise Pockett.

Bilder Biffinger

C. SCHNEIDER / DER BOTANISCHE GARTEN ZU EDINBURGH

UNTER den pflanzlichen Kulturſtätten der nördlichen gemäßigten Zone, denen wir die Einführung intereſſanter und wertvoller Zierpflanzen für Freilandkultur zu danken haben, ſtehen heute drei an erſter Stelle: das Arnold Arboretum in Boſton und die botaniſchen Gärten in Kew bei London und in Edinburgh in Schottland. Von dem letzten ſoll heute die Rede ſein. Im Juni 1924 hatte ich Gelegenheit, dieſe in vieler Hinſicht einzigartige Kulturſtätte kennen zu lernen.

Mit hohen Erwartungen fuhr ich nach Edinburgh, der im 7. Jahrhundert gegründeten, ſagenumwobenen Feſte, der Stadt Walter Scotts und Maria Stuarts. Man nennt ſie nicht umſonſt die Kaiſerin des Nordens. Sie liegt ein gut Teil nördlicher als Königsberg oder ſelbſt Kopenhagen an der Küſte der Nordſee. Klimatiſch iſt ſie durch die Nähe der See und die hier noch wirkſamen Einflüſſe des Golfſtromes ſehr begünſtigt, jedenfalls können hier unendlich viel empfindlichere Gewächſe gezogen werden, als etwa in Bremen oder Hamburg, wenn Edinburgh auch nicht ſo warm gelegen iſt wie die Küſte von Wales oder Cornwall. Die Stadt iſt auf verſchiedenen Hügeln erbaut, deren höchſten die alte Burg krönt. Auch das Terrain des Gartens iſt ziemlich bewegt. Man nennt Edinburgh nicht mit Unrecht the town of gusty corners, die Stadt der zugigen Ecken. Faſt ſtändig weht ein beträchtlicher Weſtwind hier, der mich bei meiner photographiſchen Tätigkeit im Freien nicht wenig behinderte. Aber andererſeits gilt die Lage auch für Menſchen als geſund. Die Natur hat jedoch ſelbſt den Menſchen manche Eigenart aufgeprägt; wer die Schotten zu nehmen weiß, wird ſie ſchätzen lernen.

Der botaniſche Garten liegt im Weſten der Stadt auf bewegtem, faſt quadratiſchem Gelände und umfaßt rund 23 Hektar, iſt alſo nur reichlich halb ſo groß, wie der Dahlemer botaniſche Garten mit 42 Hektar. Der Höhenunterſchied beträgt aber zwiſchen dem höchſten und dem tiefſten Punkte etwa 18 Meter, ſodaß der Garten weſentlich größer wirkt. Wenn er auch nicht ſo alt wie Kew Gardens iſt, ſo reicht die Geſchichte des Edinburgher Gartens doch bis 1670 zurück. Allerdings beſteht er an der heutigen Stelle, an Inverleith Row, erſt ſeit wenig über einhundert Jahren. Seine eigentliche Bedeutung erreichte er unter der Direktion von Sir Isaac Bayley Balfour, der von 1853 bis 1922 an der Spize ſtand. Ihm folgte der jetzige Direktor William Wright Smith, dem ich mich für weitgehende Unterſtützung bei meinem Aufenthalt ſehr zu Dank verpflichtet fühle.

Das, was mich hauptſächlich reizte, nach

Gewächshäuſer

Edinburgh zu kommen, war die Tatsache, daß dort durch die Einführungen von George Forrest eine ganz besonders reiche Zahl von neuen Pflanzen aus Westchina zusammengekommen war. Forrest sammelt auch heute noch für den Garten. Außerdem war Professor Balfour bestrebt, sich auch die Einführungen Wilsons, Farrers und Wards nutzbar zu machen, sodaß heute wohl nur noch Kew an Herbarmaterial und kaum ein anderer Garten an lebenden Pflanzen aus Mittel- und Westchina mit Edinburgh rivalisieren kann. Nun ist aber das Klima in Edinburgh ungleich günstiger als das der Londoner Umgebung, wo Kew liegt. Wir finden daher im schottischen Garten als prächtig gedeihende Freilandpflanzen noch eine Unmenge der schönsten vom Kap, von Neuseeland, von Südamerika und ähnlichen Zonen, deren Reichtum wir uns in deutschen Gärten nur beschränkt zunutze machen können, wenn sich auch eine ganze Reihe von Pflanzen bei uns halten würden, falls wir es in der rechten Weise versuchten.

So bildet denn ein Besuch des Edinburgher Gartens für jeden, der mit der Pflanzenwelt Westchinas ein wenig vertraut ist, den denkbar höchsten Genuß. Wer allein die vielgestaltige Rhododendrenwelt aus diesen Gegenden kennen lernen will, kann dies nirgends besser als in Edinburgh. Es sei denn, er hat die so seltene Gelegenheit, die Sammlung von J. C. Williams in Cornwall zu sehen.

Wir betreten den Garten von Inverleith Row aus durch den Gebäudekomplex, der das Büro, die Bibliothek, die Laboratorien und Vortragsräume enthält. Dahinter liegt eine regelmäßige Pflanzung von Stauden und Einjährigen, die dem »System« unserer botanischen Gärten entspricht. An sie schließt sich an der Gewächshaus-Komplex, den wir auf Bild Seite 14 zum Teil überblicken. Die Häuser sind nach unseren Begriffen teilweise veraltet und sollen erneuert und erweitert werden, wenn man Geld genug zur Verfügung hat. Auch hier fehlt es jetzt an Geld, und die Unterbringung der wertvollen Herbarsammlungen ist beispielsweise eine derart provisorische, wie man sie in einem so berühmten Institut des reichen Großbritannien nicht erwarten sollte. Dies kann uns heute als Trost dienen, sind doch die entsprechenden Institute bei uns zumeist vor dem Kriege modern umgebaut und viel besser ausgestattet worden, als dies fast überall in England der Fall ist.

In den Häusern interessieren uns zumeist die kleinen auf dem Bilde nicht sichtbaren, nach rechts liegenden, als indoor rockery bezeichneten, wo sich die heikelsten Alpinen und an-

deren Stauden, ſowie Kleinſträucher finden, die im Freien nicht immer ſicher oder überhaupt nicht aushalten. Viele Neuheiten werden auch verſuchsweiſe zunächſt n dieſem Haus=Steingarten untergebracht. Faſt jede Pflanze iſt hier einer Betrachtung wert. Bei meinem Beſuche blühten unter anderen die roten Primula McLarenii, P. mollis vom Himalaya, P. ſuffrutescens aus Californien, die neuſeeländiſchen Gaultheria oppositifolia und Linum monogynum, die weiße Olearia chathamiana, die auſtraliſchen Bauera, rubioides, Aotus gracillima, Olearia myrsinoides, Hibbertia Readii, die ſüdamerikaniſchen Haplocarpha scaposa, Agathaea coelestis und Ixia iridiflora; Calceolaria deflexa aus Peru, Sisyrinchium myriophyllum aus Ecuador, Sphacele campanulata aus Chile. Ferner Pertya phylicodes aus Yunnan, Thymus nitidus aus Sizilien, Fuchsia parviflora aus Mexiko, und aus dem malayiſchen Archipel Gaultheria fragrantissima und Ainslea ageratifolia. Von bekannteren Sachen notierte ich Philesia buxifolia, Sphaeralcea Munroana, Ourisia macrophylla, Erythraea conferta, Lotus Bertholletii, Saxifraga rotundifolia, Osteomeles Schwerinae, Chamaebatiaria foliolosa, Erodium corsicum, die ſchöne große Celmisia coriacea, die neuſeeländiſchen Pimelea Traversii, Epilobium glabellum, Metrosideros lucida, Brachycome Sinclairii, Senecio bellidioides, ſowie Convolvulus cneorum, Rehmannia Briscoi und andere bei uns noch wenig verbreitete Arten.

Das Rhododendron=Haus ergänzte in vieler Hinſicht die Freilandgruppen. Im Orchideenhauſe, bei den Inſektivoren, bei den Palmen, Bromeliaceen und in den weiteren tropiſchen Abteilungen, überall gab es viel Gutes in guter Kultur zu ſehen, wie auch im temperierten und Kalthauſe. Längs der Häuſer ſind in der ſyſtematiſchen, ſchon erwähnten Abteilung recht intereſſante Rabatten, auf denen ich von Gehölzen beiſpielsweiſe Cotoneaſter Henryana, Carrierea calycina, Rosa banksiopsis, Rubus Henryi, Spartocytisus nubigenus, Hydrangea xanthoneura setchwanensis, Rosa Moyesii, Viburnum Henryi und Cistus Clusii als in Knospe oder ſchon in Blüte mir anmerkte.

Der größte Teil des Gartens wird vom Arboretum eingenommen, das ſich um den Inverleith Hill zieht, auf dem die Wohnung des Direktors liegt. Von hier aus ergeben ſich einige wundervolle Fernblicke. Gegen Süden auf die Burg zu und mehr gegen Oſten auf die als Arthur's Seat bekannte höchſte Erhebung nahe der Stadt.

Im Vordergrunde des Bildes ſieht man immer über Teile des Arboretum hinweg. In dieſem ſind die Gehölze gattungsweiſe, zum Teil auch zu Familien vereint gepflanzt. Wir finden unter anderem eine reiche Sammlung von Ilexformen, doch das ſchönſte im Garten ſind und bleiben die zumeiſt gegen die Hügelkuppe angeordneten Rhododendren. Wer eine ſolche Sammlung der aſiatiſchen Arten noch nicht geſehen hat, kann ſich keine Vorſtellung von dem Formenreichtum dieſer Gattung machen. Was wir in Nordweſtdeutſchland, ja ſelbſt in Kew ſehen, ſind meiſt wenige alte Arten, wie catawbiense, caucasicum, maximum, ponticum, Smirnowii und die aus ihnen in Verbindung mit arboreum, Griffithianum und anderen Arten des Himalaya hervorgegangenen Hybriden. Hier in Edinburgh lernen wir eine neue Formenwelt kennen, die uns in erſter Linie Mittel= und Weſtchina beſcheert hat. Ich kam leider zu ſpät, um die meiſten Arten noch in Blüte zu ſehen. Dafür konnte ich mich an der ſo eigenartigen und zum Teil ſo farbenprächtigen Schönheit des auf die Blüte folgenden jungen Austriebes erfreuen. Immerhin blühten auch Mitte Juni noch eine ganze Anzahl Arten, wie beiſpielsweiſe das bekannte R. brachycarpum aus Japan, deſſen weißroſa Blüten nicht allzu angenehm duften, das ihm nicht unähnliche R. Fauriei, das ſchöne chineſiſche breitglockige, faſt weiße R. Souliei, das ſpäte weiße, duftende R. decorum, die kleinblütigen R. ledoides, R. Tschonoskii, R. micranthum, und natürlich eine ganze Anzahl von Hybriden, unter denen große Gruppen weithin aufleuchteten, wie etwa die der roten Russelianum und atrosanguineum, und ſehr zu Autochromaufnahmen reizten, die leider der nie raſtende Wind vereitelte.

Als auffällig im Austrieb merkte ich unter anderen folgende Arten an: R. niveum, ſilberfilzig; R. Fargesii, kahl grün, Blattunterſeiten bläulich; R. maculiferum, Triebe rotbraun, gelb ſchülferhaarig, junge Blätter beiderſeits hellgrün, ähnlich R. inopinum, aber Blätter unterſeits beſchülfert; R. Thomsonii, Blätter ſtark blaugrün, unten weißblau, die großen Kelche ſtark bereift; R. fulvum, hellfuchsrot; R. decosum und cyanocarpum, beide kahl mit bereiften Trieben; R. campanulatum var. aeruginosum, Blätter blauweiß, dabei unten fein roſtig lederfilzig, ähnlich iſt R. fulgens, aber nicht ganz ſo auffällig; R. Smithii, Triebe lang abſtehend, borſtig behaart; R. galactinum, Laub unten ſchön weiß lederfilzig; R. Wasonii, deſſen junge Blätter die ſilberfilzige Unterſeite gut zeigen; von kleinblättrigen Arten ſeien noch genannt R. scintillans, R. hippophaeoides, R. hedyosum, R. salignum, R. impeditum. Bei R. Falconeri fallen im Austrieb die großen gelbroten Schuppenblätter auf, während R. habrotrichum roſtborſtige Triebe und rote innere Knospenſchuppen hat. Dieſe inneren Knospenſchuppen, die ſich bei der Entwicklung des jungen Triebes zunächſt ſtark vergrößern, ſind oft ſehr auffällig, fallen aber meiſt ziemlich ſchnell ab. Sonſt waren von Rhododendren noch die prächtigen Maſſen von R. ferrugineum bemerkenswert, wie ich ſie noch nie, ſelbſt in der Heimat der Pflanzen nicht geſehen habe. Schließlich darf eine ſchöne R. praecox=Hecke nicht unerwähnt bleiben. So ließe ſich noch manches aus dem Arboretum ſchildern, obwohl die übrigen Gehölze im allgemeinen nicht ſo gut vertreten ſind.

Landſchaftlich nicht reizlos iſt ferner die zwiſchen den Glashäuſern und dem nun zu beſprechenden Felſengarten gelegene Scenerie mit dem kleinen Teich, von der wir bereits ein Bild gaben. (Band VI, Seite 123). Um dieſen Teich herum blühten eine große Anzahl hübſcher Stauden.

Die Hauptſehenswürdigkeit von Edinburgh bildet jedoch der *Steingarten,* aus dem wir hier einige Scenerien zeigen können. Rein landſchaftlich iſt er nicht ſo eindrucksvoll, als etwa der Hanbury'ſche Felſengarten in Brockhurſt (Band V, Seite 183) oder auch das große natürliche Alpinum von Graf Silva Tarouca in Pruhonitz (Band II, Seite 158). An Pflanzenreichtum übertrifft aber der Steingarten in Edinburgh dank ſeiner klimatiſch ſo viel günſtigeren Lage und als eine wohlgeleitete Sammelſtätte alles deſſen, was immer hier gedeihen kann, dieſe anderen Anlagen ganz bedeutend. Ich kenne keinen Steingarten, der in dieſer

Hinsicht sich mit dem in Edinburgh messen kann. Hier weiß man wirklich nicht, was man aus der Überfülle der oft so überraschenden Erscheinungen einer fremden Pflanzenwelt herausgreifen soll. Gar arm dünken einem all die ähnlichen Anlagen, die man etwa in Deutschland findet, seien sie auch in Anbetracht der so viel ungünstigeren Kulturbedingungen noch so reich und wohlgehalten.

Den Aufbau des Steingartens lassen die Bilder deutlich genug erkennen. Auf einigen sehen wir auch die Art der Besprengungsanlage, die hier eine große Rolle spielt und es in erster Linie mit ermöglicht, daß so viele heikle Dinge gedeihen. Die meisten Steingärten leiden ja daran, daß es nicht möglich ist, sie in die richtige nebelschwangere Atmosphäre einzuhüllen, die für viele alpine Pflanzen, mögen sie auch sonst noch so trocken und sonnig stehen, doch ein Bedürfnis ist. Wir müssen die schweren Nebel der Hochgebirge imitieren können. Namentlich für Gebirgspflanzen aus Westchina ist das wichtig, die dort im Sommer oft wochenlang im Nebel stehen. So hat man denn in Edinburgh die Wasserleitung sehr geschickt eingebaut im ganzen Alpinum. Man sprengt nun aber nicht mit Schläuchen, sondern stellt gut mannshohe Rohre auf, die an der Spitze einen feinen Zerstäuber tragen. Der Druck ist stark genug, daß wenigstens ein Teil des Steingartens immer dicht unter feinen nebelartigen Regen gesetzt werden kann. Dies geschieht nach Bedarf eventuell zweimal täglich. Hätte man in Pruhonitz, Nymphenburg oder Dahlem eine ähnliche Einrichtung, so würde man auch in Mitteleuropa ungleich mehr Pflanzen mit Erfolg ziehen können. Das Besprengen mit dem Schlauch ist immer nur ein kümmerlicher Notbehelf. Je feiner die Regenwirkung, je nebelähnlicher, desto erfolgreicher ist sie.

Beim Durchwandern des Steingartens entdeckte ich mit großer Freude immer wieder so viele Kinder der westchinesischen Hochgebirge, die ich dort in ihrer Heimat im Sommer 1914 beobachten konnte. Vor allem bewunderte ich verschiedene Meconopsis, die sich in Edinburgh selbst aussäen und nun zum festen Bestand des Steingartens gehören, während sonst ihre Erhaltung nur selten gelingt; so M. Prattii, M. latifolia, M. grandis und M. Wallichii. Auch M. quinduplinervis und robusta blühten. Von Primeln sah ich Primula Littoniana, P. vittata, P. secundiflora und möchte aus der Nähe der Rhododendrengruppen von damals blühenden noch nachtragen P. anisodoxa, P. Bulleyana, P. Beesiana, P. burmanica, P. frondosa, P. involucrata, P. lichiangensis, P. oblanceolata, P. obliqua, P. pseudosikkimensis, P. pulverulenta, P. serratifolia, P. sikkimensis und P. Veitchii. Das mit Lilium verwandte Nomocharis saluenense blühte rosa und rief mir seine Verwandten ins Gedächnis zurück, die ich in Yunnan selbst getroffen hatte. Verschiedene Codonopsis fühlen sich hier wohl und werden sich hoffentlich auch noch bei uns einbürgern. Breite Polster bildet Gentiana sino-ornata, die als Sommerblüherin so vielversprechend ist. Die tief gefärbte G. Veitchiorum, G. Farreri und G. Arethusae gehören auch zu der späten Gruppe. Von kleinen Rhododendren blühte R. sino-lepidotum, und R. prostratum machte seinem Namen Ehre. Von Zwergsträuchern seien noch genannt der seltene Juniperus litoralis aus Japan, Rhododendron myrtilloides aus Burma, Cassiope fastigiata,

Aus dem Blumengarten der Literatur

Der Wechsel der Jahreszeiten

Die Übergänge und der Wechsel der Jahreszeit regen zur Betrachtung in allen Dingen an. Die Schwermut kommt besonders dem Herbst zu, nach allgemeiner Meinung. Was aber das Herz erneut und erfreut, ist der Frühling. Der süße Schall der Vögel, insonderheit von frühlinghafter Art, indessen unter der gütigen Sonne die Kräuter an den Hecken aufsprießen. Um diese Zeit wird der Frühling erst Frühling, die Nebel steigen auf und die Blüten entfalten sich, die eine Art nach der andern. Danach wechseln Regen und Winde. Zur Wehmut unserer Herzen fallen die Blüten ab, und bald sind nur noch die grünen Blätter übrig. Auf zehntausend Arten wird unser Herz betrübt. Die Orangenblüte ist hochberühmt, aber auch der Duft des Pflaumenbaumes erinnert uns an die Vergangenheit und macht uns traurig. Die Frische der Goldrosen, die Gebrechlichkeit der Glyzinien, wir können unser Herz nicht von ihnen wenden.

Zur Zeit des Geburtsfestes des Buddha wird das frische Laub der jungen Sprossen dichter. Die Melancholie der ganzen Welt und das Bedürfnis nach Mitgefühl wächst im Menschen. So fühlen gewißlich alle. In dem „Monde des schnellen Sprossens", wo man die Iris aufs Dach setzt und den Reis harkt, so oft das Wasser wirbelt, schmilzt das Herz. Im „Feucht-Monat" erscheint das „Abendgesicht" der armen Hütten in seiner ganzen Weiße, man vertreibt die Mücken mit Rauch, unsere Sinne erwachen: die „Sühnung" ist nicht minder anziehend.

Feiert man dann den „Siebenten Abend", so sind wir entzückt. Allmählich werden die Nächte kühl, und die Wildgänse kommen mit ihrem Geschrei, die unteren Blättchen der Lespedeza werden nacheinander rot, man erntet und man trocknet den ersten Reis, den Frühreis. Alles häuft sich zu dieser Zeit noch mehr als im Herbst. Dann sind auch noch die Tage nach den Gewittern anziehend. Ich darf nicht fortfahren, ich müßte all die alten Dinge aus dem Genji Monogatari und dem Genji no Soshi wiederholen. Indes, man kann das immer wieder sagen: und seine Gedanken nicht aussprechen bläht die Eingeweide. Drum schilderte ich mit flinkem Pinsel, mein Trübsal und meinen Verdruß zu bekämpfen. Freilich sollte man das eher von sich werfen, als den Menschen vorführen.

Die trübseligen Landschaften des Winters sind aber nicht geringer als die Landschaften des Herbstes. An den Uferpflanzen des künstlichen Weihers fallen die geröteten Blätter einzeln und lagern still. Morgens liegt der Reif ganz weiß da, und aus dem Weiher steigt ein Dunst, das ist köstlich. Zu Ende des Jahres sind alle Leute in äußerer Erregung, was meist Mitleid erweckt. Es ist zu widerwärtig. Kein Mensch betrachtet länger den Mond nach dem zwanzigsten Tag, der kalt am Himmel steht. Auch das macht unser Herz schmelzen. Zur Zeit des Triduum ist es herrlich. Eine öffentliche Angelegenheit nach der andern! Man bereitet sich schon eilends auf den Frühling vor und Hunderterlei wird ausgeführt. Von der Exorzisation bis zur „Verehrung nach den vier Weltenden" (Neujahrsfeier) ist alles schön. Diese letzte Nacht zündet man bei Anbruch der Dunkelheit Fackeln an, bis nach Mitternacht. Man pocht an die Türen, man läuft und man schreit aus Leibeskräften alles mögliche Zeug aus; indessen am Morgen beim Morgengrauen verebbt der Lärm, des Jahres Ende macht unser Herz schmelzen, es ist die Nacht, da die Menschen wiederkehren. Das Fest der Geister wird zu dieser Zeit in der Stadt nicht mehr gefeiert, im Osten aber besteht es noch, und es ist sehr rührend. Damit öffnet sich der Himmel nicht anders als der Himmel des Vortages, jedoch unsere Gefühle sind andere. Man sieht alle die weiten Straßen mit den überall hoch aufgerichteten Fichten; man ist zugleich heiter und betrübt."

Aus: „Stunden der Muße" des Bonzen Kenko (1283 – 1350)
nach der Übersetzung von Paul Adler in Adler-Revon „Japanische Literatur" (Frankfurter Verlags-Anstalt).

Berberis candidula, Spiraea (Eriogynia) pectinata, Astragalus Poterium, die an Betula nana erinnernde Nothofagus Menziesii, Salix polaris in üppigen Polstern, und die weſtchineſiſche Sibiraea tomentosa.
Die Zahl der Pflanzen von Neuſeeland iſt Legion, ich hebe nur kurz hervor die Konifere Podocarpus nivalis, Veronica monticola, Gaultheria perplexa, die Carmichaelia-Arten robusta, Enysii und flagelliformis, Senecio Bidwillii, das reizend blaue Helichrysum Selago, Aristotelia fruticosa, Rubus parvus, die bromelienartige Liliacee Astelia trinervia, die ſo ſeltſame Umbellifere Aciphylla squarrosa und das wie trockenes Holz ausſehende, ſehr eigenartige Corallospartium crassicaule. Daß ein ſolcher Pflanzenreichtum in meiſt geſunden, gut gedeihenden Stücken hier zuſammenkommen und erhalten werden konnte, iſt nicht zuletzt dem trefflichen Gärtnerſtab zu danken, an deſſen Spitze R. L. Harrow ſteht, der in L. B. Stewart einen unübertroffenen Pflanzenvermehrer zur Seite hat. Ich möchte ſchließlich noch dem ausgezeichneten Photographen R. M. Adam danken, der mich ſo freundlich unterſtützte und von dem die Fernſicht, mit Genehmigung des Direktors, wiedergegeben iſt.

F. FRIMMEL / ÜBER DIE GRUNDLAGEN DER FARBENZÜCHTUNG

FREIHEIT in ſelbſtgewählten Schranken gehört dem Künſtler; das Handwerk des Züchters iſt anders bedingt. Das Befolgen einer ſtrengen Methodik, die Notwendigkeit des Abſchätzens aller Möglichkeiten, das Gebundenſein an die Geſetzmäßigkeiten, die das Werden von Form und Farbe beherrſchen, machen in der Werkſtatt des Züchters eine exakt wiſſenſchaftliche Ergründung aller Umſtände notwendig; eine ſcheinbar nüchterne Zergliederung wird unumgänglich, wo der unbefangene Blick nur Sinnenfreude empfinden möchte. Freilich nur ſcheinbar nüchtern, in Wirklichkeit iſt es kein geringerer Naturgenuß, den Geſetzmäßigkeiten, die das Naturgeſchehen beherrſchen, nachzuforſchen, und ſie gedanklich zu verwerten; er iſt nur von anderer Art. Es darf ruhig gewagt werden, den wiſſenſchaftlichen Grundlagen der Farbenzüchtung näher zu treten und die Wunderwelt der Blumenfarben vom Standpunkte des züchteriſchen Handwerkes zu betrachten. Dieſe Betrachtung möge zunächſt mit einer ſehr weſentlichen Feſtſtellung eingeleitet werden, nämlich der, daß wohl unterſchieden werden muß, zwiſchen dem ſubjektiven Eindruck, den wir als Farbe empfinden und den in der Blume vorhandenen ſehr mannigfachen Bedingungen, deren Zuſammenwirken in uns dieſen Eindruck hervorruft. Wenn wir von einer Salpiglossis-Varietät ſagen, ſie iſt braun, ſo iſt das die ganz richtige Wiedergabe des ſubjektiven Eindruckes; für den Züchter iſt damit noch nicht viel getan, erſt die Erkenntnis, daß in dieſer Blüte nicht die Spur eines braunen Farbſtoffes vorhanden iſt, ſondern daß das Übereinanderlagern eines roten über einem gelben Farbſtoffe das Braun bedingt, daß der eigentümliche Samtglanz, in dem das Braun dieſer Blüte erſcheint, durch eine ganz beſonders anatomiſche Struktur bedingt iſt, gibt Anhaltspunkte, dieſe Bedingungen für das Zuſtandekommen der Farbe zielbewußt zu beeinfluſſen. Züchteriſch beeinflußt können ja nur die Blumen werden, keineswegs aber das, was wir ſubjektiv in ſie hineinlegen; und in der Blume ſind eben beſtimmte Farbſtoffe vorhanden in beſtimmter Verteilung und gebunden an beſtimmte anatomiſche Strukturen. Dieſe Bedingungen der Blumenfarben ſind Gegenſtand der züchteriſchen Beeinfluſſung. Es iſt alſo die optiſche Konſtruktion des Blumenblattes, auf die es zunächſt ankommt. Da ſtößt nun der Beobachter auf eine wunderbare Tatſache. Die unendliche Mannigfaltigkeit der Blumenfarben, die mit Worten nicht zu ſchildern iſt, wird mit einer verblüffend farbſtoffarmen Palette erzeugt; es ſind in der Hauptſache nur drei Farbſtoffe, mit denen die Natur ihr Auslangen findet. Das Anthokyan, ein Farbſtoff, der in gelöſter Form in verſchiedenen Abſtufungen von rot über violett zu blau vorkommt, das Carotin, ein Farbſtoff, der in Form kleiner gelber Körnchen auftritt und das Anthochlor, das als gelbe Löſung ſich findet. Es erſcheint auf den erſten Blick verblüffend, daß die Natur imſtande iſt, mit ſo wenig Farbſtoffen ſo unendlich viele Abſtufungen von Farbtönen herzuſtellen. Dies wird verſtändlicher, wenn wir daran denken, daß mit Namen wie Anthokyan nicht ein Farbſtoff bezeichnet iſt, ſondern eine ganze Gruppe einander in chemiſcher Beziehung außerordentlich naheſtehender Verbindungen; jede Blume hat ihr ſpezifiſches Anthokyan. Weiter ſind dieſe Farbſtoffe nicht unveränderlich, ſie ſind vielmehr, und das gilt beſonders vom Anthokyan, durch chemiſche Einflüſſe ſehr modifizierbar. Ganz analog dem Farbſtoffe des allbekannten Lakmuspapieres erſcheint das Anthokyan in ſaurer Löſung rot, in baſiſcher blau, verſchiedene Zwiſchenſtufen ſind durch violette Töne gekennzeichnet. Auch die Nüance des gelben Anthochlors iſt, allerdings in engeren Grenzen, modifizierbar, ebenſo gibt es vom Carotin verſchiedene Abſtufungen zwiſchen Hellgelb und Orange. Dem Naturbeobachter ſind Fälle von Umſchlagen der Blütenfarbe mit dem Älterwerden der Blüte bekannt; am geläufigſten iſt das Beiſpiel des Lungenkrautes, deſſen Blütenfarbe im Alter von blau in rot umſchlägt, ein Ausdruck für eine Änderung des chemiſchen Charakters des die Anthokyanlöſung enthaltenden Zellſaftes. Mit dieſer Variation der Farbſtoffe ſelbſt iſt nun zwar die Möglichkeit einer recht reichen Farbenſkala gegeben, durchaus aber nicht die ganze ſchier unendliche Mannigfaltigkeit erklärt. Dieſe wird erſt durch die Tatſache voll verſtändlich, daß in zahlreichen Fällen an dem Zuſtandekommen einer Blumenfarbe nicht nur ein Farbſtoff, ſondern deren mehrere beteiligt ſind, und es iſt reizvoll, dieſen Farbenkombinationen ein wenig nachzuſpüren. Es kommen Fälle vor, daß im Blumenblatte, — der Sitz der Farbſtoffe iſt von Ausnahmen abgeſehen ſtets die Hautſchicht — Zellen verſchiedener Färbung nebeneinander liegen, ſo blaue neben roten, rote neben gelben. Bei der Kleinheit der einzelnen Zellen, die als ſolche mit freiem Auge garnicht wahrgenommen werden können, iſt es ſelbſtverſtändlich, daß ein ſolches Blumenblatt unſerm Auge weder in der einen noch in der andern, ſondern in einer Miſchfarbe erſcheinen muß. Zahlreiche violette Töne der Gartenprimel beiſpielsweiſe verdanken einem ſolchen Nebeneinander von blauen und roten Elementen ihre Entſtehung. Noch intereſſanter ſind die Fälle, wo zwei Farbſtoffe in einer und derſelben Zelle übereinander gelagert ſind; in dieſen Fällen abſorbiert der eine Farbſtoff gewiſſe Strahlen des Spektrums, der andere Farbſtoff wieder andere, es bleibt ein Reſt von Lichtſtrahlen übrig, der weder dem einen noch dem anderen Farbſtoffe entſpricht, ſondern wieder eine Kombinationsfarbe (Subtraktionsfarbe) darſtellt. Das Braun vieler Blüten kommt durch ein ſolches Übereinander von rotem Anthokyan über gelbem Carotin zuſtande, ebenſo können ſchwärzliche Töne durch Übereinanderlagerung von Blau über Gelb entſtehen. Die züchteriſche Bearbeitung ſolcher Kombinationsfarben gehört zu den reizvollſten Aufgaben der Farbenzüchtung. Die Mannigfaltigkeit der Farbtöne iſt jedoch nicht das einzige Problem, das in der Blumenfarbe ſteckt. Wer jemals bei hellem Sonnenſchein eine Mohnblüte betrachtet hat, eine Feuerball-Pelargonie, eine dunkelrote Varietät von Phlox Drummondi oder irgend eine andere ſtark leuchtende Blumenfarbe, der wird vor der geradezu überwältigenden Leuchtkraft ſolcher Blumen wie vor einem Wunder geſtanden haben; doppelt vor einem Wunder, wenn er ſich die Mühe genommen hat, ein ſolches Blumenblatt im Mikroſkop anzuſehen. Das an ſich außerordentlich zarte Blumenblatt iſt faſt durchwegs farblos, nur die Hautſchicht enthält die Farbſtoffe, die farbführende Schicht iſt nur Bruchteile eines Millimeters dick. Es erſcheint wirklich frappant, daß eine ſo geringe Farbſtoffmenge eine ſo blendende Wirkung auszulöſen vermag. Verſtändlich wird dies durch Betrachtung der optiſchen Konſtruktion des Blumenblattes, die folgende iſt. Das Innengewebe des Blumenblattes iſt ein ganz außerordentlich zart gebautes, von unzähligen Lufträumen durchſetztes Gewebe, welches das Licht an den unzähligen Zellwänden ähnlich zurückwirft wie etwa flockiger Neuſchnee; es wirkt als ſchneeweißer Hintergrund, ſozuſagen als Spiegel, aber in dem Sinne, daß es das auffallende Licht diffus reflektiert. Über dieſer Schicht liegt die gefärbte Oberhaut. Die Zellen dieſer ſind nun

Oben: Das direkte Sonnenlicht wird durch die Cuticularſtreifen geſtreut.
Unten: Durch Brechung wird das Licht in der Papille zu einem Lichtkegel vereinigt.

GARTENAUFGABEN / ALTE UND NEUE LÖSUNGEN

Gartenecke

BEI den meiſt recht geringen Ausmaßen unſerer Haus- und Villengärten iſt weiteſtgehende Ausnutzung der vorhandenen Grundfläche eine unabweisbare Forderung, wenn man überhaupt noch Raumwirkungen erzielen will.

Der verſtändliche Wunſch jedes Gartenbeſitzers, ſich in ſeinem Garten möglichſt unbeobachtet bewegen und aufhalten zu können, kann in einem größeren Garten oder in einem Park durch Schaffung hoher und breiter Gehölzſtreifen längs der Grenzen erfüllt werden, im kleinen Garten ſtehen uns hierzu nur Mauern, berankte Zäune und Hecken der verſchiedenſten Art zur Verfügung.

Hier iſt in die Ecke des Gartens, an dem Schnittpunkt zweier Straßen, eine kleine Terraſſenlaube mit vorgelagertem Waſſerbecken, hineingebaut. Ihre 2,50 Meter hohe Rückwand iſt zugleich Grenzmauer und wird nach beiden Seiten durch gleichhohe, dicht mit Efeu beſponnene Drahtgitter fortgeſetzt. Die innere Mauer hat nur Brüſtungshöhe; hier finden zwiſchen den in Mauerſtärke durchlaufenden Pfeilern Blumenkäſten Aufſtellung.

Mauern und Pfeiler, ſowie das Waſſerbecken wurden in Beton ausgeführt, licht ockerfarbig getönt. Der Fußboden wurde in roten Tonflieſen verlegt, das pergolaartige Gebälk des Daches braun gebeizt.

Ein kleiner Wandbrunnen an der Rückwand liefert fließendes Waſſer. Das Baſſin weiſt in der Mitte einen Springſtrahl, in den von ihm nicht erreichten ſeitlichen Ecken rot und roſa blühende Nymphaeen auf. Flankiert wird das Waſſerbecken von einigen Gruppen mit Ufervegetation, wie Bambus, Iris Kämpferi, Astilbe-Arendsi-Formen, Bergenia uſw. Die ganze Laube iſt üppig mit Glycine berankt und überwölbt von der maleriſchen, aber doch lichten Krone einer Gleditſchie, die in dem Dreieck außerhalb der Grenzmauer ihre Aufſtellung findet.

Heinrich Sandkuhl

nach außen papillös vorgewölbt. Bei ſehr ſtarker Vergrößerung läßt ſich an der Außenſeite dieſer Papillen eine äußerſt feine Streifung erkennen.
Es liegt in der Natur der Blume, daß ſie in der vollen Flut der Sonnenſtrahlen ihre Farbeffekte ausſendet, von weit her muß ſie ſichtbar ſein, ſoll ſie ihrem natürlichen Zweck der Anlockung der Blütengäſte dienen. Stunden, tagelang iſt das ſo überaus zarte Gewebe der Blumenblätter dem brennenden direkten Sonnenlichte ausgeſetzt und gibt das empfangene Licht unnennbar veredelt wieder zurück. Eine ſolche Fülle direkter Sonnenſtrahlen iſt aber für das lebende Protoplasma äußerſt gefährlich; bekanntlich iſt es ja nur das diffuſe, zerſtreute Sonnenlicht, das ſeine ſegensreichen Wirkungen auf das Wohlergehen der Pflanzen ausübt. Jeder Praktiker weiß, wie gefährlich es iſt, zarte Pflanzen, die nicht über genügend eigene Schutzanpaſſungen gegen die Schädigungen des Sonnenbrandes verfügen, dem direkten Sonnenlichte preiszugeben, daß man ſolche zarten Pfleglinge ſchattieren muß. Nur das Zarteſte des Zarten, die Blume, ſucht geradezu dieſe gefährliche Lichtflut auf! Es wäre unvorſtellbar, wie dies möglich wäre, wenn das Blumenblatt nicht über eine geradezu glänzende Schattierungseinrichtung verfügen würde. Die zarte Streifung der Oberhautpapillen wirkt auf das direkt einfallende Sonnenlicht ebenſo wie etwa ein geripptes Glas eines Glashauſes; es zerſtreut die einfallenden Strahlen und macht aus dem gefährlichen direkten das ſegensreiche diffuſe Licht. Kein Strahl geht verloren, nur abgelenkt werden ſie in verſchiedenſter Richtung und kommen als Strahlenbüſchel in die Zellen der Oberhaut, wo ſie an den ſchiefen Wänden der Papillen total reflektiert in der Mittelregion der Zellbaſis vereinigt werden; auch die auf die Seitenwand der Papille einfallenden Strahlen werden gebrochen und jener Mittelregion zugeleitet. 〈Bild〉. Es entſteht ſo am Grunde der Zelle ein beleuchtetes Mittelfeld, das von einer dunklen Randzone umgeben iſt. Dieſe Verteilung von Licht und Dunkel erklärt das Phänomen der automatiſchen Einſtellung ſo vieler Blumen der Richtung der einfallenden Strahlen zu. Das beleuchtete Mittelfeld wird dann genau unter der Spitze der Papille liegen, wenn die Richtung der einfallenden Strahlen gerade ſenkrecht zur Fläche des Blumenblattes ſteht; fällt aber das Licht ſchräg ein, dann wandert natürlich das beleuchtete Feld zur Seite, es wird jetzt eine Partie, die früher der dunklen Randzone angehört hat, ſtark beleuchtet, dafür eine Partie, die früher der hellen Mittelzone angehört hat, verdunkelt ſein. Dieſe Helligkeitsunterſchiede wirken auf das Protoplasma der Zelle als Reiz, der Reiz wird fortgeleitet und löſt eine Bewegung des Blütenſtieles aus, die erſt dann zur Ruhe kommt, bis das beleuchtete Mittelfeld wieder in die Ruhelage einſpielt, bis alſo das Blumenblatt wieder ſenkrecht zur Richtung der einfallenden Sonnenſtrahlen ſteht. Es gibt viele Blüten, die ſich vermöge dieſer äußerſt fein reagierenden Lichtſinnesorgane in die jeweilige Richtung des einfallenden Sonnenlichtes einſtellen. *(Ein zweiter Artikel folgt.)*

PAUL DOBE / DIE GELAPPTE KAPUZINERKRESSE

JEDER Blumenfreund kennt die große Kapuzinerkreſſe aus Peru mit ihren lebhaft gelben und roten Blüten, ihren einfachen ſchildförmigen Blättern. Die hier im Bilde gegebene gelappte Kapuzinerkreſſe iſt weniger verbreitet und in ihrer Geſamterſcheinung auch weniger ſchön als die andere Art. Ihre Einzelheiten aber, die wohl auch hier wie ſo oft bei den Naturgegenſtänden erſt dann geſehen werden, wenn ſie losgelöſt aus der Umgebung zeichneriſch dargeſtellt ſind, verleihen dieſer Pflanze einen ganz wunderlichen, einzigartig bizarren Charakter, der ſich zu einer geradezu geſpenſterhaften Erſcheinung ſteigert, wenn ſie als Silhouette gegen bewegten Abendhimmel geſehen iſt.

Gartenarbeit und Blumenpflege

WINTERARBEITEN

Winterschutz der immergrünen Laubhölzer

DIE tatsächliche Anpflanzung der uns zur Verfügung stehenden immergrünen Laubgehölze steht eigentlich im umgekehrten Verhältnis zu den vorhandenen Möglichkeiten. Die bestehende Unkenntnis dieser Gehölze ist einer der Gründe der Nichtpflanzung. Doch daneben herrscht auch ein starkes Mißtrauen gegen die erforderliche Frosthärte dieser Gehölze, das sehr oft selbst Kenner vor einer Pflanzung abhält. Die Frage, ob dieser Grund anzuerkennen ist, läßt sich nicht mit ja oder nein beantworten. Die jeweiligen örtlichen Verhältnisse und Umstände sind zu verschieden, die teils günstig, teils ungünstig einwirken. Allein der Versuch kann entscheiden. Dieser soll und muß getan werden, auch auf die Gefahr hin, daß trotz aller Sorgfalt und Vorsicht einmal ein Mißerfolg eintritt.

Um es gleich vorweg zu sagen: eine wohl durchdachte, richtig durchgeführte Pflanzung wird sehr oft Möglichkeiten, ja Wirklichkeiten schaffen, die ein Versagen ausschalten. Es sollte eine heute schon mehr bekannte Tatsache sein, daß die immergrünen Gehölze in kalten, trockenen Winterzeiten weit mehr durch die Folgen einer zu starken Verdunstung geschädigt werden als direkt durch die Kälte. Darum ist der Schutz, der diesen Gehölzen gegeben wird, in erster Linie gegen die starke Verdunstung zu richten. Aber ebenso ist schon bei der Pflanzung vorzuarbeiten. Standorte sind auszuwählen, die vor allem gegen die so gefährlichen Nord- und Ostwinde Schutz geben, gleichzeitig aber auch möglichst die direkte Sonnenbestrahlung ausschalten. Denn ein Laubtrieb, der dem trockenen Ostwind voll ausgesetzt ist, wird in kurzer Zeit eine beträchtliche Verdunstung erleiden, da die kalte, trockene Luft dem Blatt die Feuchtigkeit nach und nach entzieht. Das führt bei dem fehlenden Ersatz der Feuchtigkeit allmählich zum Welken, dann zum langsamen oder schnelleren Vertrocknen des Blattes. Je weicher die Beschaffenheit des Blattes, umso eher und stärker vermag der Frost einzuwirken. Ähnliche ungünstige Folgen ruft die scharfe Bestrahlung durch die Wintersonne hervor, die durch Stunden das Blatt zum Erwärmen, Auftauen bringt, am Abend aber das starke Gefrieren nicht verhindern kann. Diesem fortwährenden Wechsel erliegt das Blatt endlich. Also ist von vornherein zu überlegen und auf Abhilfe zu sinnen, wie man alles einrichten könne, um dem Gehölz die natürlichsten und günstigsten Lebensbedingungen zu schaffen.

Der Schutz ist zum Teil direkt, zum Teil auch indirekt zu geben. Im letzteren Falle soll er vorbeugend wirken. Ist die Verdunstung die Hauptgefahr, die den immergrünen Laubgehölzen im Winter droht, so muß dafür Sorge getragen werden, daß diese durchaus nicht Not an Bodenfeuchtigkeit leiden. Denn es kann wohl ruhig angenommen werden, daß tatsächlich in achtzig bis neunzig von hundert Fällen solche Gehölze im Garten trocken stehen. Naturgemäß wird das so sein, da alle Umstände dafür sprechen. Meist wird das immergrüne Gehölz in Gemeinschaft höherer Bäume und Sträucher gepflanzt, sozusagen als Unterpflanzung. Denn die nebenan stehenden höheren Gehölze bieten den Immergrünen einen ganz gewissen Schutz, den wir sogar aufsuchen müssen. Doch liegt darin eine bestimmte Gefahr: die Wurzelkonkurrenz. Diese ist überaus groß, und die langsam und schwach vorandrängenden Wurzeln der nachgepflanzten Immergrünen werden bald im Nachteil sein, sind es schließlich schon von Anfang an. Die Immergrüne durchsucht dann bald mit ihrem Wurzelwerk einen ausgesaugten, völlig ausgetrockneten Erdboden, der ihr nichts mehr zu bieten vermag. Zaust dann der anhaltende trockene Ost im Winter die Immergrünen tüchtig durch, saugt er allmählich jede Spur von Saft aus dem Pflanzenkörper heraus und ist die Pflanze nicht imstande, innerhalb einer kurzen, ihr von der Natur zugeschriebenen Zeit diese Feuchtigkeit durch Wurzeltätigkeit aus dem Erdboden zu ergänzen, dann verdunstet sie buchstäblich, und ihr Tod ist besiegelt.

Darum ist der erste und wichtigste Schutz, den wir den Immergrünen geben müssen, die starke, durchdringende Wässerung des Standortes der Pflanze. Es soll möglichst schon im Vorherbst gut und mehrmals gewässert werden. Selbst im Verlauf des Winters ist bei frostfreiem Boden die Wässerung noch möglich. Für deren Maß wird die Notwendigkeit entscheidend sein. Durch sorgfältiges Nachgraben muß sich jeder davon überzeugen. Am besten ist dann die Schaffung einer ausgedehnten Mulde um die Pflanze, so daß von ihrem Wurzeljahr an die Erde nach außen hin allmählich abfällt, dann wieder ansteigt und zwar höher, als die Erdoberfläche am Wurzelstock selbst ist. So kann die Mulde eine genügende Menge Wasser fassen. Sie wird mit der Kanne, besser mit dem Schlauch gefüllt und nach dem langsamen Verschwinden des ersten Wassers zum zweiten und dritten Male gefüllt. Es soll dabei keine falsche Sparsamkeit herrschen. Am besten ist, die Schaffung einer ausreichend großen Muldenform um jedes immergrüne Gehölz, die für immer bleibt, oder wo mehrere Gehölze beisammen stehen, um diese vereint. Ist sie einmal da, so kann das Wässern zu jeder beliebigen Zeit durchgeführt werden. Es wird ja auch im Sommerhalbjahr manchmal erforderlich sein, und dabei ist es völlig gleich, um welche Gattung oder Art es sich handelt. Alle unsere so beliebten, immergrünen Rhododendron benötigen diese Wässerung unbedingt. Doch auch andere, wie die verschiedenen Kirschlorbeerformen, wie Viburnum rhytidophyllum, Lonicera nitida, pileata, Ligustrum lucidum, Cotoneaster humifusa, Berberis verruculosa und wie sie alle heißen. Es gibt ja so viel Immergrüne, daß sie nicht alle genannt werden können.

Vorbeugend wirkt auch eine andere Maßnahme: die Düngung. Daß gut ernährte, vollwüchsige Gehölze eher dem Winterfrost standhalten werden oder etwaige Schäden leichter ausgleichen als unterernährte, schwächliche, ist wohl selbstverständlich. Wie ein gutwüchsiges Gehölz dem Garten ebenso ein ganz anderer Schmuck ist, als ein Krüppel. Daher eine gute, gelegentliche Düngung. Ist im Herbst die Wässerung erledigt, streue man in die Mulde angerotteten, oder wenn frisch, möglichst strohfreien Rinderdung. Es brauchen durchaus keine Massen gegeben werden. Eine schwache Lage genügt schon. Dies wird mindestens im übernächsten Herbst wiederholt. Auch die Rhododendron danken für eine solche Düngung in auffallender Weise. Ihr Wuchs, ihre Belaubung und ihr Blütenflor zeigen deutlich, wie stark der Einfluß der Düngung auf die Entwicklung war. Das ist bei allen Gehölzen der Fall. Am vorteilhaftesten kommt die Wirkung in an sich armen, vor allem in humusarmen Böden zur Schau. Man wird viel mehr Freude an seinen Gehölzen erleben, wenn man auch auf ihre Ernährung bedacht ist.

Der direkte Schutz besteht immer in irgend einer Schutzdecke, die natürlich recht wechselnd sein kann. In Beurteilung ihrer Wichtigkeit, Art und Form gehe man stets vom Zweck aus. Es kommt vor allem darauf an, durch sie die Verdunstung zu verhindern, aber auch der Pflanze zu ermöglichen, die verdunsteten Wassermengen recht bald wieder zu ersetzen. Das letzte ist nur möglich, wenn die Wurzeltätigkeit nur für kurze Zeiten unterbrochen wird. Also wird eine gute Deckung des Wurzelballens, der Erde um den Wurzelstock die notwendigste Schutzdecke sein. War schon etwas Dung aufgebracht, also die Mulde um die Pflanze bedeckt, so bleibt das ohne jegliche Einwirkung auf die tatsächliche Decke. Diese besteht am besten in einer genügend starken Lage recht trockenen Laubes, das fest in genügend weitem Umkreis um die Pflanze den Boden deckt. Stehen Trupps gleichartiger Pflanzen beieinander, dann wird die gesamte Fläche in gleicher Weise abgedeckt. Das schützt den Erdboden sehr vor dem Gefrieren. Doch soll das Laub durchaus trocken sein. Nasses Laub friert bald zu einem festen Klumpen zusammen und gibt dann keinen Schutz. Manchem wird eine solche Laubdecke unangenehm sein, da oft der Wind mit ihr sein Spiel treibt. Im kleineren Garten oder da, wo die Gehölze recht nahe dem Auge stehen, wird die Laubdecke als häßlicher Fleck störend empfunden. Da wird das Überlegen einiger Fichtenreiser dem Ganzen sofort einen freundlichen Anblick geben. Vor allem ist es dem Winde nicht möglich, sein Spiel zu treiben. Bei einigem guten Willen läßt sich diese Bodendecke überall anbringen, und zwar so, daß sie ihren Zweck völlig erfüllt und keinerlei Anlaß zu irgend welchen Klagen zu geben braucht.

Je mehr die richtig aufgebrachte Decke das Eindringen des Frostes in den Boden hindert, um so länger vermag die Wurzeltätigkeit ungestört weiter zu gehen. Vorübergehende Frostzeiten werden daher keinerlei Einfluß auf die Pflanze haben können. In anhaltenden, starken Frostperioden, die übrigens nur selten sind und bei uns immer wieder bald ihr Ende finden, wird die Pflanze gleichfalls noch einige Zeit unbehindert mit dem Wurzelwerk saugen und schaffen können. Der Frost kommt

erst allmählich durch das trockene Laub in den Erdboden, wo er auch nur mäßig tief eindringen wird. Die Pflanze wird daher fast immer nur während kürzester Zeit den schädlichen Einflüssen der austrocknenden Kälte ausgesetzt sein, wenn eben der starke und anhaltende Frost dennoch die Decke durchdringt und auch den Erdboden bis zu einer jeweiligen Tiefe bindet. Dadurch aber werden die Möglichkeiten der Frostschäden auf kürzeste Fristen beschränkt.

Wie weit sonst noch der direkte Frostschutz zu gehen hat, hängt von manchen Umständen ab. So manche Immergrüne werden mit guter Wässerung und genügender Bodendecke ausreichend geschützt sein. Das wäre in normalen Verhältnissen mit unseren Rhododendren der Fall. Eine weitere direkte Decke ist bei ihnen eigentlich unnötig. Nur schärfsten Kältegraden ausgesetzte Lagen erfordern sie. Wie eben die Lage, ob wärmer, kälter, geschützter oder freier, immer maßgebend ist. Junge Gehölze der gleichen Art sind stets viel empfindlicher als ältere. Letzte vertragen den Winter viel besser. Ich fand Viburnum rhytidophyllum als gut zwei Meter hohen und breiten Strauch von tadelloser Ausbildung im östlichen Deutschland, noch hoch gelegen und dem Wetter ausgesetzt, in ziemlich strengem, festem Lehmboden. Der Strauch hatte jedoch nie einen Wetterschutz erhalten. Ein Beweis, wie fest gegen Frostwirkungen ältere Gehölze sein können. Es ist falsch, diese Gehölze durch übermäßige Schutzmaßnahmen zu verwöhnen, zu verweichlichen.

Wo bei jungen immergrünen Gehölzen oder solchen, die erfahrungsgemäß etwas unsicher sind, wie einige der immergrünen Berberis, Ligustrum, Lonicera, eine weitergehende direkte Schutzdecke gegeben werden soll, handelt es sich um eine solche zur Verminderung der Verdunstung, also um Wind- und Sonnenschutz. Kleinen, jungen oder gar niederliegenden Arten ist dieser Schutz leicht zu geben. Einige Fichtenzweige werden lose über das Gehölz gelegt, seitlich in den Erdboden gesteckt, so daß die Belaubung einen sicheren Schutz vor dem kalten, trockenen Windzug hat. Jedermann weiß, wie viel wärmer und angenehmer man sich bei starker Kälte im Windschutz fühlt, als frei dem Wind ausgesetzt. Das empfindet die Pflanze in gleicher, in der Wirkung aber noch verschärfter Weise. Eine gute Decklage von Fichtenreisern hält den Wind sehr gut fern, schafft der Pflanze einen windstillen Raum. Dazu kommt, daß auch die Sonnenstrahlen abgehalten werden. Die Belaubung bleibt ziemlich unverändert in gleichem Zustand. Der schädigende, dauernde Wechsel zwischen Erwärmung und Wiedergefrieren fällt weg. Dabei ist diese Decke durchaus nicht fest abschließend. Hochragende junge Immergrüne fasse man mit Bändern lose zusammen an gleich hohem Pfahl und bringe dann die Fichtenreisig-Schutzdecke an. Doch stelle man die Zweige stets aufrecht, daß die Spitzen nach oben stehen, fange mit dem Einbinden auch oben an, damit die etwas frei und lose gelassenen Spitzen des Fichtenreisigs dem Ganzen einen mehr ungezwungenen, natürlichen Charakter geben. Das Grün an sich ist schon vermittelnd, sodaß eine einigermaßen geschickt ausgeführte Deckung durch Fichtenreisig durchaus nett sein kann.

Eine etwas schwierigere Aufgabe stellen die größeren Büsche, sofern bei ihnen ein solcher Schutz erforderlich wird. Am besten ist es noch, die Triebe oben etwas zusammen zu fassen, dann einige Stangen schräg so über den Busch zu stellen und sie unten fest in den Erdboden einzustoßen, daß sie eine breite, mehr niedrige Pyramide bilden, in der Mitte über der Pflanze zusammentreffen und hier gebunden werden können. Dann ist es leicht, durch Überlegen von großem Fichtenreisig, das an den Stangen befestigt wird, den Schutz zu geben und zwar in ausreichender Weise, und dabei auch so, daß das Ganze einen guten Eindruck macht. Jedenfalls versuche man stets, regelrechte Formen in die Schutzdecken zu bringen, da diese Regelmäßigkeit dem Auge mehr gefällt als Regellosigkeit. Bei größeren Trupps Immergrüner, die einzeln geschützt werden, stelle man einige kleine Fichten, Weihnachtsbäume, die billig zu haben sind, davor und dazwischen. Dabei entsteht ein anderes natürliches Bild, das die künstliche Mache des Schutzes verdeckt oder doch so stark mildert, daß es in einiger Entfernung überhaupt kaum wahrnehmbar ist.

Paul Kache

Arbeiten im Erdmagazin

DER Winter gilt für Garten und Gärten als Ruhezeit. Er ist es nur bedingungsweise. Noch immer muß an der Verarbeitung der Ernte gearbeitet werden und schon rufen dringende Vorbereitungen und Vorbedenkungen für das neue Gartenjahr. Aber etwas gemächlicher gehts doch im Winter zu. Die kurzen Tage erlauben, daß man die Glieder etwas länger unter der warmen Bettdecke streckt und die langen Abende geben uns Muße für gute Bücher und für die Denkarbeit über Erfolge, Fehler und zum Fassen der guten Vorsätze, wie wir künftig so vieles besser machen wollen. Uns hat es so im Vorjahr vielfach an guter Erde für die Kulturen gefehlt, Nachwirkungen der vergangenen schweren Zeiten, und mehrfach ging eine Arbeit im drängenden Frühjahr und Sommer nicht so schnell von statten, weil erst Erde gesiebt und gemischt oder noch Dünger beschafft werden mußte. So gehört zu den Zukunftsentschlüssen auch der, dem Erdvorrat noch mehr Aufmerksamkeit und Pflege zuzuwenden, denn gute zweckmäßig behandelte Erden und Dünger sind Vorbedingungen für jeden Kulturerfolg; ohne sie geht es nicht.

Wir haben im Herbst wieder einen großen Laubhaufen angefahren; wenn er sich etwas gesetzt haben wird und wenn die noch erwarteten Zufuhren gekommen sein werden, wird er sauber aufgebaut auf rechteckigem Grundriß und leicht mit Erde beworfen, damit das Laub festliegt und oben nicht austrocknet. Der vorjährige Haufen wird jetzt umgesetzt. Es zeigt sich wieder, daß Blattflächen riesig dicht sich aufeinander legen und Luft, Frost, Wind abschließen. Daher schritt die Zersetzung in den 12 Monaten nur wenig fort, und es wird hohe Zeit, daß der Haufen durchlüftet und die Schichten gelockert werden. Ein bitterlicher Geruch strömt uns entgegen, der nicht sehr fruchtbar deucht. Die Gerbsäure der Blätter wird es sein. Die Tatsache, daß wir sie riechen, zeigt ihr Entweichen an, sodaß wir keine Sorge um das Enderzeugnis haben brauchen. Ich bin nicht böse, wenn die Arbeit des Umsetzens mal unterbrochen wird auf Stunden oder Tage; wenn die Gärtner verschwinden zum Decken, Gießen in den Glashäusern oder Verpacken, denn um so reichlicher kann die Luft an die nassen unzersetzten Laubmassen heran, der nächtliche Frost legt sich auf die nassen Schichten, leistet Zersetzarbeit und beschleunigt sie. Spätherbst 1926 wollen wir schon ein Teil durchsieben, um Erde zu haben.

Neben dem Laubhaufen liegt ein Düngerhaufen aus dem Frühjahr 1925. Dünger steht bekanntlich hoch im Preise. Am höchsten im Februar-April und September-Oktober, wenn der Gärtner Frühbeete packt und der Landwirt seine Felder bestellt. Da kann unsereins normalerweise keinen Dünger kaufen. Es bleiben die Zeiten, wo wir nicht den Düngerlieferanten nachlaufen, sondern sie uns. Also wenn die Felder bestellt daliegen letzte Mai- und erste Junihälfte und im Winter. In den Heiligen 12 Nächten nach Weihnachten lassen hier manche Leute keinen Dünger fahren. Ab Mitte Juni treten schon die Spargelzüchter wieder als Käufer auf. Sie hatten in den letzten Jahren gute Einnahmen, sodaß sie die Versäumnisse des Währungsverfalles nachholen konnten. Wir müssen also Dünger kaufen zu Zeiten, wo wir ihn nicht unmittelbar aufs Land bringen können. Wir setzen ihn auf saubern Haufen von 1,50 bis 1,75 Meter Höhe, durchschichten ihn mit Landerde, Torfmull und treten ihn fest, damit er nicht verbrennt. Oben decken wir mit Erde ab, und wenn wir Gutes tun wollen, legen wir Langstroh, Erbsenkraut, alte Strohdecken und ähnliches oben auf gegen Austrocknen und Unkraut. Bis zur überdachten Düngerstätte haben wir es noch nicht gebracht. Diese Düngerhaufen noch zu jauchen halte ich nicht für ratsam oder nötig, es sei denn, daß der Dünger trocken war. Die Jauche schlemmt zusammen und die Zwischenschichten werden zu dicht. Jauche besitzen wir sowieso wenig; die Haufen, welche magere Erde haben, wie Kompost bedürfen der Nährstoffergänzung dringender.

Ein solch größerer Düngerhaufen wurde im Herbst aufs Land gefahren und in kalte Frühbeete gebracht. Es war eine mürbe, grobe Masse, mit deren Hilfe Salat, Sellerie, Tomaten, Beerenobst gut wachsen werden. In weiter zerkleinertem Zustand kann sie schon für manche zehrende Topfkultur verwendet werden. Aber ein zweiter Haufen dieser Qualität wird umgesetzt, schollige Stücke werden zerkleinert. Das muß im Herbst Misterde sein. Ihre Güte hängt davon ab, wie der Urstoff war. Kam er von Kühen oder überhaupt von ernährtem Vieh und gepflegter Dungstätte, so muß auch die Misterde entsprechend wertvoll sein. Auch das Umstechen des Düngerhaufens hat den Zweck, die Festlagerung aufzuheben, das Hereinströmen der Luft in alle Teile zu ermöglichen und die Zersetzung zu fördern. Es wird oft empfohlen, die Erdvorräte unter Bäume zu legen, Walnüsse anzupflanzen oder ähnliches. Ein leichter Schatten und ein mäßiger Windschutz sind günstig; sie verhindern starkes Austrocknen der Haufen, das einer Entwicklung der Bakterienflora hinderlich wäre. Aber zuviel Schatten halte ich für schädlich. Eine reichliche Einwirkung der Atmosphärilien erhält die Erde gesund. Lieber einen luftigen sonnigen Platz und Schutz gegen Austrocknen durch Stroh, Bohnen- oder Erbsenkraut, bei Dünger durch Erddecke, als eine dumpfe Lagerung. Man sieht oft Erdhaufen unter dichten Bäumen, dann noch gegen eine Mauer gelagert, fest getreten; er dient als regelmäßiger Ausguß von Schmutzwasser. In solchen ungepflegten Haufen erfolgt eine Zusammenschlemmung der feinen Erdteilchen und damit Luftabschluß. Solche Erde ist minderwertig und tot. Sie muß erst eine Luftkur durch-

machen, um für Kulturen brauchbar zu werden. Erde aus Teichen und Gräben sackt infolge ihrer Nässe ja auch dicht zusammen, daß keine Luft Zutritt hat. Daher bleibt sie sauer, und Umstechen, nachdem sie handlich wurde, und Zwischenschichten grober Stoffe muß sie allmählich brauchbar machen, Kalkbeigabe die Säure mildern.

Im Erdmagazin haben wir noch die Komposthaufen. Auch sie werden umgesetzt. Da sie am nährstoffärmsten zu sein pflegen, werden sie gleich mit Eingußteich für die Jauche aufgebaut. Wer viel Steine, Topfscherben und unzersetzliche grobe Stoffe im Komposthaufen hat, sollte ihn jetzt im Winter gleich sieben, damit diese Arbeit später keinen Aufenthalt gibt. Selbstverständlich ist nur ein ganz grobes Sieb nötig. Wenn schon starke Krusten gefroren sind, muß man auf das Sieben verzichten.

Wir haben noch größere Haufen von Heideerde und einer Waldnadelerde, wie sie für Erica-Arten, Rhododendron, Azaleen und andere gebraucht werden. Auch diese müssen gewendet und soweit nötig, gesiebt werden. Beide sind nährstoffarm; die Haufen werden also ebenfalls für Jaucheaufnahme hergerichtet. Sobald die Jauche aufgelassen wurde, werden die Muldenränder in den Teich hineingeworfen, sodaß die ganze trübe Wassermasse mit Erde angefüllt ist und ein dicker matschiger Brei den Haufen oben bedeckt. So wird eine gute Vermischung von Erde und Jauche mit Hilfe eines späteren Umstechens erreicht und verhindert, daß die festen Bestandteile der Jauche als verhärtende Schicht sich oben ablagern. Für Übergießen mit Jauche lasse ich dann noch aus Moostorfmull einen Haufen aufsetzen. Nach dem ersten Guß wird gleich umgesetzt, damit ein zweiter Guß die noch nicht getroffenen Teile befeuchtet; nach Bedarf folgt eine dritte Gabe. Solch gedüngter Torfmull kann schon in der nächsten Kulturperiode allen möglichen Erdmischungen beigegeben werden. Beliebt ist er bei Alpenveilchen, vielen Begonien, Gurken und ähnlichen. Natürlich darf er nicht kleinen Kindern, also Sämlingen gegeben werden, sondern Erwachsenen, die eine Portion Nahrung vertragen.

Für gleiche Zwecke lagert seit dem Herbst noch konzentriertere Masse. Ein Waggon Kuhmist, mit Torfmull durchschichtet. Der frisch aufgesetzte Haufen floß bald breit, weil die Vermischung von Torfmull und Kuhdünger nicht gleich innig genug geschehen konnte. Das haben wir 6 Wochen später nachgeholt, die nassen Düngerstellen noch mit einigen Ballen Torfmull durchpulvert. Der Frost hat geholfen, die Wände zu versteifen, sodaß der Haufen sich in jedem besseren Erdmagazin sehen lassen kann.

Nun rate ich sehr, möglichst noch weitere Schritte im Erdmagazin zu tun, um die nächste Arbeitszeit zu entlasten, nämlich die Erdmischungen für die wichtigsten Kulturen anzusetzen. Namentlich wenn Düngesalze beigegeben werden sollen oder schwerer sich zersetzende Nährstoffe, wie Hornspäne, tut eine längere Misch-Lagerung der Lösung und gegenseitigen Verbindung der Stoffe gut. — Die Zusammensetzung richtet sich nach den Kulturpflanzen und ihrem Alter. Alpenveilchen lieben vor allen Dingen eine lockere Erde, Lauberde bildet für sie den wichtigsten Mischteil; ältere Pflanzen erhalten Beigabe von gedüngtem Torfmull. Chrysanthemen und andere Pflanzen mit starkem Nahrungsbedürfnis verlangen mit dem Älterwerden und der Größenzunahme schwerere Erde. Kann man Rasenboden mit Dünger — am besten von Kühen — schichten, umsetzen, dann steht nach zwei Jahren eine vorzügliche Grundlage für Chrysanthemen da. Beigemischt wird ihr Misterde, Hornmehl, etwas Kalk. Lauberde hat für Chrysanthemen zu wenig Gehalt und kommt nur für die Jugendstadien in Frage. Ein altes Gärtnerwort »Laub ist taub« weist auf die Nährstoffarmut der Lauberde hin.

Amaryllis lieben ebenfalls Lehmgehalt der Erde und Kalk. Für die Frühbeetkulturen werden für Aussaaten vorwiegend sandige Erden gebraucht; bei Gurken sollte eine gute Misterde die Grundlage bilden; frühe Möhren lieben eine sandige Erde; Salaterde soll nicht zu leicht sein in guter Dungkraft. Erde, wie sie aus dem sogenannten Mistbeetgrund gewonnen wird, bildet zersetzt für den ganzen Erdebetrieb der Frühbeete die wichtigste Grundlage. Für das freie Land, alle Gemüsekulturen, Zwiebeln und Möhren ausgenommen, gibt es kaum etwas Besseres als Mistbeetgrund. Nur etwas einseitig pflegt solche Düngung zu sein. Kalk vor allem darf als Ergänzung nicht fehlen.

In einer Wirtschaft fallen nun noch allerlei Stoffe ab, die man gerne auf anständige Art los werden möchte, Asche, Acetylenkalk, Ruß. — Mit Asche bleibe man dem Erdmagazin fern, ausgenommen bleibt nur Holzasche, die dort am besten untergebracht wird, wo Kalibedürfnisse vorliegen. Sie kann ebensogut unmittelbar aufs künftige Möhren-, Radies- oder Rettigland kommen wie auf den Komposthaufen. Dorthin läßt sich Acetylenkalk fein verteilt bringen. Man könnte ihn auf schwereren Boden im Herbst dünn ausstreuen, damit er verwittert. Ruß hat einen bescheidenen Stickstoffgehalt und außer diesem seinem chemischen Vorzug vielleicht noch physikalische. Die Engländer mischen ihn mit Vorliebe in die Chrysanthemenerde, Rosenbeeten, Beerenobst tut er gut. Gerberlohe, Sägespäne sind fürs Erdmagazin unverwendbar.

Nun kann noch gefragt werden, ob beim Umsetzen in die Haufen noch durch Einstreu eine Bereicherung vorgenommen, ein Mangel beseitigt werden soll. Früher wurde ein Einstreuen von Kalk empfohlen, Kainit für den Stalldünger. Beide Stoffe scheinen bei reichlicher Gabe die Tätigkeit der Bodenorganismen zu lähmen. In schwachen Mengen wird aber Kalk die Säuren des Bodens abstumpfen, die in gewissen Bodenarten zweifellos reichlich enthalten sind, also etwa in den Moorerden. Dabei wird man aber bedenken müssen, welchen Kulturen die Erden bestimmt sind. War die Kalkgabe klein, etwa 1⁰/₀₀, so kann sie selbst kalkfeindlichen Pflanzen nicht schädlich sein.

Ein richtiges Erdmagazin bedeutet also keine Kleinigkeit sowohl nach Raum, wie nach Inhalt und Arbeitsaufwand. Aber seine Güte und Vollendung sind ein Maßstab für den Betrieb, und Vorbedingung für den Erfolg. Es herrscht in ihm nicht reine Ästhetik, doch des Gärtners Herz lacht jedenfalls, wenn alles da ist, und Fehlen wichtiger Bestandteile macht Sorge. Die ästhetische Seite spielt in Erwerbsbetrieben keine Rolle; da ist Ordnung genügende Ästhetik. Für Privatgärten kann saubere Begrenzung durch Hecken die Einrichtung in Zieranlagen erleichtern, doch sollte nie leichte An- und Abfuhr aus dem Auge gelassen werden. *Alexander Steffen*

HERBERT GRAF SCHAFFGOTSCH / TIEFLANDKULTUR DER ALPENPFLANZEN I

DIE mit so großer Liebe und Verständnis für die Pflanzenwelt geschriebenen Artikel von Dr. Fritz Lemperg im Oktober- und Novemberheft des letzten Bandes sind gewiß von jedem Freunde der Alpenflora mit Interesse und Freude gelesen worden. Auch ich habe dies getan, und gleichzeitig regen sie mich an, einiges aus meinen bescheidenen Erfahrungen und Betrachtungen über die Kultur der Alpenpflanzen im Tieflande niederzuschreiben. Ich besitze eine ziemlich reichhaltige Kollektion der Gebirgsflora aus aller Herren Länder, die ich teils durch Tausch und Ankauf erworben, teils aber aus Samen gezogen und selbst gesammelt habe. Die Anzucht aus Samen ist gleich jener der übrigen Stauden, erfordert aber eine größere Sorgfalt in der Zusammensetzung der dazu verwandten Erdmischungen, insofern als man auf die Provenienz der Pflanzen als Kalk- oder Urgebirgsgewächse Rücksicht nehmen soll, wenngleich mit Ausnahme einiger besonders heikler auch die Schiefergebirgspflanzen im allgemeinen mit einer auch Kalkstoff enthaltenden Erdmischung vorlieb nehmen.

Ich säe die Samen Anfang Januar in Holzkästchen aus, stelle sie in einen offenen kalten Kasten, wo sie dann vollständig einfrieren. Wenn dies geschehen, schaufle ich den ganzen Kasten mit Schnee zu, je höher um so besser. Bei Tauwetter und mit Beginn des Vorfrühlings wird der Kasten mit Balken zugedeckt, um die Schneedecke so lange wie möglich zu erhalten.

Ist dann infolge der zunehmenden Wärme die Schneeschicht geschmolzen, so wird auf die Samenkästchen Erde nachgesiebt. Sehr bald beginnen dann die Samen zu keimen. Ich habe so die besten Resultate erzielt, und kann diese Art der Aussaat sehr empfehlen, denn ich habe zum Vergleich wiederholt Schalen mit dem gleichen Samen im Kalthaus aufgestellt und konstatiert, daß jene im Freien in die Augen springend besser als die im geschützten Raum stehenden gekeimt haben. Sind die Sämlinge entsprechend erwachsen, so werden sie pikiert, aber nie tue ich dies direkt auf die Anlage, sondern unterziehe die Pflänzchen insgesamt einer Topfkultur. Erst dann, wenn sie herangewachsen sind und einen Topfballen gebildet haben, pflanze ich sie auf der Anlage aus.

Zum Sammeln der Alpenpflanzen in den Bergen erachte ich den Frühherbst als die einzig geeignete und richtige Zeit, und ganz falsch finde ich es, sie in der Vegetationsperiode oder gar in der Blüte auszugraben. Erfahrungsgemäß sind mir im ersteren Falle nahezu alle gesammelten Exemplare gut gediehen, während mir von den im Sommer geholten Pflanzen stets eine große Anzahl zugrunde gingen. Bei einiger Übung und Kenntnis der Fundstellen ist es nicht schwer, die gewünschten Pflanzen

auch dann zu finden, wenn ihr Ausſehen durch Nachtfröſte und andere Einflüſſe gelitten hat oder ſie mehr oder weniger eingezogen haben.
Zum Ausgraben verwende ich einen ſogenannten Pflanzenſtecher von ungefähr der Form eines Standhauers, welcher in einem Stück aus Eiſenſtahl hergeſtellt iſt und deſſen oberes Ende in einem Holzgriff verläuft. Das Eiſen iſt über einen halben Centimeter ſtark gehalten und ſo feſt, daß man ruhig damit Steine zerſchlagen oder ſolche auch größeren Kalibers zum Zwecke, die Wurzeln freizulegen, lockern und heben kann, ohne zu riskieren, daß das Inſtrument abſpringen würde. Soviel mir bekannt, werden ſolche nur von einer Firma, dem Meſſerſchmied A. Ockermüller in Wien IV, Wiednerhauptſtraße 16, erzeugt. Es iſt dies ein zum Ausgraben der meiſten Geſteinpflanzen beſtens geeignetes Werkzeug, während der Eispickel oder ein ähnliches hauenartiges Inſtrument für Pflanzen, die in Grashalden ſtehen, vorzuziehen iſt.
Ich trachte die Pflanzen mit einem möglichſt großen Erdballen herauszugraben, drücke dieſen in möglichſt feuchtem Zuſtande feſt zuſammen, ehe ich ihn in Papier wickle, das mit Baſt oder Schnur zuſammengehalten wird. Das große Gewicht, welches man dabei im Ruckſack herum und heimſchleppt, muß man eben mit in Kauf nehmen und ſich über die Unbequemlichkeit damit tröſten, daß es den geſammelten Lieblingen zugute kommt. Nur Pflanzen, die ſehr lange Pfahl- und wenig Faſerwurzeln haben, müſſen ohne Erdreich mitgenommen werden. Dieſe umwickle ich, ſobald ich deſſen habhaft werde, mit feuchtem Moos. Verweile ich längere Zeit an einem Orte, von dem aus ich meine botaniſchen Exkurſionen unternehme, ſo ſtelle ich die Pflanzenpakete in flachen Kiſten, die man überall bekommt, an einen ſchattigen Platz, erhalte ſie durch Beſpritzen friſch und verpacke ſie zur Heimfahrt ſo feſt wie möglich, auch zwiſchen Kleider und Wäſche, um ein Abfallen des anhaftenden Erdreiches tunlichſt zu verhindern.
Zuhauſe pflanze ich meine Ausbeute ſogleich in Töpfe, die in verſchiedener Tiefe und Breite vorrätig ſein müſſen. Speziell bei Schiefergebirgspflanzen verwende ich beim Eintopfen nur das mitgebrachte Erdmaterial, damit dieſe in ihrem heimatlichen Boden anwachſen können. Die eingetopften Pflanzen kommen in kalte Käſten unter Glas, und auch ſie finden erſt mit vollkommen ausgebildetem Wurzelballen, alſo zum früheſten im folgenden Jahre, ihren Platz auf der Anlage. Das Auspflanzen mit Wurzelballen hat, abgeſehen von der erhöhten Sicherheit, für das Gedeihen der Pflanze den großen Vorteil, daß es jederzeit auch im Sommer geſchehen kann. Wie und wo auf der Anlage das Auspflanzen zu geſchehen hat, bedarf keiner Erklärung, denn auch keinem Anfänger in der Gartenkultur wird es einfallen, xerophile Gewächſe in Schatten zu ſetzen oder umgekehrt, ſofern er überhaupt Intereſſe und Verſtändnis für das Weſen der Pflanzen beſitzt. Im Gegenteil wird jedermann trachten, den Pflanzen jene Lebensbedingungen möglichſt wiederzugeben, die er auf ihrem heimatlichen Fundorte beobachtete. Man ſoll ſich dabei nur nicht verleiten laſſen, die ſterile Lage von ausgeſprochenen Felſenpflanzen allzu getreu imitieren zu wollen, ſondern gebe auch dieſen, wie allen andern, mehr nahrhaftes Erdreich, als man ſolches auf dem heimatlichen Fundorte konſtatiert zu haben glaubt. Speziell bei Pflanzen, welche ich in ſonniger Lage zwiſchen Steine einklemme, umgebe ich den Wurzelballen mit einer mit zerſchnittenem Sphagnum vermengten Schicht von Raſen- und etwas Lehmerde, um ein Austrocknen hintanzuhalten.
Die Gebirgspflanzen in der Tieflandkultur ſind, wie nicht erſt betont zu werden braucht, ganz anderen meteorologiſchen und klimatiſchen Einflüſſen unterworfen, als jene auf den Bergen. Vor allem erwachen ſie dort um zwei bis drei Monate ſpäter aus der Winterruhe, als im Tieflande, wo ſchon im März der Frühling ſeinen Einzug hält. Bei ihrem Erwachen in der Bergheimat haben Sonne und der warme Föhn die Schneemaſſen, mit welchen ſie je nach der Höhenlage auch ſeit Anfang Oktober bedeckt waren, geſchmolzen. Der ganze Erdboden trieft von Schneewaſſer und iſt gleich einem Schwamm durchnäßt, ſo daß er auch lange Zeit nach der Schneeſchmelze feucht bleibt.
Den Sommer über ſind dann bekanntlich die Niederſchläge in den Bergen viel ausgiebiger als im Tieflande, die damit in Verbindung ſtehenden Nebel ſpenden wieder nur Feuchtigkeit, die ihnen auch in regen- und nebelloſer Zeit durch den im Gebirge herrſchenden Nachttau regelmäßig und reichlich zukommt. Zu dieſer Feuchtigkeit genießen die Pflanzen jene Fülle intenſiven Lichtes, das ihnen ſchon viel früher am Tage als der im Tale ſtehenden Pflanzenwelt geboten wird, und mit dieſer Lichtfülle iſt eine nennenswerte Erwärmung des Erdbodens verbunden, ohne aber daß die Luft in gleichem Maße erwärmt würde, weil ſie dünner iſt als im Tieflande. Bekanntlich iſt die Bergluft immer «friſch», ſie wird immer kühler, je mehr ſich der Tag neigt, bis nachts ſehr niedrige Temperatur, bis unter dem Gefrierpunkt, auch im Hochſommer eintritt.
Wie erſichtlich, ſind dies ganz andere Verhältniſſe und Lebensbedingungen als jene, unter denen die Alpenpflanzen unter 400 Meter Höhe im Tieflande exiſtieren ſollen. Hier beginnt es oft ſchon Ende Februar vorfrühjährlich zu werden, und nur allzubald iſt die durch den ſchmelzenden Schnee erzeugte Feuchtigkeit geſchwunden. Die Niederſchläge, Regen und Nachttau, ſind normalerweiſe ganz weſentlich geringer als in den Bergen. Wie oft bleibt letzter im Sommer tage- und wochenlang ganz aus. Auch wiederholtes Gießen erſetzt nicht jene Feuchtigkeit, welche die Pflanzen in der Bergheimat gewohnt ſind, ganz abgeſehen davon, daß dies immer mit Brunnen- oder Flußwaſſer geſchieht, das ganz anders beſchaffen iſt als Regenwaſſer.

(Ein zweiter Artikel folgt.)

Die Pflanze in der Wohnung

Orchideenpflege im Zimmer

NACHDEM 6 Jahre nach dem Kriege vergangen ſind und viel Liebhaberei aufgegeben werden mußte, wird jetzt wieder mancher daran denken, auf ſeine früheren Ideale zurückzukommen. Mit Recht darf daher auch jetzt die Orchideenkultur fürs Zimmer, die Blumenpflege im Hauſe wieder in Bahnen gelenkt werden, die ſie in Wirklichkeit zu einer Urſache innerer Freude und Befriedigung machen. Die Pflege der Orchideen iſt nach meinen Erfahrungen für die Zimmerkultur dankbar und dauernd anregend. Ich ſetze ſelbſtverſtändlich voraus, daß es dem Pfleger nicht um eine zufällige, kurze Spielerei oder ein allererſtes Probieren zu tun iſt, ſondern daß er die Abſicht hegt, ſolche Pflanzen zu ſuchen, die ihm ſein Heim traulich geſtalten ſollen, mit denen er ein enges freundſchaftliches Band dauernd knüpfen will. Er ſucht bei ihnen Erholung in freier Zeit, beobachtet ihr Wachstum und Blühen, ſucht ihre Lebensbedingungen zu erfüllen und gewinnt ſo einen Einblick in die pflanzlichen Stoffwechſelvorgänge in ihrer Geſetzmäßigkeit

Chysis bractescens

und Mannigfaltigkeit. Nicht jeder iſt in der Lage, ſich ein Gewächshaus bauen zu können; deshalb iſt der Blumenfreund auf ſeine Fenſter angewieſen, wo er ſeine Lieblinge unterbringt. Iſt dieſes ein hohes und breites Fenſter nach Oſten oder Weſten, womöglich ein Doppelfenſter, ſo laſſen ſich in, reſpektive an demſelben einige harte Orchideen mit Erfolg kultivieren. Man ſtelle ſie aber nicht auf das Fenſterbrett, ſondern mache ſich eine Stellage. Dieſe beſteht aus einem etwa 20 Centimeter breiten Brett, deſſen Länge der Breite des Fenſters entſpricht und das mit einem ſoliden Unterbau verſehen iſt. Die der Zimmerſeite zugekehrte Kante kann man mit Stoff in der Farbe des Möblements drapieren. Auf das Brett wird ein ſeiner oberen Fläche entſprechendes, fünf Centimeter nach oben gekantetes Zinkblech gelegt, das an den Ecken dicht gelötet iſt; auf dieſes wird eine drei Centimeter hohe Koksſchüttung gebracht, die die Pflanzen aufnehmen ſoll. Auf die Kokslage bringt man etwa zwei Centimeter ſtarke Leiſten. Auf dieſe ſtellen wir dann die Töpfe. So entſteht unter dem Topf ein Luftwechſel. Die Stellage iſt nur ſo hoch anzuordnen, daß das Zinkblech, alſo der Standort der Pflanzen, ſich 15 bis 20 Centimeter tiefer als das Fenſterbrett befindet, je nachdem größere oder kleine Pflanzen darauf plaziert werden ſollen. Durch die tiefere Aufſtellung ſoll den Pflanzen mehr Licht von oben zugeführt werden, was für ihr Wachstum beſſer iſt als Seitenlicht. Für die Gardinen des zu benutzenden Fenſters iſt dünner durchſichtiger Stoff zu wählen und ſie ſind ſo anzubringen, daß ſie den Pflanzen möglichſt viel Licht zukommen laſſen. Schutz gegen Fenſterzug und Kälte ſchafft man durch Anbringung einer Decke, die vom Fenſterbrett bis zum Fußboden herabreicht, außerdem durch gewöhnliche Zuggardinen, die nach Belieben mehr oder weniger geöffnet werden können und deshalb mit Rückſicht auf die Zulaſſung von Licht und Sonne den Rouleaus vorzuziehen ſind.

Lycaste Skinneri

Stellt man ſeine Pflanzen ſo auf, ſo haben ſie gutes Licht und einen verhältnismäßig warmen Standort; auch iſt der Fußboden geſchützt vor dem ablaufenden Gießwaſſer. Im Sommer, wo man den Koks andauernd feucht hält, wird dadurch und durch den feuchten Kompoſt der Pflanzen auch ſoviel Feuchtigkeit im Zimmer ſich entwickeln, daß der Trockenheit der Luft einigermaßen entgegengewirkt wird. Im Winter ſteht auf dem Ofen ſtets eine Verdampfſchale mit Waſſer. Als erſte Bedingung des Gedeihens der Orchideen iſt reine Luft geboten. Gegen ſchlechte Luft und Staub iſt nach Möglichkeit durch öfteres Spritzen anzukämpfen. Bei hellem, ſonnigem Wetter muß mehrere Mal am Tage geſpritzt werden. Man bedient ſich dazu einer kleinen Spritze (ſogenannter Zerſtäuber). Alle acht Tage müſſen außerdem die Pflanzen mit lauwarmem Waſſer und mit einem Schwamm abgewaſchen werden. Friſcher Luft von außen bedürfen die Pflanzen täglich, doch vermeide man Zug. Iſt die Außenluft zu kalt, wie im Winter, ſo öffnet man die Fenſter im Nebenzimmer und führt den Pflanzen durch die Verbindungstür friſche Luft, die ſich inzwiſchen erwärmt hat, zu. Gaslicht und eiſerne Öfen ſind zu vermeiden. Temperatur 15 bis 18 Grad Celſius, das normal geheizte Wohnzimmer genügt vollſtändig. Zum Gießen und Spritzen benutze man nur Regenwaſſer, da dieſes ammoniakhaltig iſt. Die Temperatur des Waſſers muß die gleiche ſein, wie die der Luft im Kulturraum.

Die wichtige Frage iſt: wie oft ſoll gegoſſen werden? Zur Beantwortung ſcheiden wir die Orchideen in zwei Gruppen, in treibende und ruhende Pflanzen. Im Treiben befindliche Pflanzen müſſen ſtets etwas feucht gehalten werden; damit iſt aber nicht geſagt, daß man täglich gedankenlos alle Töpfe bewäſſern ſoll, ohne vorher den Feuchtigkeitsgrad genau geprüft zu haben. Manche Pflanzen werden etliche Tage, vielleicht eine ganze Woche oder noch länger die Feuchtigkeit halten, was namentlich bei kühlem Wetter der Fall iſt. Wollte man dieſen Pflanzen täglich Waſſer zuführen, ſo würden ſie bald ſterben. Man laſſe alſo die Pflanzen bis zu einem gewiſſen Grade trocken werden, ehe man gießt.

Odontoglossum crispum

In der Ruhe befindliche Orchideen müſſen jedesmal, bevor ſie gegoſſen werden, vollſtändig austrocknen. Hält man ſie beſtändig feucht, ſo faulen ſie unfehlbar. Im allgemeinen wird man gut tun, die Orchideen erſt beim Einſetzen des Neutriebes zu begießen und damit fortzufahren, bis die neue Bulbe annähernd die Stärke der vorjährigen erreicht hat. Dann laſſe man mit dem Gießen langſam nach. Für die Ausbildung von Blütentrieben iſt die Beobachtung und Innehaltung der Ruheperiode, die kurze Zeit nach dem Abblühen eintritt und bei Erdorchideen (Cypripedien) vier bis fünf Wochen, bei Epiphyten aber zwei

bis vier Monate dauert, von größter, den Erfolg entscheidender Wichtigkeit. Nach Beendigung dieser Ruhezeit werden die Pflanzen je nach Bedarf mit neuem Sumpfmoos belegt oder umgepflanzt, letzteres geschieht nur dann, wenn etwa nach zwei bis drei Jahren sich der Kompost fest geballt hat, oder die Pflanzen für den Topf zu groß geworden sind. Der Kompost besteht aus Sumpfmoos (Sphagnum) und Farnwurzel (Polypodium) auch Osmundafaser, nebst einigen trockenen Buchenblättern. Alles dreies bezieht man am besten vom Lieferanten, der die Pflanzen liefert, dort bekommt man es gleich gemischt, sauber und staubfrei. Es ist dieses ein ganz vorzüglicher, poröser, federnder Kompost.
Alle Erdorchideen (Cypripedien) erhalten diese Mischung unter Zusatz von etwas altem Lehm. Bei allen Epiphyten unterbleibt jede Zugabe. In dem neuen Topf, der zuvor gewaschen wird, erweitert man das Bodenloch, füllt ihn ein Drittel mit sauberen Topfscherben, legt etwas Pflanzstoff darauf und setzt nun die Pflanze, die man vorher von abgestorbenen Wurzeln und Bulben befreit hat, darauf. Man achtet aber darauf, daß die Pflanze erhöht im Topfe zu stehen kommt, drückt nun ringsherum Kompost lose nach, bis die Pflanze feststeht. Obenauf legt man eine Schicht Sumpfmoos.
Bei dieser Aufstellung und Pflege hat man die gesündesten und blühwilligsten Orchideenpflanzen im Wohnzimmer als da sind: Odontoglossum grande, O. Rossi majus, O. pulchellum, Chysis bractescens, Chysis aurea, Acropera Loddigesii, Laelia albida, Bifrenaria Harrisoniae, Oncidium ornithorrhynchum, O. incurvum, Cypripedium (Paphiopedilum) barbatum, C. venustum, C. Ashburtoniae, Gongora tricolor und Zygopetalum Mackayi.
Alle die angeführten Arten haben mich regelmäßig alle Jahre mit ihren wunderbaren Blumen erfreut und lieferten mir dadurch den Beweis, daß von sachgemäßer Pflege auch im Zimmer das Beste zu erwarten ist. Gehen die Ansprüche aber höher, und dieses kommt von selbst, so wird aus einigen Pflanzen bald ein Zuviel. Es kommt auch der Wunsch, Cattleyen zu kultivieren, die höhere Wärme beanspruchen, dann kommt man ohne feuchte Luft nicht aus und muß zum Pflanzenhäuschen übergehen, auch dieses habe ich versucht, möchte jedoch davon abraten. Erstens ist der Raum in diesem noch beschränkter, und zweitens kommt mir dies wie ein Gefängnis vor. Schon die frische freie Luft fehlt meistens. Ja, wenn das Häuschen auf einer hellen Veranda, oder einem Balkon, oder im Garten aufgestellt wird, lasse ich das gelten. Im Winter möchte ich aber raten, die Pflanzen frei ins Wohnzimmer zu stellen. Ich bin dazu übergegangen, ein Gewächshaus im Zimmer nachzuahmen und zwar folgendermaßen: Ich habe in meinem Hause, welches drei Stockwerke enthält, oben neben meinem Wohnzimmer eine Kammer, über dieser befindet sich der Hausboden. Die Kammer ist 6,25 Meter im Quadrat, ich habe sie durch eine Glaswand geteilt, so daß der Raum nach dem Fenster zu 2,5 Meter lang und 1,25 Meter tief ist. In diesem Raum habe ich die Decke entfernt, und das Dach verglasen lassen, um Oberlicht zu erhalten. Dieser Raum dient nur zur Aufnahme der Pflanzen. Hinter der Wand rechts steht ein kleiner Ofen aus Mauersteinen und Lehm gemauert, links befindet sich ein Schornstein, welcher durch die Kammer geht. Vom Ofen aus habe ich nun ein Heizrohr aus Schamott-Tonröhren durch den Kulturraum in den Schornstein geleitet und zwar 25 Centimeter vom Fußboden entfernt. Unter dem Heizrohr steht rechts und links ein Wasserkasten aus Zink 125 mal 80 Centimeter und 10 Centimeter hoch. Diese sind stets mit Wasser gefüllt, auch um alles Gieß- und Spritzwasser aufzufangen. Über dem Heizrohr steht ein Drahtgeflecht mit zerkleinertem Torf, der stets feucht gehalten wird. 15 Centimeter über der Torfschicht ist die Tablette aus Latten, die je 5 Centimeter auseinanderliegen, auf denen die Pflanzen stehen. An der Vorderseite unter dem Fenster habe ich 10 Centimeter über dem Fußboden in der Entfernung von je 80 Centimeter einen Stein herausnehmen lassen, um Lüftung von unten zu haben. Die Löcher können durch Klappen geschlossen werden. Die obere Lüftung ist im Glasdach angebracht.
Bei der Kultur vollzieht sich nun folgender Vorgang: Man öffnet die unteren Löcher mehr oder weniger, die einziehende kalte frische Luft, die auch die für die Pflanzen so nötige Kohlensäure enthält und in geschlossenen Räumen so schnell verbraucht ist, bestreicht das Heizrohr und erwärmt sich dort, die vorgewärmte frische, aber noch trockene Luft steigt beim Aufsteigen durch den lose nebeneinander gelegten Torf und nimmt aus ihm die Feuchtigkeit mit. Erst dann gelangt die schwere feuchte Luft an die Töpfe mit den Pflanzen, die dann mit einer Luft umgeben sind, die der tropischen Urwaldluft ähnlich ist. Im Sommer gilt es, für die nötige Beschattung zu sorgen, ich benutze dazu Stäbchenwolldecken, die ich in der Zeit von 11 Uhr vormittags bis 4 Uhr nachmittags vorhänge. Bei solcher Einrichtung und Pflege habe ich mir im Laufe der Jahre einen Stamm edler Orchideen im Wohnraum herangezogen, einige fünfzig Stück, deren Lebensdauer infolge der Bauart und Einrichtung der Pflanze unbegrenzt sein kann. Ihre Bedürfnisse an Pflege sind zwar dauernd, wenn auch gering, ihre Blühwilligkeit dagegen groß und die Blütenpracht unübertroffen. Ich empfehle sie jedem, der an der Pflege eines Stückes Natur im Hause Freude findet. *G. Karge*

Am Wege

MANCHMAL stehen Leberblümchen im Sommer oder Winter ganz ohne Blätter, neben solchen mit voll erhaltenen Blättern, sind aber unterirdisch ebenso munter wie jene und ebenso für den Frühling gerüstet.

•

Mancher denkt, im Winter braucht man nichts gegen Mäuse zu unternehmen, sie sind aber in milden Winterwochen sehr lebendig. Allgemein verbreitet ist die Meinung, daß Mäusegiftmittel Gefahren für Haustiere enthalten. Es gibt aber einen Mäusekuchen, der nur Nager tötet.

•

Wenig bekannt ist, daß unter allen Arabis-Arten eine von einer ganz besonderen Kraft und Ordnungsliebe ist und das ganze Jahr hindurch besonders reizend aussieht, nämlich die weißrandige mit ihrem famosen gedrungenen Wuchs.

•

Wenn du denkst, daß du dich mit gewissen Schwächen des dunkelroten Prachtthymian gegenüber Sonnenbrand an südgeneigter Stelle resignieren mußt, so unterliegst du einmal wieder der mit jeder Resignation verknüpften Gefahr falscher Verallgemeinerung, denn es gibt zwei ebenso schöne dunkelrote Formen von vollendeter Widerstandskraft.

•

Tatsächlich tritt Adonis amurensis meist schon Anfang Januar in Blüte. Man erlebt es immer wieder, aber glaubt darin doch seiner Erinnerung kaum. Wie oft muß sich manche Erfahrung wiederholen, ehe wir unserer Erinnerung glauben.

•

Zwölf Jahre lang hat der Winterjasmin nicht versagt, sondern in jedem Winter monatelang geblüht. In diesem Herbst lockte ihn die lange Herbstwärme zu früh hervor, sodaß durch den frühen harten Winter alle Blüten und Knospen erfroren, der erste derartige Fall seit zwölf Jahren. Aber wieder kam die Resignation zu früh, denn er hat es jetzt, Mitte Januar, fertig gebracht, weiter zu blühen und zweigweise in unversehrten Knospen zu stehen.

•

Wer in Aubrietia-Einfassungen rhythmisch Iberis einsprengt, darf nicht vergessen, daß Blütezeiten und Größenverhältnisse der Sorte Weißer Zwerg, nicht der Schneeflocke in Betracht kommen.

•

Oft werden Zwergahorn in dunkelrotbrauner Frühjahrsbelaubung gekauft und nachher ihr Grünwerden bejammert. Gegen alle Zwergahornnöte: Grünwerden, teilweises Trockenwerden gibt es völlig sichere Abhilfe, zunächst den Kauf von Ablegerpflanzen oder Sämlingspflanzen, also nicht Veredlungspflanzen, des echten Acer palmatum atrorubens. Stecklingspflanzen kommen auch in Betracht, doch scheint sich wegen bestimmter, manchmal auftretender Schwierigkeiten diese Vermehrungsart nicht einzubürgern. Ganz sicher war sie nur bei A. p. dissectum. Ich habe große Quartiere von Sämlingspflanzen der A. p. atropurpureum durchgesehen und dabei ebensowenig Abänderungen wahrgenommen, wie in den benachbarten Ablegerpflanzenquartieren.

•

Wie groß ist die Anmut des Wuchsgerüstes der Lonicera coerulea! Das mittelgroße Sträuchlein, mit zierlichen Schneelasten behangen, ist von einem wunderlichen Schönheits-Geheimnis umwittert. Ruhig wartet so etwas in seiner Vereinzelung und Vereinsamung auf unterscheidungskräftige Zeiten, selten genug getroffen von Augen, die von solchem Sonderwesen mit einem kleinen elektrischen Schlag berührt werden. Seine Zweige brauen ein so frühes März-Aprilgrün, daß dies schon genügenden Anlaß zur Pflanzung bieten würde. Den frühen weißgelblichen Blüten wird man wohl noch weitere Schmuckwerte beibringen können. *K. F.*

Gartenrundſchau

NEUES AUS ALLER WELT

Gärten im Altertum

AM Schluſſe ſeiner ſehr gehaltvollen Artikelreihe in *The Gardeners' Chronicle* zieht Hilderic Friend aus ſeinen Darlegungen einige beachtenswerte allgemeine Schlüſſe. Im Altertum war der Garten, Obſtgarten, Park oder Ziergarten, immer ein eingefriedigtes Viereck, infolgedeſſen konnte er bequem in gleiche Teile zwecks Bewäſſerung geteilt werden. Für eine ſolche war immer Sorge getragen, auch Baſſins für Fiſche und Waſſerpflanzen und eine Fontäne waren oft vorhanden. Die Umfriedung erfolgte in verſchiedener Weiſe zum Schutze, ſomit bedeutet das Wort Garten, gleich dem perſiſchen Paradies und chineſiſchen, ſemitiſchen und anderen Bezeichnungen für Garten immer Einfriedigung und Schutz. Jedes Volk des Altertums hatte ſeinen heiligen Baum oder Lebensbaum, beiſpielsweiſe Dattelpalme, Banane, Olive, Orange, Apfel oder Weinſtock. Es konnte aber ſtatt des Nutzbaumes auch ein Schutzbaum ſein, wie die Eſche der Skandinavier. Der Garten war aber nicht nur Nutzgarten, ſondern ſtets gleichzeitig ein Ort der Erholung. Die alten Ägypter dachten dabei ſogar an den Garten als Stätte für die Geiſter der Verſtorbenen. Derartige Auffaſſungen führten zur Entwicklung myſtiſcher Ideen und Symbole im Garten. Alle alten Völker, von denen Mitteilungen über ihre Gärten vorliegen, waren Bewohner tropiſcher und ſubtropiſcher Gebiete. Infolge der oft drückenden Hitze ſchufen ſie Fontänen und Waſſerläufe und Grotten für Kühle und Schatten, ferner Pavillons, Sommerhäuſer und andere Raſtplätze. Mithin verdankt auch die Architektur dem Garten ſehr vieles. Vom reinen Nutzſtandpunkt ſind wir dem Altertum für die große Zahl der Früchte und Blüten, die die alten Gärtner der Nachwelt überlieferten, zu größtem Danke verpflichtet. Wie die Namen lehren, kamen vom Oſten zu uns Roſe, Tulpe, Orange und Damascener Pflaume.

Feuerdorn-Formen

AUSSER unſerem bekannten, im 17. Jahrhundert aus dem nahen Orient eingeführten Pyracantha coccinea giebt es noch eine Reihe harter Formen, über die *La Revue Horticole* berichtet. Die var. Lalandei erſchien 1874 beim Gärtner Lalande in Angers. P. crenulata wird ſchon 1814 von Roxburgh erwähnt. P. angustifolia kam gegen Ende des letzten Jahrhunderts aus China zuerſt nach Frankreich und England. Abbé Delavay entdeckte ihn 1882, und Père Soulié ſchickte 1895 Samen an Maurice de Vilmorin. P. crenulata wurde von E. H. Wilſon verſchiedentlich in China wiedergefunden, und die var. yunnanensis kam durch Père Ducloux 1906 zu Vilmorin, während Rogersiana 1913 von G. Forrest nach England geſandt wurde. Sie hat größere Früchte als der Typ, und zwar eine gelbe und eine orange Form. Die dritte Form von crenulata, var. Gibbsii, unterſcheidet ſich durch größere, breitere, tiefer gezähnte Blätter, während die Früchte ſehr denen der var. yunnanensis ähneln und gleich dieſen ſich ſpät färben. Auch F. N. Meyer führte aus Nordchina eine var. kansuense nach Amerika ein, und weitere noch zu beobachtende Formen liegen in franzöſiſchen Baumſchulen vor.

Herbſtgrüne Gehölze

UNTER den laubabwerfenden Gehölzen gibt es eine ganze Reihe, die ihre Blätter bis tief in den Herbſt hinein ſattgrün behalten und ſo durch den Kontraſt die Wirkung der ſich bunt verfärbenden Formen ſteigern. Nach Beobachtungen im *Arnold Arboretum,* die Sargent im *Bulletin of Popular Information* veröffentlicht, iſt dies dort bei folgenden Bäumen und Sträuchern der Fall: Salix vitellina, S. babylonica, S. Matsudana, Magnolia glauca, Quercus pedunculata, Ligustrum vulgare, Rhamnus Purshiana, Evonymus Bungeana var. semipersistens, Viburnum Lantana, Lonicera japonica und var. aureo-reticulata, ſowie die im Herbſt blühende var. Halliana, L. Henryi, Smilax hispida, Akebia lobata und A. quinata.

Orchideenkreuzung

BEI Orchideen ereignet es ſich oft, daß Formen, die wir gern kreuzen möchten, nicht zu gleicher Zeit blühen. Man hat nun auf verſchiedene Weiſe verſucht, den Pollen der erſtblühenden Form ſo lange zu konſervieren, bis die zweite Form in Flor kommt. Wie *The Orchid Review* berichtet, gelang es Mrs. Thwaites durch einfaches Einwickeln des Pollens in Seidenpapier und Aufbewahren in einer Blechdoſe ihn mehrere Wochen lang gut zu halten. So wurde beiſpielsweiſe Cattleya amethystoglossa mit C. Trianae gekreuzt, in welchem Falle der Pollen am 24. Februar abgenommen und am 16. April verwendet wurde. Die gleiche Forſcherin fand, daß man Pollen in Blaupapier einwickeln und in Gelatine-Kapſeln einbetten konnte, ſodaß er ſeine Lebenskraft drei und einen halben Monat behielt. Norman C. Cookson wählte eine andere Methode. Er nahm ganz kleine Reagensröhrchen, etwa drei Centimeter lang, und ſteriliſierte ſie in einer Spiritusflamme. Nach dem Erkalten brachte er den Pollen auf den Boden, erhitzte das offene Ende und ſchmolz es zuſammen. Das Glas leitete die Hitze als ſchlechter Wärmeleiter nicht bis zu dem Boden. Der eingeſchloſſene Pollen hielt ſich monatelang gut.

Einfluß von elektriſchem Licht auf Pflanzenwuchs

IN England, wo die Lichtverhältniſſe für den Pflanzenzüchter oft beſonders ungünſtige ſind, ſchenkt man dem elektriſchen Licht als konſtanter Quelle ſeit langem große Beachtung auch in der Pflanzenzucht. A. Grove berichtet darüber einiges in no. 2033 von *The Gardeners' Chronicle.* Es handelt ſich um Experimente, die Borlaſe Matthews auf ſeiner Farm gemacht hat, um die Entwicklung gewiſſer Pflanzen zu beſchleunigen. Er benutzte 1000 Watt-Lampen, die in zwei Fuß breiten Reflektoren vom Firſt des Glashauſes herabhingen, und ſich einen Meter entfernt vom Topf der Verſuchspflanzen befanden. Narcissus Pseudonarcissus, die während ſechs Nachtſtunden, als ihre Knoſpen ſich gerade zu bilden begannen, dem Lichte ausgeſetzt wurden, blühten in vier Tagen und wuchſen täglich etwa dreiviertel Zoll. Vergleichspflanzen entfernt vom Licht brauchten vier Wochen. Dieſe Experimente wären koſtſpielig geweſen, wenn nicht der Veranſtalter die Elektrizität durch eigene Waſſerkraft erzeugt hätte, außerdem wurde ſie von zwölf bis ſechs Uhr nachts für dieſe Zwecke benutzt, wo ſie für andere nicht gebraucht wurde. Da man die Lichtquelle ſo nahe der Pflanze anbringen muß, iſt ihre Wirkung begrenzt und die Koſten für die einzelnen Pflanzen ſtellen ſich zu hoch. So kann man dies Mittel nur für ganz ſpezielle Zwecke mit Erfolg anwenden. Nach Groves Feſtſtellungen iſt es praktiſcher, die Pflanzen eine Nacht um die andere zu belichten. Er ſchlägt eine andere Anordnung der Lampen vor, damit dieſe leicht verſtellt werden können. Ferner iſt es für verpflanzte Sämlinge ſehr wertvoll, wenn man ſie in der Nacht nach dem Verpflanzen belichtet, da ſie dann nicht welken und ſehr ſchnell anwachſen. Eine einmalige nächtliche Beleuchtung ſoll eine Wuchswoche erſparen. Die Stärke des Lichtes und die Art der Beleuchtung muß beſonderen Verhältniſſen aber angepaßt werden. Die von den Lampen ausſtrahlende Wärme ſpielt wohl eine nicht zu unterſchätzende Rolle dabei.

Arnold Arboretum-Expedition nach Nordweſtchina

IM September 1924 ging, wie Sargent im *Journal of the Arnold Arboretum* berichtet, J. F. Rock, ein geborener Wiener, der ſchon früher in Aſien erfolgreich geſammelt hatte, wieder nach China und kam im März 1925 nach Szechuan, nahe der tibetaniſchen Grenze in das Gebiet der Tebbu. Nach ſeinen letzten Berichten vom Sommer fand er dort viele neue Koniferen, insbeſondere Abies und Picea in verſchiedenen Arten, ferner Primeln und Meconopsis. Man darf ſeinen weiteren Mitteilungen und Sendungen mit großen Erwartungen entgegenſehen und muß hoffen, daß er trotz der unſicheren Verhältniſſe, die auch in dieſen Gegenden Chinas herrſchen, glücklich und erfolgreich zurückkehrt.

W. R. Dykes tötlicher Unfall

ENDE November verunglückte der bekannte Sekretär der Royal Horticultural Society, William Rickatson Dykes, auf einer Automobiltour ſo ſchwer, daß er am 1. Dezember nach einer erfolgloſen Operation ſtarb. In ihm verliert nicht nur die engliſche Gartenbaugeſellſchaft einen ausgezeichneten Sekretär, ſondern auch der Gartenbau im Allgemeinen und die botaniſche Wiſſenſchaft haben Grund, das plötzliche Hinſcheiden tief zu beklagen. Iſt doch Dykes als Iris-Monograph und Kenner der Gattung Tulipa und der herbſtblühenden Crocus-Arten ſeit langem weit bekannt. Ich perſönlich hatte ihm manches Entgegenkommen zu verdanken.

C. S.

Jubiläums-Gartenbau-Ausſtellung Dresden 1926

DIE Leitung der Ausſtellung bemüht ſich in jeder Weiſe, die Ausſtellung eigenartig und vielſeitig zu machen. Sie zieht auch die Bildende Kunſt in den Bereich der Gärten, was ſehr zu begrüßen iſt. Die Anlagen umfaſſen bereits ein Areal von 320000 qm. Es ſteht zu hoffen, daß der ganze deutſche Gartenbau ſich beteiligt, damit endlich wieder einmal eine über lokale Bedeutung weit hinausgehende Blumenſchau zuſtande kommt, die ein wahres Bild von der jetzigen Höhe unſeres Gartenbaues bieten kann. Dresden iſt dazu wie kein anderer Ort geeignet. An und für ſich iſt es eine vom Strom des Fremdenverkehrs ſtark beſpülte Stadt. Da nun zu der Gartenbau-Ausſtellung auch eine Internationale Kunſtſchau tritt, ſo iſt jedem Beſucher Anregung in Hülle und Fülle geboten.

Jahrhundertfeier der Flora

DIE Sächſiſche Geſellſchaft für Botanik und Gartenbau, »Flora« zu Dresden begeht am 22. Februar das Feſt ihres hundertjährigen Beſtehens. Aus dieſem Anlaß findet an dieſem Tage ein Feſtaktus ſtatt, bei dem Walter Dänhardt einen Feſtvortrag über die Geſchichte der Geſellſchaft hält. Ferner ſieht das Feſtprogramm für den 23. Februar von 10 bis 1 Uhr einen wiſſenſchaftlichen Teil vor, an dem Vorträge mit Lichtbildern von Dr. Sulze, A. Steffen, Dr. Frimmel und Prof. O. Drude ſtattfinden. Am Abend ſoll eine Feſttafel mit Ball folgen. Das endgültige Programm wird noch bekannt gegeben. *C. S.*

Neue Bücher

SCHNITTBLUMENGÄRTNEREI. Vor kurzem erſchien bei Paul Parey, Berlin, die neue, dritte Auflage von dem Werk *Curt Reiter, Die Praxis der Schnittblumengärtnerei*, Lehr- und Handbuch für den neuzeitlichen Gartenbaubetrieb. Sie umfaßt 576 Seiten mit 288 Textbildern, die im großen ganzen zweckentſprechend ſind. Reiters Buch genießt als Spezialwerk auf einem wichtigem Gebiete einen guten Ruf. Auch die Neuauflage zeigt, daß der Verfaſſer beſtrebt iſt, auf der Höhe der Zeit zu bleiben und ein wirklich praktiſches Handbuch zu bieten. Natürlich iſt es nicht möglich, zu einzelnen, teilweiſe umſtrittenen Fragen hier Stellung zu nehmen. Was mir bei genauerer Durchſicht einiger Abſchnitte, vor allem der Freilandgewächſe auffällt, ſind Flüchtigkeiten in der Namenſchreibung, die doch bei etwas größerer Sorgfalt in einem ſolchen Werke leicht vermieden werden könnten. Ich greife ein paar Beiſpiele heraus. Seite 333 Aconitum Fisheri ſtatt Fischeri; Seite 341 Aster Mrs. J. F. Ragnon ſtatt Raynor, Beauty of Cornwall ſtatt Colwall, was wohl überhaupt ein Verſehen iſt, da auf der folgenden Seite ſich eine »Schöne von Colwall« ganz richtig unter den lilafarbenen findet, wo es auch eine Chimax ſtatt Climax gibt. Auf gleicher Seite Buphtalmun ſtatt Buphthalmum. Seite 351 Diplostephium amygdalium iſt identiſch mit Aster umbellatus und nicht mit Boltonia latisquama (nicht latisquania). Bei Lilium vermiſſe ich einen Hinweis auf L. regale, auch L. Willmottiae. Wieſo Seite 482 Salix gracilistyla (nicht gracilistylis) von »zierlich hängendem Wuchs« iſt und als Hochſtamm veredelt werden muß, begreife ich nicht, der Verfaſſer muß da was ganz anderes im Auge haben. Die Gehölze bedürfen unbedingt einer beſſeren Durcharbeitung und Sichtung. Gerade in ſolchem Handbuche kommt es darauf an, eine richtige Ausleſe des Beſten zu geben! Denn es iſt beiſpielsweiſe nicht einzuſehen, weshalb man bei Cotoneaster, Seite 490/1, als ſchönſte fruchttragende gerade C. rugosa Henryi und die unanſehnliche C. nigra nennt, während man Arten wie C. multiflora calocarpa und soongorica, die weltbekannte C. horizontalis, wie auch C. bullata, C. Dielsiana und andere ausläßt. Warum Seite 491 Evonymus latifolia, eine ſo gute Art, als E. europaea var. latifolia geführt wird, iſt mir unklar. Beide haben doch nichts mit einander zu tun. Doch genug dieſer Hinweiſe. Sie ſollen den Wert des Buches nicht herabſetzen, aber den Verfaſſer zu noch größerer Sorgfalt bei künftigen Auflagen anregen.

GARTENKALENDER 1926. Diesmal erſcheint *Hönſchs Kalender* zum 25. Male auf dem Plane. Unter den leſenswerten Beiträgen finden ſich einige ſehr anregende. So von B. Voigtländer über wenig verbreitete harte Blumenzwiebeln und Knollengewächſe, von A. Naumann über die Bedeutung des Waſſers für die Pflanze, von H. Kammayer über die Erhaltung geſchichtlicher Gartenanlagen und von anderen über verſchiedene Themata.

KAKTEENZUCHT. Bei der ſo großen Beliebtheit der Kakteen iſt es kein Wunder, wenn die Kakteenbücher immer zahlreicher werden. Vor kurzem erſchien in der Franckh'ſchen Verlagshandlung, Stuttgart, von Dr. *W. von Roeder* eine kleine Schrift *Der Kakteenzüchter*, worin er die Grundſätze und Ziele neuzeitlicher Kakteenpflege ſchildert und in einem Anhange auch einige andere beliebte Sukkulenten beſpricht. Zu 26 Textbildern treten 32 kleine Tafeln. Das Buch wird jedem Kakteenfreunde Anregungen bieten, da der Verfaſſer namentlich die Kulturfragen praktiſch darzuſtellen weiß. *C. S.*

Zeitſchriften

BELGIEN

Kurze Hinweiſe über Gärten in Marokko finden ſich in no. 468 von *La Tribune Horticole*. In no. 472 werden die Pflanzen der Kongogärten geſchildert. no. 473 giebt eine Liſte der 100 beſten Pflanzen für Steingärten. — In *Le Jardin d'Agrément* vom November wird die Anlage von Waſſer- und Sumpfgärten beſprochen. Das Dezemberheft bringt eine Liſte der 25 beſten immergrünen Laubgehölze für den Steingarten.

DÄNEMARK

In No. 8 der *Havekunſt* von 1925 iſt eine Betrachtung über Ausſtellungsgärten in Paris und Wembley. Sorenſen beſpricht Siedlungsgärten. No. 9 ſchildert zwei Privatgärten. In no 10 werden Vorfahrtsplätze in Beiſpielen gezeigt.

ENGLAND

Das Novemberheft der *Orchid Review* zeigt einige ſchöne neue Odontogloſſen. Intereſſant iſt im Dezemberheft eine Notiz über Befruchtung von Orchideen mit konſerviertem Pollen. — Aus dem reichen Inhalt der November- und Dezemberhefte von *The Garden* ſei kurz folgendes hervorgehoben: no. 2816 enthält einen Vorſchlag für eine goldene Rabatte aus Stauden und einigen Gehölzen. Ferner eine Liſte der beſten Aſter Amellus-Sorten, worauf in no. 2817 eine Liſte der beſten Sorten von Aſter Novi Belgii folgt. In 2818 werden Philadelphus-Arten und Formen beſprochen, als drei ſehr gute gelten Voie Lactée, purpureo-maculatus und Virginal. Eine Reihe von Varietäten der bei uns kaum bekannten Dierama pulcherrimum werden aufgezählt. In no. 2820 beginnt E. H. Wilſon eine Artikelreihe über die Birken, wobei er Betula verrucoſa die beſte weiße Birke nennt. Ein Vorſchlag für eine weiße Staudenrabatte mit Beifügung einiger Gehölze iſt bezeichnend für England. Im folgenden Hefte iſt eine Liſte als ſehr gut geltender neuer Staudenpäonien wichtig. K. Ward berichtet in no. 2822 über einige Primeln der Nivalis-Gruppe aus Tibet. — In den Heften der letzten Monate von *The Gardener's Chronicle* findet ſich wieder ein Reichtum an wichtigen Mitteilungen. Wir weiſen kurz hin auf folgendes: no. 2024 zeigt in der Beilage den Sonnengarten von Falinge Park Rochdale, der in ſeiner Art auch in England einzig zu ſein ſcheint. In den Notizen über Gärten des Altertums werden Auszüge aus dem Sanskrit veröffentlicht. Unter den neueren Roſen iſt R. Davidii von Weſtchina, wie ein Fruchtzweigbild in no. 2031 zeigt, auch als Fruchtſtrauch ſehr zierend. Cypripedium oder Paphiopedilum »Roſalind« und »Brigadier Beckton's Var.« zeigen, welch ſchöne Frauenſchuhformen im Glashauſe jetzt zu finden ſind. F. K. Ward ſchildert weiter an der Hand eindrucksvoller Bilder ſeine 8. Reiſe in Weſtchina und Tibet. Immer größer wird die Zahl der wichtigen Rhododendren aus China. Die Tafel in no. 2034 zeigt R. orthocladum.

FRANKREICH

Im Novemberheft von *La Revue Horticole* beſpricht Meuniſſier die Arten und Formen des Feuerdornes und zeigt auf einer Farbentafel Früchte von 5 Formen. Im letzten Jahresheft berichtet Mottet über in Frankreich harte Nothofagus-Arten aus Südamerika. Die Farbentafel zeigt Sorten der gefüllten Chineſer Nelke Imperator. Im Dezemberheft von *Jardinage* wird das berühmte Arboretum Allard in Angers kurz geſchildert, das ſo reich an ſeltenen Koniferen und anderen immergrünen Gehölzen iſt.

HOLLAND

In no. 19 von *Onze Tuinen* ſchreibt van Laren über Ferula Asa foetida. M. Faber ſetzt ſeine Betrachtungen über den franzöſiſchen Garten in Europa ſeit Ludwig XIV. fort. In no. 21 beginnen Darlegungen über Miniaturgartenkunſt und kleine wintergrüne Gewächſe. Intereſſant ſind auch die Angaben über Parkanlagen auf neu aufgeſchüttetem Terrain. — Die *Floralia* vom 13. November enthält einen Artikel über die Sequoias. In no. 48 wird die neue Dahlie Secretaris Voors farbig gezeigt. no. 51 iſt eine Weihnachtsfeſtnummer.

NORDAMERIKA

In no. 34 des *Bulletin of the American Dahlia Society* iſt eine Schilderung der großen Dahlienſchau in New York von Intereſſe mit Angabe der Dahlienſorten, die ausgezeichnet wurden. — Von den Publikationen des *Arnold Arboretum* liegt das *Bulletin of Popular Information* in no. 17 und 18 vor. Intereſſant iſt eine Schilderung ſolcher Gehölze, die bis ſpät in den Herbſt hinein grün bleiben. — Das *Journal of the Arnold Arboretum* ſchließt jetzt ſchon Band VI ab. Das 4. Heft enthält wieder wichtige Noten über kritiſche Gehölze. — Auch das Bulletin of Popular Information des *Morton Arboretum* wird fortgeſetzt. No. 6 bringt weitere Berichte über Verſuchspflanzungen von Forſtbäumen. — *Horticulture* vom 1. November behandelt unter anderem das Thema Lilienpflanzung. — Die letzten Nummern von *Gardener's Chronicle of America* bringen Schilderungen von Bodnant Hall Gardens in North Wales, wo ſich wundervolle Anlagen und Sammlungen befinden. Auch zwei hübſche Gärten aus Ohio werden beſprochen.

VERLAG DER GARTENSCHÖNHEIT G. m. b. H. in Berlin-Weſtend / Verantwortlich für die Schriftleitung OSKAR KÜHL in Berlin-Weſtend, für den Anzeigenteil DOROTHEA KLETT, Berlin-Lichterfelde / Buch- und Kunſtdruckerei W. SOMMER, Inhaber OSKAR KÜHL, Berlin-Schöneberg.

Sammelmappe

LOB DES LANDLEBENS

DER Weise macht es sich zu einem Gesetze, sich nach der Natur zu richten, und einen Teil des Jahres den Beschäftigungen mit ihr zu widmen. Da sie einige Monate hindurch in den anmutigsten Reizungen erscheint, und in ihrem Schoße einen Ueberfluß der süßesten Vergnügungen erzeugt; so würde er es als eine Undankbarkeit gegen sie, und als eine Unbilligkeit gegen sich selbst ansehen, wenn er ihre Ergötzungen nicht zu der Zeit, wo sie ihm dieselben anbietet, annehmen wollte. Daher ist es rühmlich, wenn man, ohne die Sorge für das äußere Vermögen zu vergessen, sich in der Absicht Sommerhäuser erbaut, um auf ihnen die Annehmlichkeiten des Jahres zu genießen. Diese schöne Gewohnheit ist in allen angebauten Ländern sehr herrschend geworden, und vielleicht kann man aus derselben eine Art eines Beweises für den guten Geschmack unserer Zeit nehmen. Die einzelnen Hütten und Häuser waren ohne Zweifel die ersten, welche die Menschen bewohnten. Als sie sich vermehrten, verbanden sich Gesellschaften, und erhoben sich Städte, in welchen sich hin und wieder ein verbrüderter Haufen niederließ, um sich die Bedürfnisse zu erleichtern, die Bequemlichkeiten des Lebens besser zu genießen, und sich vor den Anfällen der Ungerechten zu sichern. Der Mensch ward gezähmter; die Vernunft fing an,

ihn immer mehr aufzuklären; umherziehende Rotten verminderten sich; das Land ward wieder ruhig, und der Hirt und der Pflüger waren nicht mehr in Gefahr, überfallen und ihres Eigentums beraubt zu werden. Und war es möglich, die Felder zu bebauen, und die schönen Schauspiele der Natur täglich vor Augen zu haben, ohne von ihnen gerührt zu werden? Mußte nicht der Mensch auch da, wo er seinen Nutzen fand, sein Vergnügen finden? Mußte er nicht den Lockungen so vieler angenehmen Gegenstände folgen, und auf die Spur gebracht werden, sich Häuser, nicht allein für die Notdurft, sondern auch für seine Belustigung, zu erbauen? Jetzt wurden die angenehmsten Gegenden gesucht und mit Landhäusern bepflanzt; jetzt wurden die rauhen Raubschlösser in friedfertige Lustplätze verwandelt, und von den Höhen, von welchen das Auge nur nach dem Feinde umhergeforscht hatte, sahe man jetzt in die ruhige Landschaft hin, und weidete die Blicke an dem Schönen der Natur. Man sah manchen

Freund auf dem Lande zufrieden leben, und bei Herden und beim Ackerbau reich werden; und man wählte seine Lebensart und fand sie in angekauften oder angeerbten Landgütern. Vielleicht ward auch mancher der Sitten und der Bosheit der Stadt überdrüssig, und baute sich eine ruhige Wohnung im Lande an. So entstanden unsere Sommerhäuser. Wie viel sie zur Verschönerung eines Landes beitragen, das zeigen besonders einige Gegenden in der Schweiz. Sie sind eine der vortrefflichsten Zierden, die eine Landschaft haben kann; sie erregen eine angenehme Vorstellung von dem Wohlstande ihrer Einwohner; sie erinnern an das erste glückliche Alter der Welt, wo Unschuld und Ruhe die hin und her zerstreuten Hütten der Menschen bewohnte, und bei ihrem Anblick wallt ein fühlendes Herz von einer geheimen Sehnsucht nach den stillen Ergötzungen des Landlebens.

Man liest immer mit einem lebhaften Vergnügen, was für eine Liebe die weisen Römer zu dem Landleben gehegt, und wie sehr sie es gesucht haben. Sie wählten die Ruhe ihrer Landgüter zu ihren Wissenschaften, und bereiteten sich in denselben zu den Geschäften des Staates vor; und wenn sie diese würdig verwaltet hatten, so zogen sie sich wieder in die Stille des Landes zurück und suchten ihre Erquickung. So sehr liebten die Römer die Stille des Landlebens, und suchten in derselben eine Art der Erquickung und des Trostes wider die Schwachheiten, und die Hinfälligkeit der Natur. Sie glaubten selbst wider das Unglück die beste Sicherheit in ihren Landhäusern zu finden. Sie begaben sich in dieselben durch eine freiwillige Verbannung, wenn die Bosheit sie in der Stadt verfolgte, und vergaßen die Ungerechtigkeit und Undankbarkeit ihres Vaterlandes unter dem Schatten einer stillen Entfernung. Und welcher Ort ist wohl geschickter die Sorgen zu mindern und die Bekümmernisse des Lebens zu zerstreuen? Wo ist es wohl leichter, das Unrecht der Welt zu vergessen, und die em-

pörten Leidenschaften zu unterdrücken, als auf dem Sommerhause, das uns von dem Anblick unserer Feinde entfernt, und in der glücklichen Stille, worin es uns verschließt, das Gemüt aus so vielen Annehmlichkeiten der Natur mit einer ruhigen Heiterkeit wieder belebt? Hier können diejenigen, die die Unbeständigkeit der menschlichen Dinge erfahren und von der Hand des Schicksals gedrückt werden, ihre betrübten Gedanken in der weiten Gegend verfliegen lassen, und Gram und Angst gleichsam den Flügeln der Winde übergeben, um sie wegzuwehen. Die Tränen vertrocknen unter dem mitleidigen Säuseln der Luft; das Herz zerschmelzt in eine stillere Wehmut. Die Erquickungen der Natur kommen uns überall entgegen, und wir empfangen mit ihnen eine sanfte Linderung der Schmerzen. Die traurigen Bilder verschwinden nach und nach. Der Geist widersteht nicht mehr beruhigenden Betrachtungen; und eine weise Gelassenheit bricht wie eine heitere Abendröte nach einem regenvollen Tage, mitten durch die Bekümmernisse der Seele, hervor. So verlieren sich die Betrübnisse, und die Beschwerlichkeiten unserer Tage allmählich unter der stillen Anmut des Landlebens; und welches Herz, das seine Last fühlt, wird nicht mit einer geheimen Sehnsucht seufzen?

C. C. L. Hirschfeld
in »Das Landleben«, 1768.

*

ALLERLEI

Der italienische Botaniker Gregor Fontana hat über die Fortpflanzungsmöglichkeit der Pflanzen interessante Studien angestellt. Das Bilsenkraut (Hyoscyamus niger) besitzt derart viele Samenkörner, daß, wenn alle zur Entwicklung kämen, nach seiner Berechnung vier Jahre hinreichen würden, um die ganze Erdoberfläche mit Bilsenkraut zu überwuchern.

*

Im Schönbrunner botanischen Garten zu Wien befindet sich eine zu den Asclepiadaceen gehörige Pflanze (Fockea capensis), die das einzige Exemplar der Welt ist. Sie wurde vor mehr als 100 Jahren im Auftrage des Kaisers von Oesterreich in Kapland gesammelt und seither nie mehr gefunden. Da die Früchte nicht reifen, ist an eine Erhaltung nicht zu denken.

*

HINWEIS

Der Gesamtauflage dieser Nummer liegt ein Prospekt der Firma **August Bitterhoff Sohn,** Berlin O 34, Frankfurter Allee 27, bei, der besonderer Beachtung ausdrücklich empfohlen sei.

Gartenschönheit

eine Zeitschrift mit Bildern

für Garten- und Blumenfreund · für Liebhaber und Fachmann

Februar 1926

in Gemeinschaft mit Karl Foerster und Camillo Schneider

herausgegeben von Oskar Kühl

Verlag der Gartenschönheit G.m.b.H. Berlin-Westend

GARTENSCHÖNHEIT

EINE ZEITSCHRIFT MIT BILDERN

FÜR GARTEN- UND BLUMENFREUND / FÜR LIEBHABER UND FACHMANN
IN GEMEINSCHAFT MIT KARL FOERSTER UND CAMILLO SCHNEIDER
HERAUSGEGEBEN VON OSKAR KÜHL

Erklärte dauernde Mitarbeiter:

7. JAHR / HEFT 2 FEBRUAR 1926

GARTENSCHÖNHEIT

eine Zeitschrift mit Bildern
für Garten- und Blumenfreund
für Liebhaber und Fachmann
in Gemeinschaft mit Karl Foerster
und Camillo Schneider
herausgegeben von Oskar Kühl

Inhalt des Februarheftes:

Seite

Gleditsia caspica in Eisgrub / Bild 29
Georg Lenz / Der Blumenmaler Jan van Huysum / Mit Bild 29
Gustav Schwantes / Stammlose Mesembrianthemen I / Mit 5 Bildern 30
Franz Lipp / Garteneindrücke aus Amerika / Mit 8 Bildern 34
F. Frimmel / Über die Grundlagen der Farbenzüchtung II / Mit Bild 36
Wilhelm Korff / Mistelzauber / Mit Bild . 37
Paul Kache / Die Nadelhölzer im Hausgarten II / Mit 3 Bildern 38
Camillo Schneider / Ein Besuch in Saffron Walden / Mit 5 Bildern 40
Karl Foerster / Immergrüne Zwerglaubgehölze / Mit 5 Bildern 42
B. Voigtländer / Der Forstgarten von Tharandt 45
Liste der wichtigsten Kleinimmergrünen . . 46

Aus dem Blumengarten der Literatur
Kaktusgestalten von Adalbert Stifter . . . 45

Gartenaufgaben
J. Schweizer / Eine Teichbepflanzung / Mit 2 Bildern 47

GARTENARBEIT UND BLUMENPFLEGE
Alexander Steffen / Gartengeräte: Allgemeines, Die Schaufel / Mit Zeichnung . . 49
Herbert Graf Schaffgotsch / Tieflandkultur der Alpenpflanzen II 50
William Hertrich / Das Verpflanzen größerer Kakteen / Mit 4 Bildern 51
Bepflanzungspläne / Karl Foerster: Eine Staudenrabatte / Mit Zeichnung 53
Aus der Werkstatt der Pflanzenzüchter / Robert Türke: Rosenstudien 34
Vom Werkstoff des Gartens / W. Kriechbaum: Anbau von Primelsamen / J. Anlauf: Kunstdünger für Alpenrosen und Koniferen 54

GARTENRUNDSCHAU
Neues aus aller Welt
Zwei seltene früh blühende Sträucher / Kukkucks-Pflanzen / Der Frankfurter Palmengarten / Die Tannen Europas und des Mittelmeergebietes / Deutsche Dendrologische Gesellschaft / Freilandkakteen 55
Neue Bücher
Deutsche Kakteen-Gesellschaft / Der Botanische Garten in Halle / Die nordamerikanischen Brombeeren / Die Welt der Pflanze / Gärtnerische Lehrhefte / Unser Garten / Innen-Dekoration 56
Zeitschriften 56

BILDBEILAGE
Tongefäß mit Blumen

FARBIGE BILDBEILAGEN
Immergrüne im Steingarten
Strelitzia Reginae / Billbergia pyramidalis

Monatlich ein Heft
Bezugspreis für das Vierteljahr
in *Deutschland* 4 G.-M. und 0.75 G.-M. Versandkosten (Postscheckkonto Berlin 76290), im *Ausland* einschließlich Versandkosten: 5.25 Goldmark = 1.25 U. S. A.-$ oder entsprechend in der Landeswährung.
Preis des Einzelheftes
1.50 Goldmark zuzüglich Versandkosten

Verlag der Gartenschönheit G.m.b.H.
Berlin-Westend / Akazien-Allee 14.

Im Steingarten ſind während der Winterzeit die immergrünen Polſterſtauden in ihren fein abgeſtimmten Tönungen wichtig. Auf dem oberen Bild aus Fürſtenſtein zeigen wir Schattierungen, wie ſie Thymus lanuginosus (unten), Saxifraga umbrosa (Mitte), Veronica Allionii (rechts und links davon), Cerastium Bieberſteinii (links oben) und Sedum spurium (im Hintergrund) ergeben. Bild C. S.

Unter den kriechenden Steinmiſpeln iſt die weſtchineſiſche Cotoneaster Dammeri oder humifusa nicht nur wegen ihrer immergrünen Belaubung und der feinen weißen Blütchen, ſondern vor allem wegen des lebhaft roten, den ganzen Winter über bleibenden, meiſt reichen Fruchtbehanges von ganz beſonderem Zierwerte. Sie darf heute in keinem Steingarten mehr fehlen. – Bild M. Schreiber bei K. F.

Gleditsia caspica in Eisgrub. – Bild C. S.

Im Februar

GEORG LENZ / DER BLUMENMALER JAN VAN HUYSUM

ES iſt etwas Eigenes um den Blumenmaler. Sein Leben iſt ein zärtliches Sichverſenken in die wunderſame Welt der Blumen, dieſer ſanften Geſchöpfe, von denen ein deutſcher Myſtiker geſagt hat, ſie ſeien »edler denn die ganze Welt«. Dieſe lieblichen Gebilde, die ein liebetrunkener Gott mit den prächtigſten, phantaſtiſchſten Gewändern zum hochzeitlichen Feſte geſchmückt zu haben ſcheint, erſchließen ihre rätſelvolle Schönheit ganz nur dem, der ſie ehrfürchtig und »demütig vor dem Geiſt, den ſie ausſtrömen«, liebt. Sich in dieſen Geiſt zu vertiefen, den Geiſt einer jeden Blume – denn jegliche Art unterſcheidet ſich ſo lebhaft von der andern wie der Menſch vom Menſchen – dazu gehört eine Verſonnenheit, die nur ein feinſinniger Menſch aufzubringen vermag. Dem Blumenmaler ſind Roſen, Lilien, Primeln, Nelken und alle andern Blumen nicht nur als Typen vertraut, er weiß, daß Roſe und Roſe, Lilie und Lilie und Tulpe und Tulpe einander oft ſo wenig gleichen wie eine Königin dem Bauernkind. Der zarte Schmelz einer Teeroſe, ihr weiches verwelkliches Blumenblatt, ihr hängender Wuchs, und die ſtraffe üppige Remontantroſe verhalten ſich wie eine ſanfte träumeriſche Dame zu einer lebensfrohen ſchönen Maid, und die kleine Polyantha mit ihren lieblich zarten und doch ſo kräftigen Blüten und ihrem üppigen Wuchs wirkt neben ihnen wie ein mutwillig fröhliches Kind. Die weiße Lilie, die in ihrer keuſchen Schöne von alters her die Blume der Madonna war, und die feurigrot gefleckte Tigerlilie – das ſind zwei Welten, die ſich ſo fern ſind wie Kirchenmyſtik und Sinnenrauſch. Der Blumenmaler verſteht ſie beide. Er weiß den Zauber einer Wieſenprimel mit ihrem hellen weichen Laub und dem duftenden hängenden Köpfchen ſo gut auszudeuten wie den der kleinen ſtrammen Aurikel mit ihren ſamtenen biſchofsfarbenen Blüten.

Dieſe zartſinnige Einfühlung des Künſtlers in das Leben und Weben der Blumen erklärt es wohl, daß ſeine ſtill beſchauliche Tätigkeit von jeher als beſonders idylliſch und poetiſch empfunden worden iſt und zu manchen Dichtungen angeregt hat. Schon Plinius berichtet uns mit ſichtlichem Behagen von Pauſias, dem Blumenmaler, und ſeiner Geliebten Glycere, »welche Blumenkränze zu winden einen ſehr erfinderiſchen Geiſt hatte« und ihm die ſchönſten Gedanken für ſeine Blumengemälde eingab. Goethe hat aus dieſer hübſchen Geſchichte die Anregung zu ſeinem entzückenden Gedicht »Der neue Pauſias und ſein Blumenmädchen« geſchöpft, in dem er ſo viel ſinnige Gedanken über die Blume und ihre künſtleriſche Darſtellung zu ſagen weiß. Lenau hat die Blumenmalerin als die Zauberin gefeiert, die den welkenden Blumen ein unverwelkliches Denkmal ſetzt. Und Wilhelm Raabe hat zum Helden ſeiner Erzählung »Haſtenbeck« einen Blumenmaler der Fürſtenberger Porzellanmanufaktur gemacht, deſſen Portrait er mit der ihm eigenen ſtillebenhaften Gründlichkeit überaus liebenswürdig gezeichnet hat.

Als ſelbſtändige Kunſtgattung erſcheint die Blumenmalerei erſt im 17. Jahrhundert. Und es iſt kein Zufall, daß ihre Wiege in dem ſchon damals durch ſeine Blumenzucht berühmten kleinen Holland geſtanden hat. Eine ganze Reihe von Künſtlern hat ſich dort dieſem Sonderfach gewidmet, von denen viele noch heute mit großen Ehren genannt werden. Aber auch die Blumenſtücke der kleineren niederländiſchen Meiſter aus jener Zeit, die keinen ausgeſprochen perſönlichen Stil zeigen, wahren ein bemerkenswertes Niveau, mit dem ſie ſich neben den führenden Meiſtern ganz leidlich behaupten. Bei den Zeitgenoſſen und bis ins 19. Jahrhundert hinein galt als der bedeutendſte unter den niederländiſchen Blumenmalern der im Jahre 1682 in Amſterdam geborene Jan van Huyſum, der wohl auch zu den fruchtbarſten Vertretern des Blumenfachs zu zählen iſt. Die neuere Forſchung hat mit Recht das Verdienſt mancher ſeiner Vorläufer wie David de Heem, Daniel Seeghers, Jan Fjit, Abraham Mignon, Rachel Ruyſch, nicht geringer, ja zum Teil höher eingeſchätzt. Aber auch die berechtigten Einwendungen, die man gegen Huyſums Kunſt erhoben hat, können die Bewunderung nicht ſchmälern, die ſein großes Lebenswerk fordert.

Jan van Huyſum ſtammt aus einer Künſtlerfamilie. Sein Vater, ſein Onkel und drei ſeiner Brüder waren verdienſtvolle Maler, die alle mehr oder weniger das Blumenſtück gepflegt haben. Die gute handwerkliche Tradition, die Jans Arbeiten immer erkennen laſſen, verdankt er wohl dem Vater, der ihn, als den älteſten ſeiner Söhne, von Anfang an zu allen Arbeiten heranzog und ihm offenbar eine ſehr gründliche Ausbildung zu Teil werden ließ. Selbſtändig machte ſich Jan ſchon im Jahr 1704, als er mit Eliſabeth Takens den eigenen Hausſtand gründete. Er hat ſich von da ab faſt ausſchließlich auf das Blumen- und Fruchtſtück beſchränkt, man kennt daneben von ihm nur einige heroiſche Landſchaften, denen aber keine beſondere Bedeutung beigemeſſen wird. Das

Tongefäß mit Blumen

Glück ſcheint ihm ſehr bald gelächelt zu haben. Seine Bilder wurden von Anfang an mit Beifall aufgenommen, und ſein Name wurde ſchnell über die Grenzen ſeines kleinen Vaterlandes hinaus bekannt. Huyſum wird als ein Sonderling geſchildert, ein Einſiedler, der, eiferſüchtig auf ſeine Kunſt, ſich nicht entſchließen konnte, Schüler anzunehmen, und während der Arbeit ſeine auch ſonſt nur wenigen zugängliche Werkſtatt ängſtlich verſchloſſen hielt. Von einer einzigen Schülerin wiſſen wir, Margarethe Havermann, deren er ſich aber auch wieder entledigte, ſobald ſie mit eigenen Arbeiten Erfolg hatte. Sie iſt ſpäter in Paris als Kopiſtin Huyſumſcher Blumenſtücke und mit ähnlich empfundenen eigenen Kompoſitionen hervorgetreten.

Huyſum iſt der typiſche Stillebenmaler geweſen, der mit der Verliebtheit des Spezialiſten den Ehrgeiz verband, ſich in ſeinen Blumendarſtellungen niemals gegen ihre Portraitähnlichkeit zu verſündigen. Es wird berichtet, daß er wegen einer beſonderen gelben Roſe, die ihm bei der Kompoſition eines Gemäldes fehlte, dieſes ein Jahr lang zurückhielt, bis ſie zu haben war, und daß er nicht ein Gemälde nach dem andern fertig zu ſtellen pflegte, ſondern immer eine große Anzahl von Blumenſtücken gleichzeitig in Arbeit hatte, um für ſie im Laufe des Jahres die jeweilig blühenden Blumen gewiſſenhaft nach der Natur wiedergeben zu können. Die Naivität, mit der der Künſtler ſo im bemerkenswerten Gegenſatz zu ſeiner ſonſtigen Abhängigkeit von den Naturvorbildern Blumen vereinigt, deren Blüte nie zuſammenfällt, bietet in ihrer Seltſamkeit dem Blumenfreund ein eigenartiges nie erlebtes Schauſpiel, das aber der künſtleriſchen Geſamtwirkung keinen Eintrag tut. Nahezu unerreicht iſt Huyſum in der zeichneriſchen Beherrſchung ſeiner bunten Kleinwelt, und mit bewundernswerter Virtuoſität verſteht er es, ſeine üppigen Sträuße anzuordnen. Die in überwältigender Fülle ausgebreitete Blumenpracht ſeiner Gemälde iſt oft ſchier erdrückend, und doch kann man ſich ihrem Zauber nicht entziehen, beſonders wenn man die fein modellierten Blüten einzeln betrachtet und die minutiöſe Sorgfalt erkennt, mit der hier die kleinſten Dinge in der Zeichnung und Riefelung der Blätter, jeder Staubfaden und Tautropfen wiedergegeben ſind, oder die Früchte bewundert, bei denen kein Härchen und keine Aderung und kein Sonnenreflex überſehen iſt. Gern läßt er ſeine Blumenſträuße aus einer Vaſe, einem Kübel oder Korb hervorquellen, in deren Auswahl er einen ſicheren Geſchmack beweiſt, und faſt immer läßt er ſie von Faltern und kleineren Inſekten umſchwirren, die wiederum mit aller erdenklichen Feinheit ausgeführt ſind, oder er fügt als letztes Stimmungselement, ohne ein Reiſerchen zu vergeſſen, ein Neſt mit Vögeleiern bei, das uns freilich heute etwas reichlich ſentimental anmutet. Die einheitliche Wirkung der Gemälde leidet zuweilen unter dieſem ſich Verlieren in botaniſche und andere Details. Die Blumenfreunde werden indes gerade hierfür Verſtändnis haben. In der koloriſtiſchen Behandlung ſeiner Blumenſtücke iſt Huyſum faſt immer harmoniſch, ſeine Farbenakkorde ſind voll, aber nicht laut, erſt bei den Alterswerken zeigt ſich eine gewiſſe Kälte und Buntheit.

Der Ruf des großen Künſtlers hat Huyſum ſein ganzes Leben hindurch begleitet. Wir finden denn auch in vielen Galerien Bilder von ſeiner Hand, die zum großen Teil ſchon von ihm perſönlich erworben ſind. Die Sammlungen in Paris, Berlin, Dresden, Hamburg und Kaſſel geben Gelegenheit, ihn von ſeiner beſten Seite kennen zu lernen, und beſonders zahlreich iſt er in der kleinen Schweriner Galerie vertreten.

Das niederländiſche Blumenſtück iſt in neuerer Zeit wiederholt grundſätzlich angegriffen worden. Die Naturnähe und botaniſche Treue dieſer altmeiſterlichen Arbeiten wurde beſonders von den Impreſſioniſten als durchaus unkünſtleriſch empfunden. Als beiſpielsweiſe der berühmte engliſche Äſthet John Ruskin dem Maler Whiſtler die Unbeſtimmbarkeit der Blumen in ſeinem Stilleben zum Vorwurf machte, entgegnete dieſer: »Der Maler beobachtet eine Blume nicht in der Abſicht, botaniſche Beobachtungen daran zu machen, ſondern er betrachtet ſie mit dem Auge des Äſtheten, der aus der feinen Auswahl glänzender Farben und leuchtender Töne die Anregung zu rein künſtleriſchen Harmonien ſchöpft.« Der Streit iſt müßig. Den Blumenviſionen, die Whiſtler verteidigt, ſoll ihre künſtleriſche Berechtigung gewiß nicht abgeſtritten werden, aber den paſſionierten Naturfreunden wird ſeine Einſtellung weniger kongenial ſein als die ihr zweifellos künſtleriſch durchaus ebenbürtige Auffaſſung des alten Blumenmalers, der nicht müde wurde, ſich in die zarteſten Gebilde der Schöpfung andächtig zu vertiefen und ihre Farbenpracht und ihre beſondere Stimmung künſtleriſch auszudeuten.

GUSTAV SCHWANTES / STAMMLOSE MESEMBRIANTHEMEN

DIE großen, für unſer Wirken und Wollen richtunggebenden Eindrücke kommen garnicht immer dann über uns, wenn zu ihrer Erzwingung große Veranſtaltungen getroffen ſind; ebenſo oft oder vielmehr öfter überfällt uns ein Neues, umſtrahlt uns ein nie geſehenes Licht, wenn wir gleichgültig am Rande des Alltags entlangſchlendern. Ein Zufall dieſer Art führte zu meiner erſten Bekanntſchaft mit Mesembrianthemum; ein Blick in Alwin Bergers damals kürzlich erſchienenes Buch »Mesembrianthemen und Portulaccaceen«, als es galt, in einem danebenſtehenden Werke derſelben Bibliothek etwas ganz anderes zu ermitteln, ein großer Blumentopf mit einigen aus ſeltſamen, quallenartig dicken, glänzend gelbgrünen, oft ſchön rot angelaufenen Blattmaſſen herausblühenden ſchönen glänzend gelben Blumen und dabei ſitzenden großen Samenkapſeln in unſerem Botaniſchen Garten: damit etwa begann bei mir das Intereſſe für Mesembrianthemum. Das Gefühl, hier ſtehſt du am Eingang zu einer neuen Welt, in der das Wunder aus allen Fugen und Finſterniſſen ſchaut, packte mich, und ich war glücklich, als ich nach ein paar Wochen einen kleinen Steckling jener begehrten ſeltſamen Pflanze mein eigen nannte. Das, was da in meinem Blumentopf erſt zwei Wochen lang ſich nicht rührte, bald aber mächtig ſich zu regen und zu dehnen begann, war oder vielmehr ſollte ſein Mesembrianthemum Salmii. Damals nahm ich den Namen als ein Gewiſſes mit nach Hauſe, nichtahnend, ein wie unſicheres Gebiet ich damit betreten hatte; aber das iſt ja zunächſt für jeden Liebhaber Nebenſache. Mein Cicerone belehrte mich, daß Mesembrianthemum Salmii zur Sektion der Linguiformia gehöre, den Zungenförmigen alſo, ſo genannt nach ihren mehr oder weniger breit zungenförmigen, oft aber auch ziemlich ſchmalen, aber immer ſchön friſch grünen, oft glänzenden, weichen und ſehr dicken Blättern. Schneidet man deren eins von der Pflanze und preßt es zwiſchen den Fingern: welch eine Menge Saft träufelt zur Erde; da iſt jedes Blatt ſichtbarlich eine kleine Waſſertonne — jedem Kinde kann man an dieſem merkwürdigen Gewächs aufs leichteſte das Weſen der Sukkulenten klarmachen. Ein Durchſchnitt durch ein Blattſtück läßt ohne Schwierigkeit erkennen, daß das Innere von einem klaren, großzelligen, ganz mit Reſervewaſſer erfüllten Gewebe erfüllt iſt, während das blattgrünhaltige aſſimilierende Gewebe ſich nur nahe der Haut findet. Der Steckling, ein abgeſchnittener Zweig mit drei bis fünf Blattpaaren, wie ſie ſtets an den immer nach allen Seiten wachſenden älteren Pflanzen zu ſehen ſind, wurzelt im Frühling bald, am beſten in recht ſandiger Lauberde oder auch Miſtbeeterde oder einer Miſchung beider. Am Ende ſchiebt ſich ein Blattpaar nach dem anderen heraus, ſtets das eine Blatt etwas kürzer als das andere, was der Botaniker Anisophyllie nennt. Und nicht lange, ſo erſcheinen dort, wo die Blätter am Stamme zu einer kurzen Scheide zuſammengewachſen ſind, aus dieſen andere, bald ſich zur Seite neigende Zweige oder auch die dicken, verheißungsvollen Blumenknoſpen. Sie bilden einen kurzen Stiel, und dann öffnet ſich an einem ſonnigen Tage, oft ſchon im April oder Mai die ſchöne Blume, einer Löwenzahnblüte nicht unähnlich, innerlich aber himmelweit von ihr verſchieden. Denn was wir Löwenzahnblume nennen, iſt in Wirklichkeit ein ganzes Körbchen gefüllt mit

Sämling des ſogenannten Mesembrianthemum Salmii in halber natürlicher Größe. – Bild Schwantes

Mesembrianthemum tigrinum in natürlicher Größe. – Bild Karſtens

zahlreichen Einzelblüten: bei Meſembrianthemum haben wir aber eine einzige echte Blume vor uns. Am erſten Tage öffnet ſich die ſchöne Blüte, die ſo ſeltſam aus dem etwas an ein halbdurchſichtiges Meerestier erinnerndes Blattwerk herausſchaut, nur wenig, doch mit jedem Tage wächſt ſie und erreicht ſchließlich fünf bis ſechs, ja ſieben Centimeter Durchmeſſer. Und nach der Blüte die Frucht! Ja, dieſe wunderbaren Früchte, daß es ſo etwas überhaupt im Pflanzenreiche gibt, wiſſen ſelbſt heute nur erſt wenige unter den vielen alteingearbeiteten Gärtnern und Gärtnerinnen aus Liebe. Die Meſembrianthemen haben die kompliziertеſten Samenkapſeln im geſamten Pflanzenreiche, und dies ſind die Auferſtehungsſterne, die ſo wunderbar geformt und eingerichtet ſind, daß ich ſpäter einmal von ihnen erzählen muß. Hier nur ſoviel, daß ſich die, wie geſagt, ſehr zuſammengeſetzten Kapſeln, wenn man ſie mit Waſſer befeuchtet, öffnen und bald beim Austrocknen wieder ſchließen. Man iſt immer wieder überraſcht, wenn aus der äußerlich ſo unanſehnlichen braunen Kapſel ſich ein ſo reizendes ſternförmiges Gebilde entfaltet. Darin ſieht man von feinen Membranen zierlich überdachte, ſtrahlig angeordnete Kammern, in denen man durch die feine Haut hindurch gelbe Samenkörner liegen oder in einer ſtark befeuchteten Kapſel vielmehr ſchwimmen ſieht. Nach außen zu ſieht man dieſe Kammern durch je einen weißen Pfropf verſchloſſen; daran ſchließt ſich, noch weiter dem Rande zu, der Kreis der Klappen mit dunkeln hygroskopiſchen Leiſten, die das Öffnen beſorgen, und das alles gruppiert ſich zu einem ſo entzückend feinen Gebilde, daß es mit Blumen im Wettſtreit treten kann. Übrigens hat man in alten Zeiten dieſe Kapſeln, deren Urſprung man nicht kannte, ſchon einmal als ſternförmige Pilze beſchrieben! Mit dem Austrocknen ſchließt ſich das Wundergebilde langſam; die hygroskopiſchen Bewegungen erinnern ſtark an die der Roſen von Jericho, an die beiden echten aus dem Lande Kanaan und die falſche, eine Selaginella aus Mexiko, und es iſt begreiflich, daß der Handel

Meſembrianthemum lupinum in natürlicher Größe

auch die Früchte von Meſembrianthemum gelegentlich als Roſen von Jericho verwertet. Der Vorgang des Öffnens und Schließens läßt ſich an jeder Kapſel beliebig oft wiederholen, Jahre, Jahrzehnte lang; bei manchen Arten freilich werden die Kapſeln nach allzu vielen Bemühungen ſchließlich doch träger und wollen nicht mehr. Man überlege nun folgendes: Die Kapſel gibt den Samen nur dann heraus, wenn es regnet, alſo wenn der Augenblick gekommen iſt, an dem die Samen das zum Keimen nötige Waſſer finden. Dieſe Pflanzen ſtammen ja aus der Karru, der Wüſte des Kaplandes, in der es bei andauerndem mörderlichen Sonnenbrand vielleicht im Jahre nur ganz kurze Zeit regnet; der Regen kann unter Umſtänden auch einmal ein ganzes Jahr überſchlagen. Welche Weisheit der Natur offenbart ſich da in dieſer merkwürdigen Samenkapſel. Der auf den heiß beſonnten Boden geſtreute Same könnte völlig ſeines geringen Waſſervorrates beraubt werden oder Sandverwehungen und anderen Gefahren zum Opfer fallen, wenn er nicht bis zum richtigen Augenblick in der Kapſel geborgen wäre. Aus ihr ſpült der Regen die Körner heraus — wie das eigentlich vor ſich geht und wozu die ſeltſamen Einrichtungen im Innern der Frucht da ſind, iſt vielfach immer noch ein Rätſel. Alwin Berger meinte, daß Regentropfen, die auf den Rand ſolcher komplizierten Kapſeln, wie die Linguiforma ſie haben, fallen, zunächſt im Innern der Kapſeln die Samen von ihren Nabelſchnüren löſen und ſie unter die durchſichtige Decke emporheben und dann nach und nach hinausſchleudern — eine Erklärung, die für viele Kapſeln richtig ſein mag. Manche Kapſeln haben gar keine Deckhäutchen über den Samenfächern; hier werden die Samen einfach herausgewaſchen.

Unſer Meſembrianthemum verheißt uns alſo nach der ſchönen Blüte noch einen ganz erleſenen Genuß in der Geſtalt der Frucht, freilich nur geiſtiger Art, was auch ein Glück iſt, da die Schar aller derjenigen, die beim Anblick einer Pflanze immer fragen, ob ihre Früchte auch genießbar ſeien, bei der Gattung Meſembrianthemum ſehr zu kurz kommt und daher aus dem Kreiſe der Adepten ſehr zu deſſen Vorteil ausſcheidet. Denn die ſauren »Pferdefeigen« der Buren, die einige wenige Arten mit ſaftig bleibenden Früchten tragen, wie Meſembrianthemum edule und Verwandte, werden nur recht wenigen zuſagen — ich muß freilich geſtehen, daß ich ſie noch nicht gekoſtet habe, da ihre Erzeuger bei uns leider ſo gut wie nie ihre märchenhaft ſchönen Rieſenblumen in Gelb oder Violett entfalten.

Aber auch der geiſtige Genuß einer trockenen Meſembrianthemumkapſel iſt oft garnicht ſo leicht zu erreichen. Mir ſelbſt erging es damit abſonderlich, aber dafür wurde ich für jahrelanges Warten dadurch entſchädigt, daß ich eine für Biologie und Kultur der Meſembrianthemen nicht unwichtige Tatſache entdeckte. Das kam ſo. Jedesmal, wenn an meinem

Meſembrianthemum tuberculoſum in natürlicher Größe

Jan van Huijsum, Tongefäß mit Blumen

Mesembrianthemum caninum in natürlicher Größe. Bilder Karstens

Mesembrianthemum »Salmii« eine Blüte voll entfaltet war, versuchte ich mit Hilfe eines feinen Tuschpinsels Blütenstaub auf die am Grunde sichtbaren strahligen Narbensterne zu bringen; wenn dann die Blume verwelkte und der Fruchtknoten ein wenig anschwoll, war ich froher Hoffnung, daß sich nun eine Frucht entwickeln werde; jedoch nach ein paar Wochen erschlaffte der Fruchtknoten und vertrocknete bald darauf. Das ging so Jahre hindurch. Während im Botanischen Garten die gleichen Pflanzen üppig Früchte ansetzten, wollte die meinige nicht, obgleich sie wahrlich nicht schlechter im Wuchse war als die Exemplare des Gartens. Nun mag mancher meinen, ich hätte mir ein paar Kapseln vom Botanischen Garten erbitten können und meine Sehnsucht wäre dann gestillt worden; aber wer so spricht, hat nicht die mindeste Ahnung von den Gefühlen eines richtigen Zimmergärtners und von denen eines Sukkulentenliebhabers schon garnicht. Denn ihm kommt es durchaus nicht so sehr darauf an, wie es den Pflanzen anderer Züchter ergeht, sondern er muß die Gewächse, die er von klein auf gehegt und gepflegt hat, also die Kinder seines eigenen Heimes, auf ihrem ganzen Lebenswege von der Wiege bis zum Grabe mit seiner ganzen Aufmerksamkeit begleiten. Jedes neue Blattpaar seiner Pflanzen hat er langsam sich entfalten, jeden Zweig dem Mutterstamme entsprießen sehen; jede einzelne Blüte wurde in allen Stadien der Entfaltung beachtet, bewundert, geliebt, und nun wünscht er sich seine Pflanze reich mit Samenkapseln besetzt. So ein großer Rasen oder Klumpen eines Mesembrianthemum Salmii oder einer andern Art derselben Gruppe, schließlich einen großen Topf bis zum Rande überwuchernd und endlich mit den phantastischen Zungenblätterzweigen überkletternd und auch die Seitenwände des Topfes überspinnend, mit recht festen, dicken, frisch glänzenden Blättern, ein Abbild strotzender Gesundheit und im Winter übersät mit den Wunderkapseln, das ist das Ziel des Liebhabers. Dieses Ziel der Wünsche hätte auch ich damals erreicht, wenn die Pflanze nur hätte Samen reifen wollen, aber darin versagte sie — oder ich? War der sonnige Platz am Südostfenster nicht gut genug für sie? Sie wandert also auf den Balkon und verlebt dort einen subtropischen Sommer, bekommt prachtvolles Blattwerk von nie erreichter Härte mit wunderschönen karminroten Rändern und Spitzen, blüht fast aus jedem Blattpaare — aber von Früchten keine Spur. Hier hatten doch Insekten Zutritt; ich selbst sah, wie Fliegen Pollen naschend in den Blumen ein- und ausgingen; alle etwaigen Nachteile der künstlichen Bestäubung fielen fort, und trotzdem gab es nicht eine einzige Kapsel. Da dämmerte in mir der Gedanke auf, daß ein bisher ganz unbeachtetes Etwas hier im Spiele sei, daß diese Pflanze vielleicht nie Früchte mit dem eigenen Blütenstaube ansetzen würde, daß hier die Natur Hemmungen gelegt haben könnte, die immer gern von ihr vermiedene Selbstbefruchtung, Inzucht, zu verhindern. Ich entsann mich, in Darwins »Orgin of Species« und gelegentlich auch in anderen Werken von solchen »selbststerilen«, also mit eigenem Blütenstaub unfruchtbaren Gewächsen gelesen zu haben, fand auch bald bei verschiedenen Autoren noch mehr Belege für deren Existenz, und nun kam die Probe aufs Exempel. Ich säte Samen der Pflanze aus und entdeckte dabei wieder eine Quelle reizvoller Genüsse. Aus den Samen kamen zunächst Keimpflänzchen mit zwei ganz normalen Keimblättern, die freilich rund und dick und in der Mitte verwachsen waren. Bald jedoch schwollen sie stärker an und bildeten nun zusammen ein dickes Tellerchen, aus dessen Mitte nach einigen Wochen wie zwei Hörnchen die ersten Folgeblätter erschienen, ein allerliebster Anblick. Da die Sämlinge nun groß genug erschienen, sich verpflanzen zu lassen, wurden sie einzeln in kleine Töpfe gesetzt und entwickelten sich nun in den frühen Sommermonaten mit großer Geschwindigkeit. Zunächst erschienen aus der Mitte noch zwei bis drei Blattpaare, dann aber krochen aus allen Pflanzen stets drei Seitentriebe heraus, deren Blätter nun nicht mehr kreuzweise gegeneinander standen, sondern annähernd alle in einer Ebene lagen, ganz wie bei dem alten Exemplar des Mesembrianthemum Salmii. Die Pflanze hatte also eine Jugendform und aus dieser ging eine Altersform mit anders geformten und durchaus anders gestellten Blättern hervor. Ich pflanzte nun die schönen Sämlinge vor meiner Ferienreise in den Garten, und als ich nach fünf sonnigen Wochen heimkehrte, hatten mehrere der inzwischen recht groß gewordenen Sämlinge wirklich dicke Blütenknospen. Und dann blühten die Pflanzen, und als ich sie im Herbste ins Zimmer holte, waren die Fruchtknoten so prall und fest, wie ich es noch nie an einer alten Pflanze sah. Kein Zweifel, hier waren Früchte im Entstehen! Und wirklich, im Spätherbste und Frühwinter dehnten sich die Fruchtknoten zu richtigen dicken Früchten auseinander, die im Vorfrühling zu Kapseln eintrockneten. Im nächsten Jahre wurde Staub von den Sämlingspflanzen auf das alte Exemplar übertragen, und siehe da, auch dieses setzte jetzt Frucht an, ohne Insektenbestäubung, ohne Standort an frischer Luft. Also auf den Staub einer Pflanze kam es an, die einer anderen geschlechtlichen Zeugung entstammte als meine üppige »Alte«, auf Kreuzung also mit einem anderen Individuum. Und damit war nicht nur die Selbstunfruchtbarkeit dieser Pflanzen erwiesen, sondern diese auch für mehrere andere Mesembrianthemen, die ich damals bereits pflegte, sehr wahrscheinlich gemacht. Und damals wurde mir gleichzeitig zum ersten Male klar, warum der alljährlich schön rotblühende Blattkaktus, den meine Mutter seit meiner frühesten Jugend am Fenster zog, und den ich später als einen Bastard ermittelte und Phyllocactus pseudo-Ackermannii nannte, nie Früchte angesetzt hatte, obgleich ich ihn schon als Knabe alljährlich bestäubte. Auch er mußte selbststeril sein und wahrscheinlich viele seinesgleichen, und das bewahrheitete sich in der Folgezeit durchaus. Auch dadurch wird gerade die Kultur sukkulenter Pflanzen so interessant, weil an ihnen noch so viele, viele reizvolle kleine und vielleicht ab und zu auch größere Entdeckungen gemacht werden können, und der Sukkulentenliebhaber wird, mag er wollen oder nicht, im Laufe der Jahre immer mehr zu einem Forscher, wie denn in diesen Kreisen viel Verständnis für systematische und biologische Fragen vorhanden ist. *(Ein Schlußartikel folgt.)*

FRANZ LIPP / GARTENEINDRÜCKE AUS AMERIKA

DIE Vereinigten Staaten ſind in ihrer zentralen Lage zwiſchen Europa und Aſien zu einem Kreuzungspunkt öſtlicher und weſtlicher Einflüſſe geworden, und es iſt für den Europäer intereſſant zu beobachten, wie das kulturelle Leben des ganzen Landes hiervon beeinflußt wird. Alle Sprachen der Erde kann man hier hören, Gerichte aller Nationen eſſen, Zeitungen vieler Länder kaufen, Theater und Muſik fremdartigſten Urſprungs genießen und auch Gärten aller Zeiten und Völker finden. Durch die ihn umgebenden verſchiedenen Volks-Weſensarten und ſein hierdurch angeregtes Reiſen hat der Amerikaner ſein tätiges und in mancher Beziehung überlegenes Verhältnis zur Welt gewonnen. Reiſe-Eindrücke bewirken bei ſcharfſinnigem Beobachten und nichtvoreingenommenem Vergleichen neue große Lebensmöglichkeiten, deren Auswirkungen ſich oft noch in ſpäteren Jahren geltend machen.

Solch umfaſſendes Verhältnis zur Welt kommt zuweilen im Geſamtcharakter eines Landhauſes- und Gartens zum Ausdruck. Ich hatte Gelegenheit, die Beſitzung von Mr. Lars Anderſen in Brookline in der Nähe Boſtons zu beſichtigen, der lange Jahre als amerikaniſcher Konſul in Europa und Japan gelebt hat. Ein reich bewegtes Gelände war zum größten Teil von feingepflegten Raſenflächen eingenommen, die in weiterer Entfernung vom Hauſe in der üblichen Weiſe in Parkgehölze und Wildblumenwieſen übergingen. In dieſe freiere Landſchaft waren klaſſiſche Steinbildwerke eingeſtreut, Naturtheater, Laubengänge und andere Gartenbaulichkeiten unter ſorgfältigſter Anpaſſung an den Charakter der nächſten Umgebung eingegliedert. Ein Laubengang war ſehr geſchickt benutzt, um den Höhenunterſchied zwiſchen einer Obſt- und einer Seewieſe in eine ziemlich verborgene Terraſſe zu legen, anſtatt eine ſchräge unerwünſchte Fläche anzuwenden. Spalierobſt und Wein an der Südſeite, Geisblatt, Klematis und Ariſtolochia (Pfeifenſtrauch) im Schatten blühten ungebändigt miteinander. Von dem hochgelegenen Landhaus ſah man etwas wie Thüringer Berge liegen, die Höhenzüge Neu-Englands mit dem Stadtbild Boſtons.

Ich gedenke noch meines erſten Beſuches an einem heißen Junimorgen und des überraſchenden Bildes, das ſich mir von der Terraſſe des Hauſes aus bot: eine Raſenfläche, umſchloſſen von einer Maſſe dunkler Nadelhölzer und Blutbuchen, die den Rahmen für einen einzigen, überaus reich blühenden Kirſchapfelbaum bildeten. Auch lagen die Schatten ſo eigentümlich wirkſam, daß man ſie der feinſten Berechnung zuſchrieb. Es lag eine ſo geheimnisvolle Wirkung in der Einfachheit dieſer Dinge, wie ſie wohl nur durch Weltmen-

ſchen zuſtandekommt, die noch von geſehenen Ländern träumen. Ich gedachte Lafcadio Hearns, der in ſeinen japaniſchen Reiſebüchern einmal ſagt: »Ein eigenartiger Zauber iſt der Zauber des Zuſammenklanges von Menſchenwerk mit den feinſten Naturſtimmungen von Licht, Form und Farbe.« — »Sehr wahrſcheinlich hat das Kunſtgefühl wie alles Gefühl des Überſinnlichen ſeinen erſten Urſprung im Studium der Schatten.« Jetzt erſt kam mir zum Bewußtſein, wieviel feine und reizvolle Dinge im Kleinen dieſe tiefe Wirkung unterſtützen: oſtaſiatiſche ſorgfältig gezogene Zwerggehölze in ſchönen Steinkübeln zogen die Aufmerkſamkeit auf ſich und lenkten den Blick zu einem ſeitwärts gelegenen japaniſchen Garten.

Aus der Ferne lockten die Farben eines Gartens durch Baumſtämme hindurch. Auf dem Wege dorthin kam ich an einem Baum vorbei, an deſſen Aſt eine Plakette mit folgendem Gedicht angebracht war:

I think, that I shall never see
A poem lovely as a tree,
A tree that looks at God all day
And lifts its leavy arms to pray.
Poems are made by fools like me
But only God can make a tree.

Ich ſchritt weiter durch einen mit griechiſchen Plaſtiken geſchmückten Baumgang und fand auf der Terraſſe eines Senkgartens, die links und rechts von Niſchen begrenzt, in der Längsrichtung des Gartens ſich in Baumgänge fortpflanzte. Der Garten war ſtreng architektoniſch in drei verſchiedenen Höhenlagen gegliedert, die durch ein Mauerwerk gehalten wurden und wovon die zweite an beiden Querſeiten terraſſenförmig erweitert und ausgeſchmückt war. Das Parterre war, ſeitwärts des mittleren Raſenſtreifens, in kleine, von niederen Thujahecken eingefaßte Sondergärtchen eingeteilt. Das Ganze war äußerſt gut ausgewogen in der Aufteilung und im Zuſammenklange der einzelnen Teile. Ich habe ſelten einen Garten geſehen, in dem Architektur, Pflanze und Raum zu einer ſo edlen und wohligen Wirkung vereinigt war. Dieſer Senkgarten erfüllte übrigens nebenher noch vollkommen die Aufgabe der Schnittblumen-Verſorgung des Hauſes. Zur Zeit meines Beſuches blühten dort Mohn, hellblaue Iris, Lupinen, Päonien und Sonnenblumen miteinander. Der Blick auf die Wandbrunnenterraſſe gegen den tiefgrünen Hintergrund der Tsuga canadensis, die leicht im Schnitt gehalten ſind, gab, geſteigert durch den weißen Blütenſchwall der Spiraea van Houttei, die rings um dieſe Plattform blühte, ein ſtarkes Bild. Von hier führte längſeits je ein roter, in gelben Sandſtein eingelegter Ziegelplattenweg zur gegenüberliegenden Terraſſe, wo ein Brunnen mit einem wohlgeformten Seeroſen-Becken die Mittelachſe des Gartens belebte, die von zwei alten Lorbeerbäumen und den Flügeln einer Pergola noch gehoben wurde. Alte Buxus-Prachtſtücke in Kübeln, in Formen wie: Vaſen, Tiergeſtalten, Spindeln, Kronen und reichblühende Rhododendron catawabiense in leicht violettem Hauch im Einklang mit dem blauweißen Geäder des Marmors machten dies Gartenbild in ſeiner Geſchloſſenheit außerordentlich imponierend. Der Luxus-Eindruck ward durch die Feinheit der Wirkung aufgehoben. Wohltuend war der Blick aus der Kühle der Pergola in den heißen Gartenraum. Das Ganze war von einer wundervollen Ruhe umſtrömt und wirkte gleichzeitig als ein auserleſener Geſelligkeitsraum.

Dieſer Garten trug den Stempel des Lebensgefühls eines Weltreiſenden, der ſich zur Ruhe ſetzte; er gab die Einſtellung eines Menſchen wieder, der in der neuen Welt lebt, aber doch alle Kräfte des alten Europas und Oſtaſiens würdigt. Das ſtarke Licht, von dem die Aufnahmen einen Begriff geben, läßt den ſüdlichen Glanz erkennen, in dem dieſer halb nordiſche Garten lag, und zeigt etwas von der verwirrenden Schönheit, die nordiſch-amerikaniſche Vegetation in dieſer mittelitalieniſchen Beleuchtung entwickelt.

F. FRIMMEL / ÜBER DIE GRUNDLAGEN DER FARBENZÜCHTUNG II

WIR kommen nun zur eigentlichen Farbwirkung. Die Umwandlung des in das Blumenblatt eingedrungenen weißen Sonnenlichtes in gefärbtes geſchieht ſo, daß beim Paſſieren der Farbſtoffſchicht gewiſſe Strahlen des Spektrums abſorbiert werden. Nun iſt es einleuchtend, daß, je dicker eine Farbſtoffſchicht iſt, die ein Lichtſtrahl zu durchdringen hat, deſto ſtärker die Abſorption ſein muß, deſto geſättigter alſo die Farbe. Die Farbſtoffſchicht im Blumenblatt iſt ſehr dünn, die Farbe jedoch von vollkommener Sättigung. Verfolgt man den eingedrungenen Lichtſtrahl auf ſeinem Wege weiter, ſo löſt ſich dieſer ſcheinbare Widerſpruch. Der Strahl gelangt, nachdem er die gefärbte Papille paſſiert hat, an die reflektierende weiße Mittelſchicht, wird hier in irgend einer Richtung, wie es eben der Zufall will, zurückgeworfen, gelangt wieder in die Papille, wird an den ſchiefen Wänden der Papille reflektiert, nimmt auf dieſe Art neuerdings ſeinen Weg durch die Farbſtoffſchicht ins Innere des Blattes und ſo fort, bis er zufällig einmal von dort in einer Richtung zurückgeworfen wird, daß er in genügend ſteilen Winkel auf die Wand der Papille fällt, ſodaß er, der Erſcheinung der Totalreflektion nicht mehr unterliegend, aus dieſer austreten kann (Bild). Es läßt ſich zeigen, daß das nur in der Spitzenregion der Papille möglich iſt. Jede Papille ſtrahlt alſo in der Region der Spitze einen Strahlenkegel aus, deſſen Strahlen vorher die Farbſtoffſchicht *ſehr* oft paſſiert haben. Es wirkt alſo die ganz dünne Farbſtoffſchicht infolge des wiederholten Durchganges der Strahlen ſo, wie eine vielfach dickere Schichte, die nur einmal durchſtrahlt wird. Freilich hat dieſer wiederholte Durchgang des Lichtes und die damit verbundene vollſtändige Abſorption eines Teiles des Spektrums zur Folge, daß das austretende Licht wohl farbenſatt, aber geſchwächt wird, aber auch dagegen hat der optiſche Univerſalapparat der Papillen einen Ausweg. Es werden nämlich auch alle ſchräg einfallenden Lichtſtrahlen des diffuſen Anteiles des Tageslichtes, die bei glatter Oberfläche des Körpers zurückreflektiert, ſozuſagen abrutſchen würden, von den Papillen eingefangen und der Leuchtkraft der Blüte nutzbar gemacht. Beſehen wir irgend einen gefärbten glatten Gegenſtand, ſo ſind es immer zweierlei Strahlengruppen, die das Auge aufnimmt, erſtens die von der Oberfläche des Körpers zurückreflektierten Strahlen, alſo weißes Licht, und dann das in die Farbſtoffſchicht eingedrungene und von dieſer wieder zurückgeworfene gefärbte Licht. Dem Lichte, das die Blumen ausſtrahlen, fehlen dieſe weiße Beimengungen, es iſt ausſchließlich intenſiv gefärbtes Licht, das ſie liefern. Die Oberhaut des Blumenblattes iſt alſo ein optiſcher Apparat, der trotz der Einfachheit ſeines Baues ein Höchſtmaß an Farbeneffekt gewährleiſtet. Dieſe Darſtellung der optiſchen Verhältniſſe der Blumenfarben ſtützt ſich hauptſächlich auf die grundlegenden Unterſuchungen von F. und S. Exner, die 1911 in den Sitzungsberichten der Wiener Akademie der Wiſſenſchaften erſchienen.

Zielbewußte Farbenzüchtung nun hat die Aufgabe, dieſe einzelnen Bedingungen für das Zuſtandekommen der Farben zu beeinfluſſen. Es variieren die Blumen nicht nur nach der Art der verwendeten Farbſtoffe. In der durch Kreuzung mehrerer verſchiedener Stammeltern entſtandenen Gartenprimel ſind Varietäten, die nur Anthokyan beſitzen, neben ſolchen, die nur Anthochlor, oder nur Carotin beſitzen, vertreten, daneben gibt es Varianten mit verſchiedenen Anthokyantönen (blaue und rote Zellen nebeneinander), mit Kombinationen von Anthokyan und Carotin, Anthokyan und Anthochlor, kurz, die Variationsfähigkeit in bezug auf die Art der verwendeten Farbſtoffe iſt ſehr groß. Ebenſo varriiert auch die feinſte Verteilung der Farbſtoffe, die Menge derſelben, ſchließlich auch der Bau der Papillen. Von dieſem hängt wieder die Art des Glanzes ab. Ein und derſelbe Farbton kann je nach dem Baue der Papillen in dem einen Falle matt, in dem anderen Falle tiefſamtig erſcheinen. Bei Fehlen der Papillen, und auch ſolche Fälle kommen vor, entſtehen glatt glänzende Blüten, es ſei nur an die Butterblume erinnert. Die moderne Farbenzüchtung kann umſo zielſicherer arbeiten, je genauer die Vererbungsart der einzelnen Grundbedingungen für das Entſtehen der Farben erforſcht iſt.

Es würde den Rahmen dieſer Ausführungen überſchreiten, die Einzelheiten der auf dieſem Gebiete bisher bekannt gewordenen Vererbungserſcheinungen zuſammenzufaſſen. Es mag genügen, hervorzuheben, daß die Arbeit zahlreicher Forſcher dahin geführt hat, daß die Vorſtellungen ſpeziell über die Vererbung der Anthokyanfarben zu großer Klarheit gediehen ſind. Die praktiſche Züchtungsarbeit kann an all dieſen Forſchungen nicht mehr ohne Schaden vorübergehen. Nun noch einige Worte über praktiſche Fragen der Blumenfarbenzüchtung. Doch vorher eine kurze Rechtfertigung.

Niemandem iſt jene romantiſche Stimmung ganz fremd, in der die Frage auftaucht, wozu eine künſtliche Beeinfluſſung? Iſt nicht die Blume in ihrer natürlichen unberührten Reinheit das Schönſte, was ſich denken läßt, iſt es denn wirklich eine Verbeſſerung, wenn aus dieſer unberührten

Das eigenartige Gebilde stellt eine Paradiesvogel-Blüte, den seltsamen Blütenstand von Strelitzia Reginae, dar. Es ist ein in großen Warmhäusern nicht selten anzutreffendes Bananengewächs, bei dem im Frühjahr am Ende eines bis über meterhohen Blütenschaftes über einem kahnförmigen Deckblatte die so auffällig gefärbten Blüten erscheinen, von denen es verschiedenfarbige Formen gibt.

Unter den Ananasgewächsen gibt es viele reizvolle und recht aparte Erscheinungen, die leider heute in den Kulturen immer seltener werden. Unser Bild zeigt Billbergia pyramidalis der fürstlich Pleßschen Kulturen in Libichau. Die auffallende Färbung der leider so vergänglichen Einzelblüten steht in schönem Gegensatz zu dem bläulichen Grün der Belaubung.

Bilder C. S.

Oben: Das Licht paſſiert die Farbſtoffſchicht wiederholt (Erhöhung und Sättigung der Farbe). Unten: Seitlich einfallendes Licht wird eingefangen (Erhöhte Leuchtkraft, Sättigung der Farbe).

Schönheit ein Weſen gemacht wird, das ſeiner natürlichen Erſcheinungsweiſe in Form und Farbe entfremdet als gefüllte, calycanthemiſche, zwerghafte Varietät, in Farben, die der Stammpflanze in der freien Natur fremd waren, in unſeren Gärten prangt; iſt es nicht frevelhaft, die Natur zur Erzeugung ſolcher vom natürlichen Entwicklungsgange ſo ganz abſeits liegender Varietäten zu zwingen? Es mag erlaubt ſein, mit einer Gegenfrage zu antworten. Iſt es von den Bienen, Hummeln und unzähligen anderen Inſekten, iſt es von den blumenbeſuchenden Kolibris und Honigvögeln nicht frevelhaft, daß ſie in allerdings unbewußter Züchtungsarbeit die Geſtalt und Farbe der Blumen gerade ſo verändern, wie es ihrem Schönheitsſinne entſpricht, iſt es von der Aasfliege nicht frevelhaft, daß ſie der Blüte einer Ariſtolochia jene geradezu bizarre Form, jenen für unſer Geruchsorgan geradezu widerlichen Duft angezüchtet hat; iſt es nicht frevelhaft, daß der Kolibri ſeine Vorliebe für leuchtende Farben in der Weiſe betätigt, daß er, gelegentlich auftretende helle Varianten von Salvia ſplendens vernachläſſigend, ſtets nur die leuchtenden roten beſucht, nur dieſe durch ſeine Beſtäubungstätigkeit zur Vermehrung gebracht, die nicht zuſagenden durch Nichtbeachtung zum Ausſterben verurteilt hat? Iſt der Menſch nicht ebenſo mit der geſamten Natur verwachſen, wie die Biene und der Kolibri? Iſt es nicht ſelbſtverſtändlich, daß der Menſch den Blumen, die ſeinen Schönheitsſinn beſonders gefangen nehmen, den Stempel ſeiner Geſchmacksrichtung aufdrückt? Was der Züchter mühevoll auf Grund verſtandesmäßiger Überlegungen erarbeitet, iſt nichts anderes, als eben die menſchliche Ausdrucksform für ein Naturphänomen, das wir als natürliche Züchtung als naturnotwendige Begleiterſcheinung der Beziehungen der Organismen untereinander überall in der Natur beobachten. Die gefüllte, calycanthemiſche, faſziierte, naniſtiſche, fimbriate, in tauſend neuen Farbentönen ſchillernde Blumenwelt unſerer Gärten ſteht nicht in unerquicklichem Gegenſatze zu der »unberührten« Natur. Dieſe iſt von den Fliegen, Hummeln, Bienen, Kolibris, kurz von dem Heer der Blütenbeſucher züchteriſch »berührt«, jene von der Hand des Menſchen im Sinne ſeines Schönheitsempfindens. Mit dieſem Gedankengange iſt auch ſchon die Frage der Zuchtziele angeſchnitten und gelöſt. In der Blumenzüchtung iſt alles Zuchtziel, was unſerem äſthetiſchen Empfinden als ſchön erſcheint. Mit dieſer Feſtſtellung iſt allerdings ein Gebiet betreten, deſſen Diskuſſion Berufeneren überlaſſen bleiben möge. Der Begriff der Schönheit iſt etwas ſo ſubjektives, ſo relativ je nach der Einſtellung deſſen, der das Schöne empfindet, daß es dieſen nüchternen Zeilen verſagt bleiben muß, dem ſeit Jahrtauſenden darüber Gedachten und Geſagten Worte beizufügen, nur einige einfach handwerkliche Überlegungen mögen am Platze ſein. Bei der außerordentlichen Variabilität der meiſten Blumen iſt es leicht möglich, aus jeder Form eine überraſchend große Fülle verſchiedener Farbennüancen herauszuzüchten. Doch darf man ſich keiner Täuſchung hingeben, es kommt nicht ſo ſehr auf die Fülle der Farben an, als auf deren Auswahl und nicht zuletzt auf die taktvoll richtige Übertragung einer Farbe auf eine beſtimmte Wuchsform. Es wäre verfehlt, wollte man einer Blume, die ausſchließlich für Maſſenwirkung gedacht iſt, wie einer Iris der pumila-Gruppe oder einer zwergwüchſigen Salpigloſſis komplizierte Blütenzeichnungen, effektvolle intime Kontraſte anzüchten. Die Einheitlichkeit der Farbe, die möglichſte Erhöhung der Leuchtkraft ſind in dieſem Falle zweckmäßig. Gerade die entgegengeſetzte Zuchtrichtung iſt für Schnittblumen maßgebend, da kann es nicht genug an feinen Kontraſten, zarten Abtönungen geben, ihr Wert liegt in dem Genuſſe, dem Kunſtwerk der Züchtung in der Vaſe die richtige Umgebung zu wählen, ein Vielerlei von Farben zu einer Harmonie zu vereinigen.

Die Formengebung der Blüte iſt es auch, die zunächſt gefühlsmäßig nahelegt, das leuchtende Rot einer Phlox Drummondi nicht auf ihre fimbriaten Varietäten zu übertragen, ſondern die Feinheit des Zuſchnittes der Blüte durch eine zartgefärbte Blumenzeichnung harmoniſch hervorzuheben. Solche filigrane Formen ſind nichts für einen brutal kräftigen Sinnenreiz.

Wenn man im allgemeinen geneigt iſt, Albinobildungen, vielleicht wegen des in ſie verlegten Stimmungswertes edler Reinheit, beſondere Wertſchätzung entgegen zu bringen, ſo darf das Fehlen von Farbſtoff doch nicht in allen Fällen als erwünſchte Abänderung gelten. Mir ſcheinen gewiſſe Thunbergia-Varietäten, denen das dunkle Mittelfeld abgeht, züchteriſch weniger wertvoll; das, was dieſer Blume gerade den charakteriſtiſchen Reiz gibt, die unendliche Tiefe ihres Auges, fehlt und iſt durch nichts erſetzt, als durch die vergängliche Freude »etwas anderes« zu haben. Dieſe wenigen Beiſpiele mögen andeuten, daß das Einfühlen in das überaus ſchwierige Gebiet äſthetiſcher Fragen immerhin auf gärtneriſch handwerklichen Überlegungen fußen darf und muß.

WILHELM KORFF / MISTELZAUBER

EINE der intereſſanteſten Halbſchmarotzerpflanzen unſerer Heimat iſt die Miſtel, Viscum album! Ihre abſonderliche Lebensweiſe in der luftigen Höhe der Baumwipfel hat in alten Zeiten einen ganzen Sagenkreis um ihr Leben und Entſtehen gewoben und in der Religion der alten Völker unſeres Erdteils ſpielten ihre geheimnisvollen Kräfte eine ganz beſondere Rolle. Für uns genügt die eigenartige Schönheit der Miſtelzweige, um ſie zu einem begehrten Zimmerſchmucke zur Winterszeit zu machen. Das zarte wachsartig durchſchimmernde Weiß der Beeren hebt ſich ſo wirkungsvoll von den derben gelblichgrünen Sichelblättern ab, und wochenlang halten ſich die abgeſchnittenen Zweige in einer Vaſe mit friſchem Waſſer ſelbſt im mäßig geheizten Zimmer. Kein Wunder, daß die geringen Vorräte, die alljährlich zur Weihnachtszeit in die Blumenläden der Großſtädte gelangen, reißend ſchnell Abſatz finden.

Ein wirklicher Schädling wird die Miſtel wohl nur dann, wenn ſie in ausgeſprochenen Obſtgegenden maſſenhaft auftritt und ſo ihren Wirtsbäumen Licht und Luft in den Kronen ſtreitig macht, deren ſie zum Ausbilden ihrer Früchte bedürfen. Als Halbſchmarotzer nimmt die Miſtel nur an der Saftzirkulation ihrer Wirtspflanze teil. Sie verarbeitet in ihren chlorophyllhaltigen Blättern den geraubten Saft zu eigenen Bauſtoffen im Gegenſatz zur Sommerwurz und zur Flachs- und Kleeſeide, die ihre Wirtspflanzen in der Wurzel zum Abſterben bringen. Vor ein paar Jahren erging es mir doch ſo, als ich eine kleine Samenportion der Hain-Sommerwurz, Orobanche lucorum, wiſſenſchaftshalber auf dem Wurzelhals einer kräftigen Thunbergs Berberitze anſäte. Im zweiten Sommer war der ſchöne Berberitzenbuſch von unzähligen, bräunlichgelben, über fußhohen Sommerwurz-Blütenſtielen durchwachſen. Noch im ſelben Herbſt unterlag der Strauch leider

den Folgen dieſer gelungenen Operation. Nie wieder benutze ich wertvolle Gehölzexemplare zu ſolchen Verſuchen! Wer nicht gerade in einer von Miſteln viel heimgeſuchten Gegend wohnt, wird wohl kaum Gelegenheit haben, die Entwicklung der Miſtel vom Samenkorn an zu verfolgen. Die beifolgende Abbildung zeigt den gelungenen Verſuch einer Miſtelausſaat auf den Stamm eines jungen Apfelwildlings, der bis jetzt noch nicht ſo ausſieht, als ob ihm ſein unfreiwilliges Ziehkind, das er im wahren Sinne des Wortes auf dem Halſe hat, beſonders läſtig wird. Im Januar 1914 wurde der Miſtelſame, der nebenbei erwähnt von Pappelmiſteln ſtammt, durch Zerdrücken der Beeren an den Apfelſtamm geklebt. Noch im ſelben Frühling erfolgte die Keimung. Zwei oder drei ſaugnapfartige, grüne Keimlinge, die mit den Saugfingern eines Laubfroſches viel Ähnlichkeit haben, preßten ſich dicht an die glatte Baumrinde und wurden im Laufe des Sommers von ihr überwellt. Im nächſten Frühling erſchien ein Paar ſchmaler, ſichelförmiger Miſtelblättchen an jeder Keimungsſtelle. Während der Kriegsjahre entwickelten ſich die Miſtelpflänzchen unbemerkt weiter. Seit 1921 ſchmückt ſich der inzwiſchen ſtattlich herangewachſene Miſtelbuſch alljährlich im März April mit einer Fülle von gelblichgrünen Blüten, aus denen dann erſt ſpät im Dezember die weißen Beeren reifen.

Die Miſtelblätter ſelbſt ſind nicht immergrün, wie vielfach angenommen wird, ſondern fallen im zweiten Jahr ab, ſo daß immer nur die jüngſten Gabeläſte belaubt ſind. In den Miſtelblüten ſind die Geſchlechter getrennt, es gibt alſo männliche und weibliche Blüten. Die Verteilung iſt nun entweder ſo, daß getrennte Miſtelmännchen und Miſtelweibchen auftreten, die Pflanze alſo zweihäuſig iſt, oder daß ſich beide Geſchlechter auf der gleichen Pflanze finden, mithin Einhäuſigkeit vorliegt. Dies gilt für unſeren Fall. Der abgebildete Miſtelbuſch trägt an allen Zweigen Beeren mit keimfähigen Samen. Die Gründe der Ein- oder Zweihäuſigkeit ſind wohl noch zu unterſuchen.

PAUL KACHE / DIE NADELHÖLZER IM HAUSGARTEN II

Picea excelsa nana

KLEINE Gärten erfordern vorzugsweiſe die Wahl kleinerer Wuchsformen, oder ſolcher, die nur begrenzte Ausdehnung, vornehmlich in die Breite finden. Dazu tritt in vielen Fällen das Suchen eines begründeten Standortes. Der enge Raum erlaubt nicht oder ſelten die mehr natürliche Anordnung, die in großen Gärten ſo glückliche Pflanzmöglichkeiten ſchafft. In kleinen Gärten, mit formaler Aufteilung, wird bei Pflanzung von Nadelhölzern mehr Bedacht auf die Raumwirkung genommen werden müſſen. Die Nadelhölzer treten hier mehr als Körper auf, ſei es Pyramide, Säule, Kugel oder abgeſtumpfte Pyramide. Dieſe Körper finden entſprechende Standorte, wo ſie gefühlsmäßig notwendig ſind. Der treppenartige Ausgang aus dem Haus in den Garten wird gern beiderſeits eine wuchtige ſchmal-pyramidale oder breit-ſäulige Form vertragen, ja verlangen. Nach der Schwere der Bauform richten ſich auch die Baumformen. Ein größerer, gebietender Bauteil verlangt kräftige Formen, wie ſie vielleicht Chamaecyparis Lawsoniana Triumpf von Boskoop gibt. Leichtere Bauten werden mit feineren ſchlankeren Formen, wie etwa Ch. L. Alumi, oder Ch. L. monumentalis nova harmonieren. Ja auch gut gewachſene Säulen von Taxus baccata faſtigiata können hier am Platze ſein. Dagegen kann der Abſchluß einer bogig nach unten und außen auslaufenden Treppenwange betont werden durch eine Kugelform, die wir ſo ſchön in einigen Gartenformen von Chamaecyparis Lawsoniana haben, wie in minima glauca, forstekiensis, in Thuja occidentalis umbraculifera, globosa und anderen. Dieſe Kugelformen, die nur ganz allmählich an Höhe und Breite zunehmen, ſind für den kleinen Garten ungemein wichtig. Formal aufgeteilte Gartenteile mögen an den Ecken der Raſenflächen ſolche Kugelformen erhalten. Sie ſind hier viel wichtiger als pyramidale Formen. Dieſe gehen über Aughöhe hinaus, zerſchneiden, verkleinern den Raum, die Kugelformen bleiben unter Aughöhe, betonen das Formale, laſſen den Raum größer erſcheinen. Wo Höhenunterſchiede im kleinen Gelände noch mehr herausgehoben werden ſollen, ſind ſie wirkſamer als Pyramiden. Setzt man um einen vertieften Gartenteil an den hochliegenden Ecken kräftige Kugelformen, wiederholt dies vielleicht in der Mitte der Längsrichtung ſo wird die Vertiefung weit wirkſamer erſcheinen, auch wenn ſie nur fünfzig Centimeter beträgt. Die in die Höhe gehende Säule oder Pyramide wird nie das Gefühl der Abgrenzung an dieſer Stelle ſo eindrucksvoll geben, wie kräftige, breit gelagerte Kugeln, die perſpektiviſch faſt zur Mauer zuſammenfließen. Oder, vor dem Hauseingang, der flachen Terraſſe, die ſitzplatzartig an das Haus geſchloſſen iſt, lege man einen größeren Halbkreis in Kies, um Raum vor dem Hauſe zu gewinnen. Wie wundervoll wirken dann am Rande des Raſens die grünen Kugelformen der Nadelhölzer in beſtimmten Abſtänden von einander. Doch brauchen es nicht nur die vorher genannten Formen von Chamaecyparis und Thuya zu ſein. Dieſe wirken manchmal zu ſtreng. Ein ganz anderes Bild bieten die eigenartig, oft bizarr ſich bildenden Formen der Zwergfichten, deren Umrißlinien geradezu den Ausdruck aufgelöſter Ordnung verſinnbildlichen. Bei vielen iſt die flache Kugel, die ſtumpfe Pyramide die Grundform. Aus dieſer aber ſtoßen vorwitzig und verwegen die einzelnen Spitzen kräftiger Mittel- und Seitentriebe heraus und löſen die formale Umrißlinie wieder auf. Ganz beſonders auffallend iſt es bei Picea excelsa Maxwellii zu beobachten. Doch noch andere Formen, wie compacta, Clanbrasiliana, echiniformis, conica, Merki und andere ſind gleichwertig und für ſolche Zwecke wichtig. Ganz beſonders da, wo infolge einiger hoher Bäume im kleinen Garten das Sonnenlicht mangelt, Blütenpflanzen nie zur rechten Schönheit gelangen, verſuche man durch das Bevorzugen dieſer kleinen Nadelholzformen dem Garten ein anderes, eigenes Gepräge zu geben. Man wird es ſicher nie bereuen.

Auch die Säulen- und Pyramidenform kann in kleineren Gärten da und dort höchſt wichtig werden; vor allem dort, wo eine gewiſſe Abgrenzung eines Teiles erzielt werden ſoll, alſo Raumwirkung erſtrebt wird. Soll eine beſtimmte Fläche vor dem Haus, der Laube, dem Sitzplatz vom Geſamtgarten gefühlsmäßig etwas abgeſchloſſen werden, dann tritt die ſchlanke, hochſtrebende Baumform zweckmäßig hervor, die in beſtimmten Abſtänden da gepflanzt wird, wo der Abſchluß gewünſcht iſt. Hier mögen bei engſten Grenzen der Säulentaxus, bei etwas größeren Flächen die ſchlanken Scheincypreſſen oder ähnliche Formen

Juniperus virginiana globosa nana. – Bilder K. F.

des Lebensbaumes auftreten. Die Wahl wird ſtets abhängig werden vom perſönlichen Gefühl und den zur Verfügung ſtehenden Mitteln. Selbſt Juniperus, wie pseudocupressus, oder virginiana pyramidalis, ſind hier gut am Platz. Möglich, daß Sandböden einmal dieſe Vertreter bedingen.

So kann man ſich beim Pflanzen von Nadelhölzern in kleineren Hausgärten von oben bezeichneten Geſichtspunkten leiten laſſen. Man ſtelle ſich, um noch ein Beiſpiel zu nennen, einen gut gepflegten, breiteren Verbindungsweg vor, der ſeitlich in beſtimmten Abſtänden von Kugel-, Säulen- oder Pyramidenformen begleitet wird. Welch eigenartige Wirkungen vermag man durch das Einſtellen ſolch immergrüner bis farbiger Körper auszuüben, und wie verſchieden wird die Wirkung in beiden Fällen ſein.

Zuweilen wird auch im kleinen Hausgarten die Möglichkeit beſtehen, Nadelhölzer natürlich aufzuſtellen. Aber ſparſam ſei man in der Zahl, vorſichtig in der Wahl! Von Fichten und Tannen ſind nur ganz wenig Vertreter geeignet, aber einige ſind wundervoll in der Wirkung. Eine feinere, elegantere Haltung, ein robuſteres und geſünderes Wachstum als die ſchlank in die Höhe ſtrebende Picea Omorika zeigt, gibt es kaum wieder. In loſen Trupps mit Pflanzen von verſchiedener Höhe ſtellt ſie ſich uns am ſchönſten dar. Auch Picea orientalis, mit ihrem feinen, glänzend ſchwarzgrünen Nadelwerk an der dünnen und doch dichten Beaſtung iſt ausgezeichnet zu verwenden. Aber nichts anderes dazu geſellt, keine geſchloſſenen Wuchsformen, wie ſie Lebensbaum und Scheincypreſſe geben. Wohl aber mag in der Hinzugabe einiger niedrigern Formen gleicher Sippe eine Verbindung der hochragenden Spitzformen mit der ebenen Raſenfläche erſtrebt werden. Die Picea Mariana iſt hierfür vorzüglich, ebenſo die ſchlankere var. Doumetii. Und hier auch können viele Formen unſerer Picea excelsa angebracht ſein wie Remonti, Ohlendorffii, compacta, Barryi und ſo viele andere.

Der ernſte Koniferenfreund wird trotz der eng begrenzten Fläche, die ihm vielleicht ſein Garten bietet, doch verſuchen, eine kleine Anpflanzung in rein natürlichem Sinne auszuführen. Das beſte Vorbild gibt ihm wohl die Pflanzengenoſſenſchaft der Heideformation! Vorausſetzung hierfür bleibt allerdings ein durchläſſiger ſandiger Boden oder die Bereitung eines ſolchen. Wie einfach und auch mit welch geringen Mitteln iſt ein kleines Stück deutſcher Heidelandſchaft geſchaffen, wenn man ſelbſt tief in den geheimnisvollen Zauber der Heidelandſchaft eingedrungen iſt. Auf recht kleiner Fläche iſt das zu machen. Einige hochragende lichte Birken, deren Gezweig im Sonnenlicht flimmert, angelehnt in der Pflanzung einige unſerer echten Wachholder, womöglich rechte ſchlanke Säulen und darunter, teppichartig alles umfaſſend, unſere Heide: Calluna vulgaris. Es iſt ein ganz eigner Reiz, der von einem ſolchen, mit aller Liebe und Andacht geſchaffenen Stückchen Erde ausgeht und uns gefangen nimmt. Gewiß iſt hier von Nadelhölzern der Wachholder die Hauptſache. Wo es der Raum erlaubt, komme eine Kiefer hinzu oder mehrere und ſei es nur eine niedrige Bergkiefer, die ſeitlich angeſchloſſen wird. Doch zum Säulenwachholder geſelle man die zwergige nana-Varietät, auch die gleiche nordamerikaniſchen Urſprungs, canadensis, mit ihrer goldigen Form aurea. Das ſind reizvolle, kleine Nadelhölzer von köſtlicher Schmuckwirkung. So kann gerade ein ſolch kleines Stückchen Garten, dem man etwas Naturcharakter gewährt, Nadelholzformen aufnehmen, die an ſonſtiger Stelle des Gartens beinahe unmöglich wirken würden.

Viel mehr Gelegenheit zur Pflanzung derartiger kleiner, kriechender oder ausgebreitet wachſender Formen bietet eine vorhandene Böſchung, ein kleiner Abhang, eine kleine Trockenmauer mit über ihr etwas anſteigendem Gelände. Wundervoll ſind hier die eigenartigen Formen von Juniperus, wie sabina, sabina tamariscifolia, humilis, prostrata. Auch die ſchon vorher genannten, zu J. communis gehörenden Vertreter. Prachtvoll wirkt J. sinensis Pfitzeriana. Selbſt als Vortrupp vor einigen Picea Omorika iſt er, frei im Raſen, unerſetzlich. Dagegen iſt für die Böſchung wiederum J. virginiana Kosteri beſſer, eine faſt tiſchartig wachſende, recht robuſte Form. Man beachte auch die ältere J. virg. tripartita, mit ihrem dichten, faſt federigem Gezweig und bizarren Grundformen. Juniperus Pfitzeriana überwächſt alle an Höhe, Kosteriana dagegen in die Breite, während die Sabina-Formen, mit Ausnahme von prostrata, die weithin kriecht, mehr Kiſſenform behalten. Die der communis naheſtehenden Formen ſind ebenfalls von geringer Ausdehnung.

Chamaecyparis Lawsoniana minima glauca. – Bild Kache

CAMILLO SCHNEIDER / EIN BESUCH IN SAFFRON WALDEN

WER die großen Frühjahrs-Ausſtellungen der engliſchen Gartenbau-Geſellſchaft öfter beſucht hat, dem werden immer wieder die ſchönen Darbietungen aufgefallen ſein, die der jetzt weltbekannte Nelkenzüchter *C. Engelmann* aus Saffron Walden zur Schau ſtellte. Iſt er auch nicht der einzige große Nelkenzüchter Großbritanniens, ſo ſteht er doch auf ſeinem Gebiete in der allererſten Reihe. Schon vor dem Kriege war es meine Abſicht, dieſen mir immer als muſtergiltig geſchilderten Betrieb kennen zu lernen, doch erſt im Mai letzten Jahres fand ich Gelegenheit, nach Saffron Walden zu fahren. Für uns Deutſche iſt Engelmanns Gärtnerei ſchon deshalb von beſonderem Intereſſe, weil Engelmann ein Deutſcher iſt, der ſich hier ganz aus eigener Kraft eine Kulturſtätte geſchaffen hat, die wohlverdient, daß nicht nur der Nelkenfreund ſie aufſucht.

Saffron Walden liegt unweit der altberühmten Univerſitätsſtadt Cambridge in einer ſehr hübſchen, hügeligen Landſchaft. Schon das Städtchen an ſich lohnt einen Beſuch. Iſt der Ort doch ſeit den Tagen der alten Briten bewohnt und hat in früheren Zeiten eine ungleich wichtigere Rolle geſpielt als heute. Sein Stadtrecht datiert von der Mitte des 16. Jahrhunderts. Es iſt ein ſtilles, typiſch engliſches Landſtädtchen mit einigen ſehr hübſchen alten Gebäuden und den Ruinen einer normanniſchen Burg aus dem 12. Jahrhundert, die Geoffrey de Mandeville gebaut haben ſoll.

Zwiſchenkulturen von Lathyrus im Nelkenhauſe

An dieſem hiſtoriſchen Orte hat nun vor faſt dreißig Jahren der damals mit wenig Bargeld, aber großer Unternehmungsluſt von Deutſchland kommende junge Gärtner C. Engelmann ſich ſeßhaft gemacht. Durch ernſte zielbewußte Arbeit hat er einen gärtneriſchen Spezialbetrieb aufgebaut, der in ſeiner Art muſtergültig iſt und in jeder Weiſe für die rein fachlichen, wie auch betriebstechniſchen Fähigkeiten ſeines Schöpfers das beſte Zeugnis ablegt. Gerade das macht dieſe Gärtnerei ſo intereſſant für den, der ſich in Einzelheiten vertieft, daß Engelmann es verſtanden hat, alles mit ſeinen eignen Leuten auf außerordentlich einfache und billige Weiſe, dabei aber völlig den Bedürfniſſen entſprechend zubauen. Es iſt ſchließlich keine Kunſt, heutzutage mit dem nötigen Bargeld eine techniſch ganz auf der Höhe ſtehende Anlage zu ſchaffen, wie wir ſolchen beiſpielsweiſe für Nelkenzucht in den Vereinigten Staaten begegnen. Jedoch der Aufbau eines Betriebes, wie wir ihn in Saffron Walden finden, zeigt, was ein tüchtiger Menſch leiſten kann, wenn er mit Verſtändnis und Liebe zu Werke geht. Die gärtneriſche Kulturfläche umfaßt heute rund 17 Hektar, von denen etwa vier unter Glas liegen. Die Gärtnerei liegt an zwei gegenüberliegenden Talhängen, und wird im Tal durch eine Dorfſtraße getrennt. Mit etwa 150 Leuten, unter denen die meiſten ſeit Jahren im Betriebe tätig ſind — ein jetzt ſiebzigjähriger arbeitet ſchon ſeit 1896 — wird der Betrieb tadellos inſtand gehalten.

Geſamtanſicht

Die Hauptkulturen ſind die ſogenannten amerikaniſchen Nelken (Perpetual Flowering Carnations), die wir jetzt bei uns deutſche Edelnelken nennen. Wenn auch heute noch die Amerikaner wohl die meiſten guten Sorten züchten, ſo ſind doch gerade in England von verſchiedenen Firmen ganz ausgezeichnete Sorten erzogen worden. Engelmann ſelbſt bringt alljährlich einige vortreffliche Neuheiten in den Handel. Auch in Deutſchland gibt es recht gute Kulturen, doch beweiſen die ſpäter gegebenen Sortennamen, daß vorderhand Amerika und England führend ſind.

Die großen Hausblocks, wie ſie in letzter Zeit gebaut wurden, umfaſſen je etwa einen engliſchen Acker und enthalten rund 95000 Pflanzen. Die meiſten Nelken werden zum Schnitt gezogen, doch auch der Jungpflanzenverſand nach allen Teilen der Welt iſt jetzt ziemlich beträchtlich dank der ausgezeichneten Verpakkungsmethoden. Es werden jährlich rund eine Millon Stecklinge gemacht.

Unter den Nelkenſorten, die als die beſten ſowohl für Schnitt, wie als Schaublumen gelten, ſeien folgende hervorgehoben:

Betty Lou, gilt augenblicklich als beſte tief roſafarbene in Amerika; Coral Glow, terrakotta und tief orangerot; Dainty, große Blume mit orange Grund und lachsroſa Tupfung, neue gute Topfſorte; Eileen Low, eine der beſten lachsfarbenen; Eldora, weiß mit roſa Streifen; Enchantress Supreme, hell lachsfarbener Sport der bekannten zart roſa Enchantress; Gypsy, lebhaft rot, mittelgroß; Janet, großblumige Neuheit mit lebhaft kirſchroſa Blüten; Laddie, eine der allerbeſten lachsfarbenen; Maine Sunshine, ſehr gute hellgelbe; Mikado heliotropfarben, eigenartig; Mrs. C. W. Ward, ſehr gute roſa Marktſorte; Pink Delight, bekannte mittelgroße, lachsroſa Sorte; Red Laddie, ausgezeichneter roter Sport der wertvollen Laddie; Saffron wohl beſte reingelbe; Spectrum, allerbeſte, amerikaniſche lebhaft rote; Topsy, karmeſinrot ausgezeichnet; White

Enchantress, ſehr guter weißer Sport; White Pearl, größte reinweiße Sorte; Wivelsfield Beauty, hellgelb mit roſa Tupfung. Natürlich ließe ſich die Zahl der Sorten noch beliebig vermehren. Eine gute deutſche Züchtung ſah ich darunter nicht. Die wenigen, die wir haben, konnten ſich den ausländiſchen Markt noch nicht erobern, der in erſter Linie von Amerika beherrſcht wird, wo ja die Nelkenzucht am ausgedehnteſten und erfolgreichſten betrieben wird.

Die Nelkenpflanzungen ſind auch in den beſten Häuſern nicht immer ſo, wie der Kultivateur ſie haben möchte. Zuviele Momente ſind da zu berückſichtigen, und zumal die Lichtverhältniſſe und das Klima ſpielen neben dem Boden eine ausſchlaggebende Rolle. Wenn nun die Nelkenkulturen nicht befriedigen, ſo muß der Platz noch auf andere Weiſe ausgenutzt werden, wie ja bei Engelmann ohnedies neben den Nelkenhäuſern noch ſolche beſtehen, die anderen Kulturen gewidmet ſind. Da kommen dann Duftnelken, Lathyrus odoratus, Calendula, Pyrethrum, Myosotis, Gladiolen, Narziſſen und Darwintulpen an die Reihe. Die Art und Weiſe, wie die Zwiſchenkulturen betrieben werden, iſt ſehr lehrreich. Die Lathyrus werden in hohe Tonröhren geſät. Sie durchziehen dieſe mit ihren langen Wurzeln und kommen dann in den eigentlichen Beetgrund, ſtehen aber hoch genug, um nicht von den Nelken und anderen Pflanzen anfänglich bedrängt zu werden. Die Nelken bleiben zunächſt ſo lange, bis die Erſatzpflanzen genügend entwickelt ſind und deren Raum brauchen, dann entfernt man jene. So ſtanden Lathyrus mit Calendula und Pyrethrum zuſammen. Von den Calendula gelten die Ball'ſchen Sorten aus Amerika für geeigneter, als die Sutton-ſchen aus England. Von Pyrethrum kommen hauptſächlich die Sorten Miss Bateman Brown, rotpurpurn, und Langford Scarlet in Betracht. Als Randpflanzung wird vielfach Myosotis oblongata Blue Bird gezogen, die willig aus Samen wächſt.

Einige Häuſer ſind, wie geſagt, gänzlich anderen Kulturen gewidmet. Wir finden ſechs Häuſer mit Asparagus für den Schnitt, ein Haus mit Calla, in den Sorten Perle von Stuttgart und Godfrey's Calla. Beide laſſen ſich leicht treiben. Intereſſant ſind vor allem auch die zwei Cattleyenhäuſer, in denen die Orchideen ausgepflanzt ſind und ſich zu großen reichblühenden Klumpen entwickelt haben. Auch den Treibroſen ſind vier hübſche Häuſer gewidmet, und von Cyclamen wird auch ein Haus voll zum Schnitt gezogen. Die Häuſer ſind beiläufig immer 80 Meter lang.

Dazu treten dann noch gewiſſe Saiſonkulturen, werden doch beiſpielsweiſe allein eine halbe Million Narcissus Emperor abgetrieben. Auch Tomaten gehören zum Beſtand der Kulturen, ſowie vor allem Chryſanthemen. Von letzten werden große Mengen im Freien kultiviert und im Herbſt mit Miſtbeetfenſtern überbaut.

Im Freien ſind große Schnittſtaudenflächen, wie auch Flieder und Narziſſen. Außerdem vor allem Federnelken in verſchiedenen Raſſen, wie unter anderen Alwoodii und Herbertii. Dieſe werden zweijährig gezogen, wobei jährlich über einhunderttauſend gepflanzt werden.

Das Land wird durch Gemüſekultur zur Blumenkultur vorbereitet. Zu dem gärtneriſchen Betriebe geſellt ſich dann noch landwirtſchaftlicher und auch Obſtbau. Die Viehzucht muß

Links Dainty, rechts Sämling

White Pearl

Eldora

den gerade für Nelkenkulturen im Hauſe ſo wichtigen Dünger liefern. So greift in dieſem Betriebe alles Hand in Hand. Jeder Fleck Erde wird ſachgemäß ausgenutzt und überall, wo es nur möglich iſt, wird der Betrieb maſchinell eingeſtellt. Wir ſehen die amerikaniſche Erdmiſchmaſchine in Tätigkeit, wir finden, daß der Anſtrich der Gewächshausrohre ebenſo einfach wie zweckmäßig erfolgt. In jeder Einzelheit gibt ſich der erfahrene Praktiker kund, der auch den rechten Mann an den richtigen Platz zu ſtellen weiß.
Natürlich laſſen ſich ſo ausgedehnte Schnittblumenkulturen nur in der Nähe eines großen Abſatzzentrums erfolgreich betreiben, wie es in dieſem Falle London iſt, das ja ganz andere Möglichkeiten zum Abſatz ſehr guter Ware bietet, wie etwa Berlin, deſſen Publikum noch viel zu wenig anſpruchsvoll iſt. So gehen denn täglich oder richtiger nächtlich von Saffron Walden zwei Laſtautos mit Blumen nach dem Covent Garden. Allerdings darf man ſich auch in England einen ſolchen Gartenbetrieb nicht als eine lukrative Induſtrie vorſtellen. Auch dort hat der fleißigſte und geſchickteſte Gärtner noch nie durch ſeine Tätigkeit allein Reichtümer geſammelt, wie es etwa in Induſtriebetrieben der Fall iſt. Im Gartenbau gehört immer ein Großteil lebenbejahender Idealismus dazu, um derartige Betriebe in Gang zu bringen und hoch zu halten. Wo dies aber geſchieht, da trifft man immer auf Menſchen, die man ſchätzen und bewundern muß. Zu dieſen Vertretern des Gärtnerſtandes gehört auch C. Engelmann, und darum iſt ein Beſuch bei ihm für jeden deutſchen Fachmann, der nach England kommt, doppelt angenehm.

KARL FOERSTER / IMMERGRÜNE ZWERGLAUBGEHÖLZE

DER Begriff der immergrünen Zwerglaubgehölze iſt den Garteninhabern im allgemeinen völlig fremd und läßt ſie kühl, da ſie natürlich garnicht ahnen, wie viel Wärme gerade dieſes Reich vielartiger, vermittelnder Gewächſe in den Garten trägt. Die Technik hat den merkwürdigen Begriff »Eta« geſchaffen und meint damit den Grad der Auswirkungskraft irgend einer techniſchen Veranſtaltung nach Abzug der kleinen oder großen Kraftverluſte, ſpricht alſo vom großen Eta der Dampfturbine im Vergleich zur Dampfmaſchine.
Bei der Abwägung des Etas der Gartenſchmuckgewächſe darf man ſozuſagen offenkundigere ſinnfälligere Wirkungen unterſcheiden von ſtilleren und geheimeren. Viele Pflanzen vereinigen beides und gerade zu dieſen iſt das Reich der immergrünen Zwerggehölze zu rechnen.
Ein Muſikinſtrument kann oft Fäden in das Gewebe einſchießen, die ſeinen Reichtum ins Unermeßne vervielfältigen; ein paar immergrüne Zwerggehölze an rechter Stelle in einem neugeſchaffenen Gartenanblick können den Eindruck eines handwerklichen Mechanismus ſogleich in den eines künſtleriſchen und kosmiſchen Organismus verwandeln. Solche Kraft ward vielen auf den erſten Anblick befremdlichen Gewächſen. Gerade das anfangs Abgelehnte, Befremdliche wird das Ausweitende, Ureigenſte! Frage einmal in hochgebildeter Geſellſchaft, was das Wort »Andromeda« in der Natur bedeutet. Einige wiſſen, daß dieſen Namen ein Sternbild trägt, in dem ſeltame Nebel ſind. Von den reizenden immergrünen frühblühenden Sträuchlein jenes Namens für unſere Gärten iſt aber natürlich zu keinem dieſer Empfänger ſteriliſierten Schulunterrichtes eine Botſchaft gedrungen, obwohl die Andromedaſträucher uns eben doch etwas zu geben haben, was ſich neben dem Sternbild ſehen laſſen kann.
Betrachtet man den etwas blutloſen Willensbereich naturfremder Gebildeter in Stadt und Land näher, ſo hat man das Gefühl, daß nur ein aktives leidenſchaftliches Mitleben mit der Natur auf irgend einem Gebiete von dieſer Blutloſigkeit heilen kann, wobei dem neuen Zeitalter des Gartenlebens eine unerſetzliche Rolle zufällt.
Die immergrünen Laubgehölze bringen nach Ambrózys Worten eine größere Heiterkeit in den winterlichen Garten als die Nadelhölzer. Dies gilt auch von der Ergänzung der Zwergnadelhölzer durch die immergrünen Zwerglaubgehölze, bei dieſen kommt aber auch noch die Schönheit des Beerenſchmucks, der winterlichen Knoſpengehänge und des frühen Blühens dazu.
Welch ein Schatz iſt ein alter Andromedaſtrauch im Garten. In größeren Beſtänden von Andromeda floribunda findet man manchmal Sämlinge, die ihre Knoſpengehänge noch drei Wochen früher erſchließen als die übrigen. Die ſchönſte Andromeda iſt neben der amerikaniſchen Lavendelheide die noch früher blühende japaniſche. Mit etwas Torfzuſatz ſind ſie in jedem gewöhnlichen Gartenboden zu kultivieren, auch an ziemlich trocknen Stellen bei etwas Waſſernachhilfe. Die Höhe ausgebauter Exemplare iſt 60 bis 90 Centimeter, im vorgeſchrittenen Alter werden es ſehr wuchtige Büſche.
Die Bärentraube, Arctostaphylos Uva Ursi, und die etwas ſtarkwüchſigere Form nevadensis gehören zu dem kleinen immergrünen Geſchmeide, das als Bodendeckung an ſonnigen und halbſchattigen Plätzen überall willkommen iſt. Dieſe kleinen europäiſch-amerikaniſchen Weltwanderer ſind brauchbare, zähe und etwas wuchernde Gartengewächſe. Immergrüne, ziemlich flache, bodenbedeckende Pflanzen ſind gartenkünſtleriſch von größter Bedeutung.
Dies immergrüne Sträuchlein aus deutſcher Heide lernen die meiſten erſt im Garten kennen.
Wieder eine andere Überraſchung bereitet unſere heimiſche Berberisart, der Sauerdorn mit den roten Beerengehängen, durch immergrüne zwergwüchſige Brüder, die aus den Bergen des ſüdlichen Südamerika, des weſtlichen China und dem Himalaya ſtammen. Sie ſind für unſere Steingärten wie geſchaffen. In alten ausgebauten Stücken werden einige, wie B. verruculosa aus China mit ihrem ausdrucksvollem Blattwerk bis gegen 70 Centimeter hoch (Bild Band II, Seite 9). Die feinblättrige B. empetrifolia aus Südamerika bleibt bei uns meiſt viel niedriger, und von ihr ſind es die kleineren Formen des Baſtardes mit B. Darwinii: B. ſtenophylla, die im Steingarten an geſchützten Stellen ſo prächtige Wirkungen ergeben. Am bekannteſten iſt die jetzt vielfach zu Einfaſſungen benutzte zwergige B. buxifolia nana aus Feuerland. Von Chineſen kommen in Betracht noch B. candidula mit den ſchönen weißen Blattunterſeiten und die feinblättrige B. triacanthophora.
Ganz falſch wäre es zu denken: Was ſollen uns die vielen immergrünen Büſchlein im Steingarten, ſoweit ſie nicht ſpäter auch Träger ſtarker Blüten- und Farbenwirkungen werden. Man hält es einfach nicht für möglich, wie die ſcheinbare Fülle und Verſchiedenartigkeit und auch die Menge ſelbſt von mäßig großen Steingartenräumen aufgeſogen wird. Es gibt immer noch irgendwo eine kleine Ecke an einem Felſen, an der ſolch immergrünes Gehölz Platz findet, weniger Erdraum als Luftraum beanſpruchend, allernächſt blühende Pflanzennachbarſchaft ſchützend oder vertragend und in ihrem Reiz unglaublich ſteigernd. Entſcheidende Schönheitshilfe bringen ſie beſonders auch dem zarten, allererſten Vorfrühlingsflor, für den es ſo wichtig iſt, daß er vom kahlen braunen Boden erlöſt wird und reizvolles Immergrün in nächſter Nähe vorfindet. All dieſe immergrünen Berberis können in ſehr ſchweren Wintern etwas zurückfrieren, beſonders in den erſten Jahren nach der Pflanzung. Sie ergänzen ihre Schäden aber um ſo energiſcher, je älter und kräftiger ſie ſind.
Ein weiteres unerwartetes kleines Schönheitsreich erſchließt ſich unſerer Generation mit den Zwergmiſpeln Cotoneaster, die zumeiſt aus China kommen. Es iſt nicht ausdenken, wie viel neue Lebensgeſtalten mit jedem Jahrzehnt aus den fernſten Weltteilen Genoſſen unſeres täglichen Lebens werden, ohne daß wir ihnen den Tribut zollen, uns durch ihr

Bruckenthalia spiculifolia

Gartenleben mit jenen Märchenfernen verbunden zu fühlen. Doch tröſten wir uns, die Welt iſt noch jung, der Menſchengeiſt beginnt ja eben erſt, ſich auf ſeiner Erdenwohnungsſtation heimiſch und wohnlich einzurichten und eine Ahnung zu bekommen, welch phantaſtiſche Schönheitskräfte auf ſeinen Wink ihm aus aller Welt zu Füßen liegen.

Wir konſtruieren uns aus Lebensüberreſten und der Phantaſie Bilder von Urweltlandſchaften und malen uns das Geſchehen in ihnen aus. Wie wäre es, wenn mal ein Maler, der das Zeug dazu hätte, nach lebenslangem Studium vorwegnehmend Zukunftsbilder entwerfen würde, wie die Welt Deutſchlands in kleinen und großen Gärten, in Wäldern und Parks, in Städten und Dörfern ausſehen könnte, wenn ſpätere andachtsvoller und lebensfeuriger eingeſtellte Generationen die mehr als phantaſtiſchen Schönheitsmöglichkeiten dieſer deutſchen Natur und Klimawelt ganz aufgeſchloſſen haben werden. Man kann nicht ſagen: ausgeſchöpft, denn davon kann nie die Rede ſein.

Kennworte für die gartenfreundlichſten immergrünen Zwergmiſpeln ſind Cotoneaster congesta (C. microphylla var. glacialis), C. Dammeri (ſiehe das Farbenbild), C. microphylla und C. thymifolia. Die rechten deutſchen Namen fehlen noch für dieſe ſo verſchiedenartigen Gewächſe. Was kann man nicht alles mit ihnen anfangen! Sie ſind wie Melodien, aus denen das Inſtrument jedes Gartenplatzes ganz andere muſikaliſche Schönheit herausholt. Halb eingeſchüchtert noch von ihrer Fremdheit, wagen wir ſie im Garten noch garnicht recht zu duzen und verwegen mit ihnen umzuſpringen. Gerade darauf aber warten ſie.

Jüngſt ſah ich eine ſandige Böſchung halb überdeckt mit dem flachen rotbeerigen, eng dem Boden aufliegenden Geſpinnſt der Cotoneaster Dammeri (C. humifusa), das weit nach allen Seiten ausſtrahlte. Auch im Halbſchatten zwiſchen Immergrün blüht ſie ſo ſtark, daß ihre roten Beerengehänge prachtvoll zwiſchen den blauen Immergrünblüten herausleuchten.

Helianthemum im Rauhreif

Auch im Reich der Ginſter und ginſterähnlichen Gewächſe findet der Freund immergrüner Gewächſe weſentliche und unerſetzliche Wirkung für Steingärten und Heidegärten und Naturgartenpartien. Stärkſter Reiz dieſer Art geht von alten Exemplaren des Elfenbeinginſters, Cytisus praecox aus, der allerdings über Kleingehölzmaße hinauswächſt. Ähnlich wirkt das ſträhnige Geflamme der Ephedra. Ungefeiert in ihrer Eigenſchaft als ganz kleines immergrünes Sträuchlein ſind auch die Rosmarinſeidelbaſte Daphne Cneorum major und Verloti.

Wir kommen jetzt zu dem liebenswürdigen und zuverläſſigen Reich der Zwergſpindeln, Evonymus, die wir nur japaniſchen Wäldern verdanken. Sie geben uns nicht viel zu denken, aber ſie ſind ſo ausgeſprochen gute Geſellſchaft, daß wir ſie an allen möglichen Gartenplätzen gerne um uns haben, obwohl ſie ſo ſchweigſam und in ſich gekehrt ſind. Man braucht eigentlich alle auf der Liſte genannten. Am meiſten geht die bunte Zwergſpindel in den prachtvollen roten Färbungen ihrer weißbunten Zweige im Winter aus ſich heraus, ebenſo die kleinſtblättrige Form kewensis. Ich habe kaum jemals eine ſo ſchöne immergrüne Einfaſſung geſehen, wie die aus bunter Zwergſpindel im Leipziger Palmengarten, wo ſie ſcharf wie Buchsbaum geſchnitten wird.

Ungerechter Weiſe wenig bekannt iſt der kleine Zwergefeu Hedera Helix conglomerata, der kleine kugelige Haufen bildet und das Kriechen vergißt, wenn er keine Felsfläche in der Nähe hat, an ſolcher ſich jedoch beim Kriechen unglaubliche Zeit läßt. Wer ihn hier zum erſtenmal ſieht, fängt ſofort an, das kleine verkämpfte und verknäulte Ungetüm zu ſtreicheln und zu tröſten. In den erſten Jahren nach der Pflanzung kann er von ſehr ſchweren Fröſten bisweilen etwas verſchnupft ſein, erholt ſich aber und ſetzt ſich wieder durch. Auch die kleine Buſchform des Hedera Helix aus Stecklingen von Alterszweigen verdient

Daphne Cneorum major

Pachysandra terminalis

deren kraftvolle braungrüne Blattfarbe ſehr zu preiſen iſt. Selbſtverſtändlich gehören die kleinen und großen wilden Rhododendronarten aller Alpen in Steingärten, wo ihre Plazierung natürlich vom Klima abhängig iſt. In Elberfeld kann man ſüdliche Bahnhänge mit Rhododendron im beſten Wohlſeins bedeckt ſehen, wovon hier in der Mark Brandenburg keine Rede ſein kann. Für kleinere oder mäßig große Steingärten kommen die in der ſpäter gegebenen Liſte genannten in Betracht. Unter den ſchon im Vorfrühling blühenden Rhododendron bildet hier R. praecox die ſchönſten immergrünen Büſche. Man braucht immer zwiſchen herrſchenden und ſtrahlenden Pflanzen auch ſtille und dienende. Ein denkbar unverwüſtliches immergrünes Zwerggehölz für den Schatten iſt Pachysandra terminalis, ſieht in dichter breiter Fläche im Winter auch nach ſchwerſten Fröſten eigentlich beſſer aus als irgend eine andere Bodendeckungspflanze. Natürlich hat ſie die Fehler ihrer Tugenden, für ihre Behauptungskraft braucht ſie die Fähigkeit unterirdiſchen Umherwucherns. Es fällt niemals

hier genannt zu werden. Zwei neue immergrüne chineſiſche Ankömmlinge ſind Lonicera nitida und L. pileata. In den Anfangsjahren meiner Bekanntſchaft mit nitida, ſah ich ſie mir manchmal darauf an, was ſie nun eigentlich von mir wollte. Alsbald fand ich auch tatſächlich ein Schönheitsamt für ſie, das nur ſie auszufüllen vermochte. Ich brauchte nämlich einen ſtarkwüchſigen, zierlichen immergrünen niedrigen Strauchrand im Schatten unter Bedrängnis von hohen Stauden, wo mir der Buchsbaum immerzu ausgekahlt wäre, Evonymus nicht ſtark und deutlich genug, Mahonia zu unproper, Iberis froſtgefährdet und lang werdend iſt, da ſie nur in ziemlich ſonniger Lage ſo weit ausreift, um abſolut winterhart zu ſein. L. pileata iſt noch härter und bei richtiger Pflanzung am Hang, wo die Früchte zur Geltung kommen, ſehr ſchön.

Eine der allerreizendſten immergrünen Kleinſträucher, meterhoch und meterbreit, iſt altgeworden unſere heimiſche Alpenroſe, Rhododendron hirſutum, die wir garnicht zu häufig in Gärten anwenden können und an ſehr trockenen Plätzen nicht genug durch ihre prachtvolle ſiebenbürgener Schweſter, Rhododendron Kotſchyi oder myrtifolium, erſetzen können,

Viburnum Davidii

läßig bei ihr, doch ist bei Nachbarpflanzen darauf zu achten. Etwas kräftigere kleine Gesträuche kann man natürlich mitten hineinpflanzen. Die Winterhärte ist vollständig: nur gegen sonnigen Stand bei Dürre besteht nachdrückliche Abneigung.

Doch genug der Einzelheiten, wer Pflanzen kennen lernen will, halte sich nicht zu lange bei Listen und Programmen auf und mühe sich nicht vergeblich, die Dinge seinem Gedächtnis einzuprägen, sondern verhalte sich immer möglichst draufgängerisch mit schneller Einfügung von Pflanzen in seinen Gartenbereich. Nur dann wird er schnell in ein inniges Verhältnis zu ihnen kommen.

Sieht man die Pflanzenmöglichkeiten kleiner und großer Gärten und vergleicht damit die bisherige Armut und Eintönigkeit, so hat man immer wieder das Gefühl, als ließen wir Orgeln unbenutzt und mühten uns auf alten Querpfeifen und Mundharmonikas herum.

B. VOIGTLÄNDER / DER FORSTGARTEN VON THARANDT

OBGLEICH der forstbotanische Garten der Forstakademie zu Tharandt die größte Gehölzsammlung Sachsens darstellt, wird er doch fast nie erwähnt, wenn von Dresden als einem Kulturzentrum des Gartenbaues die Rede ist. Ich möchte daher auf seinen Wert als Pflanzensammelstätte, als forstliche Versuchsstation und nicht zuletzt auf seine Bedeutung als Anschauungs- und Belehrungsstätte für die naturhungrige Dresdener Stadtbevölkerung hinweisen. Ich möchte dabei auch zeigen, welche Werte für den Gartenbau und die Forstwirtschaft verloren gehen, wenn die immer wieder angekündigte Verlegung der forstlichen Hochschule wirklich eintreten sollte.

Der Forstgarten konnte 1915 auf ein hundertjähriges Bestehen zurückblicken. An steilen Hängen emporsteigend bietet er schon infolge der Bewegtheit seines Geländes, das Höhenunterschiede bis fast zu hundert Meter aufweist, und der verschiedenen Beschaffenheit des Untergrundes die mannigfachsten Standplätze für Gehölze aller Art. Sind doch auch bereits gegen 2000 Gehölzformen hier angepflanzt, von denen sich so manche, wie wir noch sehen werden, trefflich entwickelt haben.

Die Entstehung und Geschichte des Gartens ist ziemlich bewegt. Sein Gründer war der Professor der Botanik Dr. A. Reum. Als dann 1811 Heinrich Cotta, der bedeutendste Forstgelehrte seiner Zeit, auf Betreiben des damaligen Königs Friedrich August des Gerechten, seine Forstanstalt aus Zillbach in Thüringen nach Tharandt verlegte, wurde der Garten stark vergrößert und seine Gehölzsammlung ausgebaut. Die Lage ist gegen Norden und Osten exponiert. Der älteste Teil ist der nördlichste Abhang, der Zeisiggrund, ein Frostloch, wo sich aber Ericaceen prächtig entwickeln. Ein Gebüsch von Rhododendron maximum hat beispielsweise einen Durchmesser von zwölf Metern. Nach und nach vergrößerte sich der Garten auf 14 Hektar Fläche. 1900 erfolgte die letzte Vergrößerung um 10 Ar zum Zwecke der Anzucht fremdländischer Holzarten zu Versuchsaufforstungen auf sächsischen Revieren. 1916 wurde dem

Aus dem Blumengarten der Literatur

Kaktusgestalten

Ich mußte mit dem Gärtner Simon auch in das Kaktushaus gehen, wo er mir sogleich den Cereus peruvianus wies, der durch meine Güte, wie er sich ausdrückte, in den Asperhof gekommen sei. Er wachse bereits steilrecht in seinem Glasfache empor, was durch viele Mühe und Kunst bewirkt worden sei. Die gelbliche Farbe vom Inghofe sei in die dunkelblaugrüne, gleichsam mit einem Dufte überflogene übergegangen, welche die völlige Gesundheit der Pflanze beweise. Wenn es so fortgehe, so könne auch noch die Freude der fabelhaften weißen Blumen der lebendigen Säule in dieses Haus kommen. Er führte mich dann zu einigen Kaktusgestalten, die eben im Blühen begriffen waren. Es lag eine ziemlich große Sammellinse in der Nähe, um die Blumen und nebstbei auch die Waffen und die Gestaltungen der Pflanzenkörper unter dem Einflusse des vollen Sonnenlichtes betrachten zu können. Er bat mich, die Linse zu gebrauchen. Es war eine farblos zeigende und zugleich eine, bei welcher die Abweichung wegen der Kugelgestalt auf ein Kleinstes gebracht war. Überhaupt wies sie sich als vortrefflich aus. Er erzählte mir, daß der Herr das Vergrößerungsglas eigens zum Betrachten der Kakteen habe machen, es in das schöne Elfenbein fassen und in das reine Sammetfach habe legen lassen. Heute erst sei er noch in dem Kaktushause gewesen und habe mit dem Glase die Blüten und viele Stacheln angeschaut. Ich bediente mich des Glases und sah in den von den seidenartigen Blumenblättern umstandenen gelben, weißen oder rosenfarbigen Kelch hinein, wie sie eben vorhanden waren. Daß der Glanz dieser Blumenfarben besonders schön, weit schöner als die feinste Seide und als der der meisten Blumen sei, wußte ich ohnehin, mußte es mir aber doch von dem Gärtner Simon zeigen lassen, so wie er auch der schönen, grün oder rosig oder dunkelrotbraun dämmernden Tiefe des Kelches erwähnte, aus der die Wucht der schlanken Staubfäden aufsteige, da keine Blüte so zierlich habe. Überhaupt seien die Kaktusblumen die schönsten auf der Welt, wenn man etwa einige Schmarotzergewächse und ganz wenige andere vereinzelte Blumen ausnehme. Er machte mich auch auf einen Umstand aufmerksam, den ich nicht wußte oder den ich nicht beobachtet hatte, daß nämlich bei einigen Kugelkaktus sich die Blumen stets aus neuen Stachelaugen meistens mit ganz kurzem Stengel entwickeln, während sie bei andern auf einem mehr oder minder hohen Stiele aus vorjährigen oder noch älteren Stachelaugen sich erheben. Er sagte, das werde gewiß einmal einen Grund zu einer neuen Einteilung dieser Kaktusgestalt geben. Er zeigte mir an vorhandenen Gewächsen den Unterschied, und ich mußte ihn erkennen. Er sagte, daß dies nicht zufällig sei, und daß er die Tatsache schon dreißig Jahre beobachte. Damals, als er jung gewesen, seien kaum einige dieser Gestaltungen bekannt gewesen, jetzt vermehre sich die Kenntnis derselben bedeutend, seit die Menschen zur Einsicht ihrer Schönheit gekommen sind und Reisende Pflanzen aus Amerika senden, wie jener Reisende, der von deutschen Landen aus fast in der ganzen Welt gewesen sei. Es könne nur Unverstand oder Oberflächlichkeit oder Kurzsichtigkeit diese Pflanzengattung ungestaltig nennen, da doch nichts regelmäßiger und mannigfaltiger und dabei reizender sei als eben sie. Nur eine erste genaue Betrachtung und Vergleichung derselben sei nötig, und nur ein sehr kurzes Fortsetzen dieser Betrachtung, damit die Gegner dieser Pflanzen in warme Verehrer derselben übergehen — es müßte nur ein Mensch überhaupt kein Freund der Pflanzen sein, welche Gattung es vielleicht in der Welt nicht gibt.

Aus: Adalbert Stifter
„Der Nachsommer“

Garten der Höhengarten des ehemaligen Garteninſpektors G. A. Poſcharksy in Schellerhau im Erzgebirge, in einer Höhenlage von 760 Metern, adminiſtrativ angegliedert. Poſcharksy hatte hier eine Sammlung von Alpenpflanzen aller Hochgebirge der Erde, ſoweit ſie bei uns winterhart ſind, angelegt. Außerdem wurden hier Verſuche mit Obſt- und Beerenobſtſorten ausgeführt, um die Bevölkerung in dieſer Höhenlage, wo bisher außer der Ebereſche von Fruchtgehölzen nichts wuchs, mit Erfahrungen an die Hand zu gehen.

Die Entwicklung der Pflanzen im Tharandter Garten iſt ſehr verſchieden und gibt dem Gehölzzüchter viele wichtige Winke. Im nördlichen und öſtlichen Teile gedeihen die Koniferen ſehr gut, da ſie nicht leicht zu früh austreiben. Zur guten Entwicklung trägt auch die verhältnismäßig feuchte Luft des Tharandter Thales bei. Der Garten liegt auf dem letzten Ausläufer des Erzgebirges, dem Kirchberge. So kommt denn hier manche gute Konifere fort, die in Dresden verſagt. Beſonders ſchön iſt trotz ihres exponierten kalten und zugigen Standortes eine Cedrus Deodara, die aus Samen aus dem Himalaya erzogen wurde. Ferner gedeihen vorzüglich Cedrus Libani und Sequoia gigantea, die bei einem ungefähren Alter von 45 Jahren einen Stammumfang von 130 Centimeter hat. Ausgezeichnet ſteht auch eine größere Anpflanzung von Cryptomeria japonica, und ſelbſt die weiche braunnadelige Form elegans hält ohne jeden Schaden aus. Auf ſcharfem Oſtwinde ausgeſetztem und noch dazu ſehr trockenem Standorte ſehen wir ein ſtarkes Stück von Juniperus Oxycedrus. Verſchiedene ſeltenere Abies gedeihen gut, wie A. arizonica, A. firma, A. grandis, A. subalpina. Auch die vorhandenen Stücke von Chamaecyparis Lawsoniana und Ch. nutkatensis zeigen, daß die Koniferen trotz ärmlichen Nährſtoffgehaltes des Bodens, ohne jede Pflege und Waſſerzufuhr gut gedeihen. Ganz im Gegenſatz zu vielen Laubholzgattungen. So iſt beiſpielsweiſe das Wachstum der Eſchen geradezu miſerabel. Auch viele beſſere Ahorne wollen nicht vorwärts. Die Steinfrüchtler, wie Prunus, Amygdalus und andere, ſtehen geradezu troſtlos da. Dagegen kommen andere Laubhölzer, wie Eichen, Erlen, Äpfel und Birnen, die weder gepflegt noch gedüngt werden können, recht gut vorwärts. Kräftige, prächtige Bäume von der Edelkaſtanie, Castanea vesca, zeigen, daß ſie ſich hier auf dem kalkarmen Boden ſehr wohl fühlen und reichlich Samen bringen, und ſo große geſunde Hikkorynußbäume, Carya alba und porcina, werden nicht häufig in unſeren Anlagen angetroffen. Auch von Buchen, Hainbuchen, Hopfenbuchen, Ostrya, und Graunüſſen, Juglans cinerea, ſind charaktervolle Bäume da. Von den Magnolien gefällt es vor allem Magnolia acuminata.

Im allgemeinen ſind alle Pflanzen nach einem älteren botaniſchen Syſtem angeordnet und mit großen Porzellanſchildern verſehen. Zwiſchen ihnen ſtehen viele alte große Bäume mit kleinem Schildchen, das anzeigt, daß ſie nicht zum Syſtem gehören. Ihre Umpflanzung war in den ſiebziger Jahren als die wiſſenſchaftliche Anordnung ſtattfand, nicht mehr möglich. In die ſyſtematiſche Anlage ſpringen dann noch ſporadiſch die pflanzengeographiſchen Gruppen hinein: die kaukaſiſche, die nordamerikaniſche, und die oſtaſiatiſche Florengruppe, deren durch den Krieg und ſeine Folgen unterbrochener Ausbau hoffentlich bald möglich iſt.

Neben ſeinem Hauptzweck als Unterrichtsſtätte hat der Forſtgarten noch andere Aufgaben zu erfüllen. So dient er zur Verbreitung edler Laubgehölze und Nadelhölzer. Zur Maſſenanzucht ſolcher Gehölze, die für Akklimatiſationsverſuche in Betracht kommen. Auch auf eigenem Terrain finden ſolche ſtatt. So beſitzt der Garten ſchon alte Anpflanzungen der verſchiedenen Douglasfichten-Raſſen, der Formen der ſchwediſchen Fichte, von Chamaecyparis Lawsoniana, Pinus monticola, P. Peuce, aus bulgariſchen Samen, P. Laricio corsicana, Picea sitchensis, P. alba, P. Omorika, P. pungens, P. Engelmannii, Abies brachyphylla, A. firma, A. Nordmanniana, Larix leptolepis, der japaniſchea Lärche, und vieler anderer Holzarten. Für die Forſtwirtſchaft iſt ferner wichtig der Anbau verſchiedener Kiefernraſſen, da die Kiefer durch unreellen Samenhandel in der Holzproduktion in Deutſchland ſtark zurückgegangen iſt. Es gilt aus dem jetzigen Sammelſurium die wüchſigſten und produktivſten Raſſen herauszufinden. Auch mit der gewöhnlichen Fichte muß in ähnlicher Art vorgegangen werden.

Bedeutungsvoll iſt auch die Arbeit an Eſchen, Eichen und anderen Laubhölzern in der Hoffnung, auch dieſe Holzraſſen in ihrem Ertrage zu ſteigern. Alle ſolche Verſuche ſind langwierig und erfordern Menſchenalter.

Die Bedeutung und Art des Forſtgartens ſei noch durch einige weitere Angaben gekennzeichnet. Infolge ſeiner Lage nach allen vier Windrichtungen bietet er wechſelnde Szenerien und weite Ausblicke. Bei klarem Wetter kann man vom »Heinrichseck« aus den Hohen Schneeberg bei Bodenbach in Böhmen erblicken. Auch der Geiſing und die Höhen bei Kipsdorf im höheren ſächſiſchen Erzgebirge ſind zuweilen ſichtbar. Die Wege im Garten, die ſämtlich zu ſchönen Ausſichtspunkten führen, ſind nach verdienten Männern benannt: ſo gibt es einen Beißner-, Büttner-, Willkomm-, Nobbe-, Goebel-, Reichenbach- und Franz Neger-Weg. Eine ſchöne Ausſicht bietet der Cotta-Platz. Den höchſten Punkt bildet der Königsplatz, auf dem der Botaniker auf dem ſächſiſchen Throne, König Johann, 1855 zwei deutſche Eichen pflanzte. Friedrich Auguſt fügte drei Roteichen zum Andenken an die drei letzten Könige hinzu. Heinrich Cotta, der eigentliche Begründer des Gartens fand ſeine Ruheſtätte in nächſter Nähe des Gartens inmitten ſeiner achtzig Eichen.

Die ſonntäglich in großer Zahl zum Garten pilgernden Beſucher ſtaunen über die Mannigfaltigkeit und Schönheit der Gehölze. Viele Gattungen ſind in großer Formenzahl vertreten, ſo finden ſich von Abies 25, Acer 40, Chamaecyparis 55, Fraxinus 38, Juniperus 29, Malus 20, Picea 50, Pinus 50, Populus 25, Prunus 58, Pyrus 25, Quercus 70, Rhododendron 32, Rosa 52, Sorbus 27, Spiraea 47, Taxus 20, Thuja 24, Tsuga 10 und Ulmus 35 Vertreter. Die folgenden Zahlen geben die Durchmeſſer von Stämmen in einem Meter Bruſthöhe bei einer Anzahl von Arten an, um deren Stärke zu kennzeichnen. Von Koniferen ſeien genannt: Abies lasiocarpa 45, A. Pinsapo 30, A. grandis 50, Pseudotsuga Douglasii 65, Picea Omorika 40, P. orientalis 45, Thuja gigantea 40, Tsuga canadensis 100, T. Mertensiana 45, Pinus Lambertiana 50, P. austriaca 70, Larix europaea 90. Von Laubhölzern ſind die ſtärkſten: Fagus silvatica 100 (etwa 200 Jahre alt), Juglans cinerea 45, Magnolia acuminata 55, Nyssa aquatica 40, Cytisus Laburnum 35, Quercus coccinea 90, Q. Phellos 55, Q. palustris 50, Liriodendron tulipifera 60, Castanea vesca 100, Halesia tetraptera 40, Carya alba 40, Tilia argentea 100, Alnus cordifolia 55, Corylus Colurna 45, Ostrya carpinifolia 40, Sorbus scandica 55, Betula lenta 45 und Prunus Mahaleb 40. Ein Buſch von Hamamelis virginica hat 10 Meter Breite und eine Juniperus virginiana tripartita iſt ebenſo groß. Die hier gegebenen Maße ſind um ſo bedeutſamer, als, wie ſchon betont, der Boden durchaus nicht gut iſt.

Auf jeden Fall dürfte der Tharandter Forſtgarten in bezug auf ſeinen Gehölzreichtum in Deutſchland wohl an erſter Stelle ſtehen, wenn man von den neueſten Einführungen abſieht. Seine Erhaltung als dendrologiſcher Garten, als ein Verſuchsinſtitut für den Forſtbau iſt dringend geboten.

LISTE DER WICHTIGSTEN KLEINIMMERGRÜNEN

(Höhen in Centimetern)

Gräſer:

Avena sempervirens, 60
Carex Morrowii (C. japonica), 30
— pendula (C. maxima), 60
Festuca glauca, 10
— punctoria, 10
— scoparia (F. crinum-ursi Hort.), 20
Luzula nivea, 30

Farne:

Aspidium aculeatum
— acrostichoides
— angulare
Aspidium angulare proliferum
— — — multifidum
— — polydactylum
— Lonchitis
— lobatum
Blechnum Spicant
Polypodium vulgare
Scolopendrium vulgare
— — undulatum

Laubgehölze:

Andromeda axillaris, 50
— Catesbaei, meiſt nicht über 80
Andromeda floribunda, meiſt nicht über 80
— polifolia, 30
Arctostaphylos uva-ursi, 20
— — nevadensis Hort., 20
Berberis buxifolia nana, 30 bis 40
— candidula, 30
— empetrifolia, 40
— stenophylla, niedrige Formen, 40 bis 60
— triacanthophora, 50
— verruculosa, 60
Bruckenthalia spiculifolia 15
Buxus microphylla, 50
— sempervirens subglobosa, 30

GARTENAUFGABEN / ALTE UND NEUE LÖSUNGEN

Eine Teichbepflanzung

ES war ein Teich nicht beſſer und auch nicht ſchlechter wie ſo manch anderer. Kreisrund, in offener Raſenfläche gelegen, mit einem Rande aus ſenkrecht ſtehenden Naturſteinen. Ein Teich, der nur dann zum Leben erwachte, wenn die Waſſer an Feſttagen haushoch ſpringen durften. Ja, das war das Einzige, was dieſem Waſſerbecken Daſeinsberechtigung verlieh, denn die Spiegelung, anderswo das Weſentlichſte, die ſuchte man vergebens.
So war es noch geſtern. Die Bilder erzählen vom Heute: Eine Staudenrabatte von einheitlicher Breite zieht ſich um den Teich. In Abſtänden von einigen Metern ſtehen in rhythmiſcher Folge Rankroſen (meiſt freitragende Büſche), Heracleum Mantegazzianum und Senecio (Ligularia) Clivorum. Dazwiſchen blühen zahlreiche weiße und roſafarbene Aſtilben und die vielen Stauden mit Sumpfpflanzenphysiognomie: Caltha palustris, Iris, Hemerocallis, Megasea (Bergenia), Trollius und andere. Alle ſo gepflanzt, daß der Blick auf die Teichfläche ſtellenweiſe ungehindert iſt. Die Rankroſen, ſo ſeltſam ihre Verwendung vielleicht erſcheinen mag, möchte niemand mehr miſſen. Mit ihren überhängenden, blütenſchweren Zweigen bereichern ſie das Uferbild in ungeahnter Weiſe. Von den niederen Stauden hat ſich Bergenia cordifolia am beſten bewährt, die mit ihren breiten Blättern auch zur Winterszeit einen vorzüglichen Eindruck macht.
Im kommenden Gartenjahr ſoll die Wirkung der Pflanzung durch Lythrum virgatum Roſe Queen und Lythrum roseum superbum, zwei Stauden, deren wunderbare Wirkung am Waſſer der Londoner Parks mir unvergeßlich blieb, geſteigert werden.

J. Schweizer

Calluna vulgaris Alporti
— — elegantissima
Cotoneaster congesta (C. microphylla glacialis), 10
— Dammeri, (C. humifusa), 5 bis 10
— microphylla, 10 bis 20
— thymifolia, 5 bis 10
Cytisus (nicht immergrün, ohne Blätter so wirkend)
— decumbens, 20
— kewensis, 30
— praecox, bis 100
— purgans, 40
Daboecia polifolia, 50
Daphne Blagayana, 10
— arbuscula, 30
— Cneorum major, 20
— — Verloti, 30
— collina (C. sericea), 60
Dryas octopetala
Empetrum nigrum, 30
Ephedra helvetica, 20
— distachya, 30
Epigaea repens, 8
Erica carnea, 30
— — alba
— — rubra
Evonymus radicans, 20
— — minima (kewensis), 10
— — reticulata, 20
— — vegeta, bis 50
Gaultheria procumbens, 15
— Shallon, bis 50
Genista (blattlose Immergrüne)
— anglica, 50
— hispanica, 30
— radiata, bis 70
Hedera Helix conglomerata, kriechend
— — digitata „
— — minima „
— — palmata „
— — pedata „
— — sagittifolia „
— — arborescens, bis über 50
Iberis semperflorens, 15
Kalmia angustifolia nana, 20
— polifolia, 20 bis 50
Lavandula Spica, 40 bis 50
Leiophyllum buxifolium, 30
— — prostratrum, 5
Linnaea borealis, 5 bis 8
Lonicera nitida, bis 60
— pileata, 30
Mahonia repens, 30 bis 40
Moltkia petraea, 40
Osmanthus Delavayi, bis 80
Pachysandra terminalis, 20
Pachystima Myrsinites, 10
Phyllodoce coerulea, 15
Pernettya mucronata, 60
Polygala Chamaebuxus, 3
Rhododendron arbutifolium (R. Wilsonii), 80
— caucasicum, Hochgebirgsform, 30
— hirsutum, 70
— intricatum, 70
— hippophaeoides, 50
— Kotschyi (R. myrtifolium), 40
— lapponicum, 25
— praecox, 80
—, weitere chinesische Zwergarten werden später gesondert besprochen.
Ruscus aculeatus
— racemosus
Salvia officinalis, 60
Santolina Chamaecyparissus, 30
— tomentosa, 25
Vaccinium Vitis Idaea minus, 10
— macrocarpum
Viburnum Davidii
— utile, bei Schnitt 60 bis 80
Vinca major, 25
— minor, 15
Yucca filamentosa, 50

Stauden:

Acaena Buchananii
— microphylla
Achillea argentea
— macedonica
Ajuga reptans fol. purp.
— — fol. var.
Alsine graminifolia
— laricifolia
Alyssum montanum
— saxatile fl. pl.
— — citrinum
— serpyllifolium
Androsace lanuginosa
— sarmentosa
Arabis albida fl. pl.
— — superba
Arenaria tetraquetra
Aretia Vitaliana
Armeria formosa splendens
— Laucheana
Asarum europaeum
Asperula nitida
Aster subcoeruleus floribundus
Aubrietia hybrida Dr. Mules
— — Lavender
— — Moerheimi
— Leichtlini Crimson
— tauricola
Bergenia cordifolia
— crassifolia
— hybrida
— pacifica
Calamintha alpina
Campanula grandiflora
— — alba
Cerastium Biebersteinii
— Columnae
Cotula squalida
Cyclamen europaeum
— nepolitanum (C. hederifolium)
Dianthus arenarius
— caesius
— neglectus
— plumarius hybridus Altrosa
— — — Maischnee
— spiculifolius
— zonatus
Draba Dedeana
— olympica
Epimedium pinnatum
— — sulphureum
Euphorbia capitulata
— Myrsinites
Fragaria vesca
Gentiana acaulis
Geum bulgaricum
— sibiricum
Globularia trichosantha
— cordifolia
Helianthemum amabile fl. pl. Rubin
— — Elfenbein
— — Gelbe Perle
— — Rosakönigin
— mutabile Bronce
Helianthemum mutabile oculatum
Heliopsis breviscapa
Helleborus foetidus
— corsicus
— hybridus
— — maximus
— niger
— — praecox
— orientalis
Hepatica triloba
Heuchera gracillima superba
— hybrida Feuerregen
— — Feuerrispe
— — Titania
— sanguinea Frühlicht
Hieracium rubrum
Hypericum calycinum
— reptans
Iberis sempervirens Schneeflocke
— — Weißer Zwerg
Marrubium libanoticum
Opuntia-Arten
Paronychia argentea serpyllifolia
Penstemon pubescens pygmaeus
Phlox amoena fol. var.
— Stellaria
— subulata (P. setacea)
Potentilla chrysocraspeda
Primula Auricula
— Juliae
Pulmonaria angustifolia (P. azurea)
— rubra
Sagina subulata
Saxifraga apiculata
— caespitosa
— Cotyledon pyramidalis
— Elisabethae
— decipiens hybrida Blütenteppich
— — — Juwel
— — — magnifica
— — — Schöne von Ronsdorf
— — — Teppichkönigin
— hypnoides purpurea
— irrigua
— leptophylla
— lingulata superba
— moschata
— muscoides grandiflora
— — purpurea
— trifurcata
— umbrosa
— — fol. var.
Sedum album
— dasyphyllum
— Lydium
— oreganum (S. obtusatum)
— reflexum (S. nicaense Hort.)
— rupestre
— spathulifolium
Sempervivum (siehe Liste Band VI, Seite 227)
Shortia galacifolia
Silene alpestris
Soldanella hungarica
Stachys lanata
Statice Limonium
— latifolia
Tanacetum argenteum
Thymus lanuginosus
— serpyllum album
— — coccineus
— — major
Veronica rupestris Hort. (V. Teucrium dubia)
— saxatilis
Wulfenia carinthiaca

K. F.

Gartenarbeit und Blumenpflege

ALEXANDER STEFFEN / GARTENGERÄTE

Allgemeines

WENN über die verschiedenen Arten von Gartengeräten gesprochen werden soll, so müssen unbedingt einige allgemeine Bemerkungen vorangeschickt werden, die für alle gelten. Zunächst die, daß in deutschen Gartenbaubetrieben noch viel zu wenig Wert auf gute Geräte und auf ausreichende Zahl gelegt wird und daß damit dem flotten Fortgang der Arbeit, der Stimmung des Arbeitenden unnötige Hemmungen bereitet werden. Sowohl bei Erwerbsgärtnern wie besonders in Privatgärtnereien auf dem Lande herrscht eine ganz falsche Sparsamkeit. Die Landarbeitslehre legt den Landwirten heute so dringend die Wichtigkeit bester Maschinen ans Herz um teure Menschenkraft zu sparen. Was der Landwirtschaft recht ist, muß der Gärtnerei billig sein. Die Handgeräte sind für sie eigentlich noch wichtiger, da die Handarbeit eine noch größere Rolle spielt.
Es sollen nicht nur gute Geräte da sein, sondern auch reichlich, von den wichtigsten für jeden ständigen Arbeiter ein Stück, sodaß kein Streit um die besten Stücke eintritt und damit keine Kraft in Notfällen kalt gestellt wird. Ich halte es aus gleichem Grunde und weil für die Beurteilung von Arbeitsleistungen gleiche Verbindungen geschaffen werden müssen, für wünschenswert, daß für Kolonnenarbeit nur eine Geräteform, also beispielsweise nur Spaten gleicher Art allen Arbeitenden in die Hände gegeben werden. Man wird dagegen Einwendungen erheben und mir sagen: in dem von mir geleiteten Betriebe gebe es auch recht viel verschiedene Spatensorten. Dazu bemerke ich: Die Mannigfaltigkeit hat ihre geschichtlichen Gründe. Man wirft nicht gern brauchbares fort. Dieser Grund entscheidet aber nicht. Ich würde das Wegwerfen nicht scheuen. Aber bei uns ist der Spatengebrauch durch Maschinenverwendung sehr in den Hintergrund getreten. Wir brauchen ihn noch um Bäume oder Sträucher zu roden, um Streifen zu graben, auf die Fraise oder Pflug nicht hin können; wir graben in den Frühbeeten, aber geschlossene Grabe-Kolonnen kommen kaum noch vor und mein Feldgeschrei lautet: Los von Spaten und Hacke. Es gilt nicht für alle Betriebe, wie etwa alle Kleinbetriebe. Hacke und ähnliche Handgeräte kennzeichnen die Familienbetriebe holländischer Art oder die Deutschen, wie wir sie in Werder, bei Hamburg, in Sachsen, am Main und anderen Gegenden finden. Hacken und Stoßeisen haben so parallel mit dem häufigen Anbauwechsel und dem Ineinanderschachteln der verschiedenen Fruchtarten eine liebevolle Ausbildung erfahren. Wer ausschließlich mit bezahlten Arbeitskräften zu rechnen hat, kann dabei nicht bestehen.
Zur Aufbewahung der Geräte, zu ihrer Unterbringung im Betriebe mit fremden Leuten will ich noch etwas Grundsätzliches sagen. Es gibt zwei Möglichkeiten: Zentralisation oder Dezentralisation, ferner entweder tägliche Ausgabe und Wiederhereinnahme der Geräte oder freies Belassen der Geräte in den Händen der Arbeiter und in stets zugänglichen Räumen. Die Zentralisation gefiel mir am besten in einer Rosenschule. Die Betriebsgebäude liegen dort alle dicht beieinander und annähernd in der Mitte des Gebäudes. Die Arbeit ist nur Kolonnenarbeit im freien Land; keine Verwicklung durch Frühbeete, Glashäuser. Für einen alten Arbeiter, der den Gerätekammerschlüssel hat, findet sich stets Arbeit in der Nähe, er spitzt und schält Pfähle, bessert aus und könnte schließlich leicht durch Glocke hereingerufen werden. Er ist der erste und letzte am Platze für Ausgabe und Wiederhereinnahme der Geräte. Dicht neben den Geräten befindet sich der Raum, in dem die Arbeiter und Frauen in den Pausen sich aufhalten.
Denke ich mir solche Geräte-Zentrale auf unseren Betrieb übertragen, so scheint sie mir höchst unpraktisch. Bei uns kommt wenig Kolonnenarbeit, viel Arbeit von zwei bis vier Personen, verteilt an verschiedenen Stellen, vor. Der Aufenthaltsraum für Arbeitspausen wird nur von einem geringen Teil der Leute benutzt und liegt nicht zentral. Einen eigentlichen Betriebsmittelpunkt gibt es bei uns nicht, die Orte der Arbeit wechseln. Sollten die Leute ihre Geräte abliefern und morgens holen, so würden viele Leergänge zu leisten sein und Viertelstunden vertrödelt werden. Soll eine Frau einen Rechen oder eine Gartenschnur holen, so müßte sie erst nach dem Schlüsselmann suchen, dieser müßte seine Arbeit unterbrechen, einen Hin- und Herweg zurücklegen, kurz, es würde ein nutzloses Gelaufe entstehen, was einen Betriebsleiter nervös macht und ihn zu dem Grundsatz bringt: lieber mag mal ein Spaten verloren gehen und etwas weniger Ordnung herrschen.
Also mit der Zentralisation und dem Verschließen der Geräte geht es nicht überall, aber oft. Dezentralisation kommt nur für ganz große Betriebe mit weiten Entfernungen in Frage. Wo nicht zentralisiert werden kann und wo die Geräte in offenen, allgemein zugänglichen Räumen gehalten werden, sollte man aber für ihre Sichtung nach Arten, aufhängen auf Riegeln, stete Säuberung nach Gebrauch sorgen. Es ist auch zu erwägen, ob man nicht von den wichtigsten Geräten wie Hacke, Spaten, Düngergabel jedem Hauptarbeiter ein mit eingebrannter Nummer gezeichnetes Stück zur verantwortungsvollen Verwaltung übergibt, um jeden in Besitz eines für ihn passenden, ihm genehmen Stückes zu wissen und jeden Streit um die besten auszuschließen. Ich gestehe, daß ich mit der Geräteordnung bei uns noch nicht zufrieden bin und eine mich voll befriedigende Lösung nicht gefunden habe. Es geht mir wie Nitzsche, der, wie Kaftan uns so wahrscheinlich gemacht hat, den Willen zur Macht predigte, weil er selbst sein eigenes Manko in dieser Richtung schmerzlich empfand.
Jedes Gerät hat einen Stiel, und er besteht stets aus Holz. Also muß sich etwas Allgemeines über alle Stiele sagen lassen. Das erste ist, daß sie zwar nie zu schwer, aber auch nie zu dünn sein sollen, nicht nur wegen der Haltbarkeit, sondern damit die Hand nicht zu krampfhaft zusammengedrückt zu werden braucht, um ihn festzuhalten. Wer Hühner hat weiß, daß die Sitzstangen ebenfalls nicht zu dünn sein dürfen, weil die Tiere sonst sich nicht festhalten können; sie rollen gewissermaßen um die Stange herum. Das krampfhafte Festhaltenmüssen der Stiele ermüdet die Hand. Das dünne Auslaufen der Stiele nach oben zu bedeutet also ebenfalls einen Mangel. Außerdem führt es weiter dazu, das Gleichgewicht ungünstig zu verschieben. Namentlich Hacke und Rechen werden im Verhältnis vorn zu schwer, wenn der Stiel vorn zu dick oder nach oben zu dünn wird. Die Verjüngung nach oben darf nur eine ganz geringe sein, höchstens ein Zentimeter.
Wichtig für die Dauerhaftigkeit der Stiele ist Freisein von Astlöchern, Laufen der Fasern in der Stielachse; nicht mit der Faserrichtung laufende Stiele können natürlich einem seitlichen Druck nicht standhalten.
Man könnte noch daran denken, ob sich nicht an den Stielen Stellen des Widerstandes anbringen lassen, an denen die Hand bei Druck oder Stoß eine Widerlage, einen Gegenhalt findet. Beim Rechen, der ziehend verwendet wird, könnte man denken an eine leichte keulenartige Verdickung gegen das Stielende, bei dem Spaten an ein Querholz gegen das die linke Hand sich legt beim Einstoß in die Erde. Wir haben Beispiele: am Karrenarm stößt die Hand beim Schub nach vorwärts gegen eine Holznase oder einen Eisenstift, beim Taschenmesser der Bayern sichert eine Querstange die stoßende Hand gegen das Übergleiten auf die Schneide. Solche Änderungen werden probiert sein. Beim Spaten muß der Gegenhalt mit der rechten Hand am Griff genügen. Ein Querholz würde die Bruchfestigkeit des Stiels mindern. Nach diesen Vorbemerkungen treten wir in Einzelbesprechungen ein. Ich bin von ihrer Ergänzungsbedürftigkeit überzeugt. Die Mannigfaltigkeit der Geräte ist groß, demgemäß die Gewohnheiten und die Liebe für das, was Herkommen und Übung zum Verwachsen mit den Menschen der Scholle brauchte. Die Arbeitsbedingungen zeigen eine nicht minder große Mannigfaltigkeit. Hier leichter Sand, den der Wind fortbläst, dort schwerer nasser Lehm, dort steiniger Berghang, in dem der in anderen Gegenden ungebräuchliche Karst allein zweckmäßige Dienste leistet.

Die Schaufel

WIR bedienen uns der Schaufel um feinkörnige Massen auf kurze Entfernungen fortzubewegen, meist handelt es sich um Erden verschiedener Art und kurzen Dünger, der an einen andern Platz gleicher Ebene zu werfen oder auf Wagen und Karren aufzuladen sind. Außerder hierzu nötigen Erdschaufel gibt es andere für Sonderzwecke: große, breite, kurzstielige für Kohlen, langstielige hölzerne für Getreide. Eine Zwischenform zwischen Schaufel und Gabel stellt die engzinkige Gabel dar, die ebenfalls für Kohlen in Gebrauch ist, aber auch für Kartoffeln, die

Zinken greifen beſſer unter die Bodenmaſſe als eine geſchloſſene Schaufelkante, und Kohlenſtaub, Schmutzerde der Knollen ſollen durch die Zinken hindurch fallen. Auch bei langem Dünger, für Stroh- und Unkrautladen können wir die Schaufel nicht gebrauchen, weil der breite Rand wohl *unter* dieſe Bodenmaſſe eingeſchoben werden kann, aber nicht in ſie hinein. Wir greifen in ſolchem Falle zur Düngergabel, und erſt wenn wir am Grunde des Haufens auf Feinteile ſtoßen, tritt die Schaufel in Funktion.

Die Schaufelarbeit zerlegt ſich in zwei Arbeitsphaſen, das Einſtoßen in die Bodenmaſſe, dann Heben und Entleeren; die erſte Arbeit wird vom Körper in ſeiner Geſamtheit geleiſtet unter Vorbeteiligung des vorgeſtellten linken Beines und unter Richtunggebung durch die Arme. Der zweite Vorgang wirkt ſich in erſter Linie als Armleiſtung aus unter Beteiligung des Oberkörpers. Wir heben nicht langſam, ſondern nutzen einen Schwung aus. Das Zurückführen der entladenen Schaufel geſchieht nicht durch einfaches Fallenlaſſen, ſondern die Arme behalten das Gerät in ihrer Gewalt, um es aufs Neue an paſſender Stelle einzuſetzen und eine Unterbrechung des Arbeitsrhythmus zu verhindern.

Aus dieſen Zweckbeſtimmungen und dieſer Gebrauchsweiſe ergeben ſich die Anſprüche an das Gerät. Es gilt eine Tragfläche zu ſchaffen, die durch Einſtoß in das Material leicht beladen werden kann, auf der beim Anhub genügende Maſſen liegen bleiben; die in beladenem Zuſtand ſoviel faßt, daß die Arbeit ſchafft und doch nicht ſo ſchwer iſt, daß Dauerleiſtungen unmöglich ſind. Die Entleerung muß leicht von ſtatten gehen. Das Einſtoßen und Anheben, das Schwungnehmen wird durch einen leicht gebogenen Stiel erleichtert. Die Greifgelegenheiten für die Hand am Schaufelſtiel können nicht günſtig genannt werden. Wenn am Stielende ein Quergriff angebracht wird, ſo erleichtert er, falls der Stiel nicht zu lang iſt, das Vorſtoßen, aber für's Umkippen liegt er ungünſtig. Es wurde ſchon verſucht für die vorliegende linke Hand einen beſonderen der Handform angepaßten Griff anzubringen, ſeitlich nach Art des Senſengriffs. Davon mußte man aber abſehen, denn nun geht die Stoßrichtung des linken Armes nicht mehr genau mit der Stielachſe. Die Senſe arbeitet nicht auf Vorſtoß, ſondern auf Schlag und Zug.

Das Beladen geſchieht alſo durch Verſchieben der Schaufelfläche unter die Bodenmaſſe oder wenn ſie feinkörnig iſt, auch in ſie hinein, und zwar bis an den hochgebogenen Hinterrand, an dem der Stiel befeſtigt iſt. Es bleibt ein gewölbter Haufen auf der Schaufelfläche liegen, der etwa Figur 4 (A) entſpricht. Am Rande bröckelt die Erdmaſſe ſtark ab. Man hat daher um ſie feſtzuhalten an manchen Schaufeln die Ränder der Fläche hochgebogen und eine Art Löffel geſchaffen, deſſen Faſſungskraft erheblich größer iſt (B). Die Umbiegung ſetzt des beſſeren Einſtoßens in die Bodenmaſſe wegen vorn an der Schneide erſt flach ein und verſtärkt ſich gegen den Stiel hin. Bei der Form Bild 1 kommt ein günſtiges Verhältnis von Länge zu Breite zuſtande. Die Form Bild 2 erreicht ſchon eine Länge, die in ſchwacher Hand eine gewiſſe Unſicherheit, ein ſeitliches Kippen auslöſt. Sie bedarf kräftiger Führung. Schwache Arme können mit ihr nur leichte Stoffe, wie Torfmull, trockene Lauberde laden. Die Wichtigkeit der leichten Hochbiegung der Schaufelkanten tritt beſonders hervor bei lockerem, nicht zuſammenklebendem Ladegut und beim Hochführen der Maſſe auf Wagen. Von der kleinen Brettſchaufel Bild 3 fällt noch allerhand herunter, ſobald ſie aus dem Haufen herausgehoben und ſobald die wagerechte Stellung verlaſſen wird.

Während beim Spaten die eigentliche Arbeitsfläche, das Spaten-Blatt, faſt genau in der Stielachſe liegt und wir mit ihr in dieſer Richtung in die Erde ſtechen, muß die Schaufelfläche um wagerecht — etwa rechtwinklig zur Menſchenachſe — unter die Ladung geſchoben werden zu können, einen anderen Winkel zum Stiel erhalten als das Spatenblatt. Die Schaufel muß gut in der Hand liegen. Wir prüfen die Lage, indem wir den Stiel am Ende faſſen und den Arm ſenkrecht herabhängen Bild 5. Ruht dann das Schaufelblatt glatt auf der Erde auf, ſo liegt die Schaufel gut. Bei kurzſtieligen Schaufeln kann das nicht zutreffen; auch nicht bei der unter 1 abgebildeten. Dieſe Form beſitzt überhaupt keine Allgemeingültigkeit; ihr kurzer Stiel, der geringe Neigungswinkel des Blattes zum Stiel fordern ein ſtärkeres Vorneigen des Körpers. Aber durch den kurzen Stiel hat man die Laſt mehr in der Gewalt; man kann mehr laden.

Die Brettſchaufel (Bild 3) hat die meiſte Verbreitung in Deutſchland. Sie beſteht aus ſtarkem Eiſenblech. Ihr Vorzug iſt ihre Einfachheit. Ihre Leiſtungsfähigkeit ſchätze ich nicht hoch ein. Verbeſſerungen wären erwünſcht.

HERBERT GRAF SCHAFFGOTSCH / TIEFLANDKULTUR DER ALPENPFLANZEN II

AUCH das intenſive Sonnenlicht, welches einerſeits die feuchte Wärme des Erdbodens und andererſeits die leuchtende Farbenpracht der Alpinenflora bedingt, fehlt im Tiefland. Man kann den Bergpflanzen wohl einen ihnen entſprechenden örtlichen Standort, ein homogenes Erdreich geben, nicht aber jene klimatiſchen Bedingungen für ihr Wohlbefinden bieten, die ſie in ihrer Bergheimat gewohnt ſind.

Die Lichtfülle, die kalten Nächte laſſen ſich natürlich in keiner Weiſe wiedergeben, wohl aber kann man den auf Geröllhalden wachſenden Pflanzen die Bodenfeuchtigkeit durch Anlage künſtlich feucht gehaltener »Moränen«, durch Anpflanzung an künſtlichen »Quellen« teilweiſe erſetzen. Dr. Fritz Lemperg hat die Anlage einer ſolchen Moräne in ſehr zweckmäßiger Ausführung beſchrieben; ich habe mir eine ſolche einfacher konſtruiert und richtete eine ſolch künſtliche Quelle ſo ein, daß das Waſſer ſich nur zum geringen Teil in ein Rinnſal ergießt, während der weit größere Teil unterirdiſch in ein Gemenge von Erdreich und Steinen, wie in beſagtem Aufſatz beſchrieben, abfließt und verſickert. Daß auch damit der Zweck: Feuchtigkeit von unten zu ermöglichen, ſo gut wie möglich erreicht erſcheint, beweiſt der Umſtand, daß der neben der Moräne befindliche Gehſteig in deren Ausdehnung immer naß iſt, ſo daß alſo das Waſſer dieſen Teil der Anlage durchſickert. Ich habe in dieſer »Moräne« ſpeziell die ſchwerer zu kultivierenden Schiefergebirgspflanzen angeſetzt und den Erfolg erzielt, daß ſie im allgemeinen ſehr freudig und üppig gediehen, aber — nun kommt der Pferdefuß — richtig und reichlich geblüht haben ſie nur im erſten Jahre, wo ſie noch die Blütenkeime aus ihrer Heimat in ſich hatten; das darauffolgende Jahr blühten ſie aber ſchon nur noch ſehr ſpärlich oder gar nicht mehr. Einige Arten ſind ſpäter überhaupt ganz verſchwunden, und ich bin überzeugt, daß eine Anzahl von Alpenpflanzen in der Tieflandkultur überhaupt auf die Dauer nicht fortzubringen und über lang oder richtiger zumeiſt kurz Todeskanditaten ſind. Ganz abgeſehen von vielen, die die Gletſchermoräne bevölkern und dem entzückenden vielbeſprochenen Eritrichium nanum, gehören nach meiner Erfahrung zu obigen der ſchöne Ranunculus glacialis, Androsace glacialis, Doronicum glaciale, Senecio incanus und carniolicus, Phyteuma orbiculare, Primula glutinosa, Cerastium uniflorum und wohl noch andere. Ich habe beiſpielsweiſe von Doronicum glaciale und von Senecio carniolicus Pflanzen jeder Größe mit ganz intaktem Erdballen, ſo daß auch keine einzige Faſerwurzel verletzt geweſen war, mit nach Hauſe gebracht, ſie auf einen ganz ähnlichen Platz, wie den der Fundſtelle gepflanzt, und desungeachtet wurden die Pflanzen immer weniger und gingen nach einigen Jahren ganz ein.

Es mag vielleicht ſein, daß ſolche Pflanzen aus Samen gezogen, ſich an die neue Situation beſſer akklimatiſieren und dann weniger ſchwierig fortzubringen ſind, ich ſelbſt hatte aber leider noch keine Gelegenheit, diesbezügliche Verſuche anzuſtellen, und habe daher auch keine Erfahrung darin geſammelt. Andererſeits beobachtete ich auf der Anlage Pflanzen, die ſeit einem Dezennium und mehr freudig gedeihen, die aber gar nicht oder nur ganz ſpärlich in Blüte kommen. Solche ſind unter andern Geum reptans, Potentilla nitida, Potentilla Clusiana und Primula Clusiana. Die beiden letzteren ſtammen aus unſeren nahen heimatlichen Kalkalpen, ſodaß man annehmen ſollte, daß ſie die klimatiſchen Unterſchiede weniger empfinden würden.

Im Allgemeinen habe ich die Erfahrung gemacht, daß Felſenpflanzen, wie ſolche, welche die Schutzhalden bevölkern, leichter in der Tieflandkultur gedeihen, als diejenigen, welche in der Umgebung des Gletſchers, alſo in der vom kalten Gletſcherwaſſer überſickerten Moräne oder auch anſonſten an feuchten Plätzen wachſen. Aber auch Erſteren muß man, wie ſchon erwähnt, eine entſprechende Erdſchicht beigeben, welche ihnen nach Tunlichkeit Erſatz für die hier fehlende heimatliche Feuchtigkeit gibt. Man ſoll ſich nicht verleiten laſſen, eine Pflanze, die man auf ſteiniger Erde trifft oder in Felſenritzen alſo auf ſcheinbar ſehr dürrem Standort ausgegraben hat — ähnlich ſteril zu pflanzen, denn bekanntlich verfügte ſie auch auf einen derartig exponiertem Standorte immer über genügende Feuchtigkeit.

Nur allzu oft beſteht das Gerippe eines künſtlich angelegten Alpinumhügels (in der Abſicht, das Felſengebirge möglichſt getreu nachzuahmen und recht durchläſſigen Untergrund zu ſchaffen) bloß aus Grobſteinen, deren Zwiſchenräume wieder nur mit kleineren Steinen und Ziegelſchutt ausgefüllt ſind, die oberſte Schicht aber iſt auch nur ein Steingerölle mit verſchwindend wenig Erde, worauf dann die freiliegenden Steine maleriſch placiert ſind. Wie ſollen nun in einem durch und durch ſo ſterilen Gebilde, das im Sommer von der Sonne geradezu ausgedörrt wird, und auf dem die Niederſchläge reſtlos ablaufen und verſickern, Pflanzenweſen Nahrung und Gedeihen finden, welche an eine ſo ausgiebige Feuchtigkeit, wie es bei den Alpinen der Fall iſt, gewohnt ſind!

In ſolch ſterilem Boden ſollen nun Pflanzen vom März bis in den Oktober hinein vegetieren, die ganz andere Lebensbedingungen beſaßen.

Allerdings ſind die Alpenpflanzen zum größten Teile Frühlingsblüher, ruhen daher wie unſere heimatlichen Frühlingspflanzen den Sommer über, nichtsdeſtoweniger darf nicht vergeſſen werden, daß ſie in ihrer Bergheimat all ihre Aufgaben binnen wenigen Monaten zu erfüllen haben, im Tieflande aber ſieben bis acht Monate nicht zur Ruhe kommen. Der Beweggrund, weshalb die meiſten Alpinen im Frühling, der in den Bergen je nach Höhenlage weſentlich ſpäter als bei uns eintritt, blühen, iſt wohl darin zu ſuchen — weil ſie ſich in Anbetracht ihrer dort kurzen Vegetationsdauer beeilen müſſen, um ihren Samen zur Reife zu bringen, wollen ſie nicht Gefahr laufen, über kurz oder lang auszuſterben. Dieſem Umſtande iſt es wohl auch zuzuſchreiben, daß die meiſten Alpenpflanzen ausdauernd ſind. Annuelle hätten in der kurzen Vegetationsperiode nicht die Zeit, ihren Aufgaben bis zur Samenreife nachzukommen.

Eine Eigenſchaft, welche die Alpenflora in der Tieflandkultur zum großen Teil beibehält, iſt der zwergige gedrungene Wuchs, wie ihn die polſterbildenden Pflanzen und die kriechenden Laubgehölze (Zwergweiden, Rhamnus pumila) aufweiſen, trotzdem ſie es hier nicht nötig haben, ſich an den wärmenden Erdboden, wie in ihrer Heimat, anzuſchmiegen, durch welchen Umſtand in erſter Linie dieſer flache Wuchs bedingt ſein ſoll. Ich glaube aber, daß auch der langanhaltende Schneedruck und die gewaltigen Stürme ihr Teil dazu beitragen.

Am erſtaunlichſten iſt dieſe ataviſtiſche Erſcheinung bei den zwergigen Laubgehölzen, bei denen man vermuten würde, daß ſie ſich im Tiefland ähnlich ausbreiten und auswachſen würden, wie dies beiſpielsweiſe bei der Bergkiefer der Fall iſt, die ſich bei uns aus einer Pinus montana in eine baumartige Form umwandelt. Ich beſitze Zwergweiden, wie Salix reticulata, Jacquinii, serpyllifolia, die ſeit nahezu 25 Jahren nicht höher und nur in die Breite gewachſen ſind.

Zur größten Befriedigung gereicht es mir, zu beobachten, daß meine Pfleglinge ſoweit auf der Anlage heimiſch geworden ſind, daß ſie ſich dort ſelbſt ausſäen. Es iſt dies vor allem bei Papaver alpinum, mehreren nicht ſchwierigen Androsace-, Iberis-, Dianthus-, Hieracium-, Viola-Formen der Fall. Auch Ramondia pyrenaica hat ſich ſehr reichlich auf der Anlage ausgeſät, immer aber nur an ſchattigen Plätzen, nicht in Ritzen zwiſchen Geſtein, ſondern direkt auf Steinen, auch ſolchen, welche unter Alpenroſenbüſchen liegen und von dieſen beſchattet ſind. Die Selbſtausſaat erbringt mir immer den Beweis, daß ſich die betreffenden Pflanzen auch in den geänderten Verhältniſſen wohl fühlen, es mir alſo gelungen iſt, ihnen die Lebensbedingungen, welche ſie auf ihrem natürlichen Standort beſaßen, möglichſt wiedergegeben zu haben. Dies ſoll doch die größte Sorge des Kultivateurs ſein, eine Aufgabe, die nicht ſo einfach, ohne Liebe zur Pflanze und Eingehen in deren Weſen aber überhaupt nicht zu erfüllen iſt.

Den Lebensgewohnheiten der Alpenpflanzen entſprechend ſollte man trachten, deren Vegetationsperiode tunlichſt kurz zu geſtalten. Im Frühling läßt ſich dies dadurch bewirken, daß ſie möglichſt lange unter der Decke künſtlich aufgehäuften Schnees in Ruhe verbleiben. Dazu ſollte die Anlage nach Eintritt des Froſtes ſo hoch wie möglich mit Schnee zugeſchaufelt werden. Leider iſt dies nur bei kleinen Anlagen durchführbar, bei größeren ergeben ſich techniſche Schwierigkeiten, und vor allem fehlt es bei uns zumeiſt an der entſprechenden Schneemenge. Das Zudecken mit Tannenreiſig erfüllt nicht die Aufgabe der Schneedecke, ſondern hat wenig andern Zweck, als das allzutiefe Eindringen des Froſtes und damit ein Ausheben der Pflanzen zu verhindern. Im Herbſt hingegen muß man Sorge tragen, daß die Alpinen bei andauernd warmer Witterung nicht von neuem austreiben, was eine Schwächung des einzelnen Individuums zur Folge hätte, aber nur dadurch verhindert werden kann, daß man dann die Bewäſſerung ſehr reduziert oder ganz einſtellt. Um ſo ausgiebiger muß die Bewäſſerung im Frühling nach der Schneeſchmelze ſein. Man begieße aber nicht nur die Pflanzen, ſondern auch deren Umgebung, die Steine, die durch die Anlage führenden Wege, um durch Verdunſtung des Waſſers Luftfeuchtigkeit zu erzeugen. Ich habe in meinem Alpinum mehrere kleine Baſſins angelegt, die den gleichen Zweck haben und auch ein paar Waſſerleitungs-»Quellen« entſpringen auf der Anlage, um Rinnſale zu ſchaffen.

Die intenſive Lichtbeſtrahlung in der Bergheimat läßt ſich in Wirklichkeit natürlich nicht wiedergeben. Mit Rückſicht darauf wähle man aber für die Anlage einen freien, ſonnigen Platz. Die Reinhaltung der Anlage gehört mit zu den wichtigſten Verrichtungen im Alpinum, ſie muß wiederholt und ſubtil durchgeführt werden, damit nicht Unkräuter und minderwertige Pflanzen die koſtbaren überwuchern. Die Arbeit muß von kundiger Hand geſchehen, damit wirklich nur Unkräuter und keine ſelbſt ausgeſäten Sämlinge ausgejätet werden.

An feuchten Plätzen, alſo auch auf der Moräne, bedeuten die ſich dort mit Vorliebe bildenden und raſch verbreitenden Lebermooſe einen großen Übelſtand, dem man immer wieder mit erhöhter Aufmerkſamkeit begegnen muß. Es iſt nun ſchließlich noch des Winterſchutzes zu gedenken, deſſen ich ſchon früher erwähnte und über den ich noch bemerken will, daß nur trockene Schutzmittel, nie aber Laub, welches in Fäulnis übergehen könnte, verwendet werden dürfen.

Aber auch kein Fichtenreiſig ſoll genommen werden, weil es im Verlauf des Winters die Nadeln verliert, ſein Zweck alſo illuſoriſch wäre. Ich decke überhaupt erſt dann, wenn ſtarker Froſt ohne Schneefall zu gewärtigen iſt, hauptſächlich die im ablaufenden Jahre friſch geſetzten Pflanzen. Während ich dies ſchreibe, ſchneit es draußen, ſo ſehr zuwider mir im allgemeinen der Winter iſt, ſo iſt mir die ſich eben bildende Schneedecke für meine Pfleglinge ſehr willkommen, für die ſie nicht nur eine Reminiscenz an ihre Bergheimat, ſondern eine Notwendigkeit für ihr Wohlbefinden bedeutet. Mögen ſie möglichſt lange darunter ruhen, bis die rechte warme Frühjahrsſonne, nach der ſich jedes Lebeweſen und insbeſondere der Gärtner ſehnt, ſie zu neuem, freudigem Leben erwecken wird.

DAS VERPFLANZEN GRÖSSERER KAKTEEN

IN den großen Gartenanlagen des Beſitzes von Henry E. Huntington in San Marino, Kalifornien, befindet ſich auch ein großer Wüſtengarten, in dem Kakteen und andere Wüſtenbewohner ſo gezeigt werden, wie ſie in der Heimat, beiſpielsweiſe in Arizona, auftreten. Um dieſe Anlage zu ſchaffen, mußte ihr Schöpfer, *William Hertrich*, ſolche Stücke, wie wir ſie heute im Bilde zeigen können, aus der Heimat ſelbſt holen. Er ſendet uns nun folgende Mitteilungen über die Art, wie er dabei zu Werke ging.

»An einigen Lokalitäten iſt es ziemlich ſchwierig, Kakteen für den Verſand vorzubereiten, beſonders dort, wo im Boden Sand- und Felsgeſtein vorherrſcht, was ja gerade an Standorten von Kakteen ſehr oft der Fall iſt. Man gräbt zunächſt einen Graben um die Pflanze und bringt

Das obere linke Bild zeigt Cephalocereus polylophus verpflanzfertig. Dahinter ſteht ein Pachycereus marginatus. Das rechte Bild zeigt eine im Juli 1925 verſetzte große Pflanze dieſer Art in rechter Weiſe befeſtigt. Auf dem Mittelbild iſt Cereus hexagonis transportfertig und unten ſind ſechs ſchöne Echinocactus Grusonii.
Bilder Hertrich.

die Wände der Kiſte in richtiger Weiſe an und nagelt ſie ſorglich zuſammen. In die Ecken der Kiſte kommen aufrechte Streben, die hoch genug ſein müſſen, um die Pflanze gut zu befeſtigen und in der richtigen Lage zu halten. Alle Teile dieſer Streben, die in Berührung mit der Pflanze kommen, müſſen mit Lappen oder ähnlichem Material umwickelt werden, um Verletzungen zu vermeiden. Die Anzahl der Streben richtet ſich nach der Größe und Geſtalt der zu verſetzenden Pflanze, meiſt ſind vier bis acht nötig. In lockerem Sandboden iſt es zuweilen ratſam, die Pflanze vor dem Umgraben zu ſtützen, damit ſie nicht überkippt, wenn die Wurzeln abgeſtochen werden.
Nachdem man die Seitenwände der Kiſte feſt um den Erdballen gelegt hat, wird eine Seite ſoweit unterminiert, daß man ein Brett auf den Boden legen kann. Dies nagelt man dann feſt und deckt auch den Zwiſchenraum zwiſchen dieſem Brett und dem Rande ab, worauf man auf der entgegengeſetzten Seite die Operation wiederholt. Dann kann man die Pflanze einſeitig umlegen und den Bretterboden vollſtändig einſetzen. In ſandigem Boden muß man allerdings den ganzen Boden unterlegen, ehe man die Pflanze überkippt.
Das Heben der Pflanze bis zur Erdoberfläche erfolgt dann, indem man die Pflanze einſeitig kippt und unter der Kiſte fußhoch Boden auffüllt, dann dies von der anderen Seite wiederholt und fortſetzt, bis man auf der Oberfläche iſt, ſodaß man aufladen kann. Hat man genügend Raum und ſtehen keine anderen Pflanzen in der Nähe, ſo ſchrägt man den Graben bis zum Boden der Kiſte ab und rollt die Pflanze auf dieſer Schräge auf Rollen und Planken aus dem Loche. Für ſchwere Pflanzen iſt ein Flaſchenzug oder Krahn mit Vorteil zu benutzen, ebenſo, wenn die Pflanzen oben ſchwerer als unten ſind.
Sollen die Pflanzen nur eine kurze Strecke weit transportiert werden, ſo iſt es am beſten, dies in aufrechter Haltung zu tun, um Verletzungen zu vermeiden. Bei weiten Entfernungen und bei großen verzweigten Stücken muß ein reicheres ſorgfältiges Binden erfolgen. Die beigegebenen Bilder veranſchaulichen das beſſer, als viele Worte es könnten.
Nach dem Verpflanzen ſollte man kein Waſſer an die Wurzel der Pflanze bringen, doch muß der Boden genügend feucht ſein, um die Pflanze vor Welken zu ſchützen. Wenn bei großen Stücken dicke Wurzeln durchgehauen oder verletzt werden mußten, ſo glätte man dieſe am Ende mit einer feinen Säge oder einem ſcharfem Meſſer und verſiegele die Schnittfläche, was leicht mit einer kleinen Windkerze geſchehen kann.
Ferner muß man nach dem Verſetzen die Pflanzen genügend mit Stangen ſtützen, um ſie aufrecht zu halten. Hierzu kann man auch manchmal Drahtſeile benutzen. Dann muß man dieſe aber, dort, wo ſie ſich um die Pflanze legen, durch ein Stück Gummiſchlauch ziehen, damit ſie nicht in die fleiſchigen Teile einſchneiden.
Die meiſten Kakteen ſind nicht ſehr anſpruchsvoll in Bezug auf den Boden, ſolange reichliche Drainage vorhanden iſt, die ein unbedingtes Bedürfnis für erfolgreiche Kultur darſtellt. Für beſtimmte Arten muß man jedoch die Art des Bodens genau kennen, die ſie brauchen, um ihre typiſche Färbung und Stachellänge zu

erreichen. Manchmal kann zu nahrhafter Boden oder zu ſandiger den Charakter der Stacheln völlig verändern.
Derartige rieſige Stücke, wie ſie der Verfaſſer in Kalifornien verwenden konnte, ſind in unſerem Klima ſelbſt in großen Gewächshäuſern nur ganz vereinzelt, wenn überhaupt anzutreffen. Bilder aus den großen Anlagen, die wir veröffentlichen werden, zeigen nicht nur den Erfolg, den Hertrich mit dieſen ſchwierigen Verpflanzungen hatte, ſondern geben auch eine Vorſtellung davon, wie großzügig dort gearbeitet werden kann. *C. S.*

Bepflanzungspläne

Eine Staudenrabatte

Keine Aufgabe wird Gartengeſtaltern ſo häufig geſtellt wie die Zuſammenſtellung und Pflanzung einer ſehr langen, möglichſt den ganzen Sommer hindurch blühenden Staudenrabatte.

100 50 0 100 200 300 cm

Bepflanzung

Die in Klammer ſtehenden Ziffern geben die Stückzahl der Sorten an.

1. Iberis ſempervirens Weißer Zwerg (8).
2. Aubrietia (42), einheitlich oder je 6 in den Sorten: a. Dr. Mules, b. Fire King, c. Lavender, d. Moerheimi, e. tauricola, f. Aubrey Prichard, g. Dr. Mules.
3. Potentilla hybrida Scarlet Pearl oder nepalenſis Miß Willmott (22).
4. Iris pumila cyanea (42), je 3 an 14 Plätzen.
5. Campanula carpartica alba oder C. Portenſchlagiana alba (7).
6. Dicentra ſpectabilis (6).
7. Iris germanica Purple King (18), je 3 an 6 Plätzen.
8. Iris florentina (15), je 3 an 5 Plätzen.
9. Iris interregna Helge (15), abwechſelnd mit Frithjof (10), je 5 an 5 Plätzen.
10. Iris germanica Mme. Chereau (15), abwechſelnd mit Ilſan (10), je 5 an 5 Plätzen.
11. Chryſanthemum indicum Princeſs Juliana (15), je 3 an 5 Plätzen.
12. Aſter Amellus Oktoberkind (15), je 5 an 3 Plätzen.
13. Aſter caſſubicus grandiflorus (15), je 5 an 3 Plätzen.
14. Crocus ſpecioſus Aitchiſoni (30), je 10 auf 3 Plätzen.
15. Gladiolen (150), je 15 an 10 Plätzen.
16. Frühe Tulpen (150) und Darwintulpen (150), je 15 an 10 Plätzen, ſodaß die frühen vorn, die Darwintulpen dahinter ſtehen, von den frühen beiſpielsweiſe folgende Sorten: a. Artus, b. gelber Prinz, c. La Reine, d. La Précieuse, e. Artus, f. gelber Prinz, g. La Reine, h. La Précieuse, i. Artus, k. gelber Prinz.
17. Phlox paniculata-Gruppen, und zwar wie folgt zuſammengepflanzt (ſiehe Text), doch kann man ſich auch auf weniger Sorten beſchränken, je 7 Pflanzen in einer Gruppe: a. Eliſabeth Campbell, Antonin Mercier, Frau Ant. Buchner, General van Heutsz, Sommerkleid, Widar, Wiking, b. Deutſchland, Hindenburg, Fräulein von Laßberg, Europa, Loki, Hans Vollmöller, Septemberglut, c. Dr. Königshöfer, Wanadis, Firmament, Sommerkleid, Sieger, Wiking, Marguerite Bouchon, d. Imperator, U-Deutſchland, Eliſabeth Cambell, Europa, General van Heutsz, Wiking, Hans Vollmöller, e. Württembergia, Lord Raleigh, Sommerkleid, General van Heutsz, Wiking, Septemberglut, Marguerite, Bouchon.
18. Delphinium cultorum, 4 Plätze mit je 3 Pflanzen in den Sorten Arnold Böcklin, Capri und Moerheimi.
19. Dahlien (18), 6 Plätze mit je 3 Stück und zwar in den Sorten Lola (je 1) und Nebeltau (je 2).
20. Lupinus polyphyllus albus (5), je 1 an 5 Plätzen.
21. Leucanthemum (Pyrethrum) uliginoſum, Oktober-Marguerite, (5), je 1 an 5 Plätzen.
22. Althaea ficifolia (9), je 1 an 9 Plätzen.
23. Papaver orientale (5), je 1 an 5 Plätzen.
24. Delphinium cultorum (5), je 1 an 5 Plätzen in den Sorten: a. King of Delphinums, b. Corry, c. Wilhelm Storr, d. Lamartine, e. Donau.
25. Boltonia latiſquama (5), je 1 an 5 Plätzen.
26. Rudbeckia nitida Herbſtſonne (4), je 1 an 4 Plätzen.

IM April blühen zuerſt in einfacher regelmäßiger Anordnung blaue Scilla-Trupps, aus denen Trompetennarziſſen der beſten aller bisherigen Sorten Titan hervorwachſen. Nach Mitte April beginnt die Einfaſſung von Iberis und Aubrietien und dahinter ſchwarzblauen Zwergſchwertlilien Farbe zu zeigen, während im Beet rote, weiße und gelbe Tulpen in rhythmiſchen Trupps in Blüte ſtehen. Anfangs Mai kommt der Flor der großen Schwertlilien dazu, und zwar abwechſelnd in hellblau und gelb und ſchwarzblau und weiß. Zu gleicher Zeit ſind die Frühtulpen erblüht, und Darwin-Tulpen gleich dahinter, in zehn verſchiedenen Farben, ſind in gleiche Höhe heraufgewachſen wie die Iris, deren Flor ſich durch ſpäte Sorten fortſetzt, bis auf der Rückſeite des Beetes gegen Ende des Monates die Rieſenmohne erblühen und ein Zug Lupinen durch die Mitte des Beetes geht, ob man weiße, blaue oder roſa Lupinen, mohnroten, weißen, karminfarbenen oder knallroten Mohn wählt, iſt Geſchmacks- und Erfahrungsſache.
Inzwiſchen ſind die frühen Ritterſporne ziemlich hoch geworden und zwar Capri in Hellblau, Hochheim in Weiß. Bald beginnt durch das Zuſammentreffen der früheſten großen Sommerphloxe mit den verklingenden frühen und noch blühenden ſpäten Ritterſpornen eine der ſtärkſten Farbenzeiten der Rabatte. In den Phloxtrupps ſind die eigentlichen Juliſorten luftdicht durcheinander geſtellt mit den Auguſtblühern, dieſe werden in ihren Wirkungen durch den einſetzenden Dahlienflor geſtützt. Man muß in ſolcher Phloxreihe ſehr auf die Einpaſſung der Dahlienfarben achten und möglichſt milde Rots den brandigen Rots vorziehen, oder die Phloxfarben nach den Dahlien richten. Bald beginnen nun die großen gelben Sonnenhutſtauden wirkſam zu werden. Man kann blaue Winden in ſie hineinranken laſſen.
Nach dem Verblühen der ſo lange vorherrſchenden Ritterſporne wird der Flor hoher ſpitzer Blumengeſtalten ſchon Ende Juli von einer Reihe ſibiriſcher Dauermalven übernommen. Im Vordergrunde der Rabatte blühen jetzt die roten Potentilla Scarlet Pearl mit weißen Campanula carpatica im Saum. Ihr Flor erſtreckt ſich über zehn Wochen. Im September tritt hinten im Beet der Flor der hohen weißen Boltonien hinzu, während vorne ein Saum der niedrigen Aſter caſſabicus grandiflorus in Flor ſteht. Im vorderſten Drittel der Rabatte iſt zwanglos Raum gelaſſen für Gruppen früher und ſpäter Gladiolen, die Auguſt und September mit Farben erfüllen. Im September blühen auch die Ritterſporne wiederum weiter und die Triebe der Phloxe, beſonders der Auguſtſorten, die man zu dieſem Zweck Mitte Juli ein wenig einſtutzt, bringen jetzt einen ſehr wirkſamen Nachflor. Im Oktober ſtehen hinten im Beet die mannshohen Oktobermargueriten in Flor, während vorne ein Saum der Aſter Oktoberkind entlang zieht, und zwar in 60 Centimeter hohen, dunkellila Büſchen. Zwiſchen den Aſtern iſt noch Platz für Oktober-Chryſanthemen wie Prinzeß Juliana, Normandie, Canaria, Goldperle oder für Crocus ſpecioſus Aitchiſoni, den ſpäteſten und wohl edelſten aller unverwüſtlichen Herbſtkrokus. *K. F*

Aus der Werkstatt der Pflanzenzüchter

Rosenstudien

WELCHE Rosen sollen wir zur Zucht heranziehen und kreuzen, welche Mütter (Samenträger) sollen wir auswählen, welche Vaterrosen (Pollenliefernde) sind zu benützen? Das sind Fragen, die sich jetzt dem Züchter mehr aufdrängen als in früheren Jahren, wo es jährlich noch keine Flut von Rosenneuheiten gab. Wir sind in eine rechte Wirrnis geraten, es gibt keine reinen Teehybriden, keine reinen Lutea-Hybriden mehr. Auch Polyantha-Mischungen gibt es jetzt schon reichlich. Nur die Moosrosen haben Stand gehalten und sich mit keinem Freier eingelassen, und doch hätte man so gerne reichremontierende Moosrosen, auch Mooskletterrosen wären recht willkommen. Nun, die Zukunft wird ja noch so manches bringen, wie die Zeit uns gelehrt hat. Wer hätte geglaubt, daß von einer Persian Yellow eine so wertvolle Klasse erstehen würde, wie ihre Sämlinge in dritter und vierter Generation zeigen! Die Persian Yellow ist allerdings steril, nur ihr Pollen war zu benützen, der aber auch sehr unzuverlässig und nur zu etwa vier bis sechs Prozent zeugungsfähig ist. Die reinen Lutea-Hybriden sind meist schon wieder zur Seite gestellt, weil sie sehr an Asteroma, Blattfallkrankheit und anderen Untugenden leiden. Die neueren Sorten mit Lutea-Blut sind gesünder, weil sie in zweiter und dritter Folge mit widerstandsfähigeren Sorten vermischt wurden. R. lutea (R. foetida), R. sulphurea und R. persica (R. simplicifolia) sind die einzigen, bisher züchterisch erprobten Wildarten, die die gelbe Farbe ihr Eigen nennen. Bei andern gelben Rosen, die kein Blut von den hier angeführten Arten besitzen, ist gelb nur Nebenfarbe, zur Vererbung wohl tauglich, aber nicht verläßlich. Sie enthalten kein Alkali in ihrem Blumenaufbau, wie die oben angeführten drei Arten. Rosen, die kein Alkali besitzen und von jeder Säure frei sind, blühen weiß. Bei Gartenrosen kann man sich nicht an das Mendelsche Gesetz halten. Es gilt nur für durchgezüchtete Sorten oder Arten, die samenecht fallen. Unsere jetzigen Rosen sind kaum mehr zu unterscheiden, und es ist schwer zu bestimmen, welches Blut sie besitzen. Wenn sie in eine Klasse eingereiht werden, so ist nur der Habitus maßgebend. Zur Zeit, als Bennett mit seinen Teehybriden hervortrat, verstand man unter einer Teehybride eine Kreuzung, bei der die Remontantrose Samenträgerin war, befruchtet mit den Pollen der Teerose, so meinte es auch Geschwind. Neuerdings regt sich wieder Sehnsucht nach unseren alten Remontantrosen, man kann den herrlichen Duft und die wunderbare Knospenbildung nicht vergessen, vielleicht ist es schon zu spät! Von den neueren Rosen haben wohl auch viele wunderbaren Duft, doch manche eitel wenig. Daß zur Zucht immer nur hochkultivierte Klassen herangezogen werden, ist ja richtig, aber eigentlich sind wir doch allein in der Farbengebung und Reichblütigkeit weit vorwärts gekommen, in der Widerstandsfähigkeit gegen Krankheiten und Frostempfindlichkeit leider nicht. Darum möchten wir zu recht widerstandsfähigem Zuchtmaterial zurückgreifen, beispielsweise auf die Rugosa-Formen, auch die Lord Pencanceschen Hybriden wären zu probieren und verschiedene Wildrosenarten, wie es schon Forstmeister Rudolf Geschwind versucht hat. Auch die reichblühende und ziemlich widerstandsfähige Klasse der Polyantha könnte zur Kreuzung mit unseren starkwachsenden Gartenrosen herangezogen werden, ich verweise hier nur auf Gruß an Aachen, die heute noch eine vielbegehrte herrliche Rose ist. Daß man härtere Rosen als Samenträger wählt, um den Sämlingen höhere Widerstandskraft zu verleihen, sollte nicht außer Acht gelassen werden, um unsere Sortimente nicht zu verweichlichen.

Lange Jahre hindurch habe ich mich mit Rugosa-Kreuzungen befaßt, nur um das eine Ziel zu erreichen, eine gelbblühende Rugosa-Hybride zu erzielen. Zu guter Letzt ist es mir doch gelungen, einen recht schönen Anfang damit zu machen. Ich besitze einen Sämling, dessen Knospen tief orangegelb sind, im Aufblühen geht die Farbe in ein seidenartiges Rosa über, die Knospen sind lang und spitz, die Blume ist sehr groß und dicht gefüllt, geht bei jeder Witterung leicht auf und blüht bis zu allerletzt im Jahre, dabei ist die Sorte sehr hart, ich decke sie nie. Das Allerwertvollste ist noch ein Centifolienduft, wie ihn bis jetzt keine andere Rose aufweisen kann. In den Preislisten wird sie als die wohlriechendste Rose bezeichnet, sie heißt »Türkes Rugosa-Sämling« und stammt von Conrad Ferd. Meyer × Mrs. Aaron Ward. Sie wird die Stammutter gelber Rugosa-Hybriden werden, von ihr besitze ich eine Anzahl befruchteter Sämlinge, ebenso auch Kreuzbefruchtungen, die teilweise vielversprechend sind. *Robert Türke*

Vom Werkstoff des Gartens

Anbau von Primelsamen

DIE Dauer der Keimfähigkeit ist für alle Pflanzensamen eine begrenzte. Die Tatsache spielt im gesamten gärtnerischen Samenbau eine äußerst wichtige Rolle. Freilich hängt diese Keimfähigkeitsdauer selbst bei den Samen der gleichen Pflanze von vielerlei Umständen ab, die sie oft sehr verändern können. Es beeinflußt diese Zeitdauer sehr stark, ob die Samen völlig ausgereift oder vor der Reife gesammelt wurden, ob die als Vorbeugung gegen Schimmelpilz oder Fäulnißbefall nötige Austrocknung im Schatten vorgenommen wurde, oder ob die Samen in der direkten Sonnenhitze ausgedörrt wurden, wie es des schnellen Trockenwerdens häufig geschieht. Solch Verfahren ist für die Samen nicht vorteilhaft, weil die Keimfähigkeit an einen gewissen (allerdings sehr niedrigen) Prozentsatz des Wassergehaltes gebunden ist, weshalb auch die Aufbewahrung nicht zu warm und trocken geschehen soll. Vorteilhaft gegen zu starkes Austrocknen der Samen ist ferner das Aufbewahren in den Hülsen oder Kapseln bis zum Anbau, bei fleischigen Hüllen erreicht man dies durch Stratifizieren in feuchtem Sand.

Zu den Stauden, deren Samen am besten bald nach der Ernte angebaut werden, gehören unter anderen die Primeln. Sobald die Kapseln aufzuspringen beginnen, werden sie gesammelt, acht bis vierzehn Tage an der frischen trockenen Luft im Schatten nachgereift, bis die Samen ausfallen. Diese werden dann gleich angebaut und bis zur Keimung im Dunkeln feucht gehalten. Samen von Primula rosea grandiflora, P. denticulata, P. cashmeriana Rubin, die Anfang Juni dieses Jahres gesammelt und am 17. Juni angebaut wurden, keimten offen, unter Sphagnumbedeckung liegend, schon mit hundertprozentiger Keimfähigkeit im Kalthaus. Anfangs Juli verschalt und in einem Mistbeetkasten zunächst unter Glas aufgestellt, dann ohne Bedeckung aber halbschattig und immer ziemlich feucht gehalten, waren die Pflänzchen bereits Anfang August eintopfungsfähig und wachsen bei halbwegs günstiger Witterung bis zum Herbst zu verkaufsfähigen Pflanzen heran, die im Mistbeetkasten geschützt überwintert, schon im nächsten Frühjahr blühbare Pflanzen geben, sodaß auf diese Weise, abgesehen von dem günstigen Prozentsatz der gekeimten Pflänzchen, ein ganzes Jahr gewonnen ist. Für die übrigen Primeln gilt ähnliches. Primula luteola, Mitte Juli gesammelt, Anfang August angebaut, keimten in der ersten Augustwoche ebenfalls schon nach knapp einer Woche. Es folgten nun im Anbau P. pulverulenta, P. japonica und eine Reihe anderer, meist feuchte Standorte liebender Primeln, wie secundiflora, sikkimonensis involucrata. Den Abschluß bildeten die erste Ende August reifenden P. Bulleyana, P. Beesiana, P. Bullesiana. *W. Kriechbaum*

Kunstdünger für Alpenrosen und Koniferen

ES dürfte nicht allgemein bekannt sein, daß Alpenrosen und andere immergrüne Gehölze für Kunstdüngergaben in der Vegetationsperiode außerordentlich dankbar sind, freudig wachsen und Winterkälte besser ertragen, als unterernährte magere Exemplare. Vorausgesetzt, daß die drei Grundbedingungen für das Gedeihen fast aller Rhododendren: feuchter Standort, Schutz gegen scharfe Winterstürme und gegen Wintersonne bei der Verwendung berücksichtigt sind, können gut eingewurzelte Pflanzen von Rhodendron und Koniferen wie folgt gedüngt werden. Im Winter auf weichen Schnee oder weiches Land, als Kopfdüngung je Morgen 40 Kilogramm Chlorkali 100 Kilo Kainit, im Frühjahr von April an, 60 Kilogramm schwefelsaures Ammoniak. Dieses letzte in drei Gaben, doch nicht über Ende Juni hinaus, um nicht durch übermäßige Stickstoffzufuhr ein Durchtreiben der Blütenknospen zu veranlassen. Nach oder kurz vor Regen ist die beste Zeit zur Ammoniakdüngung. Um Ätzwirkungen zu vermeiden, dürfen diese Kunstdünger nicht auf feuchtes oder betautes Blattwerk geworfen werden.

Es gibt aber noch viele andere Düngerzusammenstellungen, die ebenso wirksam sind, wenn berücksichtigt wird, daß die Dosierung immer verhältnismäßig schwach bleiben muß, um Schäden zu verhüten. *J. Anlauf*

Gartenrundschau

NEUES AUS ALLER WELT

Der Frankfurter Palmengarten

SEIT vor dem Kriege hatte ich den Palmengarten nicht wieder besucht und war nach den vielen widersprechenden Schilderungen, die man mir gegeben hatte, gespannt zu sehen, wie denn nun die Verhältnisse dort wirklich liegen würden. Ein derartiges, rein aus privaten Mitteln erhaltenes, großes Gartenetablissement mußte natürlicher Weise durch die Ungunst der Kriegs- und Nachkriegsverhältnisse ganz besonders stark leiden. So war ich denn bei meinem Besuche freudig überrascht, als sofort zu spüren war, wie hier mit froher Kraft an einem schnellen Wiederaufbau gearbeitet wird. Direktor Krauß, dem ja der Garten sehr ans Herz gewachsen ist, tut im Verein mit seinen jetzt freilich nicht mehr so zahlreichen Hilfskräften, alles was er nur kann, um zunächst die Schauhäuser wieder im vollen Flor zu zeigen. Hier scheint das schwerste schon überstanden zu sein. Überall blühte und grünte es freudig. Ist auch die Zahl der seltenen Dinge, die man sonst im Palmengarten zu sehen gewohnt war, recht viel geringer geworden, so will mich das keine große Einbuße bedünken. Das Publikum hat heute leider viel weniger Interesse an solchen, nur dem wahren Pflanzenfreunde wichtigen Sachen, es will frohe Blütenmassen, farbenerfüllte Häuser sehen. Das läßt sich auch leichter erreichen. Gewisse heute so beliebte Sondergruppen, wie die Kakteen und Sukkulenten müssen ausgebaut werden. Auch die Orchideen, deren ich vor allem von Cypripedien (Paphiopedilen) eine hübsche Sammlung sah, sollten nach und nach wieder vermehrt und durch die neuen Hybriden ergänzt werden. Da wäre es denn nötig, daß sich der doch sonst rege und reiche Frankfurter Bürgergeist etwas mehr betätigte und dem Garten mal eine Sammlung guter Neuheiten aus England stiftete. Der Palmengarten ist immer noch ein Wahrzeichen Frankfurts und verdient, daß man ihm schnell und recht auf die Beine hilft. Denn im Freien gibt es sehr viel zu tun. Da muß vor allem auch die Axt eingreifen, sonst verkommt das Alte unrettbar. Möge das die Frankfurter Bürgerschaft einsehen, ehe es wirklich zu spät ist. *C. S.*

Zwei seltene früh blühende Sträucher

EINE illustrierte Notiz in »The Garden« (no. 2826) lenkt die Aufmerksamkeit auf zwei sehr interessante Sträucher, die ihrer frühen Blüte halber wertvoll sind. Leider gehören sie zu denen, die heute unsere noch immer so armen Baumschulen nicht mehr kennen. Für ernste Gehölzliebhaber und kleine Gärten sind sie recht wohl zu empfehlen, da man sie an windgeschützten Orten in einer sonnigen Ecke und ähnlich wie Jasminum nudiflorum an der Hauswand ziehen und sich dann oft schon ab Februar an ihren eigenartigen Blüten erfreuen kann. Es sind *Sycopsis sinensis* und *Stachyurus praecox*. Die erste ist ein mit Hamamelis, der Zaubernuß, die ja in ihren reizenden Arten bei uns auch noch recht unbekannt ist, verwandter, aber immergrüner Strauch aus Mittelchina. Er hat sich im Arnold Arboretum, wie auch in Verrières bei Paris in gegen kalte Winde geschützter Lage gut gehalten und geblüht. Die Blüten sind in den Blattachseln köpfig gedrängt und besitzen keine Blumenkrone. Die gelben Staubfäden und roten Staubbeutel stechen hübsch von den rotbräunen Hüllschuppen und grünen Blättern ab. Früchte scheinen kaum zu reifen, doch ist eine Vermehrung durch Ableger und Stecklinge von angetriebenen Pflanzen möglich. Etwas schwieriger scheint die Vermehrung bei Stachyurus praecox zu sein, einem Japaner, der den wenig schönen Namen Schweifähre führt. Er gehört zu einer besonderen Familie und bedeckt sich im zeitigen Frühjahr, ehe die sommergrünen Blätter erscheinen, mit seinen hängenden rahmweißen Ähren, die sich lange halten und in windgeschützter Lage kaum unter Frost leiden. Sie riechen nicht besonders, erfreuen uns aber um diese Jahreszeit doppelt.

Deutsche Dendrologische Gesellschaft

VON dieser jetzt schon siebentausend Mitglieder zählenden Gesellschaft spiegelt sich die rührige, vorbildliche Tätigkeit ihres Leiters, Dr. *Fritz Graf von Schwerin*, recht deutlich im Jahrbuch, den *Mitteilungen der Deutschen Dendrologischen Gesellschaft* von 1925, wieder. Dies umfaßt nicht weniger als 440 Seiten und ist auch wieder mit zahlreichen Bildern ausgestattet. Aus dem reichen Inhalte seien hervorgehoben die Beiträge von: J. Mattfeld, Die in Europa und dem Mittelmeergebiet heimischen Tannen; J. A. Purpus, Freilandkakteen; H. Marzell, Die deutschen Bäume in der Volkskunde, 1. die Esche; Karl Böning, Über den inneren Bau horizontaler und geneigter Sprosse und seine Ursachen; Julius Gáyer, Der letzte Kastanien-Urwald in Ungarn; E. Küster, Beiträge zur Kenntnis der panaschierten Gehölze; F. Graf von Schwerin, Über rotblättrige Pflanzen; B. Läuterer, Eiben in Deutschland; C. Anlorge, Abies Lowiana; J. C. Uphof, Dendrologische Mitteilungen aus dem Staate Florida; G. Schönfeld, Das Taxodium unserer Braunkohlenwälder; P. Kache, Pflanzenphänologische Beobachtungen; von Thadden, Die Pflege des Einzelbaumes; J. Goerbing, Einige Fragen zur bodenkundlichen Standortslehre; Martin Kleinstück, Holz und Holzpflege bei den Japanern; und schließlich noch eine Unzahl weiterer kleiner Mitteilungen. Als angebliche Neuheit wird eine Daphne Mezereum album (!) beschrieben, doch ist die weißblühende Form dieser Daphne seit über 100 Jahren bekannt und beschrieben. Ebenso ist die hängende Pinus ponderosa längst als var. pendula festgelegt. — Da den Mitgliedern der Deutschen Dendrologischen Gesellschaft in diesem Jahre noch ein Finnlandbuch geboten werden soll, so kann sie als diejenige Gesellschaft bezeichnet werden, die ihren Mitgliedern für einen kaum nennenswerten Jahresbeitrag etwas Ordentliches bietet. Möge sie noch lange von ihrem ausgezeichneten Präsidenten, der in diesem Jahre sein siebzigstes Lebensjahr vollendet und seit fünfundzwanzig Jahren die Deutsche Dendrologische Gesellschaft führt, mit gleichem Erfolge geleitet werden können.

Die Tannen Europas und des Mittelmeergebietes

NACH den Untersuchungen, die Dr. J. Mattfeld in den Mitteilungen der D. D. G. 1925 veröffentlicht, treten in Europa außer der bekannten Weißtanne noch fünf Abies-Arten auf, von denen die südspanische A. Pinsapo und die griechische A. cephalonica seit langem in unseren Gärten bekannt sind. Mattfeld unterscheidet aber noch die süditalienisch-sizilische A. nebrodensis und A. Borisii regis aus Bulgarien, Thessalien, sowie der Insel Thasos, die zwischen A. alba und A. cephalonica steht. A. Apollinis ist nur eine Form der letzten und die fragliche A. Reginae Amaliae als mit typischer cephalonica identisch anzusehen. Nordafrika hat zwei Arten, die bekannte A. numidica und A. marocana. Dann kommen auf das westliche Kleinasien A. cilicica und A. equi trojani. Im Kaukasus ist nur die allbekannte A. Nordmanniana. Schließlich wird noch die in vieler Hinsicht gut abweichende A. sibirica besprochen, die in Europa noch ganz im Osten des russischen Reiches auftritt und vom Altai bis zum pazifischen Ozean geht.

Kuckucks-Pflanzen

IN no. 2828 von »The Garden« bespricht R. E. Head einige Pflanzen, die man im Garten, besonders im Steingarten, vermeiden soll. Er urteilt dabei nach seinen Erfahrungen in einem leichten, kalkhaltigen Boden und betont, das man in anderen Böden teilweise zu anderen Schlüssen kommen kann. Nichtsdestoweniger ist es interessant zu sehen, welche Arten er als »Kuckucks-Pflanzen« anspricht. Er beginnt mit Petasites (Tussilago) fragrans. Dann folgt Campanula glomerata, die an und für sich ganz hübsch ist. Auch Senecio tanguticus mit seinen starken Ausläufern sollte auf den Wildgarten beschränkt bleiben. Thermopsis montana, eine westamerikanische Leguminose, ist ebenso wenig erwünscht, wie Polygonum cuspidatum oder gar Calystegia pubescens. Hieracium aurantiacum ist zu verbannen, ferner die so tief wurzelnde und wandernde Centaurea montana. Auch Saxifraga muscoides soll man hindern, sich in der Nähe wertvoller Alpinen anzusiedeln. Von den Acaena können inermis und microphylla in kleinen Anlagen recht lästig werden, doch noch mehr das Nesselgewächs Helxine Soleirolii, die dort, wo sie gut gedeiht, recht aufdringlich ist.

Freilandkakteen

WENN man von winterharten Kakteen spricht, so denkt man gemeinhin nur an Opuntien. In der Tat spielt diese Gattung, wenn man die neuesten Darlegungen von *J. A. Purpus* in den *Mitteilungen der D. D. G. 1925* berücksichtigt, die Hauptrolle. Erwähnt Purpus doch im Ganzen 55 Opuntia-Arten und außerdem noch eine Reihe von Varietäten, die hart sind oder wenigstens in sehr geschützten warmen Lagen versuchswert scheinen. Als widerstandsfähigste haben sich bewährt: O. barbata, O. macrorrhiza, O. camanchica und verschiedene Formen, O. Howeyi, O. polyacantha, besonders var. borealis, aber auch andere

Formen, O. hyſtricina, O. fragilis und O. pachyarthra. Von anderen Gattungen iſt vor allem Echinocereus coccineus zu nennen. Die Echinocactus ſind ſämtlich zu empfindlich gegen unſere Winternäſſe, und von Mamillaria kommt am eheſten M. miſſouriensis in Betracht.

C. S.

Neue Bücher

DEUTSCHE KAKTEENGESELLSCHAFT. Die Zeitſchrift für Sukkulentenkunde bringt in Heft 5 vom September ein hübſches Bild von Echinocereus daſyacanthus und wertvolle Beiträge zur Kultur ſukkulenter Pflanzen von G. Schwantes. Heft 6 vom Oktober enthält den Bericht der Jahresverſammlung vom Auguſt, ein Bild von Echinocereus Fendleri und zwei farbige Tafeln, die der bekannte botaniſche Zeichner J. Pohl nach dem Leben gezeichnet hat. Es ſind Cereus Silveſtrii und C. Damazioi. Die Zahl der neu beigetretenen Mitglieder iſt wieder erſtaunlich groß.

DER BOTANISCHE GARTEN IN HALLE. Welche Bedeutung einem kleinen botaniſchen Garten, wie wir deren viele in Deutſchland beſitzen, innewohnt, darüber geben ſich nur wenige Beſucher Rechenſchaft. Es iſt daher als ein nützlicher und anregender Verſuch zu bezeichnen, einen bei aller Billigkeit hübſch ausgeſtatteten und lesbar geſchriebenen *Führer durch den botaniſchen Garten* dem Beſucher in die Hand zu geben, wie dies Dr. *R. Zander* für *Halle* im Frühjahr 1925 verſucht hat. Er erläutert kurz die Geſchichte des Gartens, der 1698 ins Leben gerufen wurde und wo Botaniker, wie Kurt Sprengel (1797 — 1833) gewirkt haben. Ehe die Pflanzen des Gartens beſprochen werden, ſchaltet der Verfaſſer einen Abſchnitt über Bau und Leben der Pflanze ein. Bei der Aufzählung der Pflanzen erwähnt er nicht nur deren Heimat, erklärt den wiſſenſchaftlichen und gibt den deutſchen Namen an, er weiſt auch auf den Nutzwert und ſonſtige für die betreffende Art bezeichnende Dinge hin. Jedenfalls hat der Verfaſſer es verſtanden, eine Schrift zu ſchaffen, die andere botaniſche Gärten ſich als Muſter nehmen ſollten, ohne das ſie ſie nachzuahmen brauchen.

DIE NORDAMERIKANISCHEN BROMBEEREN. In ſeinem *Gentes Herbarium* hat der bekannte nordamerikaniſche Gartenſchriftſteller und Botaniker *L. H. Bailey* als Heft 5 von Band I eine Abhandlung über *„Rubus: Enumeration of the Eubati (dewberries and blackberries) native in North America"* veröffentlicht, die im Oktober 1925 erſchien. Bailey will in erſter Linie die Wildarten genau kennzeichnen und läßt ſich auf die Frage hybriden Urſprungs zunächſt nicht ein. Im ganzen beſchreibt er 77 Species und eine ganze Anzahl Varietäten. 159 Bilder, zumeiſt von Herbarexemplaren, tragen weſentlich dazu bei, die oft ſo ſchwierigen Formen zu veranſchaulichen. Rubus-Arten wie frondoſus, allegheniensis und Andrewſianus ſind durch ihre Kulturſorten beſonders wichtig.

DIE WELT DER PFLANZE. Der zweite Band dieſer Sammlung, die Ernſt Fuhrmann im Auriga-Verlag in Berlin herausgibt, trägt den Titel *Craſſula*. Auf den erſten Band über Orchideen wieſen wir bereits im letzten Septemberhefte hin. Auch das Craſſula-Heft zeigt die etwas dilettantenhafte Aufmachung des Ganzen. Es handelt ſich hier um einen Verſuch, die *Formen*welt der Pflanzen durch zum Teil recht vergrößerte Einzelheiten dem Beſchauer intimer nahe zu bringen. Der Titel Craſſula iſt irreführend und müßte mindeſtens Craſſulaceen lauten. Die Aufnahmen ſind unleugbar meiſt ſehr geſchickt gemacht und wirken oft überraſchend. Man kann nur bedauern, daß die leitende Idee dieſer Sammlung nicht klarer entwickelt und die den Bildern vorausgeſchickten Betrachtungen zu wenig orientierend ſind. Auch die zum Teil unzutreffenden oder ungenauen Namenangaben für die Bilder, die leider nicht auf den Bildblättern ſelbſt ſtehen, beweiſen das. Es wäre auch nötig, anzugeben, wo und durch wen die Aufnahmen erfolgten, da ja dem Photographen das Beſte des Buches zu danken iſt.

GARTNERISCHE LEHRHEFTE. Von dieſer bei Paul Parey, Berlin, herausgegebenen Sammlung liegen wieder Heft 14 und 15 vor. Das erſte behandelt *Das Schriftwerk des Gärtners* von *R. H. Häßner* und ſoll »ein Lehr- und Hilfsbuch für Angeſtellte und Leiter gärtneriſcher Erwerbswirtſchaften« ſein. Ein ſolches Büchlein iſt ſicherlich ſehr wichtig. Der Verfaſſer hat ſich bemüht, ſeine Vorſchläge von dem leider ſo verbreiteten Kaufmannsdeutſch zu befreien. Meiner Auffaſſung nach iſt ihm dies nur bis zu einem gewiſſen Grade gelungen. Der auf Seite 15/16 als Muſter gegebene Brief eines Gartenarchitekten, worin er eine Geſchäftsgründung anzeigt, enthält gar langatmige Sätze und gibt dem Empfänger ſicherlich keinen rechten Begriff davon, daß hier ein Gartengeſtalter, der doch ein Künſtler ſein will und ſoll, zu ihm ſpricht. Es klingt mehr, als ob ein Fabrikant ihm ſeine Ware anbietet. Es würde zu weit gehen, auf die hier vorgeſchlagene Art des Briefſtils näher einzugehen, es ließe ſich gar manches dagegen einwenden. Die Phraſe »ich habe mir aus den Bericht meines Reiſenden gerne dienen laſſen« iſt ſicherlich nicht vorbildlich. In Heft 15 behandelt *W. Ebert* die *Angewandte Pflanzenanatomie und Pflanzenphyſiologie*. Das Ganze bildet für den jungen Gärtner eine recht klare Einführung in die für ihn wichtigſten Fragen dieſer nicht leicht zu umgrenzenden Gebiete. Die Bilder ergänzen den Text in beſter Weiſe.

UNSER GARTEN. Das kleine unter dieſem Titel in der Sammlung »Wiſſenſchaft und Bildung« bei Quelle & Meyer, Leibzig, ſoeben in zweiter Auflage neu erſchienene Büchlein von *F. Zahn*, dem Dozent für Gartenkunſt in Dahlem gehört zu den Ratgebern für Hausgartengeſtaltung, die man jedem Gartenbeſitzer empfehlen kann. Zahn weiß ſein Thema recht hübſch und praktiſch anzupacken. Wenn der Verlag ihn künftig darin unterſtützte, daß er für Autotypien geeigneteres Papier wählen würde, ſo würden auch viele jetzt ganz unzulängliche Bilder vielleicht doch brauchbar werden. Ich würde auch dem Verfaſſer raten, ſich den immergrünen Laubhölzern etwas mehr zu widmen und nicht zu ſchreiben: »Von immergrünen Laubhölzern haben wir nur wenige Arten vollſtändig winterhart in unſerem Vaterland«.

INNENDEKORATION. Dieſe in der Verlagsanſtalt Alexander Koch, Darmſtadt, erſcheinende Monatsſchrift befaßt ſich in erſter Linie mit Fragen der Wohnungsausſtattung, doch wird ab und zu der Garten als erweiterte Wohnung mit Recht einbezogen. Im Januarheft wird das Haus eines Kunſtfreundes in Wort und Bild geſchildert und das Thema perſönliche Heimgeſtaltung berührt.

C. S.

Zeitſchriften

BELGIEN

Im *„Jardin d'Agrément"* wird im Januarheft eine Auswahl der hundert beſten Stauden, mit Ausſchluß der Farne, Orchideen und Knollengewächſe, für den Steingarten gegeben, die zeigt, wie rege überall das Intereſſe an ſolchen Anlagen iſt. Im Februarheft wird das Steingartenthema weiter behandelt.

FRANKREICH

In der Januarnummer der *„Revue Horticole"* beſpricht Meuniſſier die Gattung Columnea und bildet farbig die hübſche Hybride C. Vilmoriniana ab.

ENGLAND

In *„The Orchid Review"* vom Januar findet ſich unter den vielen Notizen eine intereſſante über italieniſche Orchideen und über Zygopetalum maxillare und ſeine Hybriden. — Aus der Fülle der ſehr oft reich illuſtrierten Artikel in *„The Garden"* ſei in no. 2824 einer über Saxifragen im alpinen Hauſe hervorgehoben. No. 2825 zeigt, auf welch hoher Stufe die Gloxinienkultur auch in England ſteht. In no. 2826 beſpricht J. L. Gibſon die Anzucht verſchiedener guter Stauden aus Samen. Ein Bild zeigt Stachyurus praecox im Februar voll in Blüte. — Auch in dieſem Jahre ſetzt F. K. Ward in *„The Gardeners' Chronicle"* ſeine Reiſeſchilderungen fort. A. Grove beſpricht in no. 2036 Lilium Brownii und var. Colcheſteri. N. E. Brown's eingehende Betrachtungen über Meſembrianthemum und verwandte Gattungen werden weitergeführt. In no. 2037 finden wir ein Bild des ſo ſchönen, aber bei uns kaum bekannten japaniſchen Cypripedium ſpecioſum. Alwin Berger beſpricht Pflanzen aus der Familie der Sterculiaceen in ſüdlichen Gärten und bildet Brachychiton Bidwillii und Melhania melanoxylon ab. No. 2038 zeigt auf der beiliegenden Tafel einen Blütenſtand von Pitcairnia corallina. Primula malacoides wird allmählich immer mehr verbeſſert, wie das Bild der var. Golden Eye erkennen läßt.

HOLLAND

In no. 1 der *„Floralia"* zeigt die Tafel eine auffallend reich blühende Campanula latifolia. — Das erſte Januarheft von *„Onze Tuinen"* ſchildert unter anderem das Blühen des ſo ſeltſamen Amorphophallus titanum in Buitenzorg. Die Betrachtungen über die Ausbreitung des franzöſiſchen Gartenſtiles in Europa nach Ludwig XIV. werden ab no. 28 fortgeſetzt.

NORDAMERIKA

Im Januarheft von *„Gardeners' Chronicle of America"* ſetzt H. J. Eckſtein ſeine Betrachtungen über Pflanzen und ihre Namen fort und betont die Sympathien und Antipathien, die gewiſſe Namen erwecken.

ÖSTERREICH

Die *„Gartenzeitung"* der Gartenbaugeſellſchaft erſcheint von jetzt ab in neuem Gewand und legt Zeugnis ab für die rege Tätigkeit, die in Wien wieder entfaltet wird.

SCHWEDEN

Das Heft des *„Luſtgarden"* für 1925 der Vereinigung für Dendrologie und Parkpflege in Schweden bezeugt in ſeiner hübſchen Ausſtattung und dem reichen Inhalte wieder die wertvolle Arbeit dieſes Vereins, der ſich unſerer D. D. G. würdig zur Seite ſtellen kann.

C. S.

VERLAG DER GARTENSCHÖNHEIT G. m. b. H. in Berlin-Weſtend / Verantwortlich für die Schriftleitung OSKAR KÜHL in Berlin-Weſtend, für den Anzeigenteil DOROTHEA KLETT, Berlin-Lichterfelde / Buch- und Kunſtdruckerei W. SOMMER, Inhaber OSKAR KÜHL, Berlin-Schöneberg.

Sammelmappe

HIPPOLYTE TAINE
ÜBER RÖMISCHE GÄRTEN

Villa Albani

NICHTS interessiert mich an den römischen Villen mehr, als ihre alten Herren. Die Naturwissenschaftler wissen es, man erkennt das Tier sehr gut an seiner Schale.
Der Ort, an welchem ich angefangen habe, es zu verstehen, ist die Villa Albani, welche im achtzehnten Jahrhundert für den Kardinal Alexander Albani nach seinem eigenen Plane erbaut wurde. Man errät darin sofort den großen Herrn und Hofmann von der Art der Adeligen unseres siebzehnten Jahrhunderts. Es gibt Unterschiede, aber die beiden Geschmacksrichtungen sind einander benachbart. Es ist Kunst und Anordnung, was sie über alles lieben, der Natur ist keine Freiheit gelassen, alles ist künstlich. Das Wasser sprudelt nur in Strahlen und Büscheln hervor und hat zum Bette nur Becken und Urnen. Die Rasenplätze werden von ungeheuren Hecken eingeschlossen, welche höher wie ein Mann und dicker wie Mauern sind und geometrische Dreiecke bilden, deren alle Spitzen auf einen gemeinsamen Mittelpunkt treffen. Vorn erstreckt sich eine dichtgedrängte schnurgerade Pallisade von kleinen Zypressen. Man steigt auf breiten Steintreppen, welche denen von Versailles glei-

chen, aus einem Garten in den anderen. Die Blumenbeete werden von kleinen Rahmen aus Büschen eingeschlossen und bilden Zeichnungen, welche gutgestickten, mit abgestuften Farben regelmäßig gesprenkelten Teppichen ähnlich sehen. Diese Villa ist ein Ueberbleibsel, das fossile Skelett eines Lebens, welches zwei Jahrhunderte gedauert hat und dessen Hauptvergnügen in der Unterhaltung, im schönen Auftreten und in den Gesellschafts- und Vorzimmersitten bestand. Der Mensch interessierte sich nicht für die leblosen Dinge. Er sah in ihnen keine Seele und keine eigentümliche Schönheit, er machte aus ihnen ein bloßes Anhängsel seines eigenen Lebens, sie dienten den Gemälden nur zum Hintergrund, zu einem verschwommenen Hintergrunde, dessen Wichtigkeit geringer als die eines Beiwerkes war. Die ganze Aufmerksamkeit wurde von dem Gemälde selber in Anspruch genommen, d. h. von dem menschlichen Trugspiel und dem menschlichen Drama. Um einen Teil dieser Aufmerksamkeit auch auf die Bäume, die Wasser und die Landschaft zu lenken, mußte man sie vermenschlichen, ihnen ihre natürlichen Formen und Anlagen, ihre »wilde« Art und den Schein von Unordnung und Wüste nehmen, und ihnen so sehr als möglich das Aussehen eines Saales, einer Galerie mit Säulengängen und eines großen Palast-Hofes geben. Die englischen Gärten, so wie man sie heute bei uns einführt, zeugen von der Heraufkunft einer anderen

Rasse, von der Herrschaft eines anderen Geschmackes, dem Einfluß einer anderen Literatur und der Wirkung eines anderen umfassenderen, einsameren, leichter ermüdeten und den Dingen des Inneren mehr zugewandten Geistes. Ferner gewahrt man, daß unser Standes-Herr Altertumsforscher war. Außer zwei Galerien und einem mit antiken Statuen angefüllten Säulengang sind hier Stücke von Bildhauerwerken aller Arten in den Gärten verstreut: Karyatiden, Torsen, riesenhafte Büsten, Götter, büstentragende Säulen, Urnen, Löwen, große Vasen und Sockel, kurz, eine große Anzahl von oft zerbrochenen oder zerstörten Resten. Man hat sogar, um aus allem Nutzen zu schlagen, eine Reihe von gestaltlosen Trümmern in eine Mauer eingebaut. Einzelne von diesen Werken, unter anderem eine Karyatide, ein Antinouskopf und einige Kaiserstandbilder sind schön, aber die meisten bilden einen seltsamen, bunt zusammengewürfelten Haufen.

Ein dritter nicht weniger sichtbarer Punkt ist, daß unser altertumsforschender Standesherr ein Italiener, ein Südländer war. Das Klima fordert zu dieser Bauart auf. Viele in unseren klassischen Jahrhunderten nachgeahmten und unter unserem Himmel sinnlose Bauarten sind hier vernünftig und folglich schön: zunächst die großen Säulengänge mit offenen Bogen, man braucht keine Fenster, es ist sogar besser, daß es keine gibt, man geht ja vor allem darin umher, um frische Luft zu schöpfen.

Die Ausblicke und Stücke Landschaft, welche man, gerahmt von den Säulen, am Ende der Galerien sieht, sind von gleichem Geschmack. Herrliche Eichen erheben auf einer Terrasse ihre ungeheuren Pfeiler und die immergrüne Kuppel ihres monumentalen Laubes. Platanenalleen ziehen dahin und vertiefen sich wie ein Säulengang, hohe, schweigsame Zypressen drängen ihre knorrigen Aeste gegen ihre graue Rinde und steigen ernst und eintönig als Pyramiden in die Höhe. Aloen erheben vor den weißen Wänden der Mauern ihr seltsames Geflecht gleich einer verkrampften, von Aussatz bedeckten Schlange. Jenseits der Umfriedung steigt und fällt, je nach den Bewegungen des Bodens, ein Durcheinander von Bauten und Pinien. Am Himmelsrande wogt die schroffe, zerborstene Linie der Berge. Einer vor allen erhebt, blau wie eine regenbeladene Wolke, sein Dreieck, so daß es einen ganzen Zipfel des Himmels vermauert. Von dort wandern die Augen auf die Folge der runden Bogen zurück, welche den Säulenumgang bilden, auf die Geländer und die Statuen, welche den First des Daches beleben, auf die verstreuten Säulen und auf die Rundungen und Vierecke der Teiche und Hecken. In dieser Umrahmung von Bergen ergibt das genau eine Landschaft wie die des Perelle und entspricht einem geistigen Zustand, von dem ein moderner Mensch und vor allem ein Nordländer keine Vorstellung hat. Die Menschen von heute sind zarter, weniger fähig Malerei, und fähiger Musik zu genießen; diese dagegen hatten noch grobe Nerven und auf das Aeußere gewendete Sinne. Sie empfanden nicht die Seele der äußeren Dinge, sie genossen nur ihre Form. Künstlich gewählte und verteilte Landschaften gaben ihnen dieselbe Empfindung, wie ein hohes, weites, fest gebautes und schön ausgeschmücktes Gemach: das genügte ihnen, sie führten keine Gespräche mit einem Baum ...

Ich bin zwei Meilen zu Fuß weiter gegangen; es gibt eine Menge großer, mit lächerlichen

An unsere Rosenfreunde!

Die unerwartet eingetretene strenge Kälte im November-Dezember hat in vielen Gärten noch Rosen angetroffen, die noch ungedeckt waren, und daher empfindliche Lücken gerissen. Besonders sind sehr viele Stammrosen in Privatgärten eingegangen. Wer aber möchte seine Lieblinge missen, wer den ganzen Sommer die entstandenen häßlichen Lücken vor Augen haben?

Verstärkte Nachfrage ist die natürliche Folge dieser Verluste gewesen und hat zu einer teilweise ganz erheblichen Preissteigerung geführt.

Trotzdem haben wir uns entschlossen, der allgemeinen ungünstigen Wirtschaftslage Rechnung tragend, **unsere Preise nicht zu erhöhen.**

Zur Zeit haben wir noch gut gepflegte Vorräte in ganz prima Qualität von

BUSCH-ROSEN

KLETTER-ROSEN

HOCHSTAMM-ROSEN

TRAUER-ROSEN

Wir empfehlen aber baldige Bestellung, da wir natürlich, wenn wir selbst größere Mengen einkaufen müssen, um unsere Vorräte aufzufüllen, höhere Preise anlegen und dann auch wieder höhere Preise selbst berechnen müssen.

Fordern Sie deshalb sofort unsere **Sorten- und Preisliste mit Bildern,** unsere **„Winke für Pflanzung und Pflege der Rosen“,** die Ihnen kostenlos geliefert werden.

UNSERE GARANTIE: Wir nehmen jede nicht gefallende Sendung ohne weiteres auf unsere Kosten zurück, wobei wir nur die eine Bedingung stellen, daß die Verpackung wieder in gleich sorgfältiger Weise ausgeführt sein muß, wie die Ware bei Ihnen eingetroffen ist.

Rosenfirma GEBR. SCHULTHEIS in STEINFURTH bei Bad Nauheim

Drahtanschrift: Schultheis, Steinfurth, Kreis Friedberg **GEGRÜNDET 1868** Fernsprech-Anschluß: Bad Nauheim Nummer 320

Ruinen garnierter Villen, welche man eigens fabriziert und zum Teil modernisiert hat. Die entgegengesetztesten Stile vermengen sich darin, es lohnt nicht der Mühe, einzutreten. Andere bürgerlichere Häuser lassen Beete aus Palmen, Kaktus und weiße gefleckte Binsen zwischen sprudelnden Springbrunnen durchschimmern, es gibt nichts Eigenartigeres und nichts Anmutigeres. Die ärmlichsten Herbergen haben in ihrem Hof irgend einen großen, weitausladenden Baum oder eine dicke Weinrebe, welcher ein Dach aus Laub bildet. Man bekommt dort einen schlechten, gezuckerten gelben Wein, aber gegenüber breiten sich Landschaften in weichen Tönen, welche von den fernen bläulichen Gebirgen begrenzt werden, sprießendes Laub, weiße Mandelbaumwipfel und die schlanke Zeichnung brauner oder grauer Bäume, und der Himmel ist ganz feucht von leichten Wolken.

Villa Borghese

Die Villa Borghese ist ein großer, mit allen Arten von Gebäuden besäter Park von vier Meilen im Umfange. Am Eingang steht ein ägyptisches Tor von schlechtester Wirkung, es ist eine moderne Einführung. Das Innere ist harmonischer und ganz klassisch: hier eine Säulenreihe, dort ein kleiner Tempel, etwas ferner ein Säulengang in Trümmern, ein Portikus, Geländer, große runde Vasen und eine Art Zirkus. Das wogige Gelände hebt und senkt schöne, von zarten, zitternden Anemonen über und über rote Wiesen. Pinien, welche mit Absicht getrennt sind, erheben ihre schlanke Gestalt und ihr ernstes Haupt in die weiße Luft. In den Alleen murmeln Springbrunnen und in den kleinen Tälern richten große, noch kahle Eichen ihre kühnen, antiken Heldenleiber auf. Ich bin im Norden geboren und erzogen worden, Du begreifst, daß ich bei ihrem Anblick stets alle Schönheiten Roms vergesse und daß die Gebäude und Kirchen mir nichts mehr sind neben diesen knorrigen Buchen, neben diesen großen Kämpfern meiner geliebten Wälder, welche wieder aufzuleben beginnen und deren erste Triebe der feuchte Wind schon wachruft. Sie ruhen einen köstlich von Steinen und Menschen aus. Alles was menschlich ist, ist gewollt und in dieser Hinsicht Ermüdung, die Linien der Gebäude sind immer starr, eine Statue, ein Gemälde ist niemals etwas anderes, als ein Gespenst der Vergangenheit. Die einzigen Dinge, die ein vollkommenes Vergnügen gewähren, sind die natürlichen Wesen, welche stets sich bilden und wandeln, welche leben und deren Stoff sozusagen fließend ist. Man bleibt ganze Nachmittage lang hier, um die immergrünen Eichen anzuschauen, den unbestimmten bläulichen Ton ihres Laubes und ihre runden Wipfel, welche ebenso voll sind, wie die der Bäume Englands. Es gibt dort ebenso eine Aristokratie wie hier unten, nur der große erbliche Besitz kann die unnützen, schönen Bäume vor der Axt bewahren. Neben ihnen tragen die Pinien gerade wie Säulen ihre Kuppeln still im friedlichen Himmelsblau, man wird nicht müde, diesen Rundungen zu folgen, die sich aneinander reihen und sich verschlingen, dem kleinen Zittern, welches sie bewegt und der anmutigen Farbe so vieler edler Wipfel, welche dicht nebeneinander inmitten der durchsichtigen Luft stehen. Von Zeit zu Zeit erhebt eine von ihren Knospen gerötete Pappel in ihrer Mitte ihre schwankende Pyramide. Langsam senkt sich die Sonne. Ströme von Licht begießen die halbgebleichten Stämme und die Rasenhänge voller blühender Maßliebchen. Die Sonne sinkt noch tiefer und die Fensterscheiben des Palastes brennen, seltsame Röten legen sich auf die Köpfe der Bildsäulen und im Fernen hört man Weisen Bellinis, eine unbestimmte, von dem wechselnden Hauche der Brise herangetragene Musik.

Villa Ludovisi

Die Villa ist sehr freundlich, die unversehrten durch den Regen erfrischten Wiesen funkelten. Die Hecken aus blühendem Lorbeer, der Wald der grünen Eichen und die Alleen hundertjähriger Zypressen belebten durch ihre Anmut und ihre Größe die Seele und richteten sie wieder auf. Diese Art Landschaft ist einzig. Die Pflanzen entgegengesetzter Himmelsstriche vermischen und vereinigen sich darin: hier große Palmensträuße, große gefleckte Binsen, welche wie Kerzen aus ihrem Nest von glänzenden, grünen Blättern emporsteigen, dort eine Pappel und ein mächtiger, grauer, kahler Kastanienbaum, welcher rauscht. Noch seltsamer sind die alten Mauern Roms, wirkliche natürliche Ruinen, welche als Umfriedung dienen.

HINWEIS

Einem Teil der Auflage dieses Heftes liegt der Prospekt der *Verlagsanstalt Alexander Koch*, G.m.b.H., *Darmstadt*, über ihre Zeitschrift *„INNENDEKORATION“* bei. Er sei der besonderen Beachtung der Leser empfohlen.

Die Treibhäuser lehnen sich gegen die rötlichen Arkaden. Die Zitronenbäume drängen sich in blassen Reihen gegen die gelösten Ziegel und ringsherum breitet sich das neue Gras im Ueberfluß. Von einer Höhe sieht man von Zeit zu Zeit den letzten Kreis des Himmelsrandes und die bläulichen vom Schnee gestreiften Berge. Alles das befindet sich innerhalb Roms, niemand kommt hin, ich weiß nicht, ob jemand darin wohnt. Rom ist ein Museum und ein Grabgewölbe, in dessen Stille die vergangenen Formen des Lebens fortbestehen.

Die Gärten des Quirinals

Wir haben den Rest des Tages in den Gärten des Quirinals verbracht, welche von Urban VIII., einem Papste der Zeit, angelegt worden sind; sie liegen auf einem Hügel und stufen sich vom Gipfel bis zum Fuße des Abhanges ab. Es war uns, als wandelten wir in einer Landschaft Perelles: hohe Hecken, zu Vasen gestutzte Zypressen, von Büschen gerahmte Beete, welche Muster bilden, Säulengänge und Statuen. Der Garten hat die kalte Regelmäßigkeit sowie schwerfällige Korrektheit des Jahrhunderts, welche sich mit der Herstellung gut gegründeter Monarchien und sittsamer Verwaltung über alle Künste Europas verbreitet hat. Die Kirche ist in dieser Epoche wie das Königstum, eine unbestrittene Macht, welche vor den Augen ihrer Untertanen mit Würde, Ernst und Anstand auftritt.

Aber diese so aufgefaßten Gärten passen besser für Italien als für uns. Die Hecken sind aus Lorbeer und Buchs, welche den Winter überdauern und im Sommer vor der Sonne schüt-

zen. Die immergrünen Eichen, welche niemals ihr Laub verlieren, werfen zu jeder Zeit dichten Schatten, und die zähen Mauern aus Gesträuchen halten den Wind ab. Die Wasser, welche auf allen Seiten aufsprudeln, beschäftigen mit ihrer Bewegung die Augen und erhalten die Frische auf den Wegen. Von den Säulengeländern aus gewahrt man die ganze Stadt, Sanct Peter und den Janiculus, dessen gewundene Linie durch den Purpur des Abends wogt. Für einen Papst und für kirchliche Würdenträger, welche alt und ernst sind und in langen Gewändern einherwandeln, bilden diese regelmäßigen Wege, bildet diese ganze monumentale Dekoration gerade das, was zu ihnen paßt. Im Frühjahr tut es wohl, hier unter den lauen Strahlen der Sonne vor dem großen Kristallbogen, welchen der klare Himmel über die Alleen spannt, eine Stunde zu verbringen. Dann steigt man auf großen Treppen oder sanften Hängen bis zu den mittleren Becken nieder, in dem fünfzig aus den Rändern aufschießende Springbrunnen ihr blaues Wasser vereinigen. Dicht daneben gewährt eine runde, mit Mosaiken bedeckte Halle unter ihrer Wölbung Schatten und Kühlung ... Dieses Murmeln und Sprudeln des Wassers, diese Bildsäulen und der große Himmelsrand gegenüber diesem Sommersaal dienen zur Zerstreuung und ruhen den von Geschäften ermüdeten Geist aus. An einem Tage fügt man eine neue Gruppe hinzu, an einem anderen schlägt man ein Gebüsch nieder oder pflanzt ein neues: das Vergnügen zu bauen ist das einzige, was einem Fürsten und vor allem einem alten, durch die Zeremonien gelangweilten Fürsten bleibt.

Aus: Reise in Italien
(Uebertragen von Ernst Hardt, Verlag Eugen Diederichs)

ADALBERT STIFTER UND DIE KAKTEEN

ADALBERT STIFTERS Biograph Alois Raimund Hein veröffentlicht einen Brief von der Baronin Amelie von Handel an

ihn, der Zeugnis von Stifters Leidenschaft für Kakteen ablegt und gleichzeitig das eigenartige Wesen des Dichters in geistvoller Weise zergliedert:

»Ein wahres Hindernis für mich im Umgang mit Stifter war der Gegensatz meiner französischen Beweglichkeit zu seiner Breite und Tiefe. Er kam zu mir manchmal, besonders als er am »Nachsommer« schrieb, um eine Episode, die ihm für seine Dichtung notwendig schien, mündlich zu Leben zu bringen; denn, so reich ihm Empfindung und Beschreibung floß, so mühsam war ihm die Erfindung einer Handlung. Ich glaube, zu Beginn des Gespräches war ihm meine Lebhaftigkeit manchmal anregend und darum suchte er mich auf. Aber lange dauerte der Friede nie; meine leichten, seichten Gedanken fuhren mit Eilzugsgeschwindigkeit davon, und Stifter saß am Wege und grub Blumen, die zum Strauße werden sollten, samt der Wurzel aus. Gewiß habe ich ihn oft ungeduldig gemacht. Er mich auch! Aber manchmal waren wir doch der Harmonie zwischen uns sicher.

Mit Freude erinnere ich mich folgender Episode: Stille Nacht im stillen Linz; jedermann in Schlaf versunken. Zwei Uhr mag's gewesen sein. Da wird Sturm an unsrer Türe geläutet. Mein Mann öffnet das Fenster. Stifters Stimme tönt herauf: »Sag deiner Frau, daß der größte Kaktus (nach seinem botanischen Namen habe ich nicht gefragt) aufblüht. Kommt!« Ich war schneller fertig als mein Mann. Stifter wartete auf mich, und wir rannten durch die dunklen Gassen.

Seit Tagen hatte die geschlossene Knospe des Kaktus uns beschäftigt wie ein Geheimnis. Nun stand die Pflanze auf dem Tische, von Lichtern umringt, wie auf einem Altar. Gottlob, auf uns zwei hatte sie gewartet! Mein Mann kam ein bißchen zu spät, denn nun spalteten sich die Blätter, erst ein ganz klein wenig, dann von Minute zu Minute mehr, dann quollen rotgoldene Staubfäden aus dem Kelche, die Knospe war Blume geworden. Die Blume war wunderbar schön, und wir staunten sie an; aber der ersten Regung des Werdens, dem Oeffnen der Knospenlippen lauschten wir atemlos; — als könnten wir sie hören, die Stimme der Natur. Stifter hatte eine große Kakteensammlung. Manchmal dachte ich, seine Vorliebe für diese kristallisierten Pflanzenformen in stachligem Gewande ergänze ihm etwas allzu Weiches in seiner Seele . . .«

TROPISCHE NUTZPFLANZEN

Es war in Kew Gardens, wo mich diese Myrtacee interessierte, nicht wegen ihres allgemeinen Habitus, sondern wegen ihres wirtschaftlichen Wertes. Um so überraschender begrüßten mich viele Jahre später die beinahe zu Waldungen gewachsenen Bestände von *Eugenia aromatica oder caryophyllata* in Amboina in Holländisch-Indien. Dort in den nördlichen Molukken und den Philippinen ist die Heimat dieser Gewürznelke. Heute wird sie in verschiedenen Tropenländern angebaut, speziell ist Zanzibar der Weltmarkt für Gewürznelken, geringere Mengen werden aus Britisch-Indien

und der Insel Réunion exportiert. Die beste sogenannte Königsnelke wird in Amboina gepflanzt und kommt vor allem als Tafelgewürz von dort in den Handel, wogegen die in Zanzibar angebaute Nelke zur Oelgewinnung fabrikmäßig verwendet wird. Eugenia aromatica ist ein fast mittelhoher, schön belaubter Baum, eine dicht zylindrische oder pyramidale Krone, deren immergrüne Blätter länglich-oval, kurzstielig, ledrig, gegenständig, 10 bis 12 Centimeter lang sind. Kleine, recht zahlreiche Blüten stehen in Doldentrauben, sie besitzen viele Staubblätter nebst einer aus fünf weißen, unverwachsenen, vorn etwas klebrigen Blumenblättern bestehenden Blumenkrone, die später beim Oeffnen der Blüte abfällt.

Zur Ernte darf dieses Aufblühen nicht abgewartet werden, da die Gewürznelken aus den Blüten*knospen* des Baumes bestehen. Sie haben die Form einer an der Spitze eine Kugel tragenden Röhre; zuerst sind sie ganz fahl, werden dann grün und zuletzt hellrot. In diesem Zustande tritt die Ernte ein, wobei die ganzen Blütenstände gepflückt, dann die einzelnen Nelken vom Stiele getrennt, getrocknet und gesiebt werden. Bei uns wird Eugenia aromatica mit besonderer Sorgfalt in den Warmhäusern unserer Botanischen Gärten gepflegt, da sie draußen in ihrer Heimat in gleichmäßig feuchter Wärme und auf verwittertem vulkanischen Boden gedeiht. Dort im Molukken-Archipel fühlt er sich am wohlsten und gibt vom siebenten Jahre ab den über alle Länder verbreiteten und geschätzten Gewürznelken-Ertrag, der bis in das fünfzigste Jahr andauert. Im Beete auf sorgfältig gelockerter Erde ausgesät, werden die ein- bis zweijährigen Pflänzchen dann vorsichtig unter leichtem Schatten in sechs bis acht Meter Entfernung plantagenmäßig ausgesetzt. Möglichst guter Windschutz ist solchen Anpflanzungen zu geben. Auf Amboina werden solche Gewürznelken-Kulturen vorwiegend von Malaien, Japanern und Chinesen betrieben, sie geben recht gewinnbringende Erträge. Merkwürdige Zierstücke werden dem Reisenden in Amboina und anderen Molukken-Inseln zum Kaufe angeboten. Kleine Schiffe, künstliche Bäumchen, Nähkästchen und viele andere Ziergegenstände. Alles ist recht kunstvoll aus den Nelken dieser Eugenia hergestellt.

E. Kaltenbach.

Gartenschönheit

eine Zeitschrift mit Bildern

für Garten- und Blumenfreund · für Liebhaber und Fachmann

März 1926

in Gemeinschaft mit Karl Foerster und Camillo Schneider
herausgegeben von Oskar Kühl
Verlag der Gartenschönheit G.m.b.H. Berlin-Westend

GARTENSCHÖNHEIT

EINE ZEITSCHRIFT MIT BILDERN

FÜR GARTEN- UND BLUMENFREUND / FÜR LIEBHABER UND FACHMANN
IN GEMEINSCHAFT MIT KARL FOERSTER UND CAMILLO SCHNEIDER
HERAUSGEGEBEN VON OSKAR KÜHL

7. JAHR / HEFT 3 MÄRZ 1926

GARTENSCHÖNHEIT

eine Zeitschrift mit Bildern für Garten- und Blumenfreund für Liebhaber und Fachmann in Gemeinschaft mit Karl Foerster und Camillo Schneider herausgegeben von Oskar Kühl

Inhalt des Märzheftes:

Seite

Prunus yedoensis im Austrieb / Bild 57
August Endell / Frühlingsbäume / Mit 2 Bildern 57
Th. Hoog jr. / Narzissen / Mit 5 Bildern . . 60
J. Hempelmann / Koniferen von auffallendem Wuchs / Mit 3 Bildern und 3 Zeichnungen . 62
Karl Foerster / Pflanze und Reise / Mit Bild 64
Gustav Schwantes / Stammlose Mesembrianthemen II / Mit 4 Bildern 66
A. Berger / Stiefkinder der Kakteenfreunde: Rhipsalis / Mit 5 Bildern 68
Gustav Allinger / Aus englischen Gärten / Mit 7 Zeichnungen 70
Despina Streit / Attischer Frühling 73
Zwei wertvolle Zwergfichten / H. Jensen und Murray Hornibrook / Mit 2 Bildern 74
Johannes Köster / Blütennotizen 76

Aus dem Blumengarten der Literatur
Vorfrühling von Rückert, Heine, Hebbel . . 73

Gartenaufgaben
Hermann Koenig / Einjahrsblumengarten an der Auffahrt 75

GARTENARBEIT UND BLUMENPFLEGE
Alexander Steffen / Gartengeräte II: Der Rechen (die Harke) und sein Gebrauch / Mit Zeichnung 77
Frühjahrsarbeiten / Erich Wocke: Im Park / Paul Kache: Aussaat und Anzucht der Einjahrsblumen 78

Bepflanzungspläne
Camillo Schneider / Einjahrsblumenrabatte / Mit Zeichnung 81

Auf dem Balkon
H. Gehringer / Frühjahrsarbeiten 81

Die Pflanze in der Wohnung
Eine Ampelpflanze / Mit Bild 82

Am Wege
B. Voigtländer / Unkraut-Vertilgung . . . 82

GARTENRUNDSCHAU
Neues aus aller Welt
Blumentreue / Die Rose Frau Karl Druschki / Seltenheiten vor hundert Jahren / Die hundert besten Stauden / Amacrinum Howardii / Die Hundertjahrfeier der Flora in Dresden / Williams Bateson's Tod 83

Neue Bücher
Die Kakteen / Blütenstauden / Marktpflanzenzucht / Mistbeete 84

Zeitschriften 84

BILDBEILAGE
Platane in Eisgrub

FARBIGE BILDBEILAGEN
Trompeten-Narzissen, Golden Spur in Heemstede
Trauben-Hyacinthen Heavenly Blue
Hyacinthen Grand Monarque und City of Haarlem

Monatlich ein Heft

Bezugspreis für das Vierteljahr
in *Deutschland* 4 G.-M. und 0.75 G.-M. Versandkosten (Postscheckkonto Berlin 76290), im *Ausland* einschließlich Versandkosten: 5.25 Goldmark = 1,25 U. S. A.-$ oder entsprechend in der Landeswährung.

Preis des Einzelheftes
1.50 Goldmark zuzüglich Versandkosten

Verlag der Gartenschönheit G.m.b.H.
Berlin-Westend / Akazien-Allee 14.

Die Zeit der Narziſſenblüte gehörte zu den Hauptpunkten der letztjährigen Aus=ſtellung in Haarlem. Unter den Buchen in Heemſtede leuchtete es in ſatteſtem Golde. Wenn man Sorten, wie die abgebildete Trompeten=Narziſſe Golden Spur in ſolchen Mengen pflanzt, ſo verſteht man erſt recht ihre Wirkung in der Landſchaft.

Die Traubenhyacinthen bilden in ihrem ſatten Blau einen ſchönen Gegenſatz zu dem Gelb der Narziſſen. Das lehrte in Heemſtede beſonders die hier gezeigte Sorte Muscari Heavenly Blue. Es gibt nur wenige, die ſie in Maſſenwirkung errei=chen oder gar übertreffen. In dieſer Weiſe gehört ſie in den Park. – Bilder L. Blok.

Prunus yedoensis im Austrieb. – Bild C. S.

Im März

AUGUST ENDELL / FRÜHLINGSBÄUME

Im Nachlaß Auguſt Endells, des genialen, von einer unerſchöpflichen Formen- und Farbenphantaſie bewegten Künſtlers, der im vorigen Jahre ſeinem Schaffen entriſſen wurde, fanden ſich dieſe Aufſätze, die ihn auch literariſch als tief ſchürfenden Erkenner und Deuter der Naturformen zeigen. In ſeiner Liebe zu den Blumen, die ſich bis zur Ekſtaſe ſteigern konnte, wußte er ſich bei ihrer ornamentalen Formung nicht genug zu tun. Er hat mit dieſem Problem gerungen wie kaum ein Künſtler vor ihm, und er hat Blätter gezeichnet, denen wir nichts Ebenbürtiges an die Seite zu ſtellen wiſſen; aber er ſelbſt hatte uns aufgegeben, bis es ihm gelungen wäre, das ihm vorſchwebende Ziel ganz zu erreichen, ihn nicht als den Schöpfer unſerer Titelſeiten zu nennen. Das ſchwere Siechtum ſeiner letzten Jahre hat ihn verhindert, ſeine Abſicht durchzuführen, jedes Heft mit einem neuen Blumenbilde zu ſchmücken und der Gebundenheit der gegebenen Technik immer neue höchſte Wirkungen abzugewinnen. *O. K.*

DIE Zeit des jungen Grün. Keine iſt ſo oft beſungen, keine erſcheint aller Welt ſo »poetiſch«. Aber leider haben unſere Dichter ſelten Augen: was die Natur uns jetzt in ungeheurer Fülle gibt, iſt ſo viel, ſo wunderſam unendlich, und was davon wirklich geſehen wird, das iſt ſo lächerlich wenig, iſt immer nur das, was andere ſchon vorher geſehen und beſungen haben. Der Frühling kommt über Nacht, ſagt der blinde Städter, der von den langſamen Wundern der Knoſpe und des jungen Blattes nichts weiß, und er iſt obenein noch ſtolz, daß es auch für ihn, den Aufgeklärten, Vernünftigen noch Wunder gibt. Ein dürftiges Wunder: Schnelligkeit, der das Auge nicht folgen kann; ein echtes Stadtwunder, das ein bißchen an elektriſche Schnellbahnen und ähnliche ſchöne Dinge erinnert. Und dabei iſt das größte Frühlingswunder gerade die lange Dauer, der immer neue überraſchende Wechſel. Nicht das iſt erſtaunlich, daß der kahle Baum von heute morgen dichtes Laub trüge: nein, das Wunderbare iſt, wie der kahle Winterbaum hundert und tauſend Geſtalten annimmt, bis der reife volle Sommerbaum aus ihm wird. Ganz langſam ſchwellen die braunen Knoſpen, ihre Farbe verliert das Tote des Winters, ſie beginnen leiſe aufzuleuchten, ihre Haut wird ſtraffer. Und der Baum iſt ſchon ein anderer, weil überall die dicken Knötchen die kahlen Zweige beleben. Nun bricht die Spitze der Knoſpe auf, die dunklen Deckblätter treten langſam auseinander, feine dünne hellere Häutchen werden ſichtbar. Die Knötchen werden kugelig mit ſtrahlenden Punkten an den Spitzen. Und kommen wir von weitem auf den Baum zu, ſo ſcheint ſich über die dunklen nackten Zweige ein kaum ſichtbares ſchimmerndes Netz zu ſpinnen. Jeder Tag bläht die Knoſpen ſtärker auf, an den Spitzen kommt helles weiches Grün zum Vorſchein, das Netz über den Baum wird dichter, ſchimmernder. Nun brechen die jungen Blätter aus der Knoſpe, ſchon ganz in den Formen der alten, aber noch zuſammengefaltet, mit den rundlichen Deckblättern lockere grünliche Kugeln bildend. Und wieder iſt der Baum ein anderer geworden. Die leiſe Zartheit iſt dahin, die Blätterkugeln haben bei aller Jungheit doch etwas Kräftiges, ſie ſind kein Zierat an den Zweigen, wie die Knoſpen es waren, ſondern etwas, das den Zweigen die Wage hält. Die Kugeln erweitern ſich, verlieren ihre Form, die Blätter ſtreben auseinander, bilden große zuſammenhängende Flecken, die immer mehr zuſammenwachſen. Noch ſieht man den blauen oder den grauen Himmel zwiſchen ihnen. Der Baum iſt ein ganz neuer geworden. War er im Winter dünn und kahl und hart in ſeinen Linien, trübe in der Farbe, jetzt iſt er leicht und voll und rund in den Formen und lieblich im Grün. Ein ganz neues Geſchöpf, das kaum ſeine Verwandtſchaft mit jenem anderen mehr zeigt. Und er wird immer voller und ſatter, die Farbe tiefer und ſtärker, die Zweige verſchwinden, eine große kugelige grüne Wolke ſchwebt über dem dunklen Stamm.

Aber das iſt nur das Allergröbſte. Die Worte reichen nicht aus, all die Übergänge zu ſchildern, ſie ſo anſchaulich zu machen, daß man ſie innerlich ſieht. Ich kann nur neugierig machen, kann nur verlocken, einen Baum einmal Tag für Tag genau anzuſehen. Wochenlang iſt er jeden Tag ein neues Weſen, das ſich hundertmal ändert und gerade den aufmerkſamen Beobachter durch immer neue Wendungen überraſcht.

Nun haben wir nicht eine Gattung, ſondern viele, und jede iſt charakteriſtiſch verſchieden von der andern, und ſelbſt innerhalb der gleichen Gattung iſt jeder Baum anders, jeder hat ein perſönliches Geſicht, hat ſeine Eigentümlichkeiten, die ihm zukommen. Wer aufmerkſam zuſieht, wird bald merken, daß man unter Bäumen Freunde und Lieblinge haben

kann, so gut wie unter den Menschen. Aber dann muß man im einzelnen sehen, nicht alles sehen wollen. Langsam sehen. Sehen und warten. Bald wird man da oder dort wundersam angezogen werden und wird Freuden erleben, die man nicht vorher kannte. Was verwirrt, ist nur die Überfülle, die ablenkt und bald die Augen ermüdet. Die tolle jubelnde Wirrheit des Frühlings.

Nehmen wir zunächst die großen Formen der Stämme und der Verzweigung. Noch kann man sie ja erkennen. Fortwährend begegnen wir anderen Arten. Nur muß man nicht botanisch bestimmen wollen. Das wäre bald geschehen, und wir hätten doch nichts gesehen. Da gibt es Stämme, die steigen steil auf ohne Krümmung, senden hoch oben einzelne starke Äste aus, und dann plötzlich eine Wolke von dünnen geraden Zweigen. Dicht daneben ein anderer, auch mit hohem Stamm und wenigen starken Ästen, aber die Äste sind herausgebogen, und alle Zweige krümmen sich mit harten scharfen Ecken, und wie greifende Finger. Dann andere, schwer und rund im Stamm, der plötzlich viele Äste nach allen Seiten streckt, die sich später vielfältig verzweigen und eine dichte Kugel bilden. Die Baumkronen nehmen alle möglichen Formen an, die fast immer an Wolken erinnern, schwere, kugelige Formen, eckig unregelmäßige, flache Hauben, die die tragenden Äste ganz frei lassen. Dann der schwere Behang der Tannen, die dunklen Federballen der Kieferarten, die langen wehenden Haare der Birken. All das kann man in tausendfachem Wechsel bei uns sehen, auf unsern Straßen in den Ziergärten oder in unsern öffentlichen Parks. Und das ist erst der allernotdürftigste Anfang im Sehen. Haben wir darauf achten gelernt, dann beginnen die feineren Freuden. Vor uns ein riesiger Baum, der Stamm ist nach links ganz wenig geneigt, und seine Hauptäste gehen in starker Schwingung nach rechts zurück, wie wenn der Wind die Zweige fortgebogen hätte, und der Baum sich dagegen stemmt. Das gibt wundervolle gewaltige Linien, kühn, leidenschaftlich und groß, und wenn dieser Riese den ersten grünen Schleier bekommt, dann entsteht ein wundervoller Gegensatz, Kraft und Zartheit zugleich. Daneben ein Buchenstamm, ganz silbergrau, glatt mit seltenen Runzeln, ein paar Meter über dem Boden biegt er plötzlich aus nach einer Seite, dort war einmal ein Ast, der abgesägt wurde, und nun steigt der Stamm kerzengrade wuchtig in die Höhe, und dieses Aufsteigen wirkt doppelt gewaltig, weil jene schwere Ausbiegung vorherging.

Linden in Pillnitz. – Bilder C. S.

Und nun das Grün! Was ist die Sprache arm, daß sie nur ein einziges kümmerliches Wort hat, um diese unendliche Mannigfaltigkeit zu bezeichnen. Ganz helles, fast weißes Grün beginnt, aber da schimmert eines fast gelb, und dort eines bläulich, wieder andere sind hellbraun und rosa. Allmählich vertiefen sich die Farben, die Oberfläche der Blätter wird straffer. Manche fangen an zu glänzen, viele bleiben stumpf, andere bedecken sich mit weißem Flaum, noch andere haben feine Büschel am Rande. Fast alle sind auf der Oberseite ganz anders als auf der unteren. Von Tag zu Tag, von Baum zu Baum wechselt der Farbton. Selbst in den langen Reihen der Straßen, wo jeder Baum gleicher Art und gleichen Alters ist, fallen einzelne heraus, die durch irgend einen Zufall zurückgeblieben sind, und bilden reizende Gegenspiele zu ihren Genossen. Welche leise feine Schönheit und dabei welche Fülle, welche Lust. Und über dieses strahlende Märchenland kommt dann der Traum der Blüten.

*

ICH muß noch weiter von Frühlingsbäumen reden. Was beim Schreiben lebendig schien, das kommt einem draußen tot und ärmlich vor, und man möchte immer von neuem beginnen, diese bunten Wunder in Worte zu bannen, zu Betrachtung und Genuß zu locken. Ausschöpfen läßt sich die Fülle nie, auch dem Sehenden, der jahrelang sich in diese Dinge vertieft, bringt jedes Jahr und jeder Tag Neues und nie Gesehenes. Aber es wäre töricht in dieser Zeit von der Schönheit des Himmels oder der Wolken, der nassen Straßen oder des spiegelnden Wassers zu reden. Die kehren immer wieder. Aber der bunte phantastische Wandel des Frühlings, der ist nur kurz, und kein Auge ist rasch genug, all seine Schönheit zu fassen. Jetzt muß man täglich durch Gärten und Alleen, durch die Parke gehen, um das schimmernde grüne Meer zu betrachten, das sich immer ähnlich und niemals sich gleich ist. Schon sind viele Bäume ganz voll in sattem, tiefem Grün, und daneben strecken andere ihre nackten Zweige aus, nur mit dünnen schillernden Punkten besetzt. Helles fast weißes Grün, golbraunes und bläuliches stehen nebeinander, und dazwischen rieseln hier und da schneeige Blüten über einen dichten Strauch.

Dann sind Bäume da mit saftstrotzenden, in großen Bogen aufwärtsstrebenden Zweigen, die an den Spitzen gelbe fedrige Nester tragen, andere, deren aufbrechende Blätter wie kleine Zelte auf den Zweigen hocken. Akazien mit ihren schwarzgrauen langnarbigen windenden Stämmen und dem dünnen feinen Gezweig, das die kleinen zarten Fiederblätter trägt.

Dann sind Kastanien da, mit weißen Flecken durchwoben, und irgendwo auf weitem Rasen steht eine Kastanie allein, ihre Krone ist voll und schwer, ihre Blüten sind rot wie das Fleisch der Wassermelone, ihre dichte Decke leuchtet wie das Fell eines bunten Raubtiers.

Unendlich ist der Wechsel der bunten Baumkronen, da sind welche dicht und undurchdringlich, ihre kuglige Form ist ganz deutlich weithin zu sehen; dann gibt es andere, die sind so leicht und licht, daß man garnicht erkennen kann, ob die Zweige auf uns zukommen oder sich wegwenden. Nur der große Umriß ist deutlich, das andere ist nur ein Farbenton, zart und dünn wie ein durchsichtiger Stoff. Der blaßblaue dunstige Himmel scheint hindurch und die leuchtende weiße Wolke. Dann gibt es Kronen, die sind zusammengesetzt aus lauter kleinen grünen Kuppen,

immer Tal und Berg in gleichmäßigem Wechſel. Andere ſehen aus, wie wenn die ſchwere Blätterdecke zerriſſen wäre und in großen unregelmäßigen Stücken auf die unteren Zweige herabgeſunken, und wo die Ränder klaffen, ſind dunkle tiefgrüne Höhlen, in denen die ſchwarzen Stämme ſichtbar werden.

Aber die Bäume bleiben nicht gleich, ſie wechſeln, indem wir um ſie herumgehen und wir die Sonne hinter uns, vor uns oder zur Seite haben. Eine Wolke deckt grauen ungewiſſen Schatten über einen Baum, ſeine Farben werden ſtumpfer und die Schatten milder, ihre Grenzen weniger ſcharf, die Form verliert an Klarheit. Manchmal iſt das ſchade, manchmal aber bringt ſolcher Wechſel einen neuen Reiz, das Ganze wird feiner und dämmriger. Regeln gibt es da nicht, wer hinſieht, ſpürt es auch ohne Regel. Ein raſches Auge gehört auch freilich dazu, unaufhörlich wechſeln die Töne und Schattierungen. Und da wir ja meiſt uns ſelber beſtändig bewegen, ſo iſt der Wechſel unendlich. Man redet wunderlicher Weiſe ſo oft von »der« Natur, als ob das etwas Feſtes, Unveränderliches wäre, redet von Naturalismus: der Kunſtweiſe, die die Natur nimmt, ſo wie ſie iſt. Aber ſo redet nur jemand, der nie recht hingeſehen hat, ſonſt müßte er wiſſen, daß Natur nie ſtille hält, um ſich nehmen zu laſſen. Gehen wir auf einen Baum zu, und ändert ſich auch die Sonne während dem nicht, wirft auch keine weiße Wolke plötzlich ein neues Licht, der Baum wird doch mit jedem Schritt ein anderer. Zuerſt ſehen wir nur den Umriß, eine gleichmäßig ſchimmernde Farbe und unten den Stamm. Wir kommen näher, die Farben werden lebhafter, was vorher eine Farbe ſchien, löſt ſich in Flecken auf von verſchiedenen Tönen, die Form ändert ſich, der Baum wächſt immer mehr in die Höhe, je näher wir kommen, um ſo fühlbarer und eindrucksvoller wird das Überragen. Die wolkige Form der Krone löſt ſich auf, einzelne Zweigbüſchel heben ſich heraus, die Zweige, die vorher alle in einer Ebene zu liegen ſchienen, die breiten ſich jetzt vorwärts und rückwärts. Und nun haben die Zweige neue Farben bekommen, man ſieht die Rinde des Stammes, ja die einzelnen Blätter. Und nun iſt es ein ganz anderes Weſen, als das, welches wir vorhin von weitem ſahen.

Aber damit iſt nur das Notdürftigſte geſagt, noch nichts von dem wundervollen unvergleichlichen Erlebnis, wenn ſolch ſchimmernder Rieſe langſam über unſer Haupt zu wachſen ſcheint und langſam, langſam ſeine grauen Äſte glänzende farbige Arme werden, und ſein lichter Schein ſich in Tauſende von leuchtenden Blättern auflöſt.

Wir gehen auf eine Eiche zu. Vergeſſen wir all den törichten Singſang von Eichen ſtolz und kühn: dümmere Worte konnte der blinde Sänger kaum wählen. Knorrig und eigenwillig iſt die Eiche, kraus im Laub, bizarr ja beinahe fremdartig, wie ein Baum auf einer japaniſchen Zeichnung, wie ein Tier aus einem fremden Land. Daß ſie bei uns heimiſch iſt, ändert daran garnichts. Hier iſt ja nur von ihrem Ausſehen die Rede.

Erlen in Pillnitz

Und das iſt wunderſam, wirr herb, faſt feindſelig, grauenerregend, geheimnisvoll, ein Baum ſtarker unheimlicher Mächte. So iſt er im Sommer, aber jetzt iſt er ganz anders. Das krauſe Gewirr der ſchweren Äſte breitet ſich weit, unſer Baum bildet beinah eine flache Kuppel mit unmerklicher Spitze, und um das dunkle Gezweig ſchwebt ein goldiges durchſichtiges Gewand, welches aus dem ſchwarzen Geäſt hervorzubrechen ſcheint. Kommen wir näher, ſo ſcheinen leuchtende gelbe Feuer die Zweige zu beſäumen. Und gehen wir zum Stamm, ſo ſchwebt über uns eine breite Krone von ſchwarzem Dorn, aus dem tauſend Flammen brechen, die wundervoll auf dem tiefblauen Himmel erglänzen.

Eine große Baumgruppe, die Rieſen ſtehen in weiten Abſtänden und breiten ungeheure Äſte, aber die äußeren neigen ſich mehr zur Seite, denn die Blätter drängen zum Licht, und ſo können ſich die mittleren beſſer ausdehnen. Das Grau der Stämme erglänzt matt in der Sonne vereinzelte Schatten der Äſte ſcheinen ſchwarz. Alle Bäume ſcheint gleichmäßig eine gemeinſame Decke aus leichtem Gezweig zu decken, und daran hängen die Schwärme der Blätter, die ſind glatt und ganz golden. Sie hängen an langen, dünnen, biegenden Stielen, und der leiſe Windhauch bewegt ſie unaufhörlich, und darum ſcheinen ſie bald braun, bald gelb, ein einziges ſchimmerndes, niemals ruhendes Gerieſel von lichtem Gold, das wie ein leuchtender Schleier den blauen Himmel überzieht.

Dann kam ſchwerer Regen, die Blätter wuchſen, und nun iſt das goldene Meer grün und ſilbern geworden.

*

(Aus einem Aufſatz über Abendfarben in der Großſtadt.)

. . . Und über dem allem der dunkel glühende Himmel. Er iſt ganz düſter unterdes geworden. Aber — ein neues Wunder — ſeine Farbe, die kaum noch blau iſt, hat eine wunderbare tiefe leidenſchaftliche Glut. Man ſtaunt immer von neuem, daß Dunkelheit ſo mächtig ſein kann.

Nach einer Stunde iſt der Himmel ganz ſchwarz, nur das leiſe Funkeln der Sterne, oder der lebhafte Glanz eines Planeten durchbricht die dunkle Decke. Alle Häuſer ſind grell von unten beleuchtet. Merkwürdige Lichtkanten bilden ſich an den Geſimſen und Konſolen. Die Lichtkreiſe der Laternen teilen die Straße. Das junge Frühlingsgrün der Baumreihen dämpft das gelbe Licht und webt grüne Schleier; ſchreiten wir auf eine Laterne zu, ſo wird das Grün immer greller, bekommt einen merkwürdigen leuchtenden Ton, der wunderbar gegen die dunkle Straße wirkt. Die Baumſtämme ſind ganz dunkel, aber die Blendung webt auch über ſie einen ganz leichten kaum merklichen Lichtſchleier. Dann aber kommt ein Baum direkt vom Gaslicht beſtrahlt, ſeine Rinde glänzt grau, faſt ſilbern, und nur wo die Rundung der Zweige ſich von uns weg biegt, an den Konturen iſt tiefes Schwarz. Ein Bild vom zarteſten Reiz, ganz »unnatürlich«, und doch Natur, vor allem aber Schönheit.

Narcissus incomparabilis Croesus

TH. HOOG jr. / NARZISSEN

UNTER den Frühlingsboten nehmen die Narzissen einen hohen Rang ein. Welcher Gärtner und Gartenfreund freut sich nicht jedes Jahr, wenn die gelben Trompeten das Kommen des Frühlings melden? Goldgelb ist noch immer die wirkungsvollste Farbe der Narzissen. Wenngleich die größten Fortschritte bei den kurzkronigen Varietäten gemacht worden sind, im Freien sprechen die satt gelben Farbentöne am meisten an. Narzissus-Varietäten kennen und schätzen zu lernen, erfordert liebevolles Studium. In einer Gärtnerei wirkt ein Überblick über das Narzissenviertel etwas monoton; Tulpen, Krokus, Hyazinthen sprühen in glutvollerem Farbenleben; die Töne der Narzissen schwanken dagegen zwischen Gelb und Weiß. Ganz anders aber ist es, wenn man Narzissen abschneidet, mit nach Hause nimmt, und die Blumen, in Wasser gestellt, beobachtet. Die Farbe vertieft sich, die Blumenblätter breiten sich aus, und die Blüte entfaltet erst so recht ihre volle Kraft, während die anderen Blumenzwiebeln meist schon im Freien den höchsten Grad ihrer Schönheit erreichen. Vielleicht erklärt dieser Umstand, daß gerade um die Narzissen in England sich ein solcher Kultus gewoben hat. Sie drängen sich uns nicht auf, man muß lernen, sie zu schätzen.

Es wäre gänzlich unmöglich, alle bekannten Varietäten aufzuzählen, sind doch allein in England über dreitausend Sortennamen veröffentlicht worden. Ferner wird in Holland, Australien, Neuseeland gearbeitet, um die Blume noch zu vervollkommnen. Ich will heute aus den verschiedenen Gruppen nur einige der bestbekannten und einige Neuheiten hervorheben.

Man teilt die Narzissen, wie bekannt, vom gärtnerischen Standpunkte in folgende Gruppen ein: Zunächst die Trompeten-Narzissen, deren Typ Narcissus Pseudo-Narcissus ist; bei ihnen ist die Nebenkrone ebenso lang oder länger, als die Perianth-Abschnitte. Dann folgen die an N. incomparabilis sich anschließenden Formen, deren Nebenkrone ein Drittel bis über die Hälfte der Länge der Perianth-Abschnitte erreicht. Ihr schließen sich an die Formen der Hybride N. Barrii, deren Nebenkrone kürzer als ein Drittel der Perianthabschnitte und immer gelb oder orange gefärbt ist, während bei den N. Leedsii-Formen die ähnlichen Nebenkronen immer weiß oder gelblich, nie rot oder orange sind. Die als Fasanenauge bekannten N. poeticus-Sorten haben ein weißes Perianth mit ganz kleiner roter Nebenkrone. Die Polyanthus-Narzissen oder Tazetten (N. Tazetta) tragen am Blütenstengel 8 bis 15 kleinere Blumen, ebenso die Hybriden des N. poeticus mit der letzten Gruppe, die N. poetaz-Formen. Dann unterscheidet man noch die gefüllten Narzissen, und schließlich die eigentlichen Wildarten.

Enchantress

Die Gruppe der *Trompeten-Narzissen* gliedert sich gleich-

Platane in Eisgrub

ſam ganz von ſelbſt in drei Untergruppen: die gelben, die weißen und die zweifarbigen. Unter den *gelben* Trompeten-Narziſſen ſei als erſte die Sorte Golden Spur erwähnt, eine ſehr reich und früh blühende Form, die maſſenhaft zum Treiben verwendet wird. Gleich nach ihr kommt Emperor; die Blume iſt etwas größer und der Stengel höher. Beide ſind zum Verwildern ſehr geeignet. King Alfred iſt die dritte, gleich wertvolle Sorte mit großen, dunkelgelben Blumen, ebenfalls gute Treibſorte. Ganz neu iſt Apotheosis mit zart gelben Blüten. Dawson City wirkt wie ein verkörpertes Ideal dieſer Gruppe in den ſchönen Verhältniſſen ihrer auf hohem Stengel ſtehenden Blumen. Lord Wellington iſt ein Rieſe unter Rieſen. Citronella zeigt ein ſehr apartes feines Zitronengelb. Unter den *weißen* Trompeten-Narziſſen gibt es noch immer keine große Auswahl. Die bekannteſte Sorte iſt Mme. de Graaff mit ziemlich kleinen weißen Blumen, etwas ſchwach wachſend. Sulphur Beauty iſt kein rechter Name für eine zukunftsreiche Form dieſer Gruppe: die Sorte iſt faſt weiß mit etwas rahmfarbenem Perianth. Die ſchönſte reinweiße iſt Mrs. Erneſt H. Krelage, die weite Verbreitung verdient. Stolberg ſteht in der Mitte zwiſchen den Trompeten-Narziſſen und der Leedsii-Gruppe, da die Trompete kürzer iſt; dieſe Sorte öffnet die Blüten ſchwefelgelb und verblüht ſchneeweiß. White Knight hat etwas kurzen Stengel, doch ſchneeweiße Blumen.

Narcissus incomparabilis Lioba

Von den *zweifarbigen* oder bicolor-Narziſſen iſt die altbekannte princeps jetzt überholt. Ähnlich iſt ihr Cervantes, ihre Blumen ſind klein, erſcheinen aber früh und ſind zum Treiben wertvoll. Empreß iſt ein ſchönes Gegenſtück zu Emperor und zur Zeit wohl die am weiteſten verbreitete und beliebteſte der bicolor-Narziſſen neben Victoria, die zart nach Vanille duftet. Eine neuere Sorte iſt Glory of Saſſenheim, deren Treibwert ſehr groß iſt, da die Blume ſich tadellos öffnet. Grandee iſt für den Garten wichtig, da ſie ſehr ſpät blüht und ſomit die Blütezeit verlängert. Mrs. John Hoog iſt eine kräftige, blütenreiche Neuheit mit üppigem langem Stiel und kurzer, gut geöffneter, primelgelber Trompete mit weißem Perianth. Ferner ſeien noch erwähnt Spring Glory und Van Waveren's Giant, die beide wüchſige Pflanzen mit großen Blumen geben.

In den achtziger Jahren wurde in Wales wildwachſend ein Narziſſus gefunden, der von dort aus verbreitet wurde und noch immer eine der beſtbekannten der *incomparabilis*-Narziſſen iſt, die Sorte Sir Watkin. Es iſt dies eine ſtarkwüchſige Varietät mit gelber Nebenkrone und kurzer, rot angehauchter Trompete. Die Pflanze iſt widerſtandsfähig und eignet ſich trefflich zum Verwildern. Erſt kürzlich ſind einige Verbeſſerungen in den Handel gekommen: Helios und Fortune, welch letzte ihrem Beſitzer ein kleines Vermögen eingebracht hat; für den Garten werden aber beide erſt nach längerer Zeit Verwendung finden. Whitewell, ein holländiſcher Sämling, wird die Erinnerung lebendig halten an den Wohnſitz eines der beſten engliſchen Narziſſenkenner, den leider verſtorbenen Reverend J. Jacob. Das Perianth der Sorte iſt ſchwach gelblich, im Verblühen weiß, mit orangefarbener Nebenkrone. Lioba iſt eine Verbeſſerung mit größeren Blumen und chromorangefarbener Nebenkrone mit ſcharlach getöntem Rande. Die Sorte Bernardino kann mit ihrem rahmfarbenen Perianth und der breiten, aprikoſenfarbenen Nebenkrone als ſchön gelten. Auch Croeſus iſt apart mit dunkelgelbem Perianth und leuchtend roter Nebenkrone. Die Färbung von Homespun iſt faſt rein goldgelb, und die mehr bekannte Lucifer hat lange, rückwärts gebogene weiße Kronabſchnitte und kleine rote Nebenkrone. Will Scarlet, weiß mit großer feurig orangeroter Krone, iſt die Mutter vieler neuer Sämlinge, die den Kopf nicht mehr ſo hängen laſſen, wie beiſpielsweiſe Invincible, Enchantress und andere.

Bird of Paradise

Unter den Narcissus *Barrii*-Formen iſt die beliebteſte Conspicuus, eine reichblütige, anſpruchsloſe Narziſſe mit mäßig großen, gelb und roten Blumen. Schön iſt Red Beacon in ihrem Weiß und Feurigrot. Lady Moore iſt in Holland berühmt geworden, da ſie ſich leicht früh treiben läßt, während in Brightling eine neue Richtung ſich anzeigt mit bis drei Centimeter breiter, flacher Krone von leuchtend roter Farbe und dunkelgelbem Perianth.

Die Narcissus *Leedsii*-Formen ſind ſehr elegant mit großem, weißem Perianth und ganz kleiner, weißer oder rahmgelber Nebenkrone. Sie ſind beſonders als feine Schnittblumen beliebt. Altbekannte Sorten ſind Mrs. Langtry und M. M. de Graaff; als Verbeſſerungen können gelten White Lady und Queen of the North. Dieſe letzte iſt ſehr gut und reichblühend und trägt auf langem, ſchlankem Stengel

Narcissus Johnstoni Queen of Spain

Poeten-Narzissen und Tazetten hervor. Sie bilden eine neue, widerstandsfähigere Kulturrasse, die nicht den starken Duft der Tazetten besitzt. In Töpfen lassen sie sich von Mitte Januar an zur Blüte bringen. Einige gute Varietäten sind: Admiration, gelb mit lebhaft orange Kronenbecher; Elvira, weiß mit gelb, aus ihr ging die reizende neue Cheerfulness hervor, mit weißen gefüllten Blüten, die in der Mitte einige kleine gelbe Blättchen tragen; Klondyke, tief primelgelb; Laurens Koster, weiß mit orange; Orange Cup, zart rahmfarben mit orange, am Rande zierlich gekraußt; Mignon, eine Neuheit mit weißen Blüten und lebhaft orangeroter Nebenkrone; Red Guard, eine neue Zukunftssorte, deren dunkelgelbe Blüten ein leuchtend scharlachrotes Auge zeigen, welche Farbe sich eigentümlicher Weise auf dem Perianth fortsetzt und allmählich in Gelb übergeht.

Unter den *gefüllten Narzissen* gibt es außer den bereits genannten noch viele gute Sorten. Bekannt sind unter den Trompetennarzissen Van Sion Double (Telamonius plenus) und gefüllte incomparabilis-Formen. Holland's Glory ist eine gefüllte Emperor mit zart gelben, am Rande etwas blasseren Blumen, die an die einer Camellia erinnern. Argent ist weiß mit gelb, Butterfly zart gelb, Twink weiß mit orange. Mary Copeland ist eine neuere Sorte, bei der die papierweiße Grundfarbe mit kurzen orange Blättchen wechselt.

Zum Schluß seien noch einige wilde Narzissen genannt; nicht solche, die durch Kulturformen überholt sind, sondern einige kleine Arten. Sie werden am besten im Alpinum an einen recht warmen, sonnigen Platz gesetzt. Narcissus Bulbocodium, eine Art, die zuweilen als Gattung Corbularia von Narcissus abgetrennt wird, da bei ihr die Perianthabschnitte auf schmale Lappen reduziert sind, während die trompetenartige Nebenkrone unverhältnismäßig groß ist, ist in drei Farben vertreten: der gelbe Typ stammt aus Portugal, die schwefelgelbe und schönste Varietät, var. citrinus, aus den Pyrenaeen, und die reinweiße, empfindlichste var. Clusii oder monophyllus ist eine Form aus Algier. N. cyclamineus aus Portugal gemahnt in den Blüten an ein Cyclamen, da die Perianthabschnitte zurückgeschlagen sind und nicht im rechten Winkel zur Trompete stehen. Sie sind neben N. triandrus albus gut im Steingarten zu verwenden.

große Blumen mit breitlappigem, weißem Perianth. Als Riesen-Leedsii (Giant Leedsi's) gehen Sorten mit größerer, mehr trompetenähnlicher Krone, wie Lord Kitchener, White Queen, Her Grace; sämtlich mit anfangs blaß schwefelgelber, weiß verblühender Krone und fein gekraußtem Rande.

Die *Poeten-Narzissen* oder Fasanenaugen, Narcissus poeticus und Verwandte, stammen aus der Mittelmeer-Region, wo sie in Gebirgswiesen oft massenhaft auftreten. Die typische poeticus ist spätblühend und hat daher im Garten große Verbreitung gefunden. Eine schöne gefüllte Form ist var. plenus, deren schneeweiße Blüten in der Mitte einige kleine aprikosenfarbene Blättchen zeigen. Eine Form, die weite Verbreitung verdient, ist Ornatus, ebenso gut für Treiberei, wie für Massenanpflanzung im Freien. Als schöne weiße, gefüllte Sorte sei noch Silver Wing erwähnt.

Die *Tazetten* oder *Polyanthus-Narzissen*, N. Tazetta, tragen Dolden von 6 bis 10 oder mehr kleineren, kurzgestielten Blumen. Sie sind fürs Freiland weniger geeignet, da sie aus noch südlicheren Gebieten, von den kanarischen Inseln, aus Süd-China und Süd-Japan, stammen. Für die Treiberei sind sie dagegen recht wichtig. Die bekannteste Form ist Paper White (papyraceus oder totus albus grandiflorus), die im Süden massenhaft gezogen wird und sich im Zimmer ohne Mühe vom November ab zur Blüte bringen läßt. Die Blumen sind weiß mit kleiner, elfenbeinfarbener Krone. Ein Gegenstück dazu ist Grand Soleil d'Or mit dunkelgelbem Perianth und zart gelber Krone.

Die *Poetaz-Narzissen*, N. poetaz, gingen aus Kreuzungen zwischen

J. HEMPELMANN / KONIFEREN VON AUFFALLENDEM WUCHS

DER Gehölzfreund, der in seinem Park sein lebendes Museum seltener Baumformen erblickt, findet sie interessant, diese bizarren Wuchsformen von Abies, Picea und ähnlichen; der bequeme Gartengestalter erledigt sie mit blasierter, wegwerfender Geste — dem ernsthaften Gartengestalter aber sind sie Anreiz zur Betätigung seiner Phantasie.

Und wirklich, sie verdienen Beachtung von seiten des Gartengestalters. Gerade heute, vor allem im streng geformten Raumgarten sind sie ein wertvolles Mittel, durch ihre bizarre Formensprache Leben und Bewegung in die Gartenräume zu bringen — besonders im Winter. Im Steingarten greifen wir gern zu den bizarren Zwergformen wie von Juniperus, Chamaecyparis, Thuja, um das Strenge der Mauern und Terrassen im Winter, wenn das üppige Blühen und Wuchern der Stauden fehlt, zu unterbrechen. Warum sollen wir da nicht auch die größer werdenden Formen verwenden? In alten Anlagen, die nicht selten wahre Prachtexemplare bergen, genügen oft wenig umfangreiche Heckenpflanzungen als Hintergründe, Kulissen oder Bögen, um ihre bisher zerflatternde Wirkung zu konzentrieren. Das ist ja gerade der Fehler, daß man sie inmitten einer falschen, unruhigen Umgebung setzt. Ihr monströses Astwerk verlangt ruhige Hintergründe: den freien Horizont, farbigkontrastierende Hecken, Mauern und dergleichen.

Ergänzung und Steigerung der Wirkung wird durch die Verbindung mit guter Plastik erzielt.

Es gibt viel mehr solcher bizarrer Erscheinungen, als man im allgemeinen anzunehmen geneigt ist. Die Goldlärche, Pseudolarix amabilis oder Kaempferi, streckt gern ihre Äste gleich tastenden, zitternden Greisenfingern von sich. Sie gemahnt dabei an manche Cedern, vor allem die Cedrus atlantica-Formen. Cedern sind aber im allgemeinen sehr malerisch und verbinden mit der Eigenart der Wuchstracht die Besonderheit der Blattfärbung. Picea pungens pendula kann in ihrer Formengebung wie fast alle diese Varietäten recht wechselnd sein. Bald strebt sie ziellos seitwärts und aufwärts, phantastische Formen bildend, die vor

dunklem Hintergrund durch das Silbergraublau ihrer Zweigſpitzen noch gehoben werden. Bald iſt ſie ſteifer aufrecht und reicht kurze Äſte breit tatzenartig herab. Zu barocken Geſtalten von wunderſamer Eigenart wächſt ſich Picea exelsa inversa aus. Bald ſind es förmliche Waſſerfälle von glitzerndem Grün, bald hat man den Eindruck mächtiger vorweltlicher Tiere, wie eines Mammut, bald löſt ſich das Ganze in ſtarker maleriſcher Unregelmäßigkeit auf. Es gibt aber unter den pendula-Formen der gemeinen Fichte vielleicht die groteskeſten Geſtalten, die wir unter derartigen Varietäten kennen.

Die Trauerform unſerer Weißtanne, Abies alba oder pectinata pendula, läßt zumeiſt ihre Zweige in willkürlicher Unregelmäßigkeit zur Erde fallen. Dagegen baut ſich die Hängevarietät der ſpaniſchen Tanne, Abies Pinsapo pendula, gewöhnlich ſtrenger und

Vor dem dunklen Heckenhintergrunde treten die ſo hübſch bewegten Linien der Picea pungens glauca pendula mit der „Aſſyriſchen Tänzerin“ beſonders günſtig in Erſcheinung.

Die kurz- und dichtbezweigten Äſte von Picea Alcockiana unterſtützen das Linienſpiel des „betenden Knaben“, ein ſchlichter Heckenbogen umrahmt harmoniſch das Bild. (Skizzen Hempelmann.)

regelmäßiger. Auch von der Nordmannstanne, A. Nordmanniana, treffen wir gelegentlich eine pendula-Form in unseren Gärten an; ebenso von A. sibirica. Dichter, buschartiger wirken die Eibenformen mit hängender Tracht, Formen von Taxus baccata pendula, wie zum Beispiel var. Dovastonii, deren Hügelbüsche recht massiv wirken.
Von Natur hat eine hängende Tracht Picea Breweriana. Sonst sei von Fichten noch P. canadensis pendula hervorgehoben. Bei Tsuga canadensis pendula, der Hemlocktanne, rieselt der Zweigmantel in feierlichen Linien zur Erde. Anders wirken die Formen der Lebensbäume und Scheincypressen. Eine der bekanntesten ist Chamaecyparis nootkatensis pendula, die Sitkascheincypresse, mit ihrem steifen Zweigfall. Ferner natürlich die Formen der Lawsoncypresse, Ch. Lawsoniana, wie pendula und intertexta. Zierlich sind die hängenden Zweigfäden der Ch. pisifera filifera. Ganz ähnliche Formen wiederholen sich bei Thuya occidentalis und Th. (Biota) orientalis. Unvollständig wäre diese kurze Aufzählung, wenn wir nicht den Trauer-Mammutbaum, Sequoia gigantea pendula, noch anführen würden, diese überschlanke Erscheinung, die bereits in Band V, Seite 32, im Bilde gezeigt worden ist.
Aufgabe des Gartengestalters ist es, diese individuellen Dinge zu entdecken und zur rechten Wirkung zu bringen. Wo hat man es beispielsweise versucht, zur Seite eines steingefaßten Wasserbeckens Picea excelsa inversa zu setzen, anstatt die üblichen Trauerbuchen oder Trauerweiden? Es gibt mindestens dieselbe Wirkung. Welche andere Baumart übertrifft in der Wirkung eine Allee von Picea Breweriana, Alcokiana, Chamaecyparis nootkatensis pendula, vielleicht noch begleitet von dunklen Taxuswänden? Es gilt, die herkömmlichen Wege zu verlassen und von dem so vielseitigen Werkstoff, den wir haben, Gebrauch zu machen.

Schlanke Koniferen, Hecken und Plastik gewinnen durch die Silhouette der hängenden Weißtanne, Abies pectinata pendula, derart, daß sich ein Bild ergibt, dessen Eindruck nachhaltig ist. – Bilder Stipp.

KARL FOERSTER / PFLANZE UND REISE

DER Deutsche besitzt so viel wichtige Eigenschaften, deren er sich nicht bewußt ist, und glaubt sich im Besitze vieler Eigenschaften, die er eigentlich gar nicht hat; er hält sich zum Beispiel für blumenliebend, wie aber ist das zu vereinigen mit dem Eindruck fast völliger Blumenlosigkeit, den man so häufig bei D-Zug-Fahrten über einen ganzen Tag hinweg während langer, früher oder später Monate des Jahres haben kann, indem noch oder schon Zeit für unermeßliches Blumenleben der Gärten ist.
Mitte September fuhr ich von Berlin nach Aachen; stundenlang keine Blume! Wo sind eigentlich Blumengärten? fragte man und begann allmählich ganz eigentümlich unter der Blumenlosigkeit zu leiden. Sah man Blumen, wenn auch nur ein paar häßliche Dahlien am Bahnhof, so wirkten sie doch als Fanale der Lebensfreudigkeit weit über alles das hinaus, was sie unmittelbar ausstrahlten. Das Fehlen von Blumen dagegen wirkte nicht blumenfremd, sondern blumenfeindlich, lebens- und geistfeindlich, weit über die Wirkung hinaus, die man dem Fehlen von Blumen zutraut und zuschreibt. Der Eindruck einer dumpfen Mittelalteratmosphäre entsteht. Man wird ganz ausgedörrt von Blumenlosigkeit und stellt von Stunde zu Stunde immer wieder überrascht diesen jammervollen Mangel fest, diese erdgebundene, Mittel und Zwecke verwechselnde Lebensängstlichkeit, für die es gar keine Deutung als Trägheit gibt. Überall wohnen Pfarrer und Lehrer und werden durch jenen Mangel an Erhöhung und Verschönerung des äußeren Weltanblicks in den Verdacht gebracht, daß ihre Pflege des inneren Menschen ungeheuerste Hilfsmächte der äußeren Welt verkennt.

Vorfrühlingsblumen vom D-Zug-Fenster aus

SCHNEE kann man wirklich erst in den Alpen verstehen lernen. Die verschneite Alpenwelt wird uns allmählich vom Tal bis zur Höhe so vertraut und gemütlich, als wären wir Eiszeitmenschen. Aber das Hinabsteigen Ende März-Anfang April in den beginnenden Frühling der Täler oder des Südens gehört zu den ergreifendsten Erlebnissen, die ein Leben umleuchten. Vier Gewächse spielen hierbei die Hauptrolle. Die niedrige gelbe Polsterprimel, Schneeheide, Leberblümchen und Crocus. Wer diese gelbe, niedrige Kissenprimel, die schon wochenlang vor den hohen Schlüsselblumen blüht, einmal Ende März, aus der Höhe kommend, im oberen Tal des Rheins oder Tessins in Blüte sah, stundenlang mit der Bahn an den gelben Polstern vorbeifahrend, möchte sie in seinem Garten nicht missen. Sie ist außerdem noch die zuverlässigste und anspruchsloseste sämtlicher Primeln. Von welchem Glanz ist solche Blume

Unter den blauen einfachen Hyacinthen gibt es sehr feine Schattierungen. Unser Bild zeigt die Sorte Grand Monarque. Als eine der besten Sorten für Beete gilt die bekannte Queen of the Blues mit ihren wundervoll cambridgeblauen Blütenständen. Prächtig porzellanblau ist Lord Derby. Unter den dunkelblauen steht King of the Blues voran, deren Ton man als oxfordblau kennzeichnet. Bild C. S.

Die Zahl der guten einfachen gelben Hyacinthen ist nicht allzu groß. Das Bild zeigt das bleiche Gelb der Sorte City of Haarlem. Eine sehr verbreitete Varietät ist Yellow Hammer, deren Ton viel goldiger ist. Ins Primelgelbe leitet Primrose Perfection. Als reinste gelbe Sorte gilt King of the Yellows, und ins Orangerötliche spielt der Ton bei Daylight. Bild L. Blok.

umwittert, die uns den Hauch ihrer paradieſiſchen Umwelt, ihrer Wildnisheimat in jeden Gartenfrühling hineinträgt. Wer einmal Anfang April aus Davos kommend, wo der Schnee noch knirſcht und dieſe kleine Primel als Topfpflanze für einen Frank das Stück verkauft wird, in den Frühlingsglanz des Tals bei Landquart hinunterfuhr, für den iſt dieſe Primel mit dem trunkenen Glanz dieſer paradieſeswarmen Stunden behaftet, mit der lachenden Bläue dieſer Fernen, mit einem Lebensduft, für den Jahrzehnte ſo kurze Zeiten ſind, wie ein kurzer reicher Halbtraum zwiſchen Nacht und Morgen.

Am höchſten ſteigt uns unter den früheſten Blumen die Schneeheide entgegen. Wenn Ende März plötzlich Tauwetter eintritt, alle Berge klein und häßlich werden, dann glimmt es auf abgetauten Südhängen überall zartroſenrot auf. An ſehr warmen Stellen kann das auch ſchon viel früher geſchehen, aber der eigentliche Haupt- und Vollflor beginnt erſt nach Mitte März. Da kann man vom Karwendel und Wetterſtein aus nach Süden einen ganzen Tag lang unterwegs ſein und wird immer wieder von der Schneeheide verfolgt, wobei es allerdings am Brenner eine längere Pauſe gibt. Die roſigen Neſter der Schneeheide fangen immer wieder unſer Auge und wecken einen kleinen Farbenſchreck. Das Roſa iſt ſo unwahrſcheinlich ſchön und ſtark. Niemals in den Bergwildniſſen ſah ich die Schneeheide in zuſammenhängenden Flächen, ſondern immer nur in kleinen geſonderten Polſtern und immer an beſonders prallſonnigen, trocknen oder felſigen Hängen und jedes Blumenpolſter, das ſo zwiſchen mürbem Geſtein und grauem morſchem Gras ſaß, hatte von Pflanze zu Pflanze beſondere Reize des Wachstums, der Färbung und der Höhenentwicklung. Das Auge ſchien auch in der Menge nie genug zu bekommen, und immer wieder entſpann ſich das grelle Roſenrot in neue Felſenhänge und wollte für ein beſonders leuchtendes Roſa, ein niedriges dunkles Polſter, eine Felsumſpinnung oder einen gutgewählten kleinen Zwergkieferplatz belebt ſein.

Es iſt erſtaunlich, wie auch in den ungeheuerſten Landſchaften ſich all die bewachſenen Wegränder und Vordergründe nicht ihr Recht an unſerm Auge nehmen laſſen, — gerade wie auch in den großen und ſeltſamen Schickſalen kleine Umſtände und Vordergründe des täglichen Lebens von ſo uneingeſchränkter Bedeutung bleiben.

Voll Spannung rodelt man mit dem D-Zug die ſchauervoll erhabene Felſentalſtraße nach Süden herab und ſucht in den Wegrandwildniſſen und Steinwänden dieſes alten Kreuzfahrerweges nach neuen Blumen- und Pflanzenanblicken. Aber Ende März iſts noch zu früh für den Reiſenden, der nach Oberitalien will. Deutſche Leberblümchen blicken treuherzig aus morſchen Blättern am Grunde ungeheurer Felſenwände, die ganz von Efeu umſponnen ſind, der hier in ſeinem Urelement iſt. Seltſam und rührend wirken hier frühe heimiſche Wildnisblumen in dieſen Gegenden, in denen Weltgeſchichte und Landſchaftsgröße in unergründlichem Bunde ſtehen. Ich ſehe noch die Schneeheideneſter an Felshängen des Vorberges, auf dem eine grandioſe Barbaroſſaburg mit gigantiſchen Ringmauern einem mitreiſenden Berliner die aufgeregte Bemerkung gegen einen andern entlockte: »Menſch, die Weltgeſchichte hat wirklich ſtattgefunden.« Im großartig verworrenen Gelände der Zufahrt auf den Gardaſee vergaß man über Ölbäumen und Cypreſſen lange die Schneeheide, bis ſie an den Felswänden oberhalb der Citronenplantagen des Gardaſeeufers wieder auftauchte und ſo recht den Doppelklang von Süd und Nord einleitete, der uns in Italien ſo oft überraſcht.

Spätherbſtchryſanthemum

FÄHRT man gegen Mitte oder Ende Oktober, von Norden her ganz Deutſchland durchreiſend, in die Schweiz, ſo findet man ſelbſtverſtändlich die Gärten blumenleer, obgleich überall ſpäte Chryſanthemum in Blüte und Knoſpe ſtehen könnten. Ich habe zwei Jahrzehnte an der Durchbildung und Bereicherung des eigentlichen Volksgutes winterharter Gartenchryſanthemum gearbeitet und die Kraft dieſer Staude erforſcht, eine reichliche Beherrſcherin der Spätherbſtgärten zu werden.

Die ſchönſten Oktober-November-Sorten in großer Mannigfaltigkeit könnten faſt überall in Deutſchland die Herbſtgärten bunt machen, lange nach dem Abfrieren der Dahlien und unabhängig von Wirkungen ſchlechten Wetters. Ein einzelner Dorfſchullehrer könnte Gärten und Friedhöfe einer ganzen Gegend mit ſo geringen Mühen und Koſten in dieſelbe wunderbare Spätherbſtblumenatmoſphäre hüllen, wie ſie zum Beiſpiel in all den Gartenorten des Zürichſee-Südufers zu finden iſt.

An jenen wunderbaren Gartenufern, die ſich ſtundenlang in unendlichem Wechſel hinziehen, kann die Novemberwelt abends in einer Farbenſchönheit liegen, wie man ſie bunter kaum in Süd oder Nord ſieht.

Alle Gärten und Friedhöfe leuchteten in milden Blumenfarben des Gartenchryſanthemums, überglüht von goldroten Herbſtlaubwipfeln zwiſchen dunkeln Wellingtonien, durchglänzt vom erſten Aufleuchten der elektriſchen Uferſtraßenlampen; und überall durch die Farbenwirrſale der Gärten blickten fönblaue, ferne, lichterbeſäte Uferwaldberge oder goldrote und blaßgrüne Seeweiten in die Gärten hinein; denn Lämmerwolken im grünen Abendhimmel waren orangegolden von unten angeleuchtet, wie dies der November ſo gern tut.

An einem paradieſiſchen Dämmergartenplatz des Örtchens Stäfa, in dem jeder Garten, außer den Gärten der Gärtner, an der Chryſanthemumfeier teilnahm, las man plötzlich die Worte: Hier wohnte Goethe 1787, hier entſtand das bekannte ungekannte Gedicht, das anfängt: »Und friſche Nahrung, neues Blut ſaug ich aus freier Welt«. Wir laſſen koſtbarſte Gebetrollen unſerer Hohenprieſter in ihren Truhen ſchlummern und laſſen Deutſchlands Spätherbſtgärten noch blumenlos liegen, obgleich die älteſte Gartenblume der Erde (die zwei Jahrtauſende im fernſten Oſten gepflegt, zu Goethes Zeit ins Abendland kam) grenzenlos willig und geduldig auf Einlaß wartet.

Dieſe Südufer des Zürichſees ſind die ſchönſte Zufluchtsſtätte dieſer edeln gutmütigen Pflanze geworden.

Ich bin ſo oft tagelang in all dieſen Orten auf Chryſanthemumjagd geweſen; in jedem Ort gabs in Gärten und Friedhöfen wieder andere Varietäten. Prachtvoll wirkte auf Friedhöfen die Verbindung rotbeeriger ſteinumſpinnender Cotoneaſter mit Chryſanthemum. Wie edel und reizvoll ſind all dieſe Friedhöfe, von wie urwüchſigem feinem Geſchmack bis faſt in jede Grabſtätte hinein. So begraben liegen zu dürfen, hilft denn doch das Glück des Lebens vermehren.

Bis zum ſpäten Abend ſuchten wir die Orte nach neuen Varietäten ab, um überall Einzelpflanzen aufzukaufen und gleich ins Auto zu legen; bis zuletzt konnten wir es auch nicht laſſen, mit den Autolaternen in Friedhöfe und Gärten hineinzuzüngeln, um ſpäte Blumenfarben aufzuſchrecken oder von ſchönen Büſchen noch ſchnell Blitzlichtaufnahmen zu machen. Die Bevölkerung verhielt ſich freundlich duldend, da man ja doch Geiſtesgeſtörte nicht reizen darf. Überall fiel wieder ein meterhohes, oft meterbreites Chryſanthemum auf, deſſen goldrotbraune Büſche in langen Reihen über Zäune hinwegragten und als Einzelpflanzen kleine Gärtchen beherrſchten, dann wieder als Nachbarn von Schneeroſen oder ſilbergrau geſchindelten Bauernhöfen aufleuchteten oder in See- und Nebelfernen hineinfeuerten. Dieſe Sorte blüht in den letzten Oktobertagen auf, iſt bis nach Bern hinüber verbreitet und kommt uns ſchon auf der Reiſe durch den Schwarzwald als einziger Abgeſandter der Schweizer Chryſanthemumherrlichkeit entgegen. Es muß nun durch längere Jahre hindurch auf ſein Verhalten auch in kühleren deutſchen Gärten geprüft werden, hat vorläufig den Merknamen Spätherbſtfeuer empfangen.

Chryſanthemum bei Blitzlicht aufgenommen

GUSTAV SCHWANTES / STAMMLOSE MESEMBRIANTHEMEN II

ZU den Entdeckungen, die ich im Laufe der Jahre an meinem Mesembrianthemum Salmii machte, gehörte auch die, daß dieſe Pflanze mit der echten Trägerin ihres Namens, die nach dem Fürſten Salm-Dyck, einem der berühmteſten Liebhaber und Kenner ſukkulenter Pflanzen in Deutſchland vor etwa hundert Jahren, genannt iſt, nicht das mindeſte zu tun hatte. Ja, was für eine Art war denn das, was ich ſeit Jahren unter jenem Namen geliebt und weit in Freundes- und Schülerkreiſe verbreitet hatte? Da ſetzte eine Arbeit ein, mit der ich noch heute nach bald fünfzehn Jahren beſchäftigt bin, die Reviſion der Sektion der Linguiformia, die man in Zukunft wohl eher als beſonderes Genus behandeln und Glottiphyllum nennen wird. Ich habe ermittelt, daß mein Mesembrianthemum Salmii vielleicht überhaupt keine reine Art, ſondern wie die meiſten Linguiformia unſerer Kulturen, die ſtets mit Artnamen bezeichnet werden, ein Kreuzungsprodukt iſt. Denn die Arten dieſer Gruppe erzeugen untereinander ohne Schwierigkeit Baſtarde, die ſich wie unvermiſchte Pflanzen leicht durch Samen vermehren laſſen. Und gerade die Selbſtſterilität iſt mit Schuld an der Vermiſchung, da ja ein einzelnes Individuum nie artechten Samen anſetzen kann, der Liebbaber aber in der Regel ſich von jeder Art zunächſt nur ein Exemplar zulegt, das dann bald durch Inſekten oder den Pinſel, durch Blumenſtaub der in ſeiner Nähe ſtehenden Verwandten gekreuzt wird. Ich darf jetzt behaupten, daß in den kontinentalen Gärten vielleicht überhaupt keine reinraſſigen Linguiformia mehr vorkommen; in England hat ſich mindeſtens eine Art, zum Glücke die ſchönſte von allen, erhalten. Um die zum Teil viel ſchöneren Stammarten unſerer Baſtarde wieder zu erlangen, muß man aufs neue wildes Material aus der Kapkolonie einführen, womit ſchon der Anfang gemacht iſt.

Mesembrianthemum calamiforme
Bild Karstens

Ich habe die Beſprechung der Linguiformia, die man auf deutſch vielleicht Zungenblätter nennen könnte, an die Spitze dieſer Betrachtung geſtellt, weil dieſe ſeltſamen Gewächſe mich perſönlich in die Welt der Mesembrianthemen einführten, aber auch deshalb, weil ich glaube, daß ſie ſich überhaupt vorzüglich zur Einführung in Weſensart und Kultur der intereſſanteren ſtammloſen Formen eignen, und zwar wegen der Leichtigkeit ihrer Kultur, wegen ihrer großen Blühwilligkeit, wegen der Größe ihrer Blumen und Früchte. Nun iſt die Formenmannigfaltigkeit der Gruppen und Arten der ſtammloſen Mesembrianthemen ſo groß, daß es ganz unmöglich iſt, hier auch nur annähernd einen die Haupttypen veranſchaulichenden Überblick zu geben; nur einige ſonſt für Anfänger, aber auch für Fortgeſchrittene gleich dankbare Gruppen ſollen hier noch in aller Kürze beſprochen werden.

Da ſind vor allem die wunderſchönen Arten der Rachenblätter, der Ringentia, die ſowohl wegen der Schönheit und Eigenart der Belaubung als auch wegen der prächtigen gelben Blüten weiteſte Verbreitung verdienen und zum Teil auch ſchon gefunden haben. Man betrachte das Bild der ſchönſten Art, des Mesembrianthemum tigrinum, um die Berechtigung des Namens zu verſtehen. Die von weißen Zähnen ſtarrenden Ränder der klaffenden Blattpaare, deren ſchön glänzend grüne Flächen überall mit ſchneeweißen Punkten und Linien gezeichnet ſind, erinnern in der Tat ſehr an einen ſich öffnenden, fürchterlich bewehrten Tierrachen. Bei dem ſehr nahe verwandten, auch ſehr ſchön gezeichneten Mesembrianthemum tuberculosum tritt zur Zähnung des Randes noch eine ſehr ausgiebige der oberen Blattfläche hinzu; dabei herrſcht zeitweilig an dieſer Art eine mehr rötlichbraune Färbung vor. Sehr ſchön in der Belaubung iſt gleichfalls Mesembrianthemum lupinum, nur daß die Blätter geſtreckt ſind und nicht ſo ſchön gezeichnet wie bei den vorigen. Dieſe drei Arten ſind die ſchönſten ihrer Gruppe; wenn im Sommer bis zum Herbſt die großen ſtrahlend hellen Blumen aus dieſen bizarr ſchönen Blattklumpen hervorbrechen, ſo bietet ſich uns ein Anblick von höchſter Eigenart, wie er dergeſtalt in der ganzen Sukkulentenwelt nicht wiederkehrt. Dabei ſind dieſe Prachtpflanzen ebenſo leicht aus Samen wie aus Stecklingen zu ziehen. Leider hat auch hier Baſtardierung vielfach ihre Eigenart verwiſcht; was bei uns von ihnen in Kultur iſt, ſind wohl nur Miſchlinge, aber es gibt Formen unter ihnen, die den Stammeltern faſt gleichen, ſo die Gartenform Mesembrianthemum tigrinum superbum, die dem reinen Mesembrianthemum tigrinum ſehr nahe ſteht und von ihm äußerlich kaum zu unterſcheiden iſt.

Eigenartige Formen und dankbare Blüher umſchließt ferner die Gruppe der Scapigera. Auch ſie ſind Pflanzen von leichter Kultur, durch Samen und Stecklinge ſchnell zu vermehren. Ihr ſchönſter Vertreter iſt nach dem Ausſterben des prachtvollen Mesembrianthemum albidum in unſeren Kulturen M. caninum, deſſen blaugrüne, gezähnte Blätter ſtark an die Rachenblätter erinnern. Aber die meiſt gelben, ſeltener lilafarbigen oder weißen Blüten der Scapigera ſtehen zumeiſt einzeln oder zu mehreren auf langen Stielen. Sie ſind zwar nur von mittlerer Größe, aber es gibt auch hier Arten, die wegen ihrer ſchönen Blüten weite Verbreitung verdienen, ſo das überaus anſpruchsloſe und kälteharte Mesembrianthemum vespertinum, das am Spätnachmittage ſeine ſehr ſchönen ſtrahlend goldfarbenen Blüten öffnet, deren Kronblätter in entzückend graziöſer Haltung angeordnet ſind. Schön im Blatt ſind die Arten Mesembrianthemum scapigerum und Mesembrianthemum multiceps, aber der Blattrand iſt bei dieſen nicht gezähnt wie bei Mesembrianthemum caninum. Eigenartiger iſt Mesembrianthemum rhomboideum, deſſen ſchief rautenförmige Blätter auf dunkelolivfarbenem Grunde weiß gezeichnet ſind. Dieſe Art wächſt ſehr gedrungen, blüht und fruchtet leicht und iſt eine der eigentümlichſten und dankbarſten Arten überhaupt.

Ganz anders als alle genannten iſt das ſchöne Mesembrianthemum calamiforme, deſſen große, zarte, hellgelbe Blüte ſich wirkungsvoll von den langen walzenförmigen graugrünen Blättern, die ſie umgeben, abhebt.

Einer der dankbarſten Blüher ſtellt ſich in Meſembrianthemum hirtum vor, dem Vertreter einer wiederum ganz anders organiſierten Gruppe (Genus Delosperma N. E. Brown). Aus einer fleiſchigen Wurzel treiben weiche, von Papillen ein wenig glitzernde Blätter hervor und ſtrahlend purpurlilafarbene Blüten von mittler Größe. Im Winter ſterben die oberirdiſchen Triebe gewöhnlich ab, und die Pflanze wird dann nicht ſelten als tot angeſehen und behandelt. Sie treibt aber im Frühjahr aus unterirdiſchen Teilen kräftige Zweige, die bald blühen. Dieſe Art hat auch als Freilandſommerblume im Garten eine Zukunft, da ſie als mehrmonatiger Sämling ſchon reich blüht. Im Herbſt kann man die Pflanzen ihrem Schickſal überlaſſen oder ſie auch in mildfeucht gehaltener Erde in einem froſtfreien Raum überwintern. Meſembrianthemum hirtum, das ich vor etwa zehn Jahren in Deutſchland einführte, wird, wie ich beſtimmt glaube, Meſembrianthemum pyropaeum (Meſembrianthemum tricolor) aus den Gärten verdrängen, da es leichter wächſt und nicht einjährig iſt wie dieſes. In ſonnigen Sommern entwickelt Meſembrianthemum hirtum einen zweimaligen ſehr ſchönen Blumenflor.

Meſembrianthemum veſpertinum
Bild Karſtens

Nun zum Schluß wenigſtens noch eine der zahlreichen Gruppen, die minder durch ihre Blüte als durch biologiſch ſehr merkwürdige Eigentümlichkeiten des Wuchſes Erwähnung verdienen, alſo nur dem Pflanzenliebhaber etwas bieten, der das Wachſen ſeiner Lieblinge bis ins einzelne mit Intereſſe verfolgt und ſich ebenſo ſehr an ihren ſeltſamen Vegetationsgebärden erfreut als an ihren Blüten und gegebenenfalls auch auf dieſe verzichtet. Es iſt die Sektion der Schnabelblätter (Roſtrata) oder das Genus der Ärmelblätter, wie man den Namen Cheiridopſis, den N. E. Brown in Kew der Gruppe gab, überſetzen könnte. Während eine große Anzahl von Meſembrianthemen den Gefahren der furchtbaren Trockenzeit dadurch begegnet, daß die Blätter zu mehr oder weniger kugeligen Gebilden zuſammengewachſen ſind und dadurch der Verdunſtung eine möglichſt geringe Fläche bieten, verhält ſich Cheiridopſis auf ſehr originelle Art ganz anders. Die Blätter, die dieſe Pflanzen am Beginne der Regenzeit treiben, ſind einigermaßen lang und ſchmal und am Grunde wenig miteinander verwachſen und ſpreizen weit auseinander. Am Beginne der Trockenzeit treibt jedes Blattpaar aber ein anderes, das weit ſtärker verwachſen iſt als die vorigen. Bei der Art, die die Eigentümlichkeit der Gruppe am beſten verſinnbildlicht, bei Meſembrianthemum cigarettiferum ſind die beiden Blätter faſt ganz miteinander verwachſen, nur die Spitzen ſind noch frei. Während der Trockenzeit laſſen nun dieſe zuſammengewachſenen Blätter in ſich ein Blattpaar von der Art der vorangehenden entſtehen; es wächſt aber nicht aus der ſchützenden Hülle der Trockenzeitblätter hervor, ſondern ſaugt dieſe allmählich aus, ſodaß ſie ſchließlich eine trockenhäutige Röhre um das ruhende Blattpaar bilden. An dieſer weißlichen Röhre ſitzen die nicht verwachſenen, gleichfalls vertrockneten Zipfel der Blätter, aus deren Vereinigung ſie entſtand, als winzige Anhängſel. Das ganze Gebilde ähnelt in der Tat dem Mundſtück einer Zigarette, was Alwin Berger veranlaßte, dem merkwürdigen Lebeweſen den zwar nicht gerade klaſſiſchen, aber um ſo treffenderen lateiniſchen Namen zu geben. Sobald der erſte Regen den Erdboden befeuchtet, treiben die ruhenden Blattpaare aus den trockenen Scheiden ihrer Vorgänger hervor; ſie ſind wegen ihrer viel ſtärkeren Oberflächentfaltung natürlich viel beſſer zur Atmung und Aſſimilation geeignet wie ſtark verwachſene Blattpaare.

Meſembrianthemum cigarettiferum. Links in Afrika gewachſen, rechts hier kultiviert, daher drei Blattgenerationen zeigend. Alle Bilder in natürlicher Größe

Rhipsalis Neves Armandi

Rhipsalis pachyptera

A. BERGER / STIEFKINDER DER KAKTEENFREUNDE: RHIPSALIS

Mit Recht erfreuen ſich die Kakteen der beſonderen Bevorzugung durch alle Pflanzenfreunde. Ihre ſonderbaren Geſtalten, ihre ſcharfe Bewaffnung, ihre herrlichen Blüten und ihre Anpaſſungsfähigkeit an unſere Kulturbedingungen werden ihnen immer eine große Zahl begeiſterter, ja leidenſchaftlicher Liebhaber ſichern. Über ſie will ich heute nicht reden, deſſen bedarf es glücklicherweiſe kaum mehr, wohl aber verdienen die Stiefkinder unter den Kakteen, daß auch für ſie einmal jemand eintritt und daß ihr Wert in die gehörige Beleuchtung geſetzt werde. Ich meine die Rhipsalis, dieſe vielgeſtaltigen, kleinblumigen Pflanzen, die nur ſo wenige kennen. Mir ſind nur wenige Gärten bekannt, wo ſie die gebührende Berückſichtigung finden und ſo zur Schau geſtellt ſind, daß ſie auch die Augen der Beſucher auf ſich lenken. Wo das geſchieht, verfehlen ſie nie Aufmerkſamkeit zu erwecken. Die meiſten Leute vermuten in ihnen gar keine Kakteen, da ihr Wuchs ſo ganz anders iſt, ſo zierlich und elegant, und da ihnen die Stacheln fehlen. Beſonders anmutig und intereſſant erſcheinen ſie, wenn den ſchlanken Sproſſen die zarten Blüten oder die kleinen kugeligen Früchte in Menge entſpringen. Die meiſten blühen zur tiefſten Winterzeit, wenn wir für jedes Blümchen doppelt dankbar ſind.

Die Rhipsalis ſind Baumbewohner, Epiphyten, wie der techniſche Ausdruck lautet. Sie haften auf den Stämmen und Äſten der Urwaldbäume, wo ihre Wurzeln zwiſchen Mooſen, Flechten, Farnen und anderen Epiphyten auf der riſſigen Borke Halt und Nahrung zugleich finden. Den Baum ſelbſt greifen ſie nicht an, ſie ſuchen nur etwas Licht und Luft, die ſie auf dem Urwaldboden nicht finden würden. Gelegentlich liefert ihnen auch eine Felswand eine willkommene Unterlage, über deren Oberfläche die Wurzeln mit der Zeit ein dichtes Netz ſpinnen, auf dem ſich allmählich kleinere Pflanzen, wie auf den Baumäſten einfinden, ſo daß zuletzt die eine der anderen Schutz und Halt gewährt.

Die Sproſſe der Rhipsalis zeichnen ſich durch eine große Mannigfaltigkeit aus. Eine größere Anzahl haben ſtilrunde Glieder, andere verſchiedenfach gekantete und wieder andere haben flache, oft ſehr breite Glieder, die denen mancher Phyllokakteen zum Verwechſeln ähnlich ſehen. Alle Arten treiben reichlich Luftwurzeln aus den Seiten, namentlich in der feuchten Luft eines Warmhauſes. Das iſt überhaupt der Platz, wo ſie am beſten gedeihen. Die feuchte Wärme und das gedämpfte Licht ſolcher Häuſer ſagen ihnen beſonders zu. In zu hellen Häuſern wachſen ſie jedoch trotz aller Wärme und Feuchtigkeit in der Luft nicht ſo üppig und bekommen auch ein blaſſeres, gelblicheres Ausſehen und nicht den ſchönen tiefgrünen, glänzenden Ton, der am beſten Zeugnis ablegt von ihrem Wohlbefinden. Sie ſind mit wenigen Ausnahmen ſtachelloſe Pflanzen und bedürfen der Stacheln nicht. Auf ihren luftigen Standorten kommen ſie ohne dieſe Wehr aus. Es genügt für ihren Lebenshaushalt, daß ſich das Waſſer, das vom Himmel fällt, in dem Subſtrat für einige Zeit hält, da die Sproſſe damit ſparſam umgehen. Ihre zarte Oberhaut ſorgt dafür, daß Waſſeraufnahme und Abgabe im Gleichgewicht bleiben.

Am beſten befinden ſich die Rhipsalis, wenn man ihre Behandlung den natürlichen Verhältniſſen anzupaſſen ſucht. Zu Topfpflanzen eignen ſie ſich nach ihrer ganzen Weſensart nicht. Sie wirken in Töpfen auch nur unſchön und gänzlich unnatürlich. Sie ſind keine Erdpflanzen. In Töpfen habe ich ſie nur als kleine Stecklinge gehalten. Das Pflanzmaterial iſt dabei ziemlich belanglos. Es genügt etwas Sphagnum oder anderes Moos, das man mit ſcharfem Sand, kleinen Torf- oder Lauberdebrocken vermiſcht oder auch rein verwendet. Die Hauptſache iſt eine mäßige Feuchtigkeit und gleichmäßige Temperatur. Sie bewurzeln ſich leicht und in kurzer Zeit.

Zu Stecklingen eignen ſich alle Abſchnitte, kleinere oder größere. Sehr oft laſſen ältere Pflanzen kleine Aſtſtücke fallen, ohne dabei krank zu ſein. Es iſt das ihre vegetative Vermehrung, mit der ſich die Natur hilft, und ſelbſtverſtändlich laſſen ſich dieſe Teilſtücke auch in der Kultur zur Vermehrung verwenden. Wenn ſie kaum centimeterlang ſind, genügt es, das man ſie auf die Oberfläche größerer Kulturgefäße legt. Längere Stecklinge ſteckt man aufrecht und wenigſtens ſo tief, daß ſie ſich ſelbſt halten, wenn man nicht zu Stäben greifen will. Jedoch ſollte man ſpäter die Stäbchen vermeiden, ſie machen die Pflanzen nur unnatürlich und häßlich. Die meiſten Rhipsalis wollen hängen. Die Jahreszeit ſpielt bei der Vermehrung keine Rolle. Ich habe mit gleich gutem Erfolg im »toteſten« Winter wie zu jeder anderen Jahreszeit Stecklinge von Rhipsalis gemacht, je nachdem die Sendungen eintrafen.

An der Riviera zog ich die Rhipsalis im Freien mit allerlei anderen Epiphyten wie Bromeliaceen und Orchideen in den Achſeln der Blattſtielſtumpen auf verſchiedenen Palmenarten, in den Aſtgabeln der Olivenbäume und zwiſchen den Lücken und Niſchen der mächtigen Luftwurzeln eines großen Ficus macrophylla, dem Straßburger in ſeinen »Streifzügen an der Riviera« einen längeren Abſchnitt widmete. Indeſſen fehlte den Rhipsalis dort die ſoeben als notwendig betonte gleichmäßige Wärme, denn während des Winters folgen an der Riviera auf die ſchönen ſonnigen Tage oft recht kalte Nächte. Allerdings wurden dieſe Gegenſätze durch die dichten Blätterdächer immer etwas gemildert, aber ſo ſchnell und ſo ſchön wuchſen die Rhipsalis eben doch nicht wie in den gleichmäßig warmen und feuchten Gewächshäuſern, in denen ich ſpäter in Cannſtatt während des Krieges meine neue Sammlung hielt. Da mir nun keine Bäume zum Bepflanzen zur Verfügung ſtanden, ließ ich die Rhipsalis in eigens hergeſtellte, etwa fauſtgroße Drahtkörbe pflanzen. Dieſe Körbchen aus verzinntem Eiſendraht wurden zunächſt mit Moos ausgelegt und darein die bewurzelten Stecklingspflänzchen in ein recht lockeres und poröſes Pflanzmaterial aus Torf-, Heide- und Lauberdebrocken geſetzt, und dann in einem temperierten Warmhauſe mit Rohglasbedachung aufgehängt. Nur im Winter wurde etwas ſpärlicher gegoſſen; bei ſonſt gleichmäßiger Behandlung gediehen dieſe Rhipsalis vorzüglich. Ich ziehe dieſe Drahtkörbchen den Holzkörben, wie man ſie für Orchideen verwendet, vor. Sie fallen weniger in die Augen, ſind weſentlich leichter und belaſten auch das Dach weniger. Nach Be-

Rhipsalis clavata

Rhipsalis conferta

darf ersetzt man sie auch durch größere Körbe. In der mittleren Temperatur eines temperierten Warmhauses gelingen so ziemlich alle Arten, aber einige echt tropische wachsen im Sommer im Nepenthes-Hause noch besser, und ebenso können einige aus kühleren Gegenden auch in kälteren Häusern und im Sommer selbst im Freien gehalten werden.
Auch im Zimmer lassen sich viele Rhipsalis mit Erfolg in solchen Drahtkörbchen am Fenster aufgehängt ziehen, wenn man die Mühe nicht scheut, die Körbchen zum Gießen oder Tauchen in einen anderen Raum zu nehmen und jedesmal gut abtropfen zu lassen. Wenn man mit einem sogenannten Tauspender den Pflanzen außerdem etwas Luftfeuchtigkeit zuführen kann, so wird sich die kleine Mühe wohl verlohnen. Auf diese Weise hat Dr. Lindberg in Stockholm, der ein großer Kenner dieser Gewächse war, seine Rhipsalis gezogen und so manche neue Art zum Blühen gebracht, die er seinerzeit in der »Gartenflora« beschrieb. In Hängekörbchen gibt eine kleine Sammlung von Rhipsalis ein viel ansprechenderes Bild als etwa in Töpfen. Ich bin überzeugt, daß für viele Pflanzenliebhaber hier noch allerlei Möglichkeiten liegen.
Es gibt über 70 Arten Rhipsalis oder besser Rhipsalideen; denn neuerdings wurden von der alten Gattung aus guten Gründen mehrere neue abgetrennt. Ihr Hauptgebiet befindet sich in den Bergwäldern Südostbrasiliens, namentlich westlich von Rio de Janeiro. Von da gehen sie in einzelnen Arten über ganz Südamerika, nach Westindien, Florida und Mexiko. Die weiteste Verbreitung besitzt R. Cassytha, eine Art mit stilrunden, bindfadenstarken Stämmchen und Gliedern, die in über meterlangen Strähnen herabhängen und zarte kleine gelblichweiße Blüten im Winter entwickeln. Diese und einige andere solche Arten haben ihren Weg auch in die Tropen der Alten Welt gefunden. Die Rhipsalis haben nämlich Früchte wie die Misteln, also kleine, meist weiße Beeren, die wie die Mistelbeeren gern von den Vögeln gefressen werden, sodaß die Samen leicht eine weite Verbreitung erlangen. Nur durch die Vermittlung der Vögel ist es zu erklären, daß diese Arten in den tropischen Urwäldern West- und Ostmittelafrikas, Madagaskars, der Inseln des Indischen Oceans und selbst auf Ceylon gefunden werden. R. Cassytha ist meist unregelmäßig verzweigt, viele andere sind dagegen regelmäßig quirlig verästelt, wie R. virgata, die etwas aufrechte R. teres (R. conferta) und die kräftigere R. pulvinigera mit roten Beeren, die hier, wie ebenso die Blüten, aus einer Vertiefung der Glieder treten. Ganz niedliche dichte Büsche bildet die fein verzweigte R. capilliformis, deren schlanke Triebe wie eine »Perücke« über

Rhipsalis Warmingiana
Bilder A. Purpus

den Korb hängen. Sehr üppig und graziös wächst auch R. clavata mit schwach keuligen Gliedern und kleinen weißen Blüten. Sehr zierlich wirkt ferner die R. mesembrianthemoides, die von etwas rasenförmigem Wuchs ist, indem zahlreiche stilrunde Kurztriebe spiralig dicht um die Langtriebe geordnet sind. Die bekannte R. cereuscula (R. Saglionis), eine der härtesten Arten aus Argentinien, die am leichtesten Mißhandlungen überdauert, trägt gleichfalls an den Langtrieben eine Menge kürzerer Sprosse. Ihre Blüten sind verhältnismäßig groß, reinweiß und schön, und da sie reichlich erscheinen und ziemlich lange halten, so ist die R. cereuscula sehr zu empfehlen. Man kann sie im Sommer im Freien unter Bäumen aufhängen, wo sie etwas Schatten und feuchte Luft haben.
Von den Arten mit kantigen Sprossen möchte ich namentlich R. pentaptera und R. paradoxa wegen ihrer Sproßform und des leichten Wachsens empfehlen. Unter den Rhipsalis mit flachen Gliedern ist R. Wercklei aus Costa Rica eine der merkwürdigsten, während vielleicht R. Warmingiana und R. Houlletiana mit die gefälligsten und schönsten sind. Von den größeren Arten ähneln R. crispata und namentlich R. pachyptera ganz den Phyllocactus, wenn sie nicht durch die kleinen Blüten verraten werden.
Von einer weiteren Aufzählung der Arten kann ich hier absehen. Wohl aber möchte ich noch auf Vertreter einiger verwandter Gattungen aufmerksam machen, wie beispielsweise auf die goldgelb blühenden Hariota salicornioides, deren sonderbar geformte Glieder kleinen Flaschen oder Keulen gleichen. Sie wachsen ebenso wie die Rhipsalis, von denen sie sich hauptsächlich durch die Gliederform und die endständigen goldgelben Blumen unterscheiden.
Ein ganz allerliebstes Pflänzchen, das in Hängekörbchen im temperierten Hause vorzüglich wächst und weite Verbreitung verdient, ist ferner Erythrorhipsalis pilocarpa. Es hat quirlig verzweigte Stämmchen und Glieder von der Dicke eines kräftigen Federkieles und trägt an den Areolen dünne Borsten. An den Spitzen der Glieder erscheinen um die Weihnachtszeit die verhältnismäßig großen und weit offenen, reinweißen Blütensterne. Später folgen ihnen kleine rote, fein bestachelte Früchte, die sich lange an der Pflanze halten. Blüten und Früchte sind hier anders gestaltet als bei den Rhipsalis.
Als ein weiteres recht liebliches Pflänzchen aus dieser Verwandtschaft sei Rhipsalidopsis (Rhipsalis) rosea empfohlen, das häufig Flachsprossen bildet und schöne wohlriechende, fast 4 Centimeter breite, leicht rosafarbene Blüten entwickelt. Dieses interessante Gewächs, das ebenfalls von den eigentlichen Rhipsalis stark abweicht, wächst keineswegs schwierig, die epiphytische Körbchenkultur sagt ihm zu.

GUSTAV ALLINGER / AUS ENGLISCHEN GÄRTEN

FÜR die Geſchichte der Gartenkunſt und das europäiſche Gartenleben ſind die Pole, welche ſich in der Gartenkultur Englands berühren, merkwürdig genug. Der »engliſche Garten«, das Garten- und Parkideal des 19. Jahrhunderts lebt heute noch wie ehedem auch in der Gartenſehnſucht vieler deutſcher Garten- und Pflanzenfreunde. Ihnen, denen die Form der Gärten, ſo wie wir ſie heute anſtreben, nicht unbedingtes Bedürfnis zu ſein braucht, offenbart ſich in der freien maleriſchen Verteilung von Raſenflächen, Bäumen und Sträuchern ſehr oft am ergiebigſten die Schönheit der Pflanzen in ihrer allſeitigen, beſten Entwicklung. Die zwangloſe ruhige Gleichmäßigkeit auch iſt es, jene dahingleitende und doch wieder in ſich beharrende, bald ſanfte, bald ungeſtüme Gewalt natürlichen Wachstums, welche dem »engliſchen Park« trotz aller äſthetiſierenden Theorien bis auf den heutigen Tag ſeine Geltung bewahrt hat und auch künftig bewahren wird. Er hat Berechtigung und iſt auch heute noch lebendig, ſofern er Größe und Weite der Flächen zur Vorausſetzung hat. Dies iſt in ſeinem Heimatland, in England, der Fall und ſo ſehr deutlich, daß Park und Landſchaft aus urſprünglicher Weſensgleichheit geboren und zu unmittelbarer Einheit verſchmolzen ſind.

Hyde Park

Seine hiſtoriſche Entwicklung iſt ja bekannt, wenngleich die Auswirkung aſiatiſcher Einflüſſe von Japan und China her und andere Zuſammenhänge ſich nur bis zu einem gewiſſen Grade durchſichtig verfolgen laſſen. Jedenfalls, die Geſchmacksrevolution, keimend ſchon zu Beginn des 18. Jahrhunderts, gehegt von Philoſophen, Malern und Dichtern, ausgreifend nach Frankreich und nach Deutſchland, wo wir um das Jahr 1770 den Park von Wörlitz und den Weimarer Park als ſichtbaren Ausdruck der neuen Ideen entſtehen ſehen, ging von England aus. Sie entſprang einer großen geiſtigen Bewegung, die dann im Park und durch den Park ſich zu einer ungeheuren, aus vielen Quellen fließenden Sentimentalität ſteigerte. Dieſe Sentimentalität iſt heute aus den großen engliſchen Parks verſchwunden, ebenſo wie in Deutſchland ſchon zu Anfang des 19. Jahrhunderts Fürſt Pückler Ruinen und anderen Stimmungsmotiven nur noch vereinzelt zur Belebung des Bildes in ſeinen Schöpfungen Plätze eingeräumt hat. Die neueren engliſchen Parks zeigen aber in nächſter Gebäudeumgebung faſt durchweg regelmäßige Schmuckanlagen, die irgendwie terraſſenartig mehr oder weniger glücklich geſtaltet ſind. Die alten regelmäßigen Anlagen, die nach franzöſiſchem Vorbild in der Renaiſſance- und Barockzeit in England geſchaffen wurden, wie Hampton Court, bergen eben trotz mancher Verwiſchung durch ſpätere Geſchlechter und durch Verwitterung ſo viel Anregungen, daß eine radikale Umwälzung der Geſtaltungsideen ſich auf die Dauer nicht durchſetzen konnte. Deren architektoniſche Elemente waren es auch, welche in den neunziger Jahren engliſche Architekten zu Fürſprechern für den regelmäßigen Garten werden ließen. Dank der allgemeinen Bewegung, welche dann unter Führung des Herausgebers von Country Life einſetzte, unterſtützt durch die ſachkundigen und liebevollen Studien von Gertrude Jekyll und anderer, gibt es heute dort wohl keinen ſchönen Gartenwinkel, kein Gartentor, keine Gartenterraſſe mehr, welche nicht ſchon zu wiederholten Malen im Bilde feſtgehalten worden und ſo zu Anregern neuzeitlicher Gartengeſtaltung mitgeworden wären.

Der architektoniſch-regelmäßige Garten, ſo wie ihn die Engländer heute anlegen und bauen, läßt vielfach die organiſchen Zuſammenhänge des Entwurfes oder auch die konſequente praktiſche Durchführung der Entwurfsidee vermiſſen. Vielfach liegen die einzelnen Gartenteile wie zufällig nebeneinander und aneinander geſchoben, eine Feſtſtellung, die man geradezu als das Eigentümliche heutiger Gartengeſtaltung in England bezeichnen möchte. Man kann kaum umhin, dies aber auch gleichzeitig als einen Mangel zu fühlen. Gutes und ſchönes Pflanzenmaterial, ſorgfältige Pflege und ähnliche Dinge vermögen eben nicht über Disharmonien der Geſtaltungsform, über Fehler in der Erfaſſung künſtleriſcher Einheit hinwegzutäuſchen. Dies wurde beſonders fühlbar bei der gärtneriſchen Behandlung der Geſamtanlage der Wembley-Ausſtellung, wie auch in den dort zu einer eigenen Gruppe zuſammengeſchloſſenen Sondergärten engliſcher Gartengeſtalter und Baumſchulen.

An der Themse

So hat alſo der landſchaftliche Park in England einen Nebenbuhler im regelmäßigen Garten. Aber die Grenzen der beiden ſcheinen ja dort in der Öffentlichkeit ſoweit geklärt zu ſein, daß nennenswerte Kämpfe kaum auftreten dürften. Es wäre wohl zu viel, wenn man behaupten wollte, daß deshalb den neueren engliſchen Gartenent-

würfen eine gewiſſe Ungelöſtheit anhafte, zumal man bei einer beſonderen Kritik der Gärten den jetzigen Stand der Produktion und der Ziele der engliſchen Künſtler und Handwerker als Ganzes nicht außer Acht laſſen und darauf hinweiſen darf, daß gerade dieſe in letzter Zeit eine herbe Beurteilung erfahren haben. Vielleicht aber würden bei uns in Deutſchland die Anſichten über die Geſtaltungsform oft nicht ſo hart aufeinanderprallen, wenn Liebhabern und Laien ebenfalls mehr bekannt wäre, daß der architektoniſch regelmäßige Garten, unſer »moderner« deutſcher Garten zu einem guten Teile über England wieder zu uns gekommen iſt und daß viele Gartenmotive geradezu als »engliſch« bezeichnet werden müſſen. Dieſe Gegenſätze werden daher oft mit einer Leidenſchaftlichkeit bei uns hier verſchärft und ausgetragen, die in England einfach undenkbar wäre, da dort die Vorausſetzungen hierzu von vornherein aus der Tradition heraus geklärt ſind. Daß dieſe in England zur Selbſtverſtändlichkeit gewordene Klärung aber auch gleichzeitig eine große Gefahr für den Anreiz zu künſtleriſcher Höchſtleiſtung birgt und dieſer vielmehr dadurch oft unterbunden wird, wird nicht von der Hand zu weiſen ſein, und es iſt nicht ſchwer, dies mit charakteriſtiſchen Beiſpielen zu belegen.

Queen's Cottage

Aber immerhin, der Begriff Gartenkultur erſchöpft ſich nicht allein in künſtleriſcher Betätigung. Gartenkultur im weiteren Sinne iſt in England Tradition und wenn auch nicht eben älter, ſo doch wohl ſtärker als bei uns im Bewußtſein des ganzen Volkes verankert. Sie iſt Wirklichkeit geworden, und deshalb wird jeder Gärtner und Gartenfreund ſeine Augen auch dorthin wenden, um Einblick zu gewinnen in die Schönheit der Gärten und Parks, welche England beſitzt. Wer dort in architektoniſchen Gärten nach Motiven ſpürt, wird viel koſtbare Anregungen mitnehmen. Der engliſche Park und die engliſche Landſchaft als Ganzes genommen, wird jedoch immer der nachhaltigſte Eindruck ſein, den der Fremde dort empfängt und der in ſeiner Erinnerung, in ſeiner Gartenſehnſucht zuweilen unbewußt weiter lebt, und von dieſem Eindruck ſollen die folgenden Zeilen und Bilder erzählen.

Natürlich ſind die großen engliſchen Landſitze mit ihren prächtigen Parkanlagen beſonders ſehenswert. Aber auch ſchon mitten in London befinden ſich eine Reihe von größeren, ſtädtiſchen Parks, deren Beſichtigung man nicht verſäumen wird. Im Gegenſatz zu dieſen ſtädtiſchen Anlagen ſind die königlichen Gärten und die der ſtaatlichen Verwaltung unterſtellten Parks mit viel Ge-

Schloß Sion

Hampton Court

ſchick und Geſchmack gepflegt. Hierzu gehört der berühmte *Hyde Park*, deſſen Raſenflächen ſo groß ſind, daß ſie Alt und Jung täglich zur freien Benutzung überlaſſen ſind. Ohne jegliches Unterholz ſtehen die Bäume auf den großen weiten Flächen bald als randbildende Hochpflanzung, bald zu ſchattenſpendenden Trupps vereinigt. Ein flacher Teich ladet die Kinder zu fröhlichem Spiel, aber weiterhin befindet ſich ein wohlgepflegter Strand am langgeſtreckten Serpentine-River, der zu gewiſſen Stunden zum Baden freigegeben iſt. Gegen das Nordende ſind die Ufer des Waſſerlaufes mit Blütenſträuchern überhangen und finden ihren Schluß in einer architektoniſchen Anlage mit fünf großen Seeroſen-Becken. Dieſe aber tritt ebenſo wie andere kleine Teile für den Beſucher vollkommen in den Hintergrund gegenüber der Größe und Weite der baumbeſtandenen Wieſenflächen, welche mit dem Kensington-Garden nach Weſten, mit dem Green-Park und James-Park nach Oſten, zuſammenhängen. Die Freiheit nach allen Seiten ſowohl der Sicht wie der Bewegung iſt es, die hier im Hydepark ſo wohltuend auffällt. Freiheit drängt ſich in vielfachen Variationen bis an die Peripherie der Weltſtadt und pflanzt ſich von da in die engliſchen Parks auf dem Lande fort. Oder iſt es nicht umgekehrt eher die vornehme Ruhe, der Atem der engliſchen Landſchaft, welcher ſieghaft das Eigenleben und Sein der häuserumſchloſſenen Parks zur Kraft der Freiheit erhebt?

Milton Wall, Pförtnerhaus

Schon ein Spaziergang *an der Themſe* vermittelt den außerordentlich beſchwingten Reiz engliſcher Landſchaft, der in ihren Wieſenflächen, in der Phyſiognomie der alten Bäume, in dem quellenden Reichtum alles Pflanzenlebens wirbt. Auch der große Park in Kew, der berühmte Botaniſche Garten, atmet dieſe Freiheit und iſt eine merkwürdige Miſchung inſofern, als durch ihn der Zweck der wiſſenſchaftlichen Forſchung und Belehrung glücklich mit vielen Bedürfniſſen eines Volksparkes vereinigt iſt. Ohne auf Einzelheiten der Geſtaltung eingehen zu wollen, ſei nur feſtgehalten die idylliſche Lage des *Queen's Cottage*, welches Georg III. im Jahre 1760 erbaute und das von Königin Charlotte als Teehaus im Sommer benutzt wurde. Wild wuchern die Bäume und Sträucher in der Lichtung und Schlingpflanzen klettern hier in braunem Holzwerk bis auf das Strohdach hinan.

Gemächlich fließt die Themſe an der Weſtgrenze von Kew Garden entlang, und darüber hinweg ſchweift der Blick auf die fernen Wieſen und den Park bei *Schloß Sion*. Wie unendlich weich ſind doch die Silhouetten der Bäume, welche die Ufer der Themſe und ihren Lauf begleiten. Silbergrau ſchimmern die Blätter der Weiden im Glanze der Sonne und im Geflimmer des Hochſommertages. Stromaufwärts, an überaus reizvollen Ufergärten und ſchwimmenden, freundlichen Sommerhäuſern vorbei, gelangt man in einer Stunde über Richmond nach dem Park *Hampton Court*, der ebenfalls an den Fluß grenzt und ſich beſonders an einer Stelle darüber terraſſenartig ausbaut. Hampton-Court, das wiederum mit Bushey Park zuſammenhängt, iſt jene berühmte Anlage, die Cardinal Wolsey am Anfang des 16. Jahrhunderts ſchuf. Er erweckte damit den Neid ſeines Königs Heinrich VIII., und indem er das Schloß ſamt Park ſeinem König zum Geſchenk machte, glaubte er Ungnade von ſich abwenden zu können. In der Uranlage iſt es ein Renaissance-Garten, von welchem einzelne, gegen die Themſe liegende Teile, der Luſtgarten, rein erhalten ſind. Köſtliche Schätze, wie der Pont Garden, ſind ungemein ſchön in der Aufteilung und Bepflanzung. Wilhelm III. ließ dann ſpäter im Zuſammenhang mit der Erweiterung des Schloßbaues den Park an der Oſtſeite anlegen, welcher mit ſeiner achſialen Ausſtrahlung und dem langen Kanal deutlich den Einfluß der franzöſiſchen Barock-Gärten erkennen läßt. Hampton Court iſt ja einer der wenigen Parks in England, welche ſo durch die Gartenrevolution des 18. Jahrhunderts durchgingen, daß die Renaissance- und Barockanlage in ihren Hauptzügen heute noch erhalten iſt, und iſt alſo nicht der »engliſche Park«, der gegen Ende des 18. Jahrhunderts Hirſchfeldt zu ſeiner Theorie der Gartenkunſt begeiſterte, welche nachmals von Goethe und Fürſt Pückler zur Wirklichkeit erhoben wurde.

Windsor Castle

Man glaube aber nicht, daß der typiſche engliſche Park der Ebene oder des leichtgewellten Hügellandes überall in wohlbekannter Art anzutreffen ſei. Die Gärtnerarbeit, die Schönheit der Gehölze und der wertvollſten Blütenpflanzen feiert ihre herrlichſten Triumphe in jenen Parks, in denen die Erdoberfläche ſich wilder gebärdet, da, wo zutagetretendes Felsgeſtein oder gar ſteile Abhänge vorhanden ſind. Unvergeßlich bleibt mir der zauberhafte Park Leonardslee bei Horsham in Sussex. Dort, einige Meilen von der Südküſte weg, gedeihen im Freien große Chamaerops, vor etwa 40 Jahren aus Indien hierher verpflanzt, und

Camellien, phantastisch verschlungene Stämme von Rhododendron in über 8 Meter Höhe, mächtige Araukarien und Zedern verstärken das Exotische der Pflanzungen. Den schönsten Teil des Parkes bildet eine langgestreckte Schlucht, deren Sohle ein Flüßchen durchzieht. Einer der beiden ziemlich starken Abhänge ist fast ganz nur mit Rhododendron ponticum-Hybriden bewachsen und stand gerade in voller Blüte. Flußaufwärts und auf der anderen Seite der Schlucht ist das Gelände bewaldet und ebenfalls mit Rhododendron unterpflanzt. Darunter fällt besonders Rhododendron Loderi auf, welchen der dortige Gärtner als den besten und schönsten des Landes rühmt. Rhododendron Loderi erreicht eine Höhe von 4 Meter und hat schmale, etwa 20 Centimeter lange, lebhaft hellgrüne Blätter. Andere seltene Pflanzen, wie Davidia involucrata mit dem großen weißen Hochblatt gesellen sich dazu. Gegen das Wasser zu gewinnt die krautige Flora die Oberhand. Oben auf dem Berge hinter dem Schloß ist ein großer Felsengarten, dessen Farbenwunder sich in üppigster Pracht zeigen. Hier in Leonardlee liebt man auch die Tiere und schafft ihnen treffliche Lebensbedingungen. Da sind Rehe und Hirsche, oben am Waldrande jagen Känguruhs in gewaltigen Sätzen und unten in einem Stausee tummeln sich amerikanische Biber. Fürwahr, ein selten schönes Stück Erde, wo Lady Loder waltet.

So zeigt sich in der Anlage und Haltung der englischen Parks, denen gute Gärtnereien und oft großartige Gewächshausanlagen angeschlossen sind, eine ziemliche Verschiedenheit, die manche ungeahnte Überraschung mit sich bringt. In anderen Anlagen, wie im Park des Baron Rothschild in Waddesdon, befinden sich Sportplätze für viele Spiele vom Tennis bis zum Golf, und diese Plätze stehen zeitweise auch den Einwohnern des benachbarten Dorfes zum Spielen frei. Die Parks auf dem Lande sind im besten Sinne Teile der Landschaft und oft nur durch ein einfaches Stangenholz abgeschlossen vom Nachbar oder gegen die Landstraße. Eigenartig mutet die Architektur mitunter an, so etwa, wenn ein Gärtnerhaus als gotische Kapelle erscheint: ein Überrest aus der Jugendzeit des landschaftlichen Stils. Am Eingang vom Park *Milton-Hall*, in der Nähe der Stadt Peterborough, steht ein gediegenes *Pförtnerhaus*, wie man sie oft findet, klein oder solide in Stein gebaut und nicht ohne gefällige architektonische Durchbildung. Im Grunde genommen ist es nicht zum wenigsten die Eigenart der englischen Architektur, welche dem Garten die starke gemeinsame Harmonie verleiht. Es ist gewiß nicht immer nur die Harmonie der wichtigsten Baukörper und Bauglieder, sondern mehr noch die mit unbeirrbarer Beharrlichkeit verfolgte Behandlung baulicher Einzelheiten wie der Kamine, Gesimse, Fensterumrahmungen, welche überall die Bodenständigkeit der Bauweise greifbar vor Augen rückt und wodurch das ganze Land ohne Ausnahme den gleichen Willen zur Heimat bezeugt.

Eine sehenswürdige riesige Baugruppe ist *Windsor Castle*, die Sommerresidenz des Königs. Die mächtige Burg, eines der größten und schönsten Königsschlösser der Welt, erhebt sich auf einem Felsen, der nach Norden und Osten steil über dem Talgrunde steht, westlich schließt sich die Stadt mit ihren engen Straßen an. Nach Süden aber liegt der 720 ha große Windsor-Park und in der Mittelachse des Hauptbaues zieht sich 5 Kilometer weit die berühmte Ulmenallee, der Long Walk, schnurgerade bis nach Virginia Water, einem künstlichen See in herrlicher Landschaft. Windsor Castle, die trutzige Feste, birgt in ihrem Innern einen gärtnerisch hübsch ausgestalteten Wallgraben. Sind wir aber vorbei an den vielerlei Bauten innerhalb der Burg vorgedrungen bis zum letzten Torbogen, durch den man zum eigentlichen Königsbau gelangt, so erleben wir eine seltsame fabelhafte Erscheinung. Unnahbar steinern schließen sich die zinngekrönten massiven Schloßmauern um einen Innenhof. Ein Reiterstandbild auf hohem Sockel steigert die Ausdehnung des Hofraumes und seiner Proportionen ins Gewaltige. In diese gelbgraue Stille ringt sich der Stamm und das Astwerk, saugen sich die grünen Blätter eines einzigen großen Baumes. Durch ihn drängt das Leben dorthin und mischt sich fast sagenhaft mit dem rhythmisch verhallenden Echo, das die schweren Schritte der Königswache wie vor vielen hundert Jahren zitternd in sich aufnimmt.

DESPINA STREIT / ATTISCHER FRÜHLING

WENN der Norden noch tief im Winter steckt, Eis und Schnee die Erde bedecken, der Himmel grau und schwer auf kahlen Bäumen drückt, da schweifen die Gedanken gern ins Sonnenland, die Sehnsucht nach Licht und Wärme wird stärker. Kaum will man es glauben, daß zu gleicher Zeit, in nicht zu weiter Ferne, der Frühling schon erwacht ist.

Blau weitet sich in Hellas der Himmel und schmilzt in der Ferne mit dem noch blauerem Meere zusammen, der Mandelbaum streut seine Blütenflocken auf den regenfrischen Boden, von welchem neues Leben, leuchtende Farben hervorgelockt werden, wo im Sommer alles versengte.

Anemonen treiben da ihr Wesen, recken zwischen den kurzen Stumpen der Rebstöcke bald schüchtern, bald dreist ihre roten, blauen, lila Köpf-

Aus dem Blumengarten der Literatur

Vorfrühling

Siehst du, hörst du im Frühlingswind
Der Eiche Winterlaub schwirren zu Grab?
Was ist es? Die jungen Triebe sind
Erwacht und stoßen die alten ab.

Nun sendet der Himmel den Regenguß,
Der wird die Wipfel verjüngen,
Und das vermoderte Alte muß
Unten die Wurzel düngen.

Im Frühlingsregen ist zweierlei Kraft:
Leben macht er entlodern
In allem, worin sich regt der Saft,
Und Abgestandnes vermodern.

Friedrich Rückert
„Haus und Welt"

Unterm weißen Baume sitzend,
Hörst du fern die Winde schrillen,
Siehst, wie oben stumme Wolken
Sich in Nebeldecken hüllen,

Siehst, wie unten ausgestorben
Wald und Flur, wie kahl geschoren; —
Um dich Winter, in dir Winter,
Und dein Herz ist eingefroren.

Plötzlich fallen auf dich nieder
Weiße Flocken, und verdrossen
Meinst du schon, mit Schneegestöber
Hab der Baum dich übergossen.

Doch es ist kein Schneegestöber,
Merkst es bald mit freudgem Schrecken;
Duftge Frühlingsblüten sind es,
Die dich necken und bedecken.

Welch ein schauersüßer Zauber!
Winter wandelt sich in Maie,
Schnee verwandelt sich in Blüten,
Und dein Herz es liebt aufs neue.

Heinrich Heine
„Sämtliche Werke", 2. Band

Wie die Knospe hütend,
Daß sie nicht Blume werde,
Liegt's so dumpf und brütend
Über der drängenden Erde.

Wolkenmassen ballten
Sich der Sonne entgegen,
Doch durch tausend Spalten
Dringt der befruchtende Segen.

Glüh'nde Düfte ringeln
In die Höhe sich munter.
Flüchtig grüßend, züngeln
Streifende Lichter herunter.

Daß nun, still erfrischend,
Eins zum Andern sich finde,
Rühren, Alles mischend,
Sich lebendige Winde.

Friedrich Hebbel
„Sämtliche Werke", 1. Band

chen. Friſchgrüne Kornfelder ziehen ſich hin, umrandet von blendend weißen Margueritenſtreifen. Dazwiſchen Brachland, über welches der Mohn ſeinen dunklen Seidenglanz ſtreut.
Silbern ſchimmern die friſchen Blättchen an den uralten Ölbäumen, raunen und rauſchen von alten Zeiten, von Größe und Macht, von Kampf und Not. Teppiche von Gänſeblümchen rahmen die ehrwürdigen Geſtalten ein. Jeder Baum iſt ein Ganzes für ſich, eingegliedert in die große Einheit des lichten Haines. Überall weckt eine zerbrochene Säule, ein Überreſt eines alten Tempels, ein Grabmal Erinnerungen an Vergangenes. Der Frühling gibt auch ihm neues Leben, die Zerſtörung wird verdeckt durch Hunderte von wilden Blumen, die ſich an unſern Wegen hinziehen. Ihr Duft gibt dem Land einen einzigartigen Zauber. Unſere Seele wird aufnahmefähiger für all das Schöne, was die erſten Wochen des Jahres bringen. Wer im Erwachen der Natur der Akropolis immer aufs Neue gegenüber ſteht, wird von gewaltigen Eindrücken beſtürmt. Blau bricht der Himmel durch die goldroten Marmorſäulen, in allen Farben leuchten die ſchroffen Felſen herüber, eine herrliche Farbenſymphonie vom dunkelſten Braun, bis zum leuchtendſten Gelb. Alyssum drängt ſich durch alle Riſſe, die großblumige Kamille verſchwendet ihren ſüßen Duft, miſcht ihn mit dem der Affodelen (Asphodelus microcarpus), die ſich mit dieſer Umgebung wohl ſehen laſſen dürfen. Stolz ſtehen die ſchlanken Kerzen, unſcheinbar in der Farbe, ſtraff und majeſtätiſch im Bau, höher als ein Meter erheben ſie ſich aus dem Boden, aus dem der Regen umſonſt das kleine Gräslein herauszuholen ſich müht. Wie der Boden lilabraun ins Rötliche gehend ſind die Stiele und der dichte Blattſchopf, gelblichweiß die Blütenſtände, die ſich im Winde wiegen. Ihre nächſten Nachbarn ſind die eingebürgerten ſtachligen Fremdlinge, Opuntien, überſät mit gelben Blüten, und die vom Volksmund unſterblich genannten Agaven, ihre hohen Blütenbäume emporreckend.
Auf der heiligen Straße von Eleusis, bedecken noch blühende mannshohe Erikabüſche das bergige Land zwiſchen den lichten Pinienwäldern. Die Pinie hat hier keine ſchirmartige Geſtalt, tief greifen die Zweige oft bis zur Erde. Um die mächtige Stämme ſchart ſich der Nachwuchs, zierliche Bäumchen, von denen der Regen allen Staub abgeſpült, und die ihre ſaftiggrünen Zweige mit den noch jungen Zapfen im Winde rauſchen laſſen. Bald wird das Lilaroſa der Erikaſträucher mit dem Gelb vertauſcht werden, wenn der Ginſter (Sarothamnus scoparius) ſeinen Charakter der Landſchaft aufdrückt. Saftig grün ziehen ſich dann die bewaldeten Hügel bis zum blauen weiten Meer, zwiſchen ihnen leuchtet es weit, ſpiegelt ſich das ſatte Gelb in den klaren Fluten des Saronikus. Über allem wölbt ſich der hohe attiſche Himmel, leuchtet die Sonne, den Farben einen weichen Ton verleihend.
Selbſt mitten in der Stadt Athen wandern wir wie durch einen Blütentraum. Farbenprächtiges Leben durchbricht das blendende Weiß der Straßen und Häuſer. Hier ſchlingen ſich gelbe Röslein mit dunklem Laub bis zum Dach, dort klettert eine Bougainvillea kühn an einer alten Pinie, das helle Lila ihrer Hochblätter unter die Nadeln miſchend. Die Pfefferbäume bekommen ihre jungen Blättchen, die den alten Straßenwächtern ein Jünglingsausſehen verleihen. Unter ihnen verkünden an einer Wegbiegung leuchtende Farben den Blumenmarkt. Auf langen eiſernen Tiſchen ſind Berge von roten und weißen Roſen. Veilchen werden gewichtsweiſe verkauft, Rieſenzweige wilder Mandeln umrahmen das geſchäftige Bild.
Es fällt ſchwer, alle Blumen zu benennen, die in Athener Gärten von Anfang Dezember ab blühen. Groß iſt ihre Zahl, unendlich ſchön ihre Färbung und ihr Wohlgeruch.
Wer einen Blick in den »Königsgarten« geworfen, der nahm ein Blumenerlebnis mit fürs ganze Leben. Terraſſenförmig ſenken ſich die Blumenflächen gegen das Bett des Ilissos mit ſeinen uralten Platanen, eine Überfülle von Farben dringt auf uns ein, durch kundige liebevolle Hand in Schranken gehalten. Schlingroſen ſchmücken jedes Eckchen, jede häßliche Mauer, aus altgriechiſchen Vaſen wachſen Pelargonien, ſpiegeln ſich im blauen Waſſer des Marmorbeckens vor dem Gartenhäuschen, das Glyzinen überwuchern. Papaver orientalis fällt durch ſeine weit ſichtbaren Farbentöne auf, weiße Anthemisbüſche ziehen ſich vor der antiken Feſtungsmauer der Stadt hin. Blühende Orangen und Zitronenbäume, mit reifen Früchten behangen, ſtreuen ihre Blüten auf die den Weg einfaſſenden hellen und dunklen Schwertlilien. Die Veilchen miſchen ihren Duft ſiegend in alle andern Wohlgerüche, munter zwitſchern die Vögel.
Wer attiſches Erwachen einmal genoſſen, zehrt für immer daran.

ZWEI WERTVOLLE ZWERGFICHTEN

IM Novemberheft brachten wir ein Bild einer Zwergfichtenform unter dem Namen Picea excelsa Ohlendorffii, wobei eine Vertauſchung mit einem Bilde der var. echinaeformis erfolgte. Wir kommen nun heute auf dieſe beiden Formen zurück.
Picea excelsa var. *Ohlendorffii:* Dieſe Form iſt in der Ohlendorffſchen Baumſchule in Hamm bei Hamburg entſtanden und Ende der ſechziger Jahre des vorigen Jahrhunderts unter dem Namen Abies orientalis pygmaea in den Handel gegeben worden. Aus meiner Lehrzeit in dieſer Baumſchule (1873 bis 1875) erinnere ich mich ſehr gut, daß zwei, wenn nicht drei zwergige Fichten, die damals als Formen der Picea orientalis angeſehen wurden, dort vorhanden waren. Das Bild zeigt eine jetzt dreieinhalb Meter hohe Pflanze des Späthſchen Arborets, die 1882 als kleine Pflanze von Ohlendorff bezogen wurde. Die nicht zutreffende Benennung wurde von Späth in Picea excelsa var. Ohlendorffii verändert. Es iſt eine der wertvollſten Zwergfichten-Formen, die ihren kompakten Wuchs und die dichte Benadelung bis ins Alter bewahrt. Wenn das alte, im Novemberheft erwähnte Pillnitzer Exemplar von dem Späthſchen abweicht, ſo kann das daher kommen, daß, wie geſagt, bei Ohlendorff verſchiedene Zwergfichten vorhanden waren, die unter dem gleichen falſchen Namen verbreitet wurden, da ſie ſich ziemlich ähnelten. Beissner führt auch in ſeiner Nadelholzkunde (1891) bei ſeiner Picea orientalis pygmaea (Abies orientalis pygmaea Hort. Ohlendorff) als Synonyme noch orientalis compacta und nana an. Wie ſich dieſe Formen in der Ohlendorffſchen Baumſchule beim Heranwachſen bauten,

GARTENAUFGABEN / ALTE UND NEUE LÖSUNGEN

Einjahrsblumengarten an der Auffahrt

IN dem von *Hermann Koenig* angelegten Hamburger Landsitz sollte vor der Anfahrtseite des Hauses ein rundes Rasenstück gelegt werden, das dann die Auffahrt vermitteln und den üblichen Blumenrabatten-Schmuck tragen sollte. Der Gartenkünstler löste hier diese Aufgabe, indem er einen Einjahrsblumengarten mit Platten anlegte, der dem Parke gleich an der Auffahrt einen freundlichen Auftakt gibt.

iſt mir nicht bekannt. Es iſt aber ſehr wohl möglich, daß hier im Alter Wuchsverſchiedenheiten zu Tage treten. Der abweichende Bau der Pillnitzer Pflanze kann darin ſeinen Grund haben, daß eine andere der obigen Formen dahin gekommen iſt als zu Späth. *H. Jenſen*

Picea excelſa var. echinaeformis

VON den vielen Zwergformen von Picea excelſa ſind wenige beſſer gekennzeichnet, als var. echinaeformis, doch trifft man ſie ſehr ſelten echt in Kultur. Gewöhnlich findet man unter dieſem Namen entweder var. Gregoriana, die ihr in mancher Hinſicht nicht unähnlich iſt, aber kürzere, weichere, weniger ſcharf geſpitzte Nadeln hat, oder aber var. pachyphylla, deren Nadeln ſehr groß, dick und ſo ſtumpfſpitzig ſind, daß es merkwürdig ſcheint, wie man dieſe Form jemals für echinaeformis ausgeben kann. Man ſollte doch denken, daß für eine Form, die echinaeformis heißt, eine der Hauptbedingungen iſt, daß ſie ſtachelige Nadeln hat. Die echte echinaeformis ſei wie folgt gekennzeichnet. Knoſpen: klein, cylindriſch, mit runder Spitze, hellbraun, mit dunkelbraunen äußeren Schuppen, harzlos, Zweige: kahl, hell braun, leicht auffteigend gedrängt, Jahreszuwachs zweieinhalb bis vier Centimeter, Nadeln: etwa zwei Centimeter lang, wenige und radial angeordnet, im rechten Winkel zum Zweig geſtellt oder leicht nach vorn gerichtet, ziemlich entfernt ſtehend, gleich lang, rund und rohrartig, dünn, aber ſteif, in eine ſteife und ziemlich ſcharfe Spitze auslaufend, mit etwa drei Spaltöffnungslinien an jeder Seite. Var. echinaeformis iſt eine ſehr kleine und langſam wachſende Form. Eine mindeſtens zwanzig Jahre alte Pflanze in meinen früheren Garten zu Knapton, Abbey Leix, Irland, hatte ein niedriges, buckliges ziemlich abgeflachtes Kiſſen von etwa 23 Centimeter Höhe und 55 Centimeter Breite gebildet. Seine Geſtalt und ſeine ziemlich langen ſtacheligen Nadeln hatten eine ziemliche Ähnlichkeit mit einem Igel. *Murray Hornibrook*

JOHANNES KÖSTER / BLÜTENNOTIZEN

EINE Lücke in unſerer fachlichen Literatur iſt das Fehlen reichhaltiger genauer Aufzeichnungen über die Blütezeiten von Sträuchern und Stauden. Die Wichtigkeit dieſer Angelegenheit wird jeder ermeſſen, der Pflanzenzuſammenſtellungen mit Vorausberechnung der Wirkung machen möchte.

Ich hoffe, daß die Staudenblütelitten, die an dieſer Stelle fortan erſcheinen, zu reger Arbeit auf dieſem Gebiet veranlaſſen werden.

Die Notizen ſind im Anzuchtgarten des Hamburger Gartenweſen gemacht worden. Es iſt verſucht worden, das Erblühen, die Zeit der Vollblüte, den Zeitpunkt bis zu dem die Staude noch Blütenſchmuckwert hat und den Zeitpunkt des Verblühens datenmäßig zu erfaſſen. Es iſt nicht zu verkennen, daß ſolches Schema Sache ſubjektiver Auffaſſung iſt.

Andererſeits ſind die beobachteten Pflanzen Kulturpflanzen. Kulturpflanzen blühen öfter längere Zeit (die meiſten Kompoſiten) oder kürzere Zeit (Paeonien) als uralte Standpflanzen, aber der Zeitpunkt des Eintritts der Vollblüte wird nicht verſchoben, außerdem wurden nur von eingewöhnten Pflanzen Notizen gezogen.

Alle Beobachtungspflanzen haben auf derſelben offen daliegenden Kulturfläche geſtanden. In den Gärten werden ſich daher durch Standortsmodifikationen Veränderungen in der Dauer der Blütezeit beobachten laſſen, meiſtens zu Gunſten der Länge. Bei ſchattenliebenden Pflanzen kann ſich die Blütezeit an geeignetem Standort verdreifachen.

Jeder, der die Liſten benutzen will, bedenke, daß die Aufzeichnungen aus dem extremen Hamburger Klima ſtammen. Die Blütezeiten werden anderwärts meiſt früher ſein. Intereſſant iſt, wie ſich die Blütezeiten in den einzelnen Jahren verſchieben, oft bis zu drei Monaten (Chryſanthemum indicum). Bei den Sorten einer Art, wie bei den heute gebrachten Phlox, iſt die Verſchiebung annähernd gleichmäßig, frühe Sorten bleiben früh, ſpäte bleiben meiſt ſpät. Bei den folgenden Liſten wird man beobachten können, daß die Verlegung der Blütezeit bei den verſchiedenen Arten ſehr unregelmäßig iſt. Bei den hochgezüchteten heimiſchen Wieſenpflanzen iſt die Abweichung ſehr klein, aber je entfernter unſere Klimaerſcheinungen von den Wärme- und Feuchtigkeitsoptima der betreffenden Arten ſind, deſto größer iſt der Ausſchlag der Abweichungen, ſo ſind ſie um ſo größer, je mehr die Heimat ſubtropiſchem Klima angenähert iſt. Bei der heutigen Phlox decuſſata-Liſte fehlen neue, ſchon bewährte Sorten, aber ich wollte auf keinen Fall die Daten nicht eingewöhnter Pflanzen mit berückſichtigen, aus dem gleichen Grunde ſind auch die Daten vor der Eingewöhnung bei den gebrachten Sorten fortgelaſſen.

*

Aus Raumgründen mußten die Sorten mit Zahlen bezeichnet werden: 1. Baron van Dedem, 2. Coquelicot, 3. Eliſabeth Campbell, 4. Etna, 5. Europa, 6. Fellbacher Porzellan, 7. Frau Anton Buchner, 8. Frl. von Laſſberg, 9. Gartendirektor Broderſen, 10. General von Heutsz, 11. Hermann Almers, 12. Hindenburg, 13. Imperator. 14. Iris, 15. Le Mahdi, 16. Loſna, 17. Loki, 18. Lord Raleigh, 19. Reichsgraf von Hochberg, 20. Rijnſtroom, 21. Septemberglut, 22. Sommerkleid, 23. Stueben, 24. Thor, 25. Wanadis, 26. Wicking, 27. Widar, 28. Württembergia.

	1921				1922				1923				1924				1925			
Lfd. Nr.	Erblüht	Vollblüte	Noch anſehnlich bis	Verblüht	Erblüht	Vollblüte	Noch anſehnlich bis	Verblüht	Erblüht	Vollblüte	Noch anſehnlich bis	Verblüht	Erblüht	Vollblüte	Noch anſehnlich bis	Verblüht	Erblüht	Vollblüte	Noch anſehnlich bis	Verblüht
1.	27.6.	15.7.-10.8.	27.8.	23.9.	9.8.	19.8.- 9.9.	27.9.	4.10.					19.7.	30.7.-25.8.	3.9.	17.9.	4.7.	13.7.-27.7.	22.8.	16.9.
2.	13.7.	20.7.- 6.8.	13.8.	17.9.	2.8.	9.8.-19.8.	26.8.	6.9.	30.7.	6.8.-29.8.	5.9.	25.9.	19.7.	28.7.-21.8.	20.9.	27.9.	11.7.	22.7.-29.7.	12.8.	19.8.
3.	27.6.	13.7.-30.7.	13.8.	22.10.					14.7.	23.7.-15.8.	29.8.	4.10.	9.7.	16.7.- 4.8.	9.8.	10.9.	24.6.	4.7.-27.7.	15.8.	19.8.
4.	9.7.	23.7.-13.8.	27.8.	17.9.	14.7.	28.7.-19.8.	30.8.	9.9.	1.8.	8.8.-22.9.	27.9.	10.10.	19.7.	2.8.-30.8.	8.9.	20.9.	8.7.	18.7.-12.8.	20.8.	24.8.
5.									11.8.	29.8.-3.10.	17.10.	27.10.	19.7.	28.7.- 1.9.	6.9.	20.9.	4.7.	8.7.-27.7.	29.7.	19.8.
6.									6.8.	13.8.-28.9.	2.10.	10.10.	21.7.	4.8.-25.8.	3.9.	10.9.	8.7.	18.7.- 3.8.	10.8.	24.8.
7.	2.7.	15.7.-30.7.	10.8.	13.8.	19.7.	9.8.-19.8.	30.8.	13.9.	16.7.	28.7.-29.8.	10.9.	29.9.	16.7.	28.7.-16.8.	30.8.	8.9.	4.7.	8.7.- 3.8.	19.8.	2.9.
8.	20.7.	27.7.-27.8.	17.9.	1.10.					23.7.	4.8.- 8.9.	15.9.	1.10.	16.7.	30.7.-30.8.	8.9.	22.9.	8.7.	20.7.-12.8.	29.8.	26.9.
9.	30.7.	10.8.-27.8.	7.9.	23.9.	19.7.	3.8.-16.8.	26.8.	6.9.	23.7.	4.8.-10.9.	21.9.	4.10.	19.7.	28.7.-18.8.	3.9.	27.9.	6.7.	15.7.-12.8.	24.8.	3.10.
10.	13.7.	20.7.-30.7.	10.8.	27.8.	28.7.	3.8.-16.8.	21.8.	30.8.	8.8.	18.8.-20.9.	28.9.	10.10.	21.7.	30.7.-21.8.	3.9.	17.9.	15.7.	22.7.- 8.8.	24.8.	14.9.
11.	2.7.	20.7.-10.8.	27.8.	7.9.	19.7.	9.8.-19.8.	30.8.	20.9.	16.7.	6.8.-10.9.	22.9.	4.10.	12.7.	23.7.-11.8.	30.8.	17.9.	8.7.	18.7.-29.7.	26.8.	19.9.
12.									11.8.	20.8.-26.9.	6.10.	15.10.	14.7.	30.7.- 1.9.	8.9.	15.9.	8.7.	18.7.-29.7.	10.8.	29.8.
13.																	4.7.	8.7.-18.7.	1.8.	5.8.
14.	2.7.	15.7.-10.8.	25.8.	7.9.	19.7.	5.8.-16.8.	30.8.	2.9.	11.8.	29.8.-15.9.	20.9.	27.9.	30.7.	9.8.- 1.9.	6.9.	15.9.	15.7.	22.7.-19.8.	24.8.	5.9.
15.	13.7.	20.7.-30.7.	10.8.	27.8.	19.7.	28.7.- 9.8.	16.8.	2.9.	1.8.	11.8.- 8.9.	16.9.	26.9.	19.7.	2.8.-18.8.	27.8.	10.9.	8.7.	15.7.- 5.8.	12.8.	22.8.
16.									11.8.	20.8.-17.9.	24.9.	8.10.	28.7.	9.8.-30.8.	6.9.	17.9.	13.7.	22.7.-10.8.	19.8.	24.8.
17.	20.7.	3.8.-13.8.	7.9.	23.9.	9.8.	26.8.-23.9.	30.9.	11.10.	18.8.	15.9.-3.10.	13.10.	27.10.	11.8.	20.8.- 8.9.	20.9.	15.10.	22.7.	27.7.-26.8.	14.9.	3.10.
18.					9.8.	16.8.- 2.9.	15.9.	25.9.	8.8.	18.8.-20.9.	25.9.	8.10.	21.7.	4.8.-23.8.	8.9.	17.9.	8.7.	20.7.-27.7.	12.8.	28.8.
19.									4.8.	11.8.-13.9.	25.9.	3.10.	16.7.	28.7.-16.8.	27.8.	10.9.	4.7.	13.7.-29.7.	5.8.	9.9.
20.	2.7.	13.7.- 3.8.	20.8.	7.9.	28.7.	5.8.-16.8.	26.8.	6.9.	28.7.	18.8.-22.9.	27.9.	6.10.	21.7.	6.8.-27.8.	6.9.	20.9.	15.7.	22.7.-24.8.	2.9.	9.9.
21.									20.8.	2.9.-28.9.	3.10.	13.10.	28.7.	11.8.- 6.9.	17.9.	1.10.	18.7.	27.7.-24.8.	5.9.	28.9.
22.									11.8.	29.8.-24.9.	2.10.	10.10.	28.7.	9.8.-30.8.	6.9.	10.9.	18.7.	22.7.- 5.8.	12.8.	29.8.
23.	9.7.	13.7.-30.7.	28.8.	23.9.					23.7.	28.7.-25.8.	29.8.	6.10.	12.7.	26.7.-13.8.	1.9.	10.9.	1.7.	6.7.-27.7.	29.7.	2.9.
24.									6.8.	11.8.-21.9.	26.9.	3.10.	25.7.	6.8.-27.8.	6.9.	17.9.	18.7.	22.7.-15.8.	22.8.	26.8.
25.	15.7.	20.7.-10.8.	17.8.	27.8.	5.8.	19.8.- 6.9.	15.9.	4.10.	4.8.	18.8.-24.9.	1.10.	13.10.	28.7.	16.8.- 6.9.	17.9.	27.9.	22.7.	27.7.-19.8.	22.8.	26.8.
26.													25.8.	15.9.-4.20.	8.10.	18.10.	8.8.	10.8.-19.9.	26.9.	7.10.
27.	13.7.	18.7.- 6.8.	13.8.	17.9.	29.7.	5.8.-19.8.	30.8.	9.9.	28.7.	8.8.-19.8.	23.9.	28.9.	23.7.	9.8.-30.8.	6.9.	15.9.	18.7.	22.7.- 8.8.	19.8.	24.8.
28					1.8.	9.8.-26.8.	30.8.	15.9.	8.8.	18.8.-24.9.	2.10.	8.10.	19.7.	21.7.-23.8.	3.9.	20.9.	4.7.	8.7.-29.7.	22.8.	12.9.

Gartenarbeit und Blumenpflege

ALEXANDER STEFFEN / GARTENGERÄTE II

Der Rechen (die Harke) und ſein Gebrauch

DIE Verſuchsanſtalt für Landarbeitslehre Pommritz hatte auf den letzten großen Ausſtellungen der Deutſchen Landwirtſchaftsgeſellſchaft eine Sammlung der in den verſchiedenen Gegenden Deutſchlands gebräuchlichen Spaten, Hacken, Rechen ausgeſtellt und damit eine Buntſcheckigkeit des Vorhandenen handgreiflich erwieſen, die durch die praktiſchen Nutzanforderungen keine Begründung findet. Die Rechenbreite zum Beiſpiel ſchwankte zwiſchen 35 und 95 Centimeter. Es hat bisher nur eine vorläufige experimentelle Eignungsprüfung ſtattgefunden, die zur Annahme führte, daß 60 Centimeter eine gute Breite und ein Zinkenabſtand von 5 Centimetern ausreichend ſei. In der Landwirtſchaft wird der Rechen eigentlich nur für Gras beziehungsweiſe Heu und Klee gebraucht. Daher ſind dort die Anſprüche weſentlich andere als im Gartenbau. Dort treten ſchnelle Maſchinen an die Stelle der Handarbeitsgeräte; in der Gärtnerei wird Handarbeit ſtets eine große Rolle ſpielen, weil die Einzelpflanze Gegenſtand der Bearbeitung und der Zucht iſt, ſelbſt im feldmäßigen Gemüſebau, bis ſchließlich die Anbauverfahren in landwirtſchaftliche übergehen. Der Gartenbau ſtellt daher an den Rechen andere und mehr Anforderungen. Er gebraucht ihn auch wie der Landwirt zum Zuſammenholen von Stoffen wie Gras, Laub, Stroh, Kraut und dann ähneln ſich die Anſprüche, vor allem aber dient der Rechen dem Gärtner zum Einebnen von Erdflächen; im erſteren Falle arbeitet das Gerät faſt nur auf Zug, im letzteren Fall auf Zug und Stoß. Das bedingt verſchiedene Bauweiſen. Der Zugrechen kann aus Holz ſein, der Zug- und Stoßrechen nur ausnahmsweiſe. Der Zugrechen, oder ich will ihn Holzrechen nennen, muß leicht ſein. Wenn ich ihn bei der Arbeit, den Stiel in der geſenkten Rechten haltend, auf den Boden hinlege, muß er oben auf der Grasnarbe liegen bleiben, er darf ſich durch ſein Eigengewicht nicht eindrücken, denn dann würde man hinter jeden Grasbüſchel hängen bleiben. Man verſuche mit einem eiſernen Rechen Heu oder Laub zu harken! Eine zu große Zinkenzahl beim Heurechen würde die Möglichkeit ſteigern, ebenfalls hinter Grasbüſcheln hängen zu bleiben. Das iſt alſo ein weiterer Grund — neben der Gewichtsvermehrung und Verringerung der Bruchfeſtigkeit des Balkens — die Zahl der Zinken nicht unnötig zu vermehren. Heu- und Laubrechen müſſen alſo aus Holz ſein. Für Einebnen von Erde verdient der eiſerne Rechen den Vorzug. Ich will aber gleich zwei Ausnahmen erwähnen. Wenn zum Beiſpiel in Frühbeeten und Gewächshäuſern Beete geebnet werden ſollen oder bei ganz leichtem Sandboden, läßt ſich der Holzrechen, mit dem es ſich wegen ſeiner Leichtigkeit angenehm arbeitet, verwenden, weil die zu glättende Erde äußerſt mürbe iſt und gar keine Widerſtände bietet. Mit dem geraden Rücken des Rechens laſſen ſich die Frühbeetränder bei ſenkrechter Stielhaltung gut feſtſtoßen und gedreht eignet ſich der Rücken ſelbſt zum Glätten; während bei den eiſernen Tülle oder Stiel hindern. — Selbſt bei dieſer Handhabung muß man mit dem Holzrechen vorſichtig umgehen. Seine Schwäche iſt die Stielbefeſtigung im Balken, da nur auf Zug berechnet. Die vielen abgebrochenen Stiele zeugen dafür und laſſen erkennen, daß die verbotene Anwendung auf Stoß leicht mit unterläuft. Die Befeſtigung des Stiels im Querbalken erfolgt bei den in hieſiger Gegend üblichen Rechen durch Aufſägen des Stiels, Zuſpitzung der Gabeln und Einſchieben, Verkeilen im Balken. Es iſt klar, die Zuſpitzung muß ſtark ſein, ſonſt wird der Balken zu dünn. Alſo brechen die Gabelarme über dem Balken leicht ab, beſonders wenn mit den Zinken nicht ſtielwärts gezogen, ſondern rückwärts geſtoßen wird; das Abbrechen erfolgt beſonders dann, wenn den Zinken eine leichte Stellung nach innen gegeben, ſie alſo nicht ſenkrecht in den Balken eingelaſſen wurden. Uns wurden 1924 Rechen geliefert, bei denen die Gabelanſätze durch Einlaſſung in Blechhülſen verſtärkt waren, die bis durch den Querbalken reichten. Das beugt dem Bruch vor. Immerhin ſollten zum Laub- und Heurechen ſtets einige Vorratsrechen mitgegeben werden.

Ein Heurechen muß leicht ſein. Wir ziehen ihn nicht nur über der Erdoberfläche hin, ſondern heben Heu und Laub hoch, um ſie zu Haufen zuſammen zu bringen, oder um ſie noch recht luftig aufzulockern. Holzrechen von 14 Zinken und 60 cm Balkenbreite (Fig. 2) wiegen zwiſchen 850 bis 950 Gramm, ein eiſerner von 16 Zinken 1250 Gramm, mit 18 Zinken 1500 Gramm. Die Verteilung des Gewichts ſpielt für angenehme Arbeit eine Rolle. Eine ungünſtige Verſchiebung tritt zum Beiſpiel ein, wenn der Stiel oben zu dünn ausläuft. Das macht im Ganzen das Gerät vielleicht leichter, aber das Übergewicht am Balkenende wird verſtärkt und der Rechen liegt ſchlecht in der Hand, er balanciert nicht richtig. Über die Mängel zu dünner Stiele ſprach ich früher ſchon. Das allerletzte Ende ſoll ſpitz ſein, weil man die Rechenſpitze beim Wenden gelegentlich gebraucht und weil wir ſie in Pauſen in die Erde ſtoßen.

Mit dem Heurechen muß man weit auslangen können, alſo ſei der Stiel lang, 170 Centimeter. Das Zuſammenholen wird erleichtert, wenn die Zinken nicht ganz ſenkrecht zum Balken ſtehen, ſondern ein wenig ſtielwärts geneigt; bei ſenkrechtem Stand würden die Zinken leicht nach hinten weg gedrückt werden, während ſie in der leicht geneigten Stellung dem Druck des Rechergebniſſes einen verſtärkten Widerſtand entgegenſetzen. Bei Stoßarbeit würde natürlich dieſe Schrägſtellung des Zinkens beſonders verhängnisvoll wirken.

Die Einführung des Stiels in den Holzbalken wurde ſchon auf andere Weiſe als durch Gabelung des Stiels (1) verſucht. Man ließ den Stiel ungeteilt in Balken ein und ſuchte ihn durch Holz- oder Drahtbügel (2) in ſeiner Stellung zu erhalten. Beides iſt unvollkommen und hat Brüche nicht aufhalten können. Es kommt alles auf die Sorgfalt der Arbeit an. Der Mangel bleibt, daß der Stiel, um den Querbalken nicht zu ſehr zu ſchwächen und ſeine Spaltneigung zu fördern, ſtark zugeſpitzt werden muß. Man verſuchte durch Auflegen eines bandeiſernen Zwiſchenſtücks die Verbindung zwiſchen Stiel und Balken zu verbeſſern. Doch wird der Rechen endwärts dadurch etwas ſchwer.

Der Querbalken, der die Zinken trägt, kann grade oder mit leichter Biegung ſtielwärts gebaut ſein; ſelbſtverſtändlich aſtrein und mit der Holzfaſer laufend; der Querſchnitt 3 : 3 Centimeter, nach den Enden um ein geringes verdünnt. Seine Länge wird nach der Beſtimmung wechſeln. Für ganz leichte Stoffe wie Heu iſt die Pommritzer Breite von 60 Centimeter gut, aber für ſchwere wie Erde und Laub halte ich ſie für zu groß und 50 Centimeter für ausreichend. Für die meiſten gärtneriſchen Arbeiten würde eine Breite von 60 Centimeter bei Dauerarbeit zu ſehr ermüden. Bei den noch zu beſprechenden eiſernen Adlerrechen halte ich ſchon die ſeltene Breite von 48 Centimeter mit 18 Zinken für zu ſchwer. Ich beſitze ſolchen Rechen ſelbſt. Aber bei unſerem ſchweren Boden muß man ſich anſtrengen mit ihm, es wird auch ſchwer, ihn über klumpigem Grabeland in Gleichgewicht zu halten. Natürlich ſchafft bei leichten Arbeiten ſolche Breite wieder ganz anders. Die Bodenverhältniſſe rechtfertigen alſo verſchiedene Breiten.

Die Zahl der Holzzinken im Holzrechen muß ſich ganz nach der zu bewältigenden Aufgabe richten. Für Heu und anderes langfaſeriges Material genügen 12 Zinken auf 60 Centimeter Balkenbreite, für Laub möchten es 14 ſein. Bei Erdarbeiten kämen wir damit nicht aus, weil feinkörnige Maſſen bewegt werden. Alſo müſſen die Zinken enger ſtehen, drei Centimeter. Die Zinkenlänge (6) beträgt 10 Centimeter, davon ſtecken zwei Centimeter im Balken; für Heu kann die Länge zwölf Centimeter ſein. Während den Zinken, ſoweit ſie frei ſtehen, ein ovaler Querſchnitt gegeben wird, deſſen längere Achſe in die Zugrichtung geſtellt wird, erhalten ſie für das Einlaſſen im Querbalken quadratiſchen Querſchnitt, weil ſich bei dem ſteten Hin- und Herſtoßen ein runder Querſchnitt leicht ausleiert. Es liegt der gleiche Vorgang vor wie bei den Felgen eines Rades, deren Querſchnitt innerhalb der Nabe quadratiſch, außerhalb oval gefertigt wird. Die Zinken müſſen natürlich feſt in den Balken ſitzen, dürfen aber nicht mit Gewalt eingetrieben werden, ſodaß ſie den Balken ſpalten. Eine Verkeilung ſorgt für feſteren Sitz. Geſpaltene Balken muß man gelegentlich durch Aufnageln von dünnen Eiſenblechſchienen oder durch Drahtbänder zu erhalten ſuchen. Das bedeutet aber ſelbſtverſtändlich keine Verbeſſerung. Zinken müſſen ebenſo wie Balken aus feſtem Holz ſein; in unſerer Gegend nimmt man meiſt Rotbuche, für die Zinken iſt Eſche das Beſte. Der Stiel ſei Fichte.

Die eiſernen Rechen (3, 4, 5) weiſen noch viele Formen auf; die aus einem Stück geſtanzten, als Adler-Rechen gehenden werden aber alle älteren Formen verdrängen. Lange waren im Gebrauch jene Rechen, bei denen in ein Eiſenband Drahtſtifte mit breitem Kopf eingelaſſen waren. Die Tüllen waren dem Querbalken aufgenietet. Die Mängel traten beim

Gebrauch offenſichtlich hervor. Die Drahtſtifte wurden ebenſo wie die Tüllenbefeſtigung wacklig infolge Roſt und Anſtrengung, ſie verbogen ſich leicht, weil ſie in der Richtung des Widerſtandes, des Zuges oder Stoßes, keine Verſtärkung aufwieſen. Sie haben heute kein Daſeinsrecht mehr. Die Adlerrechen weiſen demgegenüber keinen runden, ſondern einen rechteckigen Querſchnitt der Zinken (7) auf, ſo daß die größte Breite von 7 Millimeter bzw. 5 Millimeter an der Spitze in der Widerſtandsrichtung liegt. Der ganze Rechen beſitzt keinerlei Nietſtellen, iſt völlig aus einem Stück, ſodaß die Möglichkeit von Bruch und Lockerung von Einzelteilen ausgeſchloſſen iſt. Ein Verbiegen iſt nur bei Mißbrauch des Gerätes möglich.
Der Querbalken mit den gebogenen Zinken ſteht wie bei manchen Holzrechen nicht ganz rechtwinklig zum Stiel, ſondern wenig ſpitzwinklig, was ebenfalls das Zuſammenraffen erleichtert. Auf eine Breite von 42 Centimeter an kommen 16 Zinken, dies iſt die gangbare Breite, bei 48 Centimeter Breite ſind 18 Zinken vorgeſehen. Dieſe Breite halte ich für ſchweren Boden und ſchwache Kräfte für zu groß. Ein kleiner Rechen wird noch gebraucht für Steige und ihrer Breite angepaßt, alſo 28 Centimeter.
Zum Einebnen von Land dient in der Landwirtſchaft ein gerader Balken aus Eiſen oder Holz, oder eine Kette, die als Schleppe über das Feld gezogen werden, ſie folgen den Pflügen, gehen der Egge voraus. Der Rechen iſt eine Egge im Kleinen. Die Zinken bilden bei Egge und beim Rechen eine Fläche bzw. gerade Linie, die als Einebnungsgerät dient; nur ſtreichen ſie nicht über die Erdoberfläche unter Fortnahme der hohen Stellen hin wie eine Schleppe, ſondern die Zinken greifen lockernd und aufreißend in das Erdreich hinein, ſie packen es und nehmen es mehr oder weniger weit vorwärts in die Zugrichtung. Durch entſprechende Stellung des Rechenbalkens kann das erfaßte Erdreich in eine gewünſchte Richtung gebracht werden, wo tiefe Stellen ſich befinden. Auch dieſe Tätigkeit erfordert weites Auslangen bei ſtehender, nur wenig nach vorn geneigter Körperhaltung; das begründet die Notwendigkeit eines verhältnismäßig langen Stiels.
Der Rechen wird nicht nur mit ſeiner Zinkenſeite benutzt, der Rücken kommt gelegentlich auch heran. Iſt ein Frühbeet eingeebnet, ſo ſtoßen wir mit ihm an der Kaſtenwand ſenkrecht ringsherum die Wände feſt, doch ſind das Nebennützungen, auf die das Gerät nicht gebaut iſt, ebenſo wenig wie ein Spaten nicht die Beſtimmung hat, zum Einſchlagen von Pfählen benutzt zu werden.
Nur auf gut geglätteter Fläche zeichnet ſich die Abſchnürung mit Gartenſchnur genügend ab. Auf glatter Fläche kann ſpäter beim Erſcheinen des Unkrautes die Hacke oder Radhacke beſſer arbeiten. Im größeren Betrieb werden bei feldmäßiger Beſtellung vielfach Flächen bepflanzt, (zum Beiſpiel mit Kartoffeln, Kohlrüben), die nicht ſauber gerecht, ſondern nur geeggt, gefraiſt, oder mit Kultivator behandelt waren. Das ſind Fälle, wo aus Geldgründen auf die Feinarbeit mit dem Rechen verzichtet werden muß. Die Pflanzen kommen in ſolchem Fall leicht in verſchiedene Höhenlagen, können dann zu tief oder zu hoch ſtehen. Für zartere, feinere gärtneriſche Kulturpflanzen wird man daher, wo kein feldmäßiger, ſondern gartenmäßiger Anbau vorliegt, die Fein-Einebnung der Flächen mit Rechen durchführen. Wer Beete anlegt und nicht feldartig, alſo mit Steigen pflanzt, wird gleich beim Graben rechen und dann nochmals nach Abſchnürung der Beete. Dies zweite Rechen ſtellt die letzte Feinarbeit dar, das geſchieht mit ſteiler, faſt ſenkrechter Rechenhaltung und beſeitigt weitere Buckel und Unebenheiten leicht, weil durch die geſpannte Gartenſchnur eine Richt-Grade gegeben iſt, an der ſich Höhen und Tiefen abheben. Auf ungepflegtem Land entſteht beim Rechen viel Aufenthalt durch Ableſen von Quekken, Steinen, Wurzeln.
Im Kleinen läßt ſich ein Rechen benutzen, um längs der geſpannten Gartenſchnur Saatrillen aufzuhacken. Dazu muß man einen recht breiten ſpitzzähnigen, alſo eiſernen Rechen haben. Mit ihm zieht man ſpäter die beſäten Rillen zu und unter ſteiler Rechenhaltung ſtößt man die Erde der Saatrillen feſt, damit der Same gut von Erde umſchloſſen iſt und nicht leicht austrocknet.
Der Rechen bedeutet für den Garten das Gleiche wie die Egge fürs Feld. Sie folgt dem Spaten und ebnet ein, was bis dahin uneben und rauh dalag, ſie glättet und macht den Garten ſchön. Wenn die Arbeit getan iſt, dann gibt der Beſitzer den Steigen und Wegen einen letzten Verſchönerungsſtrich, ſodaß der Garten jungfräulich ausſieht, die Spuren der groben Arbeit ſind weggewiſcht. Doch löſt dies Wegerechen nicht nur äſthetiſche Gefühle aus, es hat praktiſche Bedeutung: die von der Wegmitte nach den Seiten getretenen Kiesmengen werden wieder auf die freigewordene Befeſtigung gezogen, Unebenheiten werden ausgeglichen, ſodaß ſich keine Regenpfützen bilden können, die jungen keimenden Unkrautſämlinge werden geſtört.
Beim gegrabenen Lande geſchieht das Rechen ſogleich hinter dem Spaten; die Arbeiter ſehen es als Vertrauensſache an, daher führt der Älteſte, der Vorarbeiter, oder der Geſchickteſte den Rechen. Daß er ſofort folgt, iſt für lehmigen Boden wichtig, da er in kurzer Zeit kruſtig wird und harte Klumpen bildet, die ſich 24 Stunden ſpäter nicht mehr völlig zerkrümeln laſſen. Das Glattrechen geſchieht unter kurzen Stößen auf die Klumpen, um wenigſtens an der Oberfläche eine feinkrümlige Maſſe zu ſchaffen, die gleichmäßig abdeckt, auf der ſich Abzeichnungen durch Gartenſchnur und andere Geräte gut abheben, die ein gutes Bett für Saat und Jungpflanzen darſtellten. Mit der Recharbeit ſoll auch ein Teil der beim Graben entſtandenen Hohlräume geſchloſſen werden.
Wenn beſtellte Felder und Beete durch Regenſchlag verkruſtet ſind, kann ein Rechen zum Auflockern der Kruſte dienen; es kommt nur ein ſpitzer eiſerner Rechen in Frage; mit ihm fährt man leicht über die Fläche, ohne viel Erde aufzuwühlen, unter Schonung gekeimter Saaten; fährt man in der Längsrichtung der Saatenreihen über die Fläche, ſo tut das junger Saat von Mohn, Möhren und ſo weiter nichts, weil in der Regel Sämlinge im Überfluß ſind und weil die Pflänzchen ausweichen. Je größer und zerbrechlicher die Pflänzchen (Bohnen), um ſo mehr Vorſicht. Man muß zu kleineren Rechen greifen, um nur *zwiſchen* den Reihen zu bleiben.

FRÜHJAHRSARBEITEN

Im Park

HATTE der Winter 1923/24 durch ſeine ungeheuren Schneemaſſen, die mancherorts noch zu Anfang Mai nicht verſchwunden waren, die Arbeiten im Park erſchwert und ganz unmöglich gemacht, da das ſpäte Frühjahr alle Kräfte in Anſpruch nahm, ſo gaben die folgenden beiden gute Gelegenheit, die Schäden wieder auszumerzen. Ungeheuer ſchwer und oft geradezu verwüſtend hatte der Schneedruck unſere Baum- und Strauchgruppen belaſtet! Große, altehrwürdige, charaktervolle Baumgeſtalten, dichteſte Gebüſchmaſſen wurden auseinander geriſſen, aus Form und Haltung gebracht und oft genug in ein wüſtes Chaos gewandelt. Nach ſo kataſtrophalen Wintern bedarf es beim Aufräumen freilich des ſcharfen Blickes eines naturfreudigen und auch kunſtbegabten Jüngers und vieler geſchickter Hände, um nicht mehr Schaden als Nutzen zu ſtiften. Nur nicht alle herabgebeugten, loſe und leicht geſchwungenen Linien tief niederwallender Baumäſte und Zweige in ein Nichts auflöſen und wegſchlagen. Nur nicht jedem leicht geneigten Baume durch Einſtutzen aller ſeiner Glieder Weſensart, Eigenſchwung,

Freiheit rauben, um Ordnung zu ſchaffen. Dann lieber da und dort einen ganzen ſchweren Aſt, und muß es ſein, auch einen mächtigen Baum *ganz* herausſchlagen! Hie und da auch durch eine Eiſenſtange oder Kette einen Anker ſchaffen oder ein Eiſenband gegen drohenden Abbruch tiefneigender Äſte anlegen als Halt, vielleicht auch eine möglichſt unauffällige Stütze geben, ſodaß Leben und Gleichgewicht erhalten bleiben und Lücken vermieden werden.
Dichtbuſchige, ältere Nadelhölzer wie Eiben, Wacholder, Lebensbäume und Verwandte, Rhododendron, Stechpalmen, Baumbuchs und andere Immergrünen, denen die lange ſchwere Schneelaſt nicht minder Halt und Form nahm, ziehe und binde mit einem Draht oder ſtarken Kokosſtrickbande wieder zuſammen und ſchütze ſie dauernd dadurch gegen Spaltungen; wer weiß, was uns der tückiſche Märzmonat bringen kann, gedenke nur der gefährlichen, wäſſerigen Schneelaſten, die oft ſelbſt noch der April ſpendet.
Und in Sonnenlagen ſchirme Deine Immergrünen an ſonnigwarmen Lenztagen mit Tannenäſten; wie leicht kann eiliger Nachthauch verhängnisvolle Spuren an Laub, Knospen und auch an den Blüten der Frühaufſteher Rhododendron dauricum, praecox, mucronulatum hinterlaſſen.
In den Linden, Ahorn und Pappeln alter Parke häufen ſich, jetzt recht augenfällig, manchmal die Miſteln, Viscum album, zu wahren Rieſenkugeln; wo ſie nicht gerade im Übermaß auftreten, laſſe ſie den Naturpark getroſt weiter ſchmücken: welche glitzernde, fröhliche Winterzier, welch munteres Vogelleben, Amſeln, Singdroſſeln, Stare, Zeiſige, Meiſen, Dompfaffen locken ſie ſcharenweiſe herbei und beleben die winterliche Stille. Wo ſie freilich die Kronen zu unterdrücken drohen oder in der Nähe von Obſtpflanzungen ihr Unweſen treiben, müſſen ſie mit ihren Nähräſten, die meiſt ſchon recht entkräftet und morſch ſind, beſeitigt werden. Wer es um Weihnachten tut, gewinnt dabei gleichzeitig eine reizende Zier und einen lohnenden Handelsgegenſtand.
Wie ſehen noch manche *Gebüſchgruppen* nach dem harten Winter aus. Auch hier haue im Notfalle ſtarkes, altes, gänzlich überlebtes und kraftloſes Holz ganz heraus, um jungem Nachwuchs Platz zu machen. Und fort mit den vielen ekligen Schößlingen an Edelflieder, dem aufdringlichen Geſchmeiß überall ſich einniſtender Ahorn-, Ulmen- und Lindenſämlingsbäumchen. Im Übrigen aber im Punkte Gehölzſchneiden Augen auf und Gedanken bei der Sache: Blütengehölze ſind individuell zu behandeln. Nur Verbrauchtes, Verblühtes herausnehmen und auch nicht einmal unbedingt jedes Jahr. Und was *bald* blühen will und ſchon Knoſpen zeigt, wie Forsythien, Magnolia, japaniſche Quitte, Flieder, frühe Spiraeen und dergleichen, nicht Rühran! Aber auch Sommerblüher wie Deutzien, Philadelphus und ähnliche nur nach dem alten Grundſatze vom Verbrauchten, deſſen Reſte auf die Dauer ſtören und deshalb von Zeit zu Zeit heraus müſſen. Lieber garnicht als ſinnlos ſchneiden. Gründliches Verjüngen tief ins alte Holz wird nach 8 bis 10 Jahren wohl auch da und dort im Naturpark nötig, ſoll aber nie zur mechaniſchen Gewohnheit werden.
Die Allerweltsſträucher wie Schneebeere Symphoricarpus, wilder Flieder und Berberitzen, ungewollt angeflogenes Holundergebüſch, manchmal auch Caragana-Wüſten und Loniceren-Wildniſſe weiſe kraftvoll in die gebührenden Grenzen zurück oder noch beſſer: rode ſie gänzlich heraus, ein Neueres, Schöneres zu bauen. Unſere vielen köſtlichen blütenreichen und ſchönen Philadelphus, Deutzien, Pirus, Forsythien, Diervillen, Spiraeen, Cydonien, die prächtigen Wildroſen und all das noch Neue können garnicht reichlich genug gegen jenes längſt überholte, rückſtändige Alltagsgeſindel ausgeſpielt werden.
Freilich muß, wo Neues anwachſen ſoll, auch Neuland vorhanden ſein oder geſchaffen werden. Wirf den alten Nährboden bis zu Metertiefe um, bringe in die oberen Schichten reichliche Mengen Kompoſt, alten verrotteten Dünger, abgelagerten Teichſchlamm, Kalk, faules Laub, vermiſche es gründlich (der Herbſt wäre freilich geeigneter geweſen) und dann flott an die Arbeit. Eine gute Düngerdecke iſt allen friſchgepflanzten zuträglich; alter wie neuer. Darum darfſt Du auch alternden Gehölzen und Gebüſchgruppen die Nahrung und Wäſſerung, wo es nottut, nicht vorenthalten. Bei offenem Boden iſt winterliche Jauchedüngung durchaus am Platze. Die alte Laubdecke gönne ihnen auch.
Das beliebte, tiefe und unnachſichtlich-pedantiſche Umſtechen der Gehölzgruppen, und beſonders älterer, iſt ein Unfug und ſtört die ruhige Weiterentwicklung, verletzt Wurzeln und erzeugt Hemmungen im Wachſen. Lockeres Hacken bei gleichzeitigem Jäten genügt vollkommen, und dann das belebende Düngen, auch mit Kunſtdünger wie Thomasmehl, 100 Gramm oder Düngekalk und auch 50 Gramm Kali (40 %) auf den Quadratmeter, nicht verſäumen.
Und dann Umſchau halten, welcher Zweck, welcher Raumwert jeder Gehölzgruppe zukommt. Und auch ſonſt im Park den Blick frei auf das Ganze gerichtet, auf den Grundgedanken, der dem Erbauer wohl vorſchwebte, auf die Eigenart gerade Deines Parkes, die herauszukehren, zu betonen, pietät- und verſtändnisvoll hochzuhalten, Deine Pflicht iſt. Denn auch ſo ein alter Park war einmal wie auch Du ein Kleines, Unentwickeltes, dem nur die Grundlinien gegeben waren, und das nun erſt als Ausgewachſenes ſeine Zwecke und Zielgeſtalt angenommen hat. Hat er das auch wirklich? Oder hat er ſie bereits überſchritten, und wo liegt der Fehler? Wache und behüte Deinen alten Park wie Dich ſelber und gönne ihm, nun er alt geworden, die freie Poeſie wohliger Ungebundenheit: Laß Moospatina an den alten Baumſtämmen haften, laſſe in ihren Schatten ihre tauſend Kinder gedeihen und wehre auch nicht in den Lichtungen der Wucherblumen, der Akelei, dem Maßliebchen und all der anderen angeflogenen Wildblumenzier.
Gerade die winterliche Muſterung gibt, wie ſchon Graf Silva Tarouca einmal hier ausgeführt hat, Gelegenheit, das Ganze wie jedes einzelne Hilfsorgan, jeden Baum und Strauch, deſſen eigene Schönheit uns im Sommer entging, in ſeinem Aufbau und Charakter zu betrachten und unſer Verſtändnis für ihre Zuſammenhänge zu vertiefen. Das iſt nicht weniger genußreich und wichtig als alle noch ſo durchdachte Kleinarbeit und ſchließliche Erfüllung aller Aufgaben.
Durchblicke, Ausſichten, Alleen, Hecken, Umwehrungslinien, alle wollen richtig gelenkt und begrenzt werden, Lücken verſtändnisvolle Ergänzungen erfahren, um gewollte Wirkungen und Eindrücke zu erzielen. Der übermäßigen Ausbreitung gern wildernder Lianen, wie Clematis vitalba, Wildreben, Epheu, Hopfen, tue maßvollen Einhalt, weil ſie mit ihrem kraftvollen Lebenswillen Jungpflanzungen erſticken können, ſo maleriſch ſie in ungebundener Freiheit auch wirken mögen.
Auf eingedeckte Zärtlinge, wie empfindliche Roſen und die Immergrünen, habe ſtets ein wachſames Auge. Eine Lockerung und Durchlüftung ihrer Winterſchutzhüllen iſt bei milder Witterung wichtig; vielleicht dürfen ſie da und dort ſchon ganz davon befreit werden; ſie in ſteter Bereitſchaft zu halten, iſt immerhin geboten, denn Nachtfröſte liegen wie Strolche auf der Lauer. Neu beſchaffte Roſenſtämmchen oder -büſche können nicht früh genug im Jahre gepflanzt, müſſen dann freilich noch geſchützt und beſonders Kronenbäume für mehrere Wochen mit Erde bedeckt werden, um ſie vor Schäden zu bewahren.
Staudenpflanzungen bedürfen gewöhnlich nach 3 bis 4 Jahren einer Umlegung, um lebensfriſch und blühwillig zu bleiben oder es wieder zu werden. Wir teilen und pflanzen ſie, von allem anhaftenden Unrat geſäubert, in neuen dungreichen, tief gegrabenen Boden; eine zweifingerhohe Deckung mit verrottetem Miſt oder latriniſiertem Torfmull ſchützt auch ſie vor allerlei Schäden und ſichert ihr Gedeihen. Aurikeln und einige andere Stauden, beſonders auch jüngere Nachzucht werden häufig bei Barfroſt gehoben und ſind der Gefahr des Verdorrens ausgeſetzt; drücke ſie mit feſtem Griff wieder ein, pflanze ſie neu oder umgieb ſie mit kräftiger Erde.
Für Neupflanzungen von Stauden bietet meiſtens ſchon der März beſte Gelegenheit, zumal, wenn bereits im Herbſt zuvor der Nährboden vorbereitet wurde. Halbmetertiefes Durcharbeiten, reichliche Stalldünger- und Kompoſtuntermiſchung, auch Beigabe von Fäkaltorf, wenn nötig auch Düngekalk, etwa 50 Kilogramm auf 100 Quadratmeter Fläche, (in leichtem Boden kohlenſaurer, in ſchwerem Boden Ätzkalk), alles gut durchgearbeitet, geben einen guten Nährboden ab. Vor Gehölzgruppen mag eine 50 bis 80 Centimeter tief reichende Schutzwand aus Dachpappe eingegraben werden, um das gierige Eindringen fremder Wurzeln zu verhüten. Eine große Anzahl der bekannteſten Zierſtauden iſt ſo widerſtandsfähig, daß ſie faſt während der ganzen Winterzeit, ſofern nur der Boden offen iſt, gepflanzt werden können, ſo zum Beiſpiel Aſtern, Märzglöckchen, Funkien, Harpalium, Iris germanica, Rudbeckia, Goldball, Goldruten und andere. Je früher wir ſie wieder in den Boden bringen können, deſto beſſer natürlich für ſchnelleres Erblühen.
Wo in der Nähe des Wohnhauſes Parkraſenflächen ſichtbar werden, wird ihre Kurzhaltung oft erwünſcht ſein. Wenn es nicht ſchon in den Vormonaten geſchah, mögen ſie eine Düngung über ſich ergehen laſſen: Breite etwa ein Kubikmeter gute, unkrautfreie, düngerreiche Erde auf je 100 Quadratmeter ganz kurz gehaltener Raſenfläche bei leichtem, trockenem Froſt aus, verharke ſie gleichmäßig und walze danach. Alte Raſenplätze werden durch eine kräftige Jaucheſpende zu neuem, üppigem Wuchs angeregt, freilich muß der Boden offen ſein, um ſie ſchnell aufzunehmen. Auch wird empfohlen, wo Jauchedüngung nicht am Platz iſt, mit 200 bis 300 Gramm Fiſchguano und konzentriertem Rinderdünger und 20 bis 30 Gramm Kaliſalz (40 %) auf den Quadratmeter Raſenplätze während des Winters zu düngen.
Gegen Moosbildung im Raſen pflegt man mit Erfolg möglichſt feinge-

mahlenen Düngerkalk einzustreuen, auch fein gepulverte Holzasche ist nützlich, schließlich wird auch Eisenvitriol in trockenem, ganz fein gestoßenem Zustande, und zwar 10 bis 15 Gramm auf ein Quadratmeter Fläche, verwendet, stille trockene Tage sind dafür besonders geeignet.
Wo abseits der Wohnstätten nicht auf pedantisch-peinliche Reinkultur der Grasflächen Wert gelegt wird und der Rasen sich zwangloser bestocken darf, sei indessen auch der freieren Moosbildung kein Hindernis bereitet, wenn sie auch vielleicht ein Gräslein erstickt und manches Kräutlein sich zu Gaste ladet. In den luftfeuchten Seen- und Gebirgsgegenden ist die Vermoosung der Parkrasenfläche oft garnicht aufzuhalten. Was tut es? Erfüllt doch auch ein Moosteppich seine Zwecke, einen seidigweichen, glänzend immergrünen Rasen zu erzeugen, der dem Boden zudem die Frische sichert und einer Fülle lieblichster Wildstauden einen beschaulichen und wohligen Platz gewährt: weiße Margareten, lila Glockenblumen, weiße Lichtnelken, gelbe Habichtskräuter und manche andere, je nach der Gegend, verschmelzen zu einem unsagbar lieblichen, und in seiner Schlichtheit Herz und Sinnen wohltuenden Bildchen von unendlicher Poesie, das erst im Verscheiden der Sense verfallen darf.
Wenn auch die Reinhaltung im Parke Grundsatz sein muß, den ersten farbigen Unkräutlein, so den rosigen Taubennessel, den leuchtenden Kreuzkräutern, den fast immerblühenden Gänseblümchen, den himmelblauen Ehrenpreisarten sei der kurze Lenztraum vergönnt, bald genug werden sie Asche und Staub sein. *Erich Wocke*

Aussaat und Anzucht der Einjahrsblumen

DER März ist die Zeit, die Hauptaussaaten der verschiedenen, für unsere Gärten so wichtigen Einjahrsblumen vorzunehmen. Allerdings ist es für einige Vertreter schon reichlich spät, sie müssen unmittelbar zur Aussaat gebracht werden, falls es nicht schon geschehen ist. Die Reihe unserer farbenfrohen Einjahrsblumen ist sehr groß. Sie enthält recht verschieden anspruchsvolle Gattungen und Arten und deren Nachkommen, so daß hierauf in der Anzucht Rücksicht genommen werden muß. Denn neben einigen langsam wüchsigen, in der Jugend recht empfindlichen Sorten, die möglichst im Gewächshaus zur Aussaat gebracht werden müssen, giebt es eine große Zahl, deren Aussaat im kalten Mistbeetkasten vor sich geht, und noch andere, die gleich ins Freie gesät werden. Die letzten sind besonders für den Gartenfreund wichtig, dem Kästen und Gewächshaus fehlen.
Eine frühe Aussaat im mäßig warmen Gewächshause verlangen die schönen, dankbar und immerblühenden kleinen Begonien, die Lobelien, Petunien, Löwenmäulchen und ähnliche. Diese müssen eigentlich schon im Januar-Februar zur Aussaat gebracht werden, sofern man sie recht früh in Blüte haben will. Wird erst jetzt ausgesät, dann kommt die Blüte entsprechend später. Es ist immer noch besser, eine verspätete Aussaat vorzunehmen, als diese überhaupt zu unterlassen. Da es sich bei den genannten Gattungen um feines Saatgut handelt, ist eine recht sorgsame Bearbeitung geboten. Saubere Saatgefäße, eine recht sandige, humose Erde, eine nicht zu dichte Saat und aufmerksame Beobachtung der fertigen Aussaaten sind nötig. Wenn auch bis zum Auflaufen der Saat eine gewisse Wärme erforderlich ist, müssen die jungen Sämlinge kühler stehen. Auch viel Licht muß ihnen gewährt werden, wie ihnen auch frische Luft zugeführt werden muß. Häufig wird der Fehler begangen, Aussaaten und Sämlinge zu feucht zu halten. Das ist völlig verfehlt. Es gibt bei zu starker Feuchtigkeit zu leicht Fäulnis, wodurch oft in kurzer Zeit alles verdorben ist. Der erfahrene Pfleger weiß, daß zur Keimung und zum guten Auflaufen wohl eine gleichbleibende, wenn auch nur mäßige Feuchtigkeit erforderlich ist. Er weiß aber auch, daß die jungen Sämlinge eher eine gewisse Trockenheit vertragen als zu große Feuchtigkeit. Steigt die Trockenheit zu sehr an, dann zeigt das allmähliche Welken selbst die Notwendigkeit des Wässerns an.
Für die zweite Gruppe der Einjahrsblumen, die in kalte Mistbeetkästen auszusäen sind, ist die Aussaat in der zweiten Märzhälfte gerade richtig. Manche wie Zinnien, Balsaminen können noch gut in der ersten Aprilhälfte ausgesät werden. Die bekanntesten Gattungen sind hier folgende: Astern, Chrysanthemum, Coreopsis, Dianthus, Levkojen, Nemesia, Phlox, Salpiglossis, Tagetes, Verbena. Dem noch wenig erfahrenen Liebhaber ist eine engere Auswahl anzuraten.
Für diese Aussaaten sind kalte Mistbeetkästen erforderlich. Die Bezeichnung kalte soll besagen, daß es nicht erforderlich ist, diese Saatkästen durch Unterpackung von Dung und Laub oder eines anderen Materials zu erwärmen. Die natürliche Wärme, besonders die durch übergelegte Fenster gefangene Sonnenwärme genügt zur guten Keimung vollkommen. Aus diesem Grunde kann man auf einen Mistbeetkasten verzichten. Es genügt, ein recht gut bearbeitetes Saatbeet des Freilandes mittels Bretter kastenartig einzufassen und mit Mistbeetfenstern abzudecken, Notkästen zu bauen. Die Hauptsache ist ein bestimmter, gleichbleibender Schutz und Speicherung der Sonnenwärme, die sowohl die Erde wie die Luft im Aussaatkasten erwärmt. Die Bretter und Fenster geben dieses hinreichend.
Wichtig ist die Wahl der Aussaaterde. Obwohl eine leichtere, humose Erdmasse das beste Keimbett darstellt, darf sie keine unverwesten Dungteile enthalten, auch muß sie reichlich mit scharfem Sand durchsetzt sein. Wenn im allgemeinen die jungen Einjahrsblumen, im Sämlingsstadium wenig empfindlich oder anspruchsvoll sind, so ist bei Levkojen doch besondere Sorgfalt ratsam. Gerade ihnen gebe man eine recht sandige, lieber etwas hungrige als zu üppige Erde, da sie in fetteren Böden sehr leicht von Krankheiten heimgesucht werden. Sie erhalten »schwarze Beine«, wie der fachliche Ausdruck lautet, fallen um und verderben. Ein fast überall auftretender Fehler, die zu dichte Saat, ist infolge der kleinen Samen hier ganz besonders üblich. Man solle es zur Gewohnheit machen, stets in Reihen auszusäen, selbst feinere Saaten. Mit scharfkantiger Latte drücke man in das gut geebnete Saatbeet feine, ziemlich eng laufende Rillen und streue den Samen weitläufig in diese. Trotz des Bemühens weite Saat einzuhalten, werden auch so noch die Sämlinge dicht genug stehen. Doch ist jedenfalls einer zu dichten Saat vorgebeugt. Die Bedeckung des Samens sei nur schwach. Ein leichtes Anbrausen sorgt für Anfeuchtung und Bindung des Saatbeetes. Dann werden die Fenster aufgelegt und bis zum Auflaufen der jungen Sämlinge geschlossen gehalten. Wie bei den feineren Haussaaten sei man auch hier vorsichtig mit dem Gießen der Saat und jungen Sämlinge. Man bedenke, daß stärkere Feuchtigkeit im kalten oder doch kühlen Boden noch viel schädlicher wirkt als im wärmeren Boden des Gewächshauses. Auch beachte man ein genügend reichliches Lüften dieser Kästen, wenn die Sämlinge aufgelaufen sind. Dadurch wird von Anfang an ein gesundes Wachstum der Jungpflanzen sicher gestellt.
Die schönsten, stärksten und gesündesten Jungpflanzen erhält man, wenn die jungen Sämlinge recht bald verstopft, verpflanzt werden. Bei den frühen Aussaaten von Begonien, Lobelien, die gewöhnlich im Gewächshause erfolgen, ist das Verstopfen üblich. Es werden handliche, flache Holzkästen, die etwa die Größe von 50 : 30 : 8 Centimeter haben, oder doch annähernde Ausmaße, hierfür erforderlich. Sie werden nach Schaffung eines guten Wasserabzuges mit sandiger, humoser Erde gefüllt. Mittels kleiner Hölzchen pflanzt man dann die noch sehr jungen Sämlinge, die oft erst die Samenblättchen entwickelt haben, aus den Saatgefäßen in diese »Handkästen«. Nach Fertigstellung verbleiben sie vorerst noch im Gewächshause, werden aber später, wenn in gutem Wachstum stehend, hinaus in kalte Kästen gestellt. Hier ist die weitere Entwicklung der Jungpflanzen besser als wenn sie im Gewächshause verblieben. Die beste weitere Bearbeitung ist allerdings die, die nun schon stark gewordenen Sämlinge vorerst aus den Handkästen direkt in einen kalten Kasten, etwas weiter gestellt, auszupflanzen. Denn so ist die stärkste Entwicklung der Pflanzen möglich. Im Hausgarten, bei kleinen Mengen, sollte man sich dieser kleinen Mehrarbeit gern unterziehen.
Aus dem oben angegebenem Grunde sollte überhaupt das Verstopfen der jungen Sämlinge vieler Einjahrsblumen mehr üblich sein. Besonders sind die Levkojen dafür dankbar. Fast könnte man sagen, daß nur dadurch überhaupt eine wirklich gute Jungpflanze herangezogen werden kann. Auch bei Astern ergibt das Verstopfen eine sehr gute Pflanze.
Allerdings erfordert diese Arbeit viel Platz im kalten Kasten oder in einem Behelfskasten. Stehen Bretter zur Verfügung, dazu einige kurze Holzpflöcke, sowie die erforderlichen Mistbeetfenster, dann hat es keine Not. Es genügt dann, in einem solchen Kasten ein einfaches Erdbeet zu errichten, wozu eine gute humose, gesunde Erde dient. Je nach der Stärke der Jungpflanzen werden sie entsprechend weit gepflanzt. Es genügt als mittlere Entfernung etwa die Länge eines Fingergliedes, um stärkste Pflanzen zu erziehen. Auch ein klein wenig engerer Stand reicht aus. Natürlich muß den Pflanzen stets eine aufmerksame Pflege gewährt bleiben. Vor allem sind sie nie zu feucht zu halten. Sie können bei Sonnenwetter öfter, doch nur leicht gespritzt werden, nie bei trübem Wetter. Das Sonnenlicht muß auf die Pflanzen ungehindert einwirken können, und wenn es im Kasten zu warm wird, muß hohes Lüften für Ausgleich sorgen. Bei den Levkojen ist die Wässerung recht behutsam zu halten. Man gieße durchdringend, dann aber längere Zeit nicht mehr. Wenn bei ihnen die obere Erdschicht eine gewisse Trockenheit besitzt, die unteren Erdschichten aber feucht sind, dann bildet sich die gesündeste Pflanze. Verluste durch Wurzelfäule kommen dann nicht vor.
Wenn schon die verstopften Jungpflanzen eine sorgsame Pflege erfordern, so ist diese bei den nicht verstopften Sämlingen erst recht nötig. Dazu tritt, daß bei zu dichtem Stand ein leichtes Vereinzeln erfolgt, um zu

vergeilte, dünne Pflanzen zu vermeiden. In allen Fällen iſt ebenfalls auch die baldigſte Entfernung jeglichen Unkrautes erforderlich.
Selbſt da, wo der einfachſte Kaſten- und Fenſterſchutz den jungen Saaten nicht gegeben werden kann, iſt es möglich, eine ſtattliche Zahl ſchönſter Einjahrsblumen im Garten zu pflegen. Laſſen ſich doch viele der ſchönſten direkt an Ort und Stelle ihrer ſpäteren Blüte ausſäen. Als Beiſpiele ſeien Clarkien, Godetien, die Ritterſporne, Mohne, die Ringelblume, Jungfer im Grünen, wohlriechende Wicken, Lupinen, Winden genannt.
Die Ausſaat ins Freiland ſelbſt ſoll nicht eher erfolgen, bis die Erde gut abgetrocknet und bearbeitet iſt. Eine zu frühe Ausſaat iſt im allgemeinen nicht ratſam. Nur die einjährigen Ritterſporne ſollen ſo früh wie möglich zur Ausſaat kommen, da ſpäte Ausſaat ihnen nicht mehr die vollkommene Entwicklung gibt. Im übrigen genügt die zweite März- bis erſte Aprilhälfte. Sehr gut, ja wichtig iſt es, dieſe Beete ſchon im Herbſt tief zu bearbeiten, unter Umſtänden ihnen dabei etwas gut verrotteten Dung zu geben, der aber nicht untergegraben zu werden braucht, ſondern auf das gegrabene Land obenauf geſtreut wird. Bis zum nächſten Frühjahr iſt er völlig zerfallen und wird beim Saatfertigmachen der Beete mit den oberſten Bodenſchichten ganz vermiſcht. Er dient ſo in den oberen Bodenſchichten den Pflanzen mehr als tief unten.
Auch bei der Ausſaat direkt ins Freiland iſt eine zu dichte Saat zu meiden. Soweit es irgend möglich iſt, ſoll in Reihen, in flachere oder tiefere Rillen, je nach Größe des Saatkornes geſät werden. Ein feſtes Lagern des Samenkornes in der Erde iſt nötig. Bis zum Auslaufen wird die vorhandene Erdfeuchtigkeit genügen. Nur wo infolge eines ſehr feinen Saatgutes nur eine ſehr leichte Bedeckung gegeben iſt, wird bei trockenem Wetter ein Überbrauſen unerläßlich. Sobald die jungen Sämlinge hochkommen, wird ſich auch ein Hacken der Beete notwendig machen. Die Bodenpflege ſoll gerade in der Zeit des erſten Wachstums der Sämlinge recht anhaltend ſein, um den Jungpflanzen ein recht flottes Wachstum zu ſichern, um aber auch das Aufkommen von Unkräutern völlig unmöglich zu machen. Dann iſt ein Vereinzeln der Sämlinge erforderlich, ſobald ihr zu dichter Stand überhaupt feſtgeſtellt iſt. Je früher die überflüſſigen Pflanzen verſchwinden, umſo beſſer iſt es für die übriggebliebenen. Nur ſo iſt ein gut ausgewachſener Beſtand und ein reicher Blütenflor zu erwarten.

Paul Kache

Bepflanzungspläne

Einjahrsblumenrabatte

FREUNDE der Einjahrsblumen werden gern den Verſuch machen, dieſe für Rabatten im kleinen Garten zu verwenden. Das ſollte in der Tat auch öfter als bisher geſchehen, doch iſt eine ſolche Aufgabe nicht eben leicht zu löſen. Viele ſehr beliebte Einjahrsblumen erfordern eine zeitige Ausſaat ins Frühbeet oder auch eine Herbſtſaat ins Land. Bei dem hier gemachten Vorſchlage wird verſucht, faſt nur ſolche Sorten zu wählen, die keiner Vorkultur bedürfen und noch jetzt im März oder in den erſten Aprilwochen an Ort und Stelle geſät werden können. Die Anordnung nach Farbe und Wuchs iſt eine rhythmiſche. Die Rabatte lehnt ſich an eine Hecke oder Mauer an und liegt ſonnig. Man kann zwiſchen Beet und Hecke eventuell noch einen Weg von 50 Centimeter Breite legen, um auch bequem zu den hinteren Pflanzen zu können.
Um kräftige Pflanzen zu erzielen, iſt natürlich auch bei einer ſolchen Rabatte eine richtige Bodenverbreitung erforderlich. Man dünge aber bei Einjahrsblumen nicht mit friſchem Dung, ſondern verwende nur gut verrotteten Dung oder guten Kompoſt. Später kann man dann ſolchen Arten wie den Sonnenblumen, dem Ziermais und der Malope auch flüſſige Dunggaben ſpenden. Die Ausſaat erfolge nicht zu dicht. Man vereinzele dann die jungen Pflänzchen nach Bedarf, damit ſie ſich kräftig und buſchig ausbilden können. Durch Punkte iſt auf der Planſkizze bei jeder Sorte die Höchſtzahl der Pflanzen angedeutet, die bei einer Nummer ſtehen bleiben dürfen. Oft wird man mit weniger auskommen, wenn die Entwicklung zufriedenſtellend iſt. Ein Aufbinden darf nur im Notfalle erfolgen. Gute, genügend weit ſtehende Pflanzen ſollen ſich ſelbſt tragen. Aſtern und Tagetes müſſen zum Erſatz für die etwas zu früh abblühenden Linum (oder Linaria) und Silene herangezogen werden, um dann gleich als blühende oder blühbare Pflanzen an deren Stelle zu kommen.

Bepflanzungsplan

1. Zea japonica fol. var., Blätter weißbunt geſtreift, 1,2 – 1,5 Meter
2. Helianthus annuus globosus fistulosus, gelb gefüllt, 1,5 – 2 Meter, ab Auguſt

2a. Helianthus annuus purpureus, einfach, gelb mit braunrot, 2 – 2,25 Meter, ab Auguſt

3. Malope trifida grandiflora rosea, 1 – 1,2 Meter, ab Auguſt
4. Schizanthus, hohe pinnatus oder retusus-Formen, bunt, lila, gelb und weiß, 0,6 – 0,8 Meter, Juli-September
5. Lupinus hybridus nigrescens, tiefblau, und superbus weiß (a), 0,8 Meter, Juli – September
6. Coreopsis Drummondii, gelb, 50 – 60 Centimeter, Auguſt – Oktober
7. Centaurea Cyanus, hohe blaue Form, 60 – 80 Centimeter, Juli – September
8. Eschscholtzia californica, ſcharlachorange und weiß, 40 – 50 Centimeter, Juli – September
9. Kochia trichophylla, Blattfärbung, 60 – 80 Centimeter
10. Dimorphoteca aurantiaca, orange, 35-40 Centimeter, Juli-September
11. Linum grandiflorum rubrum, 30 Centimeter, Juli – Auguſt; oder Linaria bipartita, 30 – 40 Centimeter, blauviolett mit orange und weiß, Juli – Auguſt; beide nach Abblühen durch mittelhohe rote oder weiße Aſtern zu erſetzen, die in Blüte gepflanzt werden können
12. Silene pendula, 25 Centimeter, lachsroſa, Juli – Auguſt; ſpäter durch halbhohe hell oder dunkelgelbe Tagetes zu erſetzen.
13. Tropaeolum majus nanum, rot, weiß (a) und gelb (b), 25 – 30 Centimeter, ab Ende Juli.

C. S.

Auf dem Balkon

Frühjahrsarbeiten

WIR gehen dem Frühjahr entgegen, der Blumenfreund überlegt ſich, wie er ſeinen Balkon am beſten und ſchönſten ſchmücken könnte. Es gilt, ſich einen Plan zu machen und ſich zu überlegen, was am beſten für jeden Balkon paſſend iſt. Himmelsrichtung, Oſten, Süden, Weſten, Norden, die Umgebung, der Anſtrich des Hauſes, ob geſchützte oder rauhe Lage, dies alles ſind Faktoren, die bei der Balkonbepflanzung in Betracht gezogen werden müſſen. Nicht zuletzt ſpielt auch die Geldfrage in der gegenwärtigen Kriſenzeit eine Rolle. In erſter Linie wird der Blumenfreund ſeine alten Beſtände nachſehen, die wohl mehr oder weniger gut durch den Winter gekommen ſind, je nach Standort und Pflege. Die Toten werden entfernt, an den noch Lebenden wird alles Abgeſtorbene abgeſchnitten, die Erde gelockert, alle geilen Triebe werden ſtark zurückgeſtutzt und die guten Triebe entſprechend zurückgenommen, um buſchige Pflanzen zu erzielen.
Wenn möglich, gebe man den Pflanzen einen beſſeren Standort, viel Licht und etwas mehr Wärme, mit dem Gießen ſei man noch ſehr vorſichtig; ſo lange die Belaubung fehlt, verbrauchen die Pflanzen noch wenig Waſſer. Bei zunehmender Vegetation kann reichlicher gegoſſen werden, jetzt ſind auch leichte Düngergaben ſehr vorteilhaft. Von den in Töpfen gezogenen Pflanzen wird der größte Teil der alten Erde entfernt und durch kräftige, jedoch nicht zu ſchwere Erde erſetzt. Gut verrotteter Kompoſt, mit etwas Zuſatz von Lehm und Torfmull, ſowie als Dünger etwas Hornſpäne oder Kunſtdünger geben eine gute Erde für Topfpflanzen. Auch hier iſt ein vernünftiger Rückſchnitt nicht zu verabſäumen.
Es iſt nun auch die Zeit, verſchiedene Ausſaaten für die Balkonausſchmückung zu machen, beſonders von Einjahrsblumen und Schlingern. Von für den Liebhaber leicht heranzuziehenden, wirkungsvollen, für Balkonſchmuck ſich eignenden Sorten ſeien genannt: Salvia splendens, niedrige Tagetes-Arten, wie Tagetes Ehrenkreuz, braun, und T. patula nana aurea fl. pl., gelb, die Balſaminen in ihren verſchiedenen gefüllten Sorten, niedrige Löwenmaul-Formen, Calendula officinalis, niedrige Zinnien, wie Zinnia elegans fl. pl., Liliput und Haageana fl. pl.
An Schlingern für Balkons laſſen ſich leicht heranziehen: die Kapuziner-

kreffe, befonders die Tropaeolum Lobbianum-Sorten, ferner die Edelwicken, Lathyrus odoratus, weiter Cobaea scandens und ganz befonders die wundervolle Trichterwinde Ipomaea grandiflora praecox coerulea Himmelblau mit ihren fechs bis fieben Centimeter im Durchmeffer haltenden, prachtvoll himmelblauen Blüten, die in reicher Folge den ganzen Sommer die Pflanzen zieren.
Blumenliebhaber, die auch im Vorfrühling ihre Balkons oder Fenfterkäften mit blühenden Pflanzen fchmücken möchten, haben in den Stiefmütterchen oder Pensées und in den winterharten Vergißmeinnicht fehr dankbare, gegen Fröfte unempfindliche Frühjahrsblüher. Von den Stiefmütterchen würde ich die frühblühenden fogenannten Eispensées in reinen Farben empfehlen, wie Eiskönig, filberweiß, Himmelskönigin, hellblau, Märzzauber, dunkelfammtblau, Winterfonne, goldgelb, Wodan, tieffchwarz. Von Vergißmeinnicht-Sorten dürften Myosotis alpestris Victoria, Indigo und Indigo ameliorata compacta oder alpestris Victoria, indigoblau, für unfere Zwecke die beften fein. Im März gepflanzt, dauert der Flor bis Anfang Juni, zu welcher Zeit die Käften wieder für die Sommermonate neu zu bepflanzen find. *H. Gehringer*

Die Pflanze in der Wohnung

Eine Ampelpflanze

DER Blumenliebhaber im Zimmer verfügt nicht über allzu viele fchönblühende Hängegewächfe. Unter diefen ift eine Schotenklee-Art von den kanarifchen Infeln fehr willkommen, die unter dem Namen *Lotus peliorhynchus* zu gehen pflegt, aber jetzt L. Bertholetii heißt. Der Amerikaner nennt fie Korallengemme, während die Eingeborenen in der Heimat ihr den Namen Pico de Paloma, Taubenfchnabel, gegeben haben, da die Samenfchoten fchnabelartig find. Das Bild zeigt die Tracht, kann aber den Silberglanz, der infolge der fchimmernden Seidenbehaarung über der Pflanze liegt, nicht getreu wiedergeben. Die Blättchen find fädig und gemahnen in der Form an die eines Zierfpargels. Vor diefem hat aber der Lotus die prächtig fcharlachroten, ins Gelbliche übergehenden Blüten voraus, die im Sommer die Zweige wie Korallen bedecken. Es gibt auch eine fehr dunkel fcharlachfarbene Form mit faft fchwarzer Fleckung der Blüten. Die Anzucht ift keineswegs fchwer. Die Korallengemme gibt fich mit jeder nicht zu leichten und auch nicht zu fchweren Gartenerde zufrieden, und es genügt ihr im Winter die Temperatur eines Kalthaufes. Im warmen Sommer fteht fie am Fenfter oder an einer fonnigen, gefchützten Stelle im Freien. Jeder Liebhaber kann diefen Lotus aus Samen heranziehen, doch geht es fchneller durch Stecklinge. Alte Pflanzen laffen fich vorfichtig teilen. Wer aber Raum hat, wird die Pflanzen gern fo groß wie nur möglich werden laffen, damit fie ihn mit ihrer farbigen Blütenfülle in reichftem Maße danken. Für Wintergärten, die nicht zu warm gehalten werden, bildet diefer Lotus einen prächtigen Schmuck. Sein einziger Nachteil ift dann, daß feine Blütezeit nicht in die Wintermonate fällt. So aber währt fie durch lange Sommerwochen. *C. S.*

Am Wege

Unkraut-Vertilgung

EIN unkrautfreier Weg hebt jeden Garten. Doch wie oft macht ein folches dem Leiter großes Kopfzerbrechen. Das ftändige Reinhalten mit Arbeitskräften läßt fich oft wegen der großen Geldausgabe nicht ausführen, und doch ift das gemeinfte aller Unkräuter das einjährige Rispengras, Poa annua, immer wieder vorhanden.
Auch ich hatte viel Ärger mit diefer Plage. Deswegen habe ich alle für diefen Zweck auftauchende und wärmftens empfohlene chemifchen Mittel ausgeprobt. Leider alle, bis auf eins, mit negativem Erfolg. Entweder waren fie zu gefährlich für die umftehenden Kulturpflanzen (durch Breitlaufen) oder fie waren durch ihre Unwirkfamkeit teurer als Arbeit.
Von den vielen Mittelchen war bis vor kurzen nur eines einigermaßen befriedigend, das gewöhnliche Viehfalz. Streute oder goß man diefes frühmorgens nach ftarkem Tau auf die vergrasten Stellen, fo war nach einigen Tagen das Unkraut verbrannt. Diefe Wirkung (und darauf kommt es hier auch hauptfächlich an, die meiften Mittel verbrannten das Unkraut auch fofort) hielt auch eine ganze Zeit an. Auch wenn Regen zu erwarten war, wendete ich diefe Mittel an. Bei ftarkem Regen fchwemmte diefer es aber ab, auch bei ganz ebenen Flächen kam es dann in die Kulturflächen und verdarb dort vieles. Alfo nur bei ganz vorfichtiger Anwendung (dazu gehörte auch, daß man gegen 20 Centimeter den Rafenkanten fernblieb) kann man diefes Mittel, das allerdings verhältnismäßig billig ift, benutzen.
Neuerdings wird ein neues Mittel für diefen Zweck angeboten. Es heißt Via rasa. Ich habe es, da ich bei meinen vielen Wegen und wenigen Arbeitskräften fcharf hinterher fein muß, auch ausgeprobt. Und da muß ich allerdings fagen, daß es bei mir fehr gut gewirkt hat und wenn es noch etwas billiger werden würde, wohl eine große Erfparnis bei Reinhaltung der Wege bedeuten könnte.
Es ift ein Abfallprodukt bei einer Fabrikation und wird trocken aufgeftreut. Wenn es auch nicht fo weit um fich greift wie das Viehfalz, tut man trotzdem gut, von den Wegkanten auch etwas weg zu bleiben. Nur fo viel fei noch erwähnt, daß Via rasa im Frühjahr nach Vorfchrift geftreut, bis zum Herbft die behandelten Stellen *ziemlich die ganze Zeit unkrautfrei hält.* Ein großer Vorteil für denjenigen, der große Wegftrecken bei wenig Zeit und Geld fauber halten muß.
B. Voigtländer

Gartenrundschau

NEUES AUS ALLER WELT

Blumentreue

AM oberen Ende meines Gartens liegt ein Wäldchen; in seinem Schatten wohnen Leute, vor denen ich jedesmal den Hut abnehmen würde, wäre ich ein Mann, und alte Erinnerungen umfangen mich... Als wir das Elsaß verließen, das 46 Jahre unsere Heimat war, packte ich das Kostbarste meines schönen Gartens in drei große Kisten mit starken Handhebern. In vier Wochen sollten sie uns nachfolgen; da konnte ich also schon etwas dicht übereinander packen. Jedoch die Zeit dehnte sich. Treue Seelen begossen manchmal die verlassenen Lieblinge im schattigen Grasgarten (Obstgarten) zwischen Schuppen und Kirschbaum. Sie berichteten aber auch, daß die kranken Pferde, die dort frei umherliefen und grünes Gras und fruchtbaren Boden mit ihren Hufen tief aufrissen, ihren Durst mitunter an den saftigen Wurzeln meiner Päonien und Iris löschten. Das stimmte meine Erwartungen etwas herab.

Fast anderthalb Jahre vergingen, dann kamen unsere Sachen. Aus drei Kisten Stauden war eine geworden und in dieser einen lagen auf einem Haufen staubtrockener Erde etwa 25 fast zur Unkenntlichkeit zusammengeschrumpfte Brocken. Sie wurden als Reste meiner Päonien und Iris erkannt und sogleich gepflanzt.

In der trockenen Erde fielen mir 10 Knöllchen auf in Erbsengröße, mit einem zottigen Anfang von Würzelchen. Waren dies auch entstellte, kleine Freundinnen, die kamen, die alte Blumenpflegerin noch einmal zu grüßen? Wer hatte doch diese charakteristischen Wurzeln? Leberblümchen? Die dicken Büsche der rotgefüllten waren weg, aber ich hatte zehn junge Pflanzen blauer, gefüllter besessen, die ich mir meine ganze Jugend hindurch wünschte und dann endlich 1917 fand. Diese zarten Waldkinder waren wohl nicht lebend durch so viel Trockenheit und Entbehrungen gekommen?

Indessen Arzt und Blumenfreund hoffen bis zur letzten Möglichkeit. In sorgfältig gemischter, fasriger Kompost- und Lauberde wurden sie an feuchtschattiger Stelle gepflanzt und gepflegt. Im nächsten Frühjahr erschienen richtig schon einige zartblaue Blüten. Von da an ging es rasch vorwärts. Sie wanderten dann mit mir abermals in einen neuen Garten, und freuen sich dort des schützenden Wäldchens. Ein altes mütterliches Scolopendrium gab ich ihnen als Nachbar. Primeln bilden den Vordergrund. Weitere Farne, Adonis und anderes sollen folgen.

Wer würde nicht verstehen, daß ich meine tapferen Leberblümchen mit noch mehr bewundernder Freude betrachte, als ehedem wir Kinder das Entfalten einer trockenen Rose von Jericho.

Waldleben umgibt sie wie zuhause. Rotkehlchen lugt mit klugen Augen unter die verrotteten Blätter und stutzt erstaunt, wenn es anstatt der gewohnten Wurm- und Insekten-Leckerbissen, auf neugierige, leuchtendgelbe Eranthis-Köpfchen stößt, die in einer Menge und Selbstverständlichkeit auftreten, als wären sie die berechtigten Voreinwohner des Wäldchens. Meisen und Goldhähnchen blicken von den Zweigen, und früheste und späteste Sonne grüßen die Waldbewohner so wie sie es lieben.

Clara Heller.

Die Rose Frau Karl Druschki

DIESE Weltrose feierte im letzten Jahre ihr fünfundzwanzigjähriges Jubiläum. Der Züchter, Peter Lambert, gibt zwar an, daß sie 1901 in den Handel kam, doch dürfte 1900 richtiger sein, wie auch aus einem Aufsatz in Nr. 8 der Rosenzeitung von 1925 hervorgeht. Sie wurde in diesem Jahre beim Wettbewerb um einen Tausend Mark-Preis zuerst beurteilt, der ausgeschrieben war, um eine Bismarckrose zu erlangen. Es kam aber damals zu keiner Entscheidung. So erhielt die Rose, die sicherlich den Namen Bismarckrose mehr als jede andere verdient hätte, den Namen der Frau eines Großkaufmannes in Görlitz, der seinerzeit Vorsitzender des Vereins deutscher Rosenfreunde war. Im Ausland hat sie namentlich während des Krieges, eine ganze Anzahl anderer Benennungen erfahren, so La Reine des Neiges, Snow Queen und White American Beauty. Sie ging hervor aus einer Kreuzung von Merveille de Lyon und der gleich berühmten Mme. Caroline Testout. Auch von der Druschki gibt es jetzt einenRanksport. Ferner geht als Crimson Frau Karl Druschki die Sorte His Majesty, als Red F. K. D die gleiche Sorte und auch Barbarossa. Als Yellow F. K. D. bezeichnet man Ludwig Möller und als Pink F. K. D. die Sorten Georg Arends und Heinrich Münch. So sehr die Druschki Bismarcks Namen verdient hätte, so wäre es doch sehr zu beklagen, wenn man ihr ihn jetzt noch beilegen würde, wie es von mancher Seite befürwortet wird. Einmal gültige Namen dürfen nicht mehr geändert werden. Es wäre schlimm, wenn die deutsche Rosenzucht nicht doch noch eine wirklich gute Bismarckrose herausbringen sollte, nachdem die Schmidtsche Theehybride von 1908 Otto von Bismarck versagt hat.

Seltenheiten vor hundert Jahren.

IM Mai 1829 veranstaltete die Dresdener »Flora«, die kürzlich ihr hundertjähriges Bestehen feierte, ihre erste Blumenausstellung. In der bei dieser Gelegenheit herausgegebenen Festschrift, auf die wir noch zu sprechen kommen werden, berichtet der Gründer der Flora, Professor Ludwig Reichenbach, daß auf dieser ersten Schau folgende »seltenste und neueste« Gewächse gezeigt wurden: »Chorizema rhombeum, in 3 Töpfen, aus dem bot. Garten; Senecio lilacinus Schrad., in 2 Töpfen ebendaher; Ionopsidium acaule, in einem Topfe, ebendaher; alle drei noch in keinem engl. Werke abgebildet und in keinem Kataloge aufgeführt. Dryandra nivea, blühend, aus Pillnitz; Dryandra floribunda, mit einigen fünfzig Blütenköpfen bedeckt, ebendaher; erstere noch nicht abgebildet; Grevillea rosmarinifolia, juniperina, ebendaher; erstere neu für die Gärten und schön. — Boronia serrulata, Geum coccineum, Calanthe veratrifolia, Calythrix glabra, Dilwynia cinerascens, Indigofera procumbens, Lisianthus longifolius, Tradescantia Sellowiana Pohl. (crassiuscula L K.) aus dem Kreyssigschen Garten: alle erst neuerlich in Englands Gärten bekannt geworden. — Brexia spinosa var. integrifolia, blühend, aus dem Herzogengarten (Theophrasta Hortul., aber sehr verschieden von den wahren Theophrasten). — Pelargonium hortensioides aus dem Wäberschen Garten. — Pelargonium Dennisianum, Bunchosia nitida, aus dem Hoffmannseggischen Garten; Cyclamen latifolium Sm. und Pothos ventricosa, blühend, von den Gebrüdern Poscharsky. Calceolaria corymbosa, in Prachtexemplaren, aus dem botanischen Garten, Palaisgarten und Menageriegarten.« Sehr viele dieser Pflanzen suchen wir heute auch in botanischen Gärten vergebens, und nur ganz wenige Namen sind uns davon heute noch geläufig.

Die hundert besten Stauden

ES ist interessant, zu studieren, wie J. Havaux in La Tribune Horticole Nr. 480 diese Frage zu lösen sucht. Er fügt allerdings auch ein Gehölz, Fuchsia Riccartoni, ein. Ferner zählt er zu den „besten" auch Baptisia (Podalyria) australis und Cassia marylandica, sowie Catananche coerulea und Gerardia tenuifolia. Im allgemeinen hat er nur höhere Rabattenstauden im Auge, denn Alyssum, Aubrietia und Iberis fehlen. Von Campanula nennt er latifolia, persicifolia und pyramidalis und von solchen Gattungen, wie Delphinium, Phlox, Pyrethrum und ähnlichen mit vielen Kultursorten schlägt er natürlich keine bestimmte Form vor. Der Versuch zeigt, wie schwer solche Auswahl ist.

Amacrinum Howardii

DIESE in Nr. 20/30 von The Gardeners' Chronicle abgebildete neue Gattungshybride zwischen Amaryllis Belladonna und Crinum Moorei scheint sehr schön und wertvoll zu sein. Sie wurde von F. Howard in Los Angeles, Californien, erzogen, wo sie auch als Freilandgewächs bedeutsam ist. Übrigens dürfte das auch in sehr geschützten warmen Lagen bei uns möglich sein, doch ist die Hybride, wie es heißt, auch eine gute Topfpflanze. Die in großen Dolden stehenden, zart nelkenrosafarbenen, duftenden Blüten erinnern sehr an den Crinum-Vater, ebenso die wohl immergrünen Blätter. Anscheinend ist schon 1921 in Italien eine analoge Kreuzung entstanden, die man Crinodonna Memoria Corsii genannt hatte.

Die Hundertjahrfeier der Flora in Dresden

DIE sächsische Gesellschaft für Botanik und Gartenbau »Flora« beging am 22. und 23. Februar das Fest ihres einhundertjährigen Bestehens in feierlicher Weise. Am ersten Tage fand eine Feier im Festsaale des Rathauses statt, bei der nach vielen Ansprachen der Bücherwart der Flora Walter Dänhardt einen Festvortrag »Hundert Jahre Flora« hielt. Am Abend war Festvorstellung in der Staatsoper. Am zweiten Tage folgten Vorträge in der Technischen Hochschule, wobei unter anderen Dr. Frimmel, Eisgrub, über die Bedeutung der stimulirenden

Wirkung des Kreuzungsaktes für gärtnerische Pflanzenzüchtung und A. Steffen, Pillnitz, über gärtnerische Arbeitslehre und Betriebsführung sprachen. Das Blumenfest am Abend verlief sehr angenehm unter überreicher Teilnahme. Gelegentlich der Besprechung der Festschrift, die seitens der Flora aus Anlaß dieser Feier herausgegeben wurde, werden wir noch auf die Tätigkeit der Gesellschaft eingehen.

William Bateson's Tod

DIE englische Botanik wie der englische Gartenbau haben infolge des Todes dieses ausgezeichneten Forschers einen schweren Verlust zu beklagen. Dr. Bateson hat sich vor allem auf dem Gebiete der Vererbungslehre hervorgetan. Er war zuletzt Direktor der John Innes Horticultural Institution zu Merten. Auch als Mensch war der Verstorbene eine außerordentliche Erscheinung und in jeder Beziehung einer der hervorragendsten britischen Biologen, dem der Gartenbau viel zu danken hat.

C. S.

Neue Bücher

DIE KAKTEEN. Nach der ersten vorliegenden Lieferung von *Friedrich Vaupels* Kakteen-Monographie, die bereits kurz angezeigt wurde, dürfen wir von dem Verfasser, dem Vorsitzenden der Deutschen Kakteengesellschaft, ein umfassendes Handbuch der Kakteenkunde erwarten, an dem es in letzter Zeit sehr gefehlt hat. Der Nachtrag zu Schumanns Gesamtbeschreibung der Kakteen war 1903 erschienen, seither hat die Kenntnis dieser Pflanzen große Fortschritte gemacht, sodaß das sonst treffliche Buch allmählich veraltet, ohne indessen an seinem Wert einzubüßen. Die vielen neuen Veröffentlichungen sind zerstreut und oft schwer zugänglich. Außerdem ist das große vierbändige Prachtwerk von Britton und Rose wegen seines hohen Preises nur wenigen erschwinglich und von vornherein bestimmt gewesen, eine Seltenheit zu werden. So kann man dieses Mal mit Recht sagen, daß die Neuerscheinung einem »gefühlten Bedürfnis« entspricht.

Was an der Arbeit besonders zu loben ist, ist die übersichtliche Anordnung des Stoffes, die klare, von Fremdwörtern freie Sprache und die scharfen, nicht zu weitschweifigen Beschreibungen, die allen Ansprüchen gerecht werden. Auch die Art und Weise, wie die Synonyme und die so zahlreichen »verschollenen« Arten behandelt werden, verdient Beifall. Die beigegebenen Abbildungen werden vielen Benutzern des Werkes sehr willkommen sein, ebenso auch die Hinweise auf die sonst veröffentlichten Abbildungen.

Der Verfasser scheint mit wenigen Ausnahmen an den bisher gebräuchlichen großen Sammelgattungen fest zu halten. Dagegen ist nichts einzuwenden, zumal die neuen Gattungen wenigstens unter der Synonymie deutlich geführt werden. Die erste Lieferung enthält die Gattungen Peireskia mit 18 Arten, Maihuenia mit 5 Arten und den Anfang der Rhipsalis bis zu 37 Arten. Bei jeder Gattung erleichtert ein kritischer Schlüssel die Übersicht, und eine Aufzählung der Arten hinsichtlich ihrer Verbreitung gibt dem Leser ohne langes Blättern sofort ein Bild über diese. So darf man mit Spannung auf die Fortsetzung des Werkes warten, das hoffentlich raschen Fortschritt nimmt, denn die zahllosen Liebhaber und die Kenner der Kakteen bedürfen seiner sehr notwendig.

Alwin Berger.

BLÜTENSTAUDEN. Von dem bekannten Staudenzüchter *Adolf Ernst* ist soeben im Selbstverlage, Möhringen a. F.-Stuttgart, ein kleines Büchlein über »die zweckmäßige Verwendung der Blütenstauden« erschienen, das vielen Gärtnern und Staudenfreunden ein willkommener Ratgeber sein wird. Es enthält auch Pläne für Staudengärten und Teile solcher. Leider wird in den Erläuterungen dazu keine genaue Pflanzliste gegeben. Letzten Endes kommt es aber in solchen Anlagen gerade darauf an, zu wissen, *was* man pflanzen soll. Die Sortenauswahl ist von ausschlaggebender Bedeutung. Mag die reine formale Aufteilung des Geländes auch oft recht hübsch erscheinen, ein solcher Garten baut sich aus der Pflanze auf, und in der Bepflanzung machen unsere Gartengestalter immer noch die gröbsten Fehler. Deshalb muß ihnen an guten Beispielen deutlich gezeigt werden, was unter bestimmten Verhaltnissen gewählt werden kann.

MARKTPFLANZENZUCHT. In der Sammlung der Gärtnerischen Lehrhefte im Verlage von Paul Parey, Berlin, sind unter diesem Titel außer dem bereits früher von uns angezeigten Hefte noch zwei weitere von *Paul Kache* erschienen. Er behandelt in Heft 7 der Reihe die *Allgemeinen Grundlagen* für Kulturräume, Erde, Vermehrung und was sonst zur Marktpflanzenzucht gehört und gibt damit auch für die Hausgärtnerei im allgemeinen sehr wichtige Darlegungen. Im dritten Teil, Heft 9, kommen *Grünpflanzen und Schnittgrün* an die Reihe, insbesondere Asparagus (Zierspargel), Farne, Palmen und Araukarien. Beide Hefte sind wieder ganz besonders zu empfehlen.

MISTBEETE. Der Herausgeber der Gärtnerischen Lehrhefte, die bei Paul Parey, Berlin, erscheinen, *A. Janson,* behandelt in Nr. 10 der Reihe »Das Mistbeet, wie es eingerichtet, angelegt und bewirtschaftet sein will«. Wenn er auch recht hat, daß viele in der Fachliteratur sich anpreisende Bezugsquellen nichts taugen, so berührt es doch seltsam, daß nur Typen einer einzigen Firma empfohlen werden. Dabei läßt der Verfasser die doch auch 1924 schon zur Genüge bekannten Mistbeete aus Beton ganz unerwähnt, die jetzt immer weitere Verbreitung finden. Diese Lehrhefte sollen doch möglichst objektive kritische Darstellungen geben, wodurch allein ihr großer Wert für den Gärtner gesichert wird.

C. S.

Zeitschriften

BELGIEN

In *La Tribune Horticole* (no. 480) wird versucht, eine Liste der hundert besten Stauden zu geben. no. 482 behandelt die Verpflanzung großer Bäume

DÄNEMARK

Die *Havekunst* bringt im letzten Heft 1925 Vorschläge für Phloxrabatten.

ENGLAND

In no. 2827 von *The Garden* bespricht Johnson wertvolle Einjahrsblumen, und Hadden Lilien im Garten. In den folgenden Heften gibt R. L. Praeger eine Auswahl von 50 der besten Steingartenpflanzen. Auch das Einjahrsblumenthema wird weiter behandelt. In no. 2829 werden vor allem Neuheiten und weniger bekannte Pflanzen besprochen. Eine Artikelreihe über Meconopsis beginnt K. F. Ward im folgenden Hefte, das auch hübsche Blumenzwiebel-Bildseiten enthält. In no. 2831 wird der Tod von Reverend Joseph Jacob gemeldet, der sich besonders mit Blumenzwiebeln befaßt hat und von dem erst 1924 ein hübsches Buch »Hardy Bulbs for Amateurs« erschien. Das Februarheft der *Orchid Review* enthält unter anderem ein Bild der Erdorchidee Calypso bulbosa. Auch Chondrorrhyncha Lipscombiae wird abgebildet. — In no. 2040 von *The Gardener's Chronicle* setzt N. E. Brown seine überaus wertvollen Darlegungen über Mesembrianthemum fort. Ein Aufsatz behandelt die Vermehrung von Epheu durch Blätter. Die folgende Nummer zeigt das schöne Paphiopedilum Sir Trevor, sowie einen Blütenstand von Strelitzia kewensis. F. Brooker schreibt über Nomocharis, wovon die Tafelbeilage ein Bild der N. pardanthina gibt. In no. 2043 zeigt die Tafel das schöne Dendrobium Gatton Monarch, und H. Friend setzt seine Artikelserie über klassische und legendäre Gärten fort. — Der erste Teil von Band LI des *Journal of the Royal Horticultural Society* enthält wiederum viele sehr wertvolle Beiträge. J. H. Priestley behandelt Probleme der vegetativen Vermehrung. M. Fenwick schildert an der Hand schöner Bilder Abbotswood Gardens. Die Geschichte und Bedeutung des Botanical Magazine stellt sein jetziger Herausgeber O. Stapf dar. Über schwer zu kultivierende Alpine plaudert C. Elliot. Auf Murray Hornibrooks Artikel über Hybride Saxifragen kommen wir an anderer Stelle zurück. Die Schilderung des Botanischen Gartens in Calcutta von A. T. Gage ist sehr interessant. Unter den Pflanzen, die Wertzeugnisse erhielten und als kulturwert besprochen werden, sind diesmal keine Neuheiten. Die Versuchsberichte aus Wisley sind, wie immer, sehr interessant und erwecken stets von neuem das Verlangen, daß auch wir in Deutschland eine solche Gartenbauversuchsstation haben möchten.

FRANKREICH

Im Februarheft der *Revue Horticole* stellt das Farbenbild Paphiopedilum Delenatii aus Tonkin und Annam dar. — *Jardinage* setzt im Februar die Artikelreihe über Stauden in Gärten fort und berichtet über die Stauden im antiken Garten. Auch der Aufsatz über das Arboretum Allard wird weiter geführt.

HOLLAND

In no. 32 von *Onze Tuinen* wird Aloe variegata besprochen, ferner werden Betrachtungen über Sukkulenten und Mesembryanthemen fortgesetzt. Die nächste Nummer ist ein Einjahrsblumenheft. — In der *Floralia* setzt G. Bleeker in no. 6 die Behandlung des Baumschnittes fort.

NORDAMERIKA

Das Januarheft der *Landscape Architecture* enthält folgende wichtige Beiträge: A. A. Shurtleff, ein Besuch der für einen Nationalpark vorgeschlagenen Areale in den südlichen Apalachians; F. L. Olmsted, Randwege (border roads) für Parkstraßen und Parks; Hare and Hare, Fünf Gärten in Kansas City (nur Bilder); F. A. Waugh und P. French, Der Bildhauer und Gartenarchitekt Daniel Chester French; M. H. Dill, Einige Wies und Warums guter Pflanzung; R. N. Cram, Einige englische Gartentreppen; A. D. Taylor, Angaben über Wasserzuleitung und Bewässerung. — *Horticulture* bringt in no. 2 und 3 unter den vielen kurzen Betrachtungen unter anderem Beiträge über Baumschnitt, Einjahrsblumen für die Seeküste, Mauergärten, Hauspflanzen und ähnliches.

OESTERREICH

In Heft 2 der *Gartenzeitung* beginnt eine Schilderung des Lebens und der Tätigkeit von Clusius, dem berühmten Botaniker und Gärtner Charles de l'Ecluse, zu seinem 400. Geburtstag am 19. Februar 1926.

C. S.

VERLAG DER GARTENSCHÖNHEIT G. m. b. H. in Berlin-Westend / Verantwortlich für die Schriftleitung OSKAR KÜHL in Berlin-Westend, für den Anzeigenteil DOROTHEA KLETT, Berlin-Lichterfelde / Buch- und Kunstdruckerei W. SOMMER, Inhaber OSKAR KÜHL, Berlin-Schöneberg.

Sammelmappe

GÄRTEN AN DER FRANZÖSISCHEN RIVIERA

SEIT Jahrhunderten sind die Franzosen der Mittelmeerküste Meister in einzelnen Zweigen der Gartenkunst. Der reiche Boden ihres Landes, besonders in den südlichen Provinzen, weist sie darauf hin. Vor allem aber treten sie in der Provence, die schon in der Römerzeit eine der fruchtbarsten Kolonien des Weltreichs war, in die Fußtapfen der Alten, von denen sie ihr kunstvolles Bewässerungssystem zur Frischhaltung der Gärten trotz sengender Sonnenglut ererbt haben. Teilweise wurden sogar die Bogen der alten Kanäle und Leitungen aus der klassischen Zeit durch Neubauten ergänzt, und ein wohlgeordnetes, durch den Lauf der Jahrhunderte eingebürgertes, bewährtes Wasserrecht bildet die Grundlage zu einer Rosen- und Palmenkultur, zu einer Blumenpflege, wie wir sie an der italienischen Riviera oder in den Gärten Neapels und Capris kaum in dem Maße finden.

Rosen! Sie bilden hohe Laubengänge, sie ranken sich in üppiger Fülle um die Ketten am Brunnen, sie überwuchern die eisernen Bandeisen der Kugeln und Pyramidenformen, in die man sie zu zwängen versucht. Ihre blühenden Zweige liegen bis zu drei Metern Länge am Boden, da wo die Schere nicht rechtzeitig ihres

Amtes waltet. Und die rosa und roten Rosen der Gartenhecken, die vierzehn Tage nach dem Septemberschnitt schon wieder in voller Blüte stehen, sind eben gut genug, um den draußen am Wegrande grasenden weißen Ziegen als Nahrung zu dienen, nachdem sie sie ein Weilchen kokett im Maule hielten. Die Rosenkultur südfranzösischer Gärten erstreckt sich hauptsächlich auf wurzelechte Hänge- und Kletterrosen, Teehybriden aller Art. Dort glaubt man sich in der eigentlichen Heimat der Rose, die uns in allen Varianten begegnet und in dem grobsteinigen fruchtbaren Lehmboden, der der Anzucht zarterer Blumen Schwierigkeiten bereitet, wundervoll gedeiht.

Neben der Rose ist es besonders die Fächerpalme (Chamaerops humilis) und die Dattelpalme (Phoenix dactylifer), die den Gärten der Riviera den typischen Charakter verleiht. Es ist eine Eigentümlichkeit dieser Gärten, daß vielen in ihrer Anlage noch etwas von dem Charakter aus der Zeit Ludwigs XIV. anhaftet. Sie behalten trotz der Fülle ihrer seltenen Bäume und Sträucher, die aus allen Weltteilen hier akklimatisiert wurden, etwas Förmliches, Steifes.

Eine breite, meist von Zwergbuchs oder zart grauem Thymian gerandete Auffahrt führt in Windungen zum Hause. Rechts und links Palmen — vor denen man Rabatten bemerkt, die je nach der Jahreszeit mit blühenden Geranien, Zinnien, Astern, Margeriten — oder im Winter mit Veilchen, Narzissen,

Goldlack, Freesien, Jonquillen, Gladiolen bepflanzt sind. Rechts und links vom Wege wieder buchsumrandete Blumenparterres in steifen Formen zwischen die kleinen zierlichen Orangenbäumchen mit leuchtenden übergroßen Früchten, Pittosporum sinense, und alle Arten der vielfarbig blühenden Canna-Feigenkaktus und die stachligen Aloe Abwechslung bringen. Blühende Oleander und Magnolien überragen die niedrigeren Sträucher und jenseits des Weges an der dichtgepflanzten, immergrünen hohen Schutzmauer von Eucuben, Taxus oder Cypresse, die den Garten als Windschutz gegen den gefürchteten Mistral umgibt, bietet ein breit ausladender Eukalyptus oder eine Korkeiche Gelegenheit zu einem Ruheplatz. Seit langem spendet der Mespilus Japonica — besonders in der Umgebung der Gartenstadt Hyères-les Palmiers seine früh reifen Früchte, und im Herbst leuchten — an den Gärten der Hesperiden gemahnend — die goldenen Früchte des gleichfalls aus Japan eingeführten Kukhibaumes verlockend unter breiten grünen Blättern hervor. Merkwürdigerweise gedeihen diese asiatischen Bäume, ebenso wie Mandel- und Feigenbaum in der Provence und besonders an der »Côte d'Azur« besser als die Orangen. Seit etwa vierzig Jahren ist der Orangenbaum, auf den die Gärtner so stolz sind und dessen Pflege schon unter der Regierung Heinrichs IV. v. Navarra durch Aussetzung von Prämien gefördert wurde, durch eine unerkannte Krankheit, wahr-

scheinlich Phyloxera, aus den Gärten so gut wie verschwunden. Man sieht daher nur vereinzelte Exemplare.
Gerade die Gärten Südfrankreichs mit ihrem exotischen Pflanzenwuchs reizen den Besucher zum Nachdenken über den Zeitpunkt ihrer Akklimatisation auf europäischem Boden, ihre Lebensbedingungen. Was hier so mühelos zu wachsen scheint, hat viel Lehrgeld gekostet, und es bedurfte jahrhundertelanger Erfahrung, um die reichen üppigen Gärten zu schaffen, die jetzt das Auge erfreuen. Schon 1575 liest man in der Kosmographie von Münster und Belleferet, daß in den Gärten der Stadt »Jéres« zum erstenmal Zuckerrohr, zunächst als Zierpflanze, gezogen wurde. Seit etwa sechzig Jahren gedeiht mit Erfolg Bambus als Windschutz, und erreicht zwei Daumen dicke, 15 bis 20 Fuß hohe Triebe. Die Justicea Adhatoda oder »indischer Nußbaum«, die in dem schlimmen Winter 1820, bei 5 Grad Kälte auszusterben schien, bildet einen reichen vielgeschätzten Gartenschmuck.

Eine herrliche Zierde der südfranzösischen Gärten sind die Jahrhunderte alten maritimen Pinien, deren hohe breite Aeste lange Alleen bilden, unter deren Schultern man Schutz vor der sengenden Sonne findet und die würzige Luft einatmet. Da wo sie gedeihen, verlieren die Gärten ihren steifen Charakter, und man denkt unwillkürlich an den evangelischen Friedhof an der Cestiuspyramide in Rom, oder an die von Lafcadio Hearn so schön geschilderten Haine Buddhas im Lande des Lotos. Herrlich wirken Anlagen, wie der Vorgarten der Villa Henri Joseph in Hyères. Um neue edle Araucaria und die Stämme mit Datteltrauben schwerbehangener Palmen ranken sich in üppiger Fülle blühende Bongainvilleen. Wunderbar wirkt auch die Casuarina equisetifolia — ein Baum aus Neuholland, der eine Höhe von 30 Fuß erreicht und als einer der schönsten angesehen werden kann, die in Europa gedeihen. Den Stolz eines südfranzösischen Villenbesitzers bildet in der Regel ein gut gepflegtes Warmhaus, in dem besonders empfindliche Varianten südlicher Gewächse gezogen werden, und alle Anlagen zeichnen sich durch gute Pflege sauber gehaltene Kieswege aus. Man bemerkt kaum irgendwo die malerische Wildnis und verträumte Verwahrlosung altitalienischer Gärten; man möchte das fast bedauern, spräche aus allen nicht die Liebe der Bevöl-

kerung zur sorglichen Pflege des eigenen Besitzes. Denkt man sich diese Gärten versetzt unter einen strahlenden blauen Himmel, umrahmt von einem Kranz blühender Ortschaften, üppiger Weinhänge und mit Korkeichen bewaldeten, in goldenem Licht schimmernden Bergketten des Mauretti- oder Esterellegebirges — in der Ferne die geschwungenen Linien der meerumsäumten leuchtenden Küste, so entschleiert sich dem trunkenen Auge ein Gesamtbild, das einen unvergeßlichen Eindruck hervorruft. *Elise von Hopffgarten*

DIE GÄRTEN DES ADONIS

DIE Geschichte von Adonis ist sehr alt. Sie setzt sich aus verschiedenen Legenden zusammen, über die H. Friend in The Gardeners' Chronicle fesselnde Ausführungen macht. Bei seiner Geburt wurde das schöne Adoniskind der Pflege der Persephone übergeben, die sich später weigerte, ihren Schützling wieder herzugeben. Adonis wurde der Geliebte der Aphrodite, und bei seinem Tode war deren Gram so groß, daß es Adonis gestattet wurde, die Hälfte jedes Jahres mit ihr auf der Erde zu verbringen, die andere Hälfte in der Unterwelt. Nach den Mythologen ist Aphrodite das Symbol der fruchtbringenden Kräfte der Natur, Adonis das des Todes der Natur im Winter. Der Tod des Adonis und seine Rückkehr zum Leben gaben Gelegenheit zu alljährlichen Festlichkeiten, bekannt als Adonai zu Athen, Alexandria, Byblos und an anderen Orten.
Wie bekannt, trägt mehr als eine Pflanze den Namen Adonis. Die Bezeichnung Flos Adonis wurde von Linné dem Fasanenauge, Adonis

HINWEIS
Der Gesamtauflage dieses Heftes liegt der Prospekt der Firma Frantz de Laet, Contich bei Antwerpen bei, der besonderer Beachtung der Leser empfohlen sei.

autumnalis beigelegt. A. aestivalis trägt den Namen Blutströpfchen zur Erinnerung an das unzeitige Ende unseres Helden. Eine der darauf bezüglichen Legenden geht dahin, daß Adonis, nachdem er die tödliche Wunde durch den Eber empfangen hatte, sein Blut auf den Rasen vergoß, woraus die Adonisblüte entsprang. Ovid und andere haben diese Legende wiederholt und hinzugedichtet. Es heißt auch, daß von der Leiche des Adonis die Anemone erblühte, während das Blut, das vom Fuße der Göttin floß, die ihm zu Hilfe eilend in einen Dorn trat, die weiße Rose rot färbte. Shakespeare spielt darauf an in Venus und Adonis.
In dem alten Codex des Dioscorides, der in Wien aufbewahrt wird, findet sich eine Abbildung der

HINWEIS

Der Gesamtauflage dieses Heftes liegt der Prospekt der Firma **Hermann Wigand, Steinindustrie, Linse an der Weser** bei, der besonderer Beachtung der Leser empfohlen sei.

Adonisblüte, wie sie Ovid beschreibt unter dem Namen Argemone. Bei den Römern war Adonis eine der verschiedenen Gottheiten, unter deren Schutz die Gärten standen. Daher hat die Bezeichnung »Gärten des Adonis« verschiedene Bedeutungen. Es waren nicht nur Vergnügungsstätten, sondern es gab auch Stätten, die ihm speziell gewidmet waren. Besucher von Rom braucht man nicht zu erinnern an die von Domitian nahe seinem Stadium zu Ehren des Adonis angelegten Gärten. Plinius erwähnt sie als die erste Pflanzenschule aller Dinge, die geboren sind zu leben und zu sterben je nach ihrer Art. Griechische Schriftsteller aber gebrauchen die Bezeichnung Gärten des Adonis in einem ganz verschiedenem Sinne. So sei nach Professor Sayce folgende Beschreibung zitiert: »Der Tod des Adonis wurde vor allem in der phönizischen Stadt Gebal oder Byblos (acht Meilen nördlich von Beirut) gefeiert. Nahebei war der Fluß Adonis, jetzt der Nahr Ibrahim, der durch eine Felsenschlucht in die See strömte. Jedes Jahr, wenn die Frühlingsregen und schmelzenden Schneemassen ihn mit dem roten Mergel der Berge färbten, sah darin das Volk von Gebal das Blut des ermordeten Sonnengottes. Dann fand, im Januar oder Juni, die Leichenfeier des Gottes statt. Sie dauerte sieben Tage. ‚Die Gärten des Adonis', wie man sie nannte, wurden gepflanzt — Töpfe mit Erde und abgeschnittenen Kräutern gefüllt, die in der starken Sommersonnenhitze schnell dahinwelkten — passende Sinnbilder des verlorenen Adonis selbst. Adonis, der Junge, der Schöne, der Geliebte der Ashtoreth, war tot: die klare Sonne der Frühlingssonnenwende war ebenso wie das Grün der Natur, das sie ins Leben gerufen, erschlagen und vertrocknet durch den heißen Gluthauch des Sommers.«
Die Pflanzen, die man bei solchen Gelegenheiten benutzte, waren nicht immer abgeschnittene Kräuter oder Zweige, die verwelkten, wenn die Sonne schien. In den kleinen irdenen Töpfen zog man Salat, Fenchel, Kresse und

andere Pflanzen, wobei ein hölzernes Bild des Gottes in ihre Mitte gestellt wurde. Alles war symbolisch. Der Salat zum Beispiel wurde von den Alten als eine für Trauerzeit geeignete Speise angesehen, weshalb sie ihn reichlich bei Begräbnismälern zur Erinnerung an den Tod des Adonis verwendeten, den Venus in einem Salatbeet verborgen hatte, wo er von dem wilden Eber gefunden und getötet wurde, als dieser zur Weide dahin kam.

Der griechische Name für Garten war Keros, und die Gärten des Adonis (Adonidos keroi) waren »Kresse und andere Pflanzen, die schnell in Töpfen herangezogen wurden.« Hiervon stammt der sprichwörtliche Gebrauch der Bezeichnung für Vergnügungen und Zeitvertreib.

Ein anderer Gebrauch dieser Phrase stammt aus der Zeit Leos X., der zum Beginn des 16. Jahrhunderts so viele Gelehrte um sich versammelte, darunter einen Italiener namens Guarino, dessen erste Veröffentlichung in einer Sammlung griechischer Ueberlieferungen bestand. Sie trug einen sehr hochtrabenden griechischen Titel, der lateinisch, Thesaurus, Cornucopiae et Horti Adonidis' lautete. Der Drukker sagt in der Vorrede, daß das Buch mit gleicher Berechtigung bezeichnet werden dürfe als »Horn der Fülle, ein Thesaurus, oder die Gärten des Adonis«.

*

UNSERE NEUERSCHEINUNGEN

BÜCHER DER GARTENSCHÖNHEIT

Vierter Band:

IMMERGRÜNE LAUBGEHÖLZE
ERFAHRUNGEN IN MALONYA VON JOSEF MIŠÁK

80 Seiten auf holzfreiem Kunstdruckpapier mit 50 Bildern.

IN diesem neuen Bande der Bücher der Gartenschönheit legt Josef Mišák, der seit dreißig Jahren der Mitarbeiter des Grafen István Ambrózy-Migazzi bei der Schaffung des einzigen immergrünen Parkes Mitteleuropas in Malonya gewesen ist, seine reichen Erfahrungen mit immergrünen Laubgehölzen nieder. Er will damit nicht nur den Fachleuten dienen, sondern vor allem die Liebe zu den immergrünen Laubgehölzen in den weitesten Kreisen der Gartenfreunde wecken. So spricht er über ihre Bedeutung für Garten und Park und das besondere Beispiel, das Malonya darstellt, gibt eine Gesamtübersicht über die Arten und Formen, die durch die eindrucksvollen, fast ausschließlich aus Malonya stammenden Bilder veranschaulicht wird, und schildert dann in allgemein verständlicher Form ihre Vermehrung, Kultur und Verwendung.

Das Buch erscheint seines Gegenstandes willen zugleich in *deutscher* und *tschechischer* Sprache.

In Halbleinen 6 Mark / In Ganzleinen 8 Mark.

NEBEN den Büchern der Gartenschönheit, die ihre Themen im engeren Sinne im Reiche des Gartens und der Gartenpflanzen und der Arbeit mit ihnen suchen, planen wir eine neue Reihe von Büchern, die sich vornehmlich ihrem Kultur- und Gefühlsgehalt zuwenden. Ihr Titel ist in Anlehnung an das Goethe-Wort aus der Italienischen Reise »Ein Weltgarten hatte sich aufgetan« gewählt:

Der Weltgarten

Diese Bücher sind ganz auf das Wort gestellt. Ihre Form ist im Gegensatz zu dem großen, zur günstigsten Stellung der Bilder gewählten Format der ersten Reihe das Oktav des literarischen Buches. Sie werden auf bestem holzfreiem Papier in Tiemann-Fraktur gedruckt. Zunächst wird diese Reihe Arbeiten von *Karl Foerster, Fritz von Oheimb, Karl Sprenger, Paul Landau* bringen.

Soeben erschienen

Erster Band:

Karl Foerster / Unendliche Heimat

KARL FOERSTER hat die Aufsätze allgemeinen Gehalts, die er in diesen Blättern veröffentlichte, in neuer Bearbeitung vereinigt und durch neue ergänzt, um mit seiner Art der Natur- und Gartenbetrachtung die Geheimnisse des Heimatgefühls neu zu beleuchten. »Und dies hattest du so lange in deiner Nähe, ohne es zu wissen und im Gefühl zu haben – denken wir so oft bei Neuentdeckungen und Wiederentdeckungen in der Landschafts- und Menschen-Nachbarschaft, in Wohnung und Garten. Neu und eigen sind die Schätze, die das Herz in jeder neuen Gegend, jedem neuen Waldsaum und Bachufer sammelt, und das Niegesehene ist uns schon ahnungsvoll bekannt, wie Vertrautes ewig wieder so wunderlich neu.«

In diesen Worten der Einleitung ist der Sinn und die Absicht dieses Buches niedergelegt.

In Pappband 3 M. / In Ganzleinen 4 M. / In Leder 9 M.

Vielfachen Anregungen folgend, werden wir aus dem Material der Gartenschönheit neue mehrfarbige und einfarbige

POSTKARTEN-SERIEN

herausgeben. Die ersten beiden farbigen Serien liegen jetzt vor:

Erste Serie:

Pernetrose Souvenir de Georges Beckwith / Iris / Dahlie Ehrliche Arbeit / Orchideen Laelia Latona und Laelia cinnabarina× Cattleya gigas / Clivia miniata.

Zweite Serie:

Steingarten im Sommer / Herbst im Kurpark von Pyrmont (2 Motive) / Brennende Liebe, Eisenhut und Staudenwicken / Ahorn in den Alpen / Rankrose Dorothy Perkins als Tafelschmuck.

Preis jeder Serie von 6 Postkarten 1 M postfrei.

VERLAG DER GARTENSCHÖNHEIT, BERLIN-WESTEND

Gartenschönheit

eine Zeitschrift mit Bildern

für Garten- und Blumenfreund · für Liebhaber und Fachmann

April 1926

in Gemeinschaft mit Karl Foerster und Camillo Schneider
herausgegeben von Oskar Kühl

Verlag der Gartenschönheit G.m.b.H. Berlin-Westend

7. JAHR / HEFT 4 APRIL 1926

GARTENSCHÖNHEIT

eine Zeitſchrift mit Bildern für Garten- und Blumenfreund für Liebhaber und Fachmann in Gemeinſchaft mit Karl Foerſter und Camillo Schneider herausgegeben von Oskar Kühl

Inhalt des Aprilheftes:

Seite

Aus Pruhonitz / Bild 85
Karl Foerſter / Die Zukunft des deutſchen Waldes / Mit 3 Bildern 85
K. Volkersz / Hyazinthen / Mit 3 Bildern 88
Harry Maaß / Gartenſelbſthilfe / Mit 4 Bildern und 3 Zeichnungen 91
Karl Foerſter / Gartenumgang mit Frühjahrsblumen / Mit 8 Bildern 93
Kurt Pöthig / Das Gartentheater / Mit 3 Bildern und 2 Zeichnungen 97
Blütenſträucher des April / 3 Bilder 99
Paul Landau / Vom Gartenglück der Renaiſſance / Mit 1 Zeichnung 100
Camillo Schneider / Neue Frühlingsprimeln Mit 2 Bildern 104

Aus dem Blumengarten der Literatur
Der Liebesgarten von Petrarca 101

Gartenaufgaben
Camillo Schneider / Treppenſtudien / Mit 3 Bildern 103

GARTENARBEIT UND BLUMENPFLEGE
Camillo Schneider / Der Gartenberater V 105
Alexander Steffen / Gartengeräte III: Die Düngergabel, die Grabegabel und ihr Gebrauch / Mit Zeichnung 106
Paul Kache / Anzucht von Blütengewächſen 107

Die Pflanze in der Wohnung
Japaniſche Miniaturgärten / Mit 2 Bildern 108

Auf dem Balkon
H. Gehringer / Arbeiten im April 108

Aus der Krankenſtube der Pflanzen
M. Noack / Der Grauſchimmel (Botrytis cinerea) 109

Aus der Werkſtatt der Pflanzenzüchter
Robert Türke / Erfahrungen mit Lutea-Kreuzungen 110

Am Wege
Aus dem Pruhonitzer Verſuchsgarten . . . 110

GARTENRUNDSCHAU
Neues aus aller Welt
Jubiläums-Gartenbau-Ausſtellung in Dresden / Die fünfzig beſten Steingartenpflanzen / Primula malacoides / Roſen für rauchige Induſtriegegenden / Nordlandroſen . 111

Neue Bücher
Feſtſchrift der Flora / Kakteenſtammbaum / Vogelſchutz / Keramiſche Gartenplaſtik / Die Gartenflora / Wohnungsausgeſtaltung 111
Chronik 112
Zeitſchriften 112

BILDBEILAGE
Im Alpinum zu Pruhonitz

FARBIGE BILDBEILAGEN
Cytisus praecox / Aubrietia graeca superba
Primeln

Monatlich ein Heft

Bezugspreis für das Vierteljahr
in *Deutſchland* 4 G.-M. und 0.75 G.-M. Verſandkoſten (Poſtſcheckkonto Berlin 76290), im *Ausland* einſchließlich Verſandkoſten: 5.25 Goldmark = 1,25 U. S. A.-$ oder entſprechend in der Landeswährung.

Preis des Einzelheftes
1.50 Goldmark zuzüglich Verſandkoſten

Verlag der Gartenſchönheit G.m.b.H.
Berlin-Weſtend / Akazien-Allee 14.

Der Name Cytisus praecox hat den König der Ginſter bisher zu einem unbekannten König gemacht, obgleich er nicht nur der edelſte, ſondern auch der unverwüſtlichſte iſt und an Härte alle heimiſchen Ginſter übertrifft. 15 Jahre alte Exemplare haben vier Meter Durchmeſſer. Das abgebildete Exemplar iſt vier bis fünf Jahre alt, einen Meter hoch, einen Meter breit. Ende April, Anfang Mai ſchlägt er ſein goldenes Rad über den blauen Lava-Strömen der Aubrietien.

Aubrietia graeca superba, etwas blauer als die faſt ebenſo ſchöne Aubrietia tauricola, fällt wie dieſe aus der Reihe aller übrigen durch ihre Gartenwilligkeit und ihr treues Reichblühen auch als zehn Jahre alte, ungepflegte Polſter heraus. Aubrietia paßt in Frühlingsſteingärten zu Iberis, ſibiriſcher Erdwurz, Zwergiris und Ginſter, ebenſo zu Einfaſſungsbändern, an trockene Böſchungen und in Frühlingsteppichbeete. – Bilder K. F.

Aus Pruhonitz. – Bild C. S. *Im April*

KARL FOERSTER / DIE ZUKUNFT DES DEUTSCHEN WALDES

WIR ſtehen im Beginn der größten Weltwende des Wald- und Gartenweſens, welche die Geſchichte kennt. Es iſt an der Zeit, immer größere Kreiſe, die dieſen Dingen noch fern ſind, mit Ahnung und lebendigen Begriffen dieſer neuen Entwicklung zu erfüllen. Unſer Gefühl meint ganz andere Wälder und Gärten, als wir haben. Hat nun dieſes Gefühl, das ganz andere und viel reichere Wälder fordert, Recht oder hat es ſich, wie bisher, forſtwirtſchaftlichen Notwendigkeiten zu beugen? Sollen wir auf alle Zeit hinaus in dieſen jahreszeitloſen öden Kiefernwäldern unſer Leben vertrauern oder werden hier dereinſt ganz andere Wälder erſtehen, hat der Romantiker oder der Fachmann Recht?

Die Antwort auf dieſe Frage iſt überraſchend. Die Pioniere der modernen forſtwirtſchaftlichen Geſtaltungsarbeit geben dem Waldromantiker Recht auf Grund ihrer dreißigjährigen Waldarbeiten an armen Böden. Das Gefühl für Naturromantik erweiſt ſich immer mehr als Weſenseins mit der weiſeſten Vorausſicht in die Gleichgewichtsbedingungen des großen Naturhaushaltes, was gleichbedeutend mit dem Wirtſchaftshaushalte der Menſchen. Alle großen nachhaltigen Gefühle ſind alſo abgekürzte Formeln für den Verſtand. Skepſis ruht immer auf Unbeweglichkeit und vorzeitigem Abbruch der Gedanken- und Erfahrungsreihen.

Alles, was im Sinne neuer Waldſchönheit und Wirtſchaftlichkeit zu ſagen iſt, wird durch Zahlen jener großen und praktiſchen Forſchungspioniere bis ins kleinſte belegt. Ich nenne vier Namen, die im deutſchen Volke, deſſen Sinn für große Künſtlernamen etwas ſehr auf Koſten des Sinns für Naturgeſtalternamen entwickelt iſt, unbekannt ſind: Möller, Wiebecke, von Kaliſch und von Keudell. Und doch wird von dieſen vier Namen unſerer deutſchen Welt ein Schönheitszuwachs von einer Fülle und Bedeutung kommen, neben der uns die Bereicherung, die wir manchem überall genannten Künſtlernamen verdanken, verhältnismäßig klein und zeitlich erſcheint.

Was ſoll nun aber plötzlich mit den deutſchen Wäldern vorgehen? Wachſen denn überhaupt auf den Kieferböden ganz andere Wälder, und ſollen wir denn wirklich ohne übergroße wirtſchaftliche Opfer aus dieſer ſchrecklichen, allzu einſeitigen Kiefern- und Fichtenwaldperiode herauskommen?

Nicht Gedanken, ſondern Erfahrungsergebniſſe ſollen hier vorgetragen werden. Die Formeln für den Zukunftswald, aufgeſtellt von den Führern der Forſtwirtſchaft, im weſentlichen anerkannt von dem größten Teil privater, ſtaatlicher und ſtädtiſcher Waldpfleger, ſind ziemlich kurz zuſammenzufaſſen.

Die Zukunft gehört hauptſächlich dem Miſchwalde, der vielartige Nadelhölzer und Laubgehölze vereinigt. Sie gehört dem Dauerwalde, in dem es keinerlei glattraſierende Kahlſchläge breiter Räume mehr gibt, ſondern nur die alljährliche Ausholzung einzelner paſſender Bäume durch die ganzen Beſtände verteilt. Dieſe Wälder beſtehen aus Bäumen der verſchiedenſten Alter, verjüngt durch wildwachſende Sämlinge. Solche genügend reichliche Verjüngung durch Sämlinge iſt im allgemeinen nur im Miſchwalde möglich, weil hier die Ausſichten für das Keimen und das erſte Heranwachſen der Sämlinge von der Verſchiedenheit des Jahreswetters genügend wechſelreich begünſtigt werden und der Boden nicht durch einſeitige Beanſpruchung verarmt.

Die Zukunftswälder, ſoweit ſie den Namen verdienen, gehören ferner dem Prinzip der örtlichen Raſſenpflege und der Raſſenveredelung, ſie gehört der Ertüchtigung der Pflanze genau ſo wie die Zukunft der Gärten.

Der alte große Irrtum, daß Veredlung und Verfeinerung in Wäldern und Gärten, auch in Menſchenweſen, Pflanzen und Tieren irgendwie durch Verzärtelung und Einbuße an Naturkraft erkauft werden müſſe, wird abgebaut werden durch eine Unzahl neuer Ergebniſſe der Arbeit an der Steigerung der Organismen.

Überall ſchlummern in den Organismen neben den Veredelungsmöglichkeiten unerweckt wartende Urkräfte und Widerſtandsfähigkeiten, ſowie vor allem auch Nachhaltigkeiten, welche die Lebenskraft der unbeeinflußten Natur unendlich übertreffen. Wenn man eine Goldranunkelpflanze aus den Wieſen, alſo einen Trollius der wilden europäiſchen Art, neben eine gartenveredelte Pflanze derſelben Art in ein Wieſenbeet ſetzt und beide Pflanzen nach ſechs Jahren mit den Erdwurzelballen herausgräbt, ſo kann noch ein Kind die wilde Pflanze tragen, während an der veredelten ein Mann ſchwer hebt.

Es iſt noch garnicht ſo lange her, daß man mit der Wahlloſigkeit bei der Auswahl des Waldſaatgutes gebrochen hat. Wir haben noch in

Deutſchland an ungezählten Stellen Sämlinge franzöſiſcher Kiefernraſſen ſtehen, die nur ein Drittel der Wüchſigkeit beſtgewählter lokaler Kiefernſorten erreichen.

Wir treten alſo ein in das Zeitalter der Entdeckung des genialen oder ſonderlich begabten Individuums nicht nur in der Gartenpflanzenwelt, ſondern auch im Baumreich der Wälder. Pioniere der Waldbaumzuchtarbeiten laſſen ſchon jetzt unter Verwendung von hohen Feuerwehrleitern beſtimmte Zweige wegſchneiden, um Beſtäubungen zu lenken und Saaten von beſtimmten Zweigen zu ernten. Geh durch einen Wald und ſieh die geheimnisvollen Unterſchiede von Baum zu Baum.

Eine Eiche treibt früh, die andere ſpät und eine blüht immer in Froſtzeiten hinein, während die ſpätblühende dieſen entrückt iſt. Eine Eiche iſt kahl, die andere ſchon belaubt, eine hat dunkelgrüne, glänzende Blätter, die andere zerfreſſenes und vermehltautes Laub. Jede Fichte hat ein anderes Geſichte und eine andere Geſchichte — heißt es irgendwo. Ein Baum wächſt ſchlank ohne Seitenverzweigung empor, ohne daß ein Eingriff geſchah, der andere iſt unten ganz mit Seitenzweigen umgeben, Unterſchiede, die forſtwirtſchaftlich ganz ungeheuer ins Gewicht fallen. Die Ergebniſſe dieſer Zuchtarbeit aus holzwirtſchaftlichen Gründen werden aber ebenſo auch unſerer Freude am Einzelbaum zu Gute kommen, deſſen Schönheit wiederum im Dauermiſchwalde ſich am ſtärkſten auswirkt.

Das Wichtigſte aber, was man von der Sendung des Dauermiſchwaldes moderner Struktur ſagen kann, iſt ſeine bodenveredelnde Kraft, die langſam, aber ſicher wirkt, immer im Wachſen bleibt und nicht durch große Kahlſchläge zerſtört oder auf zwei bis drei Jahrzehnte unterbrochen wird. Im Walde der Zukunft gibt es kein Wegnehmen von welkem Laub oder welken Nadeln oder kleinem Reiſig, kein Wegnehmen der alten Baumſtümpfe und Wurzeln. Ihr Stehenlaſſen iſt in ſeiner großen Bedeutung für das bakterielle Leben des Bodens wenigſtens in vielen Bodenarten erkannt worden. Dem Waldboden wird ſein natürliches Leben erhalten und der Stifterſche Ausdruck vom unberührten Schmelze der Forſten wird tatſächlich als etwas erkannt, was zahlenmäßig größere Holzerträge bringt als banale Nutzwälder.

Im Zukunftswalde kommt nun überall wieder im Innern des Waldes, an allen äußeren Waldrändern und auch allen Rändern der Waldwege auch der ſchöne, Schatten vertragende Waldſtrauch und Waldranker, und der beerentragende und neſterbergende Wacholder zu ſeinem Recht und zwar zunächſt nicht einmal aus romantiſchen Anwandlungen, ſondern aus der Einſicht in den Haushalt des Waldes.

Die Vogelwelt iſt unerſetzlich als Schutzpolizei gegen die Schädlinge der Bäume. Dieſe kleinen Tiere wirken vielmehr ins Große, als man denkt. Das Waldinnere und das geheimnisvolle Leben des Erdbodens wird durch die Strauchgürtel der Ränder vor austrocknenden und ausfrierenden Winden bewahrt. Landvogelwelt liebt Windſtille.

Man fängt an, den Baum noch in ganz anderem neuen Sinne als ein Kollektivweſen zu erkennen, das mit gleichen und mit anderen Baumarten und Pflanzen, am meiſten aber mit dem mikroskopiſchen Tier-, Pflanzen- und Bakterien-Reich des Bodens eng zuſammenhängt.

Das Neue aber iſt, daß dieſes geheimnisvolle Bodenleben, das ſich um die Wurzeln bis zu einer Tiefe von 80 Centimetern abſpielt, zu der Baumwelt über ihm in einem Verhältnis ſchnell fortſchreitender, gegenſeitiger Steigerung ſteht, das auf jahrzehntelanger Ungeſtörtheit urwaldmäßigen Charakters ruht.

Ein Klümpchen Walderde birgt Millionen kleiner Lebeweſen in ſich, die an den ungeheuren Organismus des Baumes gebunden ſind, wie dieſer an ſie. Wirtſchaftlich durch geſteigerten Holzertrag ſich offenbarende Bodenverbeſſerung iſt nur im Dauerwalde möglich und im Miſchwalde am höchſten.

Wohl die ſtärkſten Walderlebniſſe verdanke ich den wunderbaren Miſchwäldern um Fürſtenberg in der Mark, kaum zwei Stunden nördlich von Berlin. In ſolchen Wäldern gipfelt ſich die königliche und imponierende Schönheit des großen Kollektivweſens Wald. Hier gipfelt ſich die Beziehung der Nachbarbäume untereinander zu ſeltſamer Wechſelrede und Lebensgeſelligkeit, deren Eindruck uns ganz neue Maßſtäbe des Schönheitsurteils über einartige Wälder einbaut. Dieſe haben natürlich auch ihre beſondere Schönheit und genau in dem Maße, als ſie ſchön und üppig ſind, bleibende oder einſtweilige wirtſchaftliche Berechtigung. Es kann keine Rede davon ſein, ihre eigenartige Schönheit je entbehren zu ſollen. Aber der Geſamtorganismus unſeres Landes kann auf die Dauer nicht auskommen ohne jene anderen, vielartigen Wälder.

Zu den Umſtänden, die der Forſtwirtſchaft mit ihren einſeitigen Nadel=

wäldern und Kahlſchlägen unerwartet dicke Striche durch die Rechnung machten, gehört neben der Bodenverarmung auch die Ungeziefergefahr. Dieſe Schädlingsepidemien nehmen niemals im natürlich verjüngten Dauermiſchwalde ihren Ausgang. Es würde hier zu weit führen, zu unterſuchen, wodurch hat ſich denn dieſes ganze Kiefernwaldſyſtem mit den Kahlſchlägen ſo lange und ſo weit in Deutſchland ausbreiten können? Warum hat ſich denn die Berliner Gegend in Kiefernwälder verwandelt, nachdem herrliche Laubholzwälder vor mehr als einem Jahrhundert von Königen und Eroberern, die Gold oder Holz brauchten, in Auslandsexporte oder Kriegsgeräte verwandelt wurden? Verdorbene Wälder können nicht einfach in Muſterwälder übergeführt werden.

Hauptſchuld tragen falſche Verallgemeinerungen ungünſtiger Erfahrungen mit durch Kahlſchlag verwüſteten früheren Waldböden.

Die Erkenntnis, daß mit Hilfe des Dauermiſchwaldes auf allen möglichen Böden, auch auf den heruntergewirtſchafteten, allmählich wieder mit Vorteil faſt alle Baumarten zu ziehen ſind, hat zur Vorausſetzung erfolgreiche und negative Erfahrungen von Generationen und Jahrzehnten, lange kühne und mühevolle praktiſche Verſuche. Eingehende Zahlenberichte über die Rentabilitätsberechnungen der Dauerwalderträge und der Kahlſchlagwalderträge führen hier zu weit. Nur einen kleinen märchenhaften Bericht des Forſtmeiſters Wiebecke will ich hier wiedergeben.

Es war vor dreißig Jahren ein Mann, der ſollte von ſeinem Walde leben. Im Walde war beſtens nach Ertragstafeln und Flächen feſtgeſetzt, was in Kahlſchlag zu hauen und mit junger Aufforſtung weiter zu kultivieren wäre. Da ſagte er ſich: Wenn ich nur ſo wenig haue, wie es die Abſchätzung meines Reviers vorſchreibt, kann ich nicht von meinem Walde leben. Sprachs und ſchlug mehr als das Doppelte, aber ohne Kahlſchlag überall aus dem Walde heraus, kultivierte garnicht und ließ überall junge Sämlinge nachwachſen.

Jeder, der es ſah, weisſagte ihm: Sie ſind in kurzer Zeit mit Ihrem Wald erledigt. Denn ſein Revier enthielt nur 70 Hektar dritter Bodenklaſſe, 400 Hektar vierter und 150 Hektar fünfter Bodenklaſſe. Es hatte fünf Hektar hundertjähriges, 60 Hektar achtzigjähriges, 100 Hektar vierzigjähriges und 500 Hektar jüngeren Holzes. Geſamtholzvorrat 30000 Feſtmeter. Nach der Taxe durfte er nur jährlich 1000 Feſtmeter ſchlagen. Er ſchlug aber laut Buchführung 2000 und zwar dreißig Jahre lang. Sein Geſamtderbholzvorrat ſtieg trotzdem auf 90000 Feſtmeter. Die mittlere Bodenertragskraft für 1880 nicht einmal auf vierte Klaſſe berechnet, war dreißig Jahre ſpäter ſchon auf dritter Klaſſe. Das ganze Revier hatte alſo einen mehr als doppelten Einſchlag geliefert, Vorrat verdreifacht, Bodenqualität um fünf Viertel erhöht und das alles ohne jede Aufforſtungsfläche, allein dadurch, daß der Boden ohne jedes Kahlſchlagveröden ſtets in vollſter Ruhe gepflegt und ſämtliche Beſtände allmählich überall durch die ganzen Waldräume hindurch, aber ſtets nur ſehr vorſichtig, durchhauen wurden und der ganze Wald im Anflug von Bäumen jeden Sämlingsalters belaſſen wurde. Das Ganze iſt kein Märchen und der Mann iſt Herr von Kalitſch auf Bärenthoren, der jetzt als Dr. h. c. der Forſtwiſſenſchaft ſein Lebenswerk im Walde Wiſſensbegierigen aus allen Landen zeigt, unter denen auch Forſtmänner aus fernen Ländern, bis von Japan her, erſcheinen.

Bilder Dr. Schoenichen

Am Zukunftsbilde deutſcher Wälder werden auch gewiſſe ausländiſche Holzarten immer ſtärker mitwirken. Die größte Zukunft hat wohl die phantaſtiſch ſchnellwachſende Douglasfichte, die alle deutſchen Examina beſtanden hat und in ihrem Holze ſo wertvoll durch deſſen Widerſtandskraft gegen Feuchtigkeit iſt.

Manche fremden Gehölze, wie die ſchnellwüchſige japaniſche Lärche, haben die Kraft erwieſen, auf großen Landſtrecken den Boden wieder waldfähig zu machen, auf dem es jahrzehntelang nicht gelungen war, Wälder emporzubringen, weil der Boden dort durch beſtimmte Zerſetzungen baumfeindlich geworden war. Eine Zeitlang glaubte man dieſen Baum wegen Gipfeldürre in Trockenheitszeiten mit Fragezeichen verſehen zu müſſen, erlebte dann aber eine unglaubliche Ergänzungsfähigkeit ſeines Wuchſes, die alle Schäden wieder ausheilte.

Störungen des Heimatcharakters ſind von all dieſen Fremdlingen nicht zu befürchten, im Gegenteil, es ſind nur Steigerungen zu erhoffen, daß ſich dieſe nordiſchen Lebensgenoſſen unſerer Heimatsatmoſpäre ganz einpaſſen, was ja ſogar auch ſüdliche fertig bringen, wie die Edelkaſtanie.

Aus dem Anblicke der noch nicht ein halb Jahrhundert alten Pflanzungen, die Graf Silva Tarouca in ſeinem rieſenhaften Landſchaftspark bei Prag unternommen hat, gewinnt man den Eindruck, daß noch eine Fülle lebenskräftiger und herrlichſter Geſtalten aus dem Reich der Bäume,

Seenzug im Pruhonitzer Park. — Bild C. S.

Sträucher und Stauden anderer Länder für immer deutſchen Wäldern und Waldrändern einzufügen iſt. Man kann jedem Wald= und Gartengeſtalter, der Zukunftsluft wittern möchte, nur raten, ſich jenen Park anzuſehen und ſeine ganze Park= und Waldfantaſie von dieſen Eindrücken befruchten zu laſſen.

Im März ſieht man dort den Boden von Hainen turmhoher Douglasfichten, die vierzigjährig ſchon mehr als Ausmaße hundertjähriger deutſcher Fichten beſitzen, überall mit den niedrigen gelben Primeln bedeckt, die Teſſin und oberſtes Rheintal erfüllen und das Zeug dazu haben, in Deutſchland ſchon drei Wochen vor allen Schlüſſelblumen einen viel ſchöneren Primelflor als jene zu entfalten. Dazwiſchen wachſen wuchtige kleine Büſche farbiger kaukaſiſcher Schneeroſen, auf Waldwieſen verwildern Himalaya=Primeln, Felſen ſind haushoch mit den Zweigen rankender Kletterhortenſien bedeckt, trockene Felſenufer eines Sees ſind von Tauſenden üppiger Blaufichten bewachſen, an Plätzen, an denen jede europäiſche Tanne und Fichte vor Trockenheit und geringer Bodenmenge zwiſchen den Felſen ſofort eingehen würde.

Jedes Stück neuer fremder Naturſchönheit in Wäldern und Gärten, das ſich unſerer heimiſchen Welt dauerhaft und glücklich einfügt, wird allmählich zu einer neuen Quelle des Heimatgefühles. Für die dringend notwendige Ausgeſtaltung unſeres Grunewaldes, in dem die deutſche Eiche zwiſchen den Kiefern ſchwer aufzubringen ſein wird, haben ſtarkwüchſige amerikaniſche Eichen eine große Zukunft. Man wird im Grunewald ſo vorgehen müſſen, daß man zunächſt eine große Fülle kleinerer und größerer vielgeſtaltiger Anforſtungsoaſen ſchafft, die man gegen das Feſttreten der Böden zunächſt eingattern muß und licht mit gemiſchten Beſtänden von Buchen, amerikaniſchen Eichen, Feldahornen, Birken, Ebereſchen und anderen Laubbäumen möglichſt wechſelreich bepflanzt. An einem vollen Erfolge ſolcher Pflanzung iſt nicht zu zweifeln. Daß eine Millionenſtadt wie Berlin ſich dieſe Karikatur eines mächtigen Waldes vor den Toren ihrer Stadt nicht ſchon längſt in ein herrliches wildes Waldparkparadies verwandelt hat, dafür hat ſie noch auf lange eine ſchreckliche Strafe, nämlich den Grunewald, in dem man ſich der Natur irgendwie ferner fühlt, als auf der Tauentzienſtraße.

Wälder und Gärten der Zukunft unterſcheiden ſich von den bisherigen noch durch mancherlei gemeinſame Merkmale. Die bei ihrer Schaffung und auch bei ihrer ſpäteren Durchbildung geiſtig leitenden Perſonen können ihre Arbeit nicht mehr wie bisher ſo recht vom Bürotiſch aus machen, ſondern gehören in die Natur hinaus, müſſen ihre Intelligenz und ihren Geſchmack in unmittelbarer Fühlung mit der Natur auswirken. Der Schöpfer und Erhalter des Dauerwaldes braucht in der alljährlichen Ausholzung der Bäume viel mehr Takt und Vorausſicht oder hiermit begabte Helfer als der bisherige Forſtbeamte, der einen Kahlſchlag anordnete, alſo wahllos die Bäume beſtimmter breiter Räume niederlegen ließ. Kahlſchlagdekrete ſind ebenſo bequem wie manche Reißbrettgärten der Gartenkünſtler, die man mit Buchsbaum und Raſen und geraden Weglinien ſo bequem draußen herſtellen laſſen konnte.

Beide Berufe gewinnen immer großartigere Geſamtlinien, müſſen immer aufmerkſamer auf Kleinarbeit werden, befreien ſich immer energiſcher von allen unproduktiven Arbeiten durch Ertüchtigung und Erziehung des Pflanzenwuchſes und vereinfachende techniſche und künſtleriſche Geſtaltungsmethoden, um ſchließlich in der Geſamtauswirkung aller neuen Arbeitsrichtungen äſthetiſche Auswirkungen von größter Mannigfaltigkeit zu gewinnen.

Die Unterſchiede von Wald zu Wald und von Garten zu Garten werden ſich durch alle Arten von Anpaſſungen und zunehmenden Pflanzenreichtum immer mehr vertiefen.

Perſönliche künſtleriſche Geſtaltungskraft wird oft auch in die Formung der Waldcharaktere hineinfließen und das Lied »Wer hat dich, du ſchöner Wald, aufgebaut ſo hoch da droben?« geht einem neuen großartigen Doppelſinne entgegen.

Es iſt in jeder Jahreszeit reizvoll, von langen Wildnis= und Waldgängen wieder in blühende Gärten hinabzuwandern, die die Kultur und den Naturreichtum neuerer Zeiten enthalten.

Am ſeltſamſten iſt es aber im Herbſt, im verklingenden, abſteigenden Leben der Wildniſſe, des blühenden, aufſteigenden Lebens moderner Herbſtgärten zu gedenken.

Wälder ſind wunderbarſte Folie für Gärten.

Wir können nie genug Natur bekommen, nie genug von Wildniſſen und Gärten.

Von Kunſtfreuden muß der Menſch ruhen, Natur= und Gartenfreuden ſind von geheimnisvoller Unermüdbarkeit.

Nur wer Wildnis und Garten, eines ſo wie das andere kennt und braucht, erfaßt beide in ihren Tiefen.

K. VOLKERSZ / HYAZINTHEN

Gelegentlich der großen Ausſtellung in Haarlem im letzten Jahre hatte ich Gelegenheit, den Verfaſſer, der Direktor der Reichsgartenbauſchule in Liſſe iſt, kennen zu lernen. Dieſer Ort liegt im Mittelpunkt des eigentlichen Blumenzwiebelbezirkes. Da jetzt bei uns die ſo lange entbehrten Blumenzwiebeln wieder in Aufnahme kommen, ſo erſcheint es angebracht, von berufener Seite einen kurzen Überblick über die Kultur und die beſten Hyazinthen zu geben. Wir weiſen dabei auf die bereits im Märzheft erſchienenen Farbenbilder hin. C. S.

DIE Kultur der Hyazinthen hat ſich zwiſchen Haarlem und Leiden längs der Nordſeeküſte auf den zu dieſem Zwecke abgeſandeten inneren Dünen entwickelt, alſo auf reinem, kalkreichem Seeſand von ganz gleichmäßiger und geringer Korngröße. Zum Abſanden wird das ganze Gebiet faſt überall durch zahlreiche, ziemlich breite Kanäle durchſchnitten, die durch kleine Gräben miteinander verbunden ſind. Dieſe Kanäle dienen dem Transport der Zwiebeln, des Düngers und anderen Verkehrs= und Kulturzwecken. Der Waſſerſtand der Kanäle liegt, da

Im Alpinum zu Pruhonitz

Links La Grandesse
rechts Arentine Arendsen

das ganze Blumenzwiebelgebiet ein Polder ist, immer 55 bis 60 Centimeter unter der Bodenoberfläche. Nur während Perioden großer Trockenheit wird die obere Erdschicht zu trocken, was natürlich den Zwiebeln sehr schadet. Andererseits ist der Boden sehr durchlässig, sodaß die Kulturen fast nie von Wassermangel zu leiden haben. Das niederländische Seeklima ist offenbar für die Blumenzwiebelkultur sehr geeignet, wenn auch dann und wann Nachtfröste vorkommen und zuweilen recht feuchte und schwüle Luft die Entwicklung bestimmter Krankheiten begünstigt. Auch starker Wind und Hagelschlag können oft großen Schaden verursachen. Dessen ungeachtet wachsen die Hyazinthen sehr gut, zumal die Kultur sich auf Jahrhunderte alten Erfahrungen aufbaut und ständig Sachverständige alles kontrollieren. Jedenfalls treffen hier so viel günstige Umstände, wie nirgends sonst zusammen, sodaß Hyazinthen gleicher Qualität zum selben Preise anderswo nicht gezogen werden können.
Man pflanzt die Zwiebeln gewöhnlich im September-Oktober, teilweise auch noch im November, selten jedoch später. Sie kommen je nach Sorte sechs bis zehn Centimeter tief. Zum Schutz gegen Frost werden die Beete Ende Oktober Anfang November etwa acht Centimeter hoch mit Schilf bedeckt. Diese Decke wird im Februar entfernt und durch eine dünnere von zwei bis drei Centimeter ersetzt. Meist schon anfangs März wird auch diese entfernt. Wenige Wochen später schmücken die Felder sich mit zartem Grün und beginnen die Hyazinthenblüten sich zu entfalten. Die Farben sind besonders zart. Leider dauert diese Blütenpracht, die für den Frühling hier so bezeichnend ist, nur ein paar Wochen. Kaum haben die Blüten sich voll entwickelt, werden sie abgeschnitten und vernichtet. Zum Versand gelangen sie nicht mehr. Nach der Blüte werden die Beete ständig beaufsichtigt, und jede kranke Pflanze wird entfernt.
Nach Beendigung der Wachstumperiode werden die Zwiebeln herausgenommen und zum Trocknen auf Stellagen in Lagerräume gelegt. Zwiebeln, die zum Frühtreiben benutzt werden sollen, nimmt man zwei bis drei Wochen früher aus dem Boden und legt sie in geheizte Lagerräume. So bekommt man sogenannte »präparierte Hyazinthen«, die vor allem zur Weihnachtstreiberei geeignet sind. Nicht nur die Größe der Zwiebeln bestimmt ihre Qualität. Es ist beim Zwiebeleinkauf ganz besonders nötig, sich nur an ganz zuverlässige Quellen zu wenden. Es gibt überall Schleuderfirmen, die durch außerordentlich billige Angebote zu blenden suchen. Der holländische Blumenzwiebelexportverband ist aber jederzeit bereit, Auskunft zu geben und die Lieferung ungenügender Ware zu verhindern.
Die Zahl der Hyazinthen-Varietäten war früher bedeutend größer. Jetzt ist das Bestreben, große Mengen von nur wenigen, aber bewährten Sorten zu züchten. Dadurch besteht die Gefahr, daß Sorten mit sehr guten Eigenschaften, die zum Gewinnen neuer Varietäten aus Samen verwendet werden können, verloren gehen. Müssen doch neue Varietäten fast nur aus Samen gezogen werden. Es dauert aber sieben bis acht Jahre, ehe man ihre Eigenschaften genau genug kennt. Zeigt es sich nun nach vielen Prüfungen, daß man es mit einer wirklich hervorragenden Sorte zu tun hat, so vergehen noch etwa zehn Jahre, ehe die Neuheit eine Handelssorte geworden ist. Daneben entstehen auch wohl neue Sorten durch Knospenvariation aus schon bestehenden. Solche können binnen kürzerer Zeit dem Handel übergeben werden. Nur ein ganz kleiner Bruchteil der Neuheiten ist aber besser oder auch nur ebenso gut, wie die alten Sorten. Es gibt noch viele solcher in den Gärtnereien, die ungeachtet der vielen Zwiebeln, die während der Wachstumsperiode zugrunde gehen, doch weiter gezogen werden, weil es keine anderen gleicher Qualität gibt.

Roi des Belges

Von jeder Sorte sind Zwiebeln verschiedener

Größe und Qualität zu bekommen. Solche erſter Größe meſſen 19 bis 20, ſolche zweiter 17 bis 18 Centimeter; Miniaturzwiebeln haben einen Umfang von 13 bis 14 Centimeter. Dieſe eignen ſich beſonders zum Füllen von Körbchen, Töpfen und Schalen. Daneben kommen mehrblütige Hyazinthen vor, das ſind Zwiebeln, die eine derartige Behandlung erfahren haben, daß jede Zwiebel ſtatt einer ſtarken Traube mehrere kleine hervorbringt, wie das Bild der Sorte *Generaal de Wet* zeigt, die eine Knoſpenvariation von Grand Maitre iſt. Sie hat einen ſtarken Blütenſchaft und eignet ſich daher für mehrblütige Hyazinthen. Zur Beetbepflanzung braucht man ebenfalls Sorten mit ſtarkem Blütenſchaft. Will man Hyazinthen auf Gläſern treiben, muß beſonders auf geſunde, unverletzte Zwiebeln geſehen werden, die gründlich von alten Wurzeln und Zwiebelreſten befreit werden. Zu große Zwiebeln ſind für Gläſer nicht geeignet. Man muß bei Beſtellungen alſo genau angeben, für welchen Zweck die Zwiebeln benutzt werden ſollen, ob zum Frühtreiben (Weihnacht), zum Treiben ab Februar, ob für Gläſer oder ob zur Beetbepflanzung. Im letzten Falle iſt es wichtig, wenn mehrere Sorten gebraucht werden ſollen, die Farben richtig zu wählen und die Blütezeit genau zu kennen. Für all die genannten Zwecke ſei folgende Sortenauswahl gegeben, wobei zunächſt nur einfache erwähnt werden.

Generaal de Wet
Bilder C. S.

WEISSE SORTEN:

„L'Innocence": eine Handelsſorte erſten Ranges für Weihnachtstreiberei, Glaskultur und Beete. Zur Frühtreiberei kaufe man präparierte Zwiebeln, dies gilt auch für alle anderen Sorten, die ſich dazu eignen. Meiſt bringen die größten Zwiebeln die ſtärkſten Trauben, während die kleineren eine nicht ſo kompakte Traube mit weniger Blüten liefern, die für Schalen und ähnliches aber recht paſſend iſt. Die genannte Sorte hat ſchöne große, ziemlich runde und weiße Zwiebeln.

„Arentine Arendsen": ſie ſieht voriger recht ähnlich, hat aber größere Glocken und das ſchönſte reine Weiß. Sie gilt als beſte Miniaturhyazinthe. Die Blüten der Traube entfalten ſich nicht allmählich von unten nach oben, ſondern gehen auf einmal auf. Zum Ladenverkauf eignet ſie ſich, ſo ſchön ſie ſonſt iſt, deshalb nicht recht.

„La Grandesse": ſie iſt die älteſte der bisher genannten drei weißen, aber keineswegs die wenigſt ſchöne. Sie eignet ſich beſonders für Treiberei und Beete, wird aber für Glaskultur gern benutzt. Ihre Blätter ſtehen ziemlich ſenkrecht, ſie iſt etwas teurer als andere Sorten, da ſie etwas ſchwieriger zu kultivieren iſt. Ihre Blüte iſt ſchön und reinweiß, ſie läßt ſich aber nicht ſo früh treiben, wie die erſten Sorten.

„Hein Roozen": ſie blüht im Freien am früheſten und eignet ſich auch für Frühtreiberei. Ihre Blüte entwickelt ſich dann leider meiſt etwas raſcher als die Blätter; die Glocken hängen etwas mehr als bei anderen Sorten. Geſchmackvoll ſind beſonders die Trauben der Miniaturzwiebeln mit ihren ſchönen langen Blütenglocken.

ROSA SORTEN:

„Moreno": es iſt ziemlich ſchwierig, dieſe Sorte zu Weihnacht zur Blüte zu bringen, ſelbſt wenn man präparierte Zwiebeln nimmt. Die Farbe iſt ſchön roſa, der Blütenſchaft aber meiſt nicht ſtark genug, um die Traube zu tragen, deshalb muß ſie geſtützt werden. Sie eignet ſich weniger zur Beetpflanzung, da die zarte Farbe bei ſtarkem Sonnenſchein bald ziemlich blaß wird.

„Gertrude"; ſie iſt ſpäter als vorige und hat dichtere Trauben mit kleineren Blüten, ihr Blütenſchaft iſt dagegen beſonders ſtark. Zur Beetbepflanzung gibts keine beſſere, weder Sturm noch Regen ſchaden ihr. Sie bildet oft Zwiebeln, die zwei gleichſtarke Blütentrauben bringen; rings um jede Traube ſtehen dann Blätter, und man nennt ſolche »Doppelnaſen«. Zur Frühtreiberei iſt Gertrude ungeeignet.

„De Morgenstond": ſie iſt eine für Frühtreiberei vorzüglich geeignete Sorte, die durch Knoſpenvegetation aus Gertrude entſtand. Vorläufig iſt die Neuheit noch viel zu teuer zum Verkauf ins Ausland.

„Nimrod": ſie hat eine lockere Traube mit vielen feinen Blüten und iſt als Miniaturhyazinthe deshalb viel beſſer, als Gertrude mit ihren gedrängten, ziemlich kleinen Glocken. Zur Frühtreiberei iſt ſie geeignet; große Zwiebeln werden faſt nie geliefert, da dieſe faſt immer mehrere kleine Trauben hervorbringen. Zur Beetbepflanzung und Glaskultur iſt ſie ebenfalls weniger gut; ihr Blütenſchaft könnte etwas ſtärker ſein.

„Marconi": dies iſt eine neuere Sorte mit ſchön geformter, großer, breiter Traube mit vielen Glocken von lebhafter roſa Farbe. Iſt ſie auch zum Frühtreiben ungeeignet, ſo umſo beſſer zum Treiben ab Februar; auch für Glaskultur und Beete iſt ſie reizend.

ROTE SORTEN:

Schöne rote Hyazinthen werden zu Weihnachten immer gern gekauft. Die drei folgenden ſind hierfür am beſten geeignet. *„Generaal Peliſsier"*, *„Victor Emanuel"* und *„Garibaldi"*. Es ſind alte Sorten, die meiſt ſogar ohne präpariert zu ſein, zu Weihnachten blühen. Dennoch empfiehlt ſich die Verwendung ſolcher Zwiebeln. Die erſtgenannte Sorte iſt etwas heller als die anderen.

Von den neueren Sorten iſt ebenſo früh wie dieſe nur *„Van Tubergen's Scarlet"*: es iſt eine Knoſpenvariation der ſchön dunkelvioletten Distinction. Ihre Traube iſt klein, aber die Farbe ein prachtvolles glühendes Dunkelrot. Zur Weihnachtszeit wird ſie unzweifelhaft ſehr beliebt werden, ebenſo zur Füllung von Körben und Schalen.

„La Victoire": keine Sorte blüht im Freien ſo früh, wie dieſe. Zum Frühtreiben iſt ſie jedoch nicht geeignet, dagegen um ſo beſſer ab Februar und für Glaskultur, wie Beetbepflanzung. Ihre Traube iſt groß und dicht, die Farbe ein ſchönes Rot. Draußen liegen ihre Blätter anfangs etwas gedreht auf dem Boden, heben ſich aber nach Abſchneiden der Blüte. Die Sorte wird gern gekauft.

„Roi des Belges": eine alte Varietät, die ebenſo wie die drei erſten roten Sorten in der Kultur viele Fehler zeigt und deshalb faſt nicht mehr gezüchtet wird. Sie iſt trotzdem die beſte rote Beethyazinthe, deren Farbe nicht verblaßt.

BLAUE SORTEN:

„Fürſt Bismarck": zum Frühtreiben iſt ſie die beſte; dann iſt ihre Farbe auch ſchön blau. Die Traube iſt groß, locker und breit, da beſonders die unteren Blüten ziemlich langſtielig ſind. Dieſe ſind groß mit zurückgeſchlagenen Abſchnitten. Für Beete eignet ſie ſich weniger, da die Farbe draußen nicht ſo ſchön iſt; zur Glaskultur iſt ſie mit Vorteil zu verwenden und gehört noch zu den neueren Sorten.

„Dr. Lieber": ſie läßt ſich ebenſo früh treiben, wie vorige. Ihre Farbe iſt etwas dunkler, die Traube dichter und reichblütiger. Man kann ſie für jeden Zweck verwenden, wenn auch gleich Fürſt Bismarck etwas weniger gut für Miniaturzwiebeln.

„Schotel": ſie ähnelt in ihren Eigenſchaften ſehr den vorigen beiden,

wenn ſie auch etwas ſpäter iſt. Sie hat ziemlich große, etwas hängende Glocken, die zuſammen ein lockeres Ganze bilden. Etwas ſpäter getrieben iſt ſie ſchön porzellanblau, bei ſehr frühem Treiben blaſſer.

„Queen of the Blues": porzellanblau und eine der beſten Handelsſorten, doch nicht zum Frühtreiben. Vom Februar ab zur Blüte gebracht iſt ſie wunderſchön, ebenſo für Glaskultur und Beete. Ihre weiße Knoſpenvariation »Queen of the Whites« hat die gleichen guten Eigenſchaften.

„Grand Maitre": auch ſie eignet ſich nicht zum Frühtreiben, iſt aber ausgezeichnet für Beete, weil ſie einen ſtarken Blütenſchaft hat. Für Glaskultur wächſt ſie etwas zu hoch. Ihre Farbe iſt dunkler als die der vorhergehenden Sorten.

„King of the Blues": ſchöne dunkelblaue Sorte mit regelmäßiger und oben ſchön runder Traube, die man aber erſt ab Februar zur Blüte bringen darf. Für Beete und Gläſer ausgezeichnet. »Queen of the Pinks« iſt eine ganz ähnliche roſa Knoſpenvariation von ihr.

VIOLETTE SORTEN:

„Distinction": ſie iſt glänzend dunkelviolett, hat eine kleine Traube mit ſtarkem Blütenſchaft und eignet ſich zum Frühtreiben, für Miniaturzwiebeln und für Beete.

„Lord Balfour": ſie hat eine größere Traube und größere Blüten, ihre Farbe iſt aber viel heller und ihr Blütenſchaft weniger ſtark; für alles außer zum Frühtreiben geeignet.

„Laura": ſie iſt lila, hat eine viel kleinere Traube als Lord Balfour mit vielen feinen Glocken und ähnelt etwas der Sorte Nimrod. Wenn präpariert, kann ſie im Januar in Blüte ſtehen, eignet ſich auch gut als Miniaturhyazinthe.

GELBE SORTEN:

„Yellow Hammer": ſie hat zart hellgelbe, breite, dichte, nicht zu große, oben etwas platte Trauben und eignet ſich weniger für Miniaturhyazinthen. Man kann ſie zu Weihnacht in Blüte haben und ſie auch gut für Gläſer und Beete verwenden.

„City of Haarlem": ſie iſt größer, etwas dunkler, aber nicht ſo früh, ſonſt für jeden Zweck geeignet. (Farbenbild im Märzheft).

„Prinz Hendrik": eine neuere ſchön gelbe, großtraubige Sorte, die im Freien früh blüht.

GEFÜLLTE SORTEN:

Sie eignen ſich weit weniger zum Frühtreiben, ſind aber für Gläſer und Beete ausgezeichnet. Als beſte können gelten: *„La Grandesse"* ſchön weiß, *„Preſident Rooſevelt"*, roſa und *„Kastanjebloem"*, hellroſa.

HARRY MAASZ / GARTENSELBSTHILFE

IN wirtſchaftlich guten Zeiten war es üblich, mit der Neuanlage eines Gartens zu beginnen und ſie noch im ſelben Quartal unter Zuhilfenahme eines entſprechenden Stammes geübter Gärtner und Arbeiter zu vollenden. Heute iſt das anders. Nur wenige können ſich glücklich preiſen, die immerhin nicht unerheblichen Mittel für die Gartenneuanlage voll bereit zu ſtellen. Die Vielen aber, denen ein ſchöner Garten langerſehnter Wunſch iſt, müſſen ſich darauf einſtellen, in ſyſtematiſcher Folge Schritt für Schritt zum Ziel zu gelangen. Das aber iſt kein Nachteil, denn im langſamen Vorwärtsbewegen ſteigert ſich die Freude am Kleinſten, und die Erfolge führen ſicher zum erhöhten Gartengenuß mit einer Reihe lebendiger Freuden und köſtlicher Überraſchungen. Ihnen wird ein bis in alle Einzelheiten ſorgfältig bereiteter Plan dienlicher ſein als die Arbeit eines Landſchaftsgärtners, der mit den augenblicklich verfügbaren, ſtark zurückgeſetzten Mitteln rechnen muß, darum mangelhafte Arbeit zu leiſten gezwungen iſt, die in ungenügender Bodenvorbereitung, minderwertigem Material und überſtürzter, und darum notgedrungen ſchlechter Arbeit ihren Ausklang findet.

Eine beſtimmte Flächengröße verlangt immer bei ſorgfältiger Durchführung der Arbeit einen entſprechenden Koſtenaufwand. Oder aber es geht auf Koſten der Qualität. Das aber rächt ſich nirgend ſchneller und nachhaltiger als im Garten. Es wird noch weiter ſo gehen, daß der größere Teil unſerer Gärten in ſehr langſamem Schritt in die Schönheit, in die Vollkommenheit wachſen wird. Und ſicherlich iſt dieſe Art des Gartenſchaffens die erfolgreichſte überhaupt.

Wie muß nun ein ſolcher Plan beſchaffen ſein, und was verlangt unſere Zeit heute von dem gewiſſenhaft Planenden?

Es war im Winter 1924, als der Besitzer dieses Gartens mir aus Süddeutschland die für die Planbearbeitung erforderlichen Unterlagen zusandte: einen Geländeplan und einige Lichtbilder mit ein paar persönlichen Wünschen für den zukünftigen Garten.
Nachdem auf schriftlichem Wege auf Grund des ersten Vorentwurfes eine Einigung erzielt war, entstand der Hauptgrundplan, daneben orientierte ein Blatt über die Bepflanzung im Großen unter Einbeziehung des Rosengartens und ein anderes Blatt enthielt die Vorschläge für die Anordnung der Stauden. Listen geben über Art, Anzahl und Sorten Auskunft.

Pflanzenlisten

A. Gehölze

1. 3 Betula alba, Weißbirken, 2. 1 Malus floribunda, 3. 1 Malus Scheideckeri, 4. 2 Prunus serrulata Hisakura, 5. 16 Syringa vulgaris-Hybriden, 13 S. persica, 6. 5 S. vulgaris-Hybriden, 3 Forsythia suspensa Sieboldii, 3 F. intermedia densiflora, 3 Amelanchier canadensis, 3 Buddleja Davidii superba, 3 Kerria japonica plena, 3 Cydonia japonica, rot, 3 Weigelia Eva Rathke, dunkelkarmin, 3 Rosa rubrifolia, 7. 6 Laburnum vulgare chrysophyllum, 4 Lonicera tatarica rosea floribunda, 3 Mespilus germanica, 3 Philadelphus latifolius, 3 Evonymus europaea, 2 Berberis vulgaris atropurpurea, 5 Viburnum Opulus, 2 Rosa rugosa Carmen, 8. 62 Carpinus Betulus, Heckenpflanzen, 8a. 200 Acer campestre, für provisorische Hekke, 9. 140 Rosa rubiginosa, für provisorische Hecke, 10. 2 Rankrosen Rubin, rot, 11. 2 Rankrosen Alberic Barbier, Frl. Oktavia Hesse, gelb, 12. 2 Rankrosen Minnehaha, dunkelrosa, 13. 1 Rankrose Venusta pendula oder White Dorothy, weiß, 14. 190 Polyantha-Rosen, rot: Eblouissante oder Rödhätte, 15. 64 Buschrosen, gelb: Golden Emblem, Rayon d'or, Mrs. Wemyss Quin, 15a. 92 Buschrosen, orangekupferrot: Mad. Herriot, Queen Alexandra-Rose, Padre, 16. 90 Buschrosen, rosa: Lady Ashtown, Mme. Abel Chatenay, Mme. Jules Grolez, 17. 90 Buschrosen, dunkelrot: Mrs. Edward Powell, Gruß an Dresden, Gloire de Hollande, 18. 1 Ampelopsis Engelmannii, 19. 2 Lonicera fuchsioides, 20. 2 Clematis paniculata, 21. eventuell Einjahrsblumen, 22. 127 laufende Meter Buchsbaum.

B. Stauden

1. 10 Saxifraga hypnoides purpurea, 1a. 10 S. hybrida Schöne v. Ronsdorf, dunkelkarmin, 1b. 10 S. longifolia, weiß, 2. 5 Potentilla calabrica, gelb, 2a. 5 P. nepalensis, karminrosa, 3. 10 Phlox setacea atropurpurea, 3a. 5 P. setacea F. G. Wilson, hellblau, 4. 5 P. Nelsoni, blauweiß-lila, 5. 15 Centaurea montana, 6. 5 Aubrietia hybrida Dr. Mules, leuchtend dunkelviolett, 7. 10 Myosotis palustris Nixenauge, 8. 5 Veronica incana, dunkelblau, 8a. 5 V. Henderssoni, 9. 10 Campanula carpartica, 9a. 10 C. macrantha, dunkelblau, 9b. 10 C. persicifolia, 10. 10 Aster subcoeruleus floribundus, lavendelblau, 10a. 7 A. Amellus Rudolf Goethe, 10b. 5 A. acer, 10c. 5 A. hybridus Ceres, 10d. 5 A. cordifolius Ideal, 10e. 5 A. Beauty of Colwall, 10f. 5 A. Amellus Schöne v. Ronsdorf, 11. 10 Dicentra spectabilis, 12. 10 Aquilegia haylodgensis, 13. 5 Inula ensifolia, 13a. 5 I. glandulosa grandifolia. Nun folgen Iris und dazwischen Gladiolenzwiebeln als Herbstflor: 14. 5 Iris sibirica, 14a. 5 I. germanica Bridesmaid, 14b. 5 I. pallida dalmatica, 14c. 5 I. orientalis Snow Queen, 14d. 5 I. germanica Maori King: 14e. 5 I. germ. Rheinnixe, 14f. 5 I. germ. Fro, 14g. 5 I. germ. Mrs. Reuthe, 14h. 5 I. germ. Lohengrin, 14i. 15 I. pumila, 14j. 10 I. pumila excelsa, 15. 15 Heuchera sanguinea, 16. 5 Incarvillea grandiflora, 17. 8 Pulmonaria azurea, 18. 10 Arabis alpina, 19. 10 Antennaria tomentosa, 20. 10 Armeria Laucheana, 21. 10 Trollius hybridus und Orange Globe, 22. 2 Phlox decussata Coquelicot, rot, 22a. 10 P. A. Buchner, weiß, 22b. 5 P. Dr. Königshofer, feurig zinnober, 22c. 5 P. A. Mercier, zartlila weiß, 22d. 5 P. Le Madhi, blau, 22e. 5 P. Fritjof, lilarosa, 22f. 5 P. nana coerulea, 22g. 5 P. F. von Laßberg, weiß, 22h. 5 P. Hindenburg, rot, 22i. 5 P. Meteor, rosa, 23. 10 Gaillardia hybrida, 24. 10 Lychnis chalcedonica rubra, 25. 10 Pyrethrum hybridum Vivid, 26. 5 Delphinium Arnold Böcklin, 26a. D. Belladonna, 26b. 5 D. Moerheimi, 26c. 5 D. Schwalbach, 27. 5 Solidago aspera, 28. 7 Astilbe Arendsi Rubin, 29. 8 Leucanthemum maximum Edelstein, 29a. 5 L. max. Ophelia, gelb, 30. 5 Doronicum caucasicum, 31. 5 Liatris spicata, 32. 10 Dianthus plumarius, 33. 5 Cerastium Biebersteinii, 33a. 5 C. tomentosum, 34. 5 Lupinus polyphyllus, 35. 10 Lilium candidum, 35a. 5 L. speciosum rubrum oder L. tigrinum, 36. 5 Euphorbia polychroma, 37. 10 Aconitum Fischeri, 38. 4 Papaver orientale Goliath, 39. 6 Hepatica triloba, 40. 5 Viola cornuta G. Wermig, 40a. 5 V. odorata Königin Charlotte, 41. 5 Helianthemum amabile, 42. 5 Coreopsis verticillata, 43. 5 Chrysanthemum indicum Sonne, gelb, 43a. 5 Ch. ind. Provence, rosa, 44. 5 Funkia Fortunei glauca, 45. 12 Gypsophila paniculata, davon 2 für die Treppenwangen, 46. 5 Helleborus niger, 47. 3 Helenium autumnale superbum rubrum.

C. Polsterstauden für Mauer und Plattenbelag

10 Antennaria tomentosa, 20 Armeria Laucheana, 10 Festuca glauca, 30 Saxifraga in Sorten, 20 Sagina subulata, 10 Thymus, 10 Ajuga reptans, 20 Sedum acre, album, Ewersi, 10 Campanula pusilla, 10 Lavendula vera.
Auch für das Gartenhaus, für das Wasserbecken, den Plattenbelag und die Mauern wurden Arbeitszeichnungen gefertigt und beigefügt. Der Bau des Hauses ist erst einer künftigen besseren Zeit vorbehalten. Für ihn ist eine entsprechend große Fläche freigehalten, die

Niedrige gelbe Primeln, Primula acaulis, und Leberblümchen, Hepatica triloba, ſtehen im Naturgärtchen von erſter Märzhälfte an in langdauerndem gemeinſamem Flor. Dieſe Primel iſt die unverwüſtlichſte aller, verträgt auch noch mehr Sonne und tiefen Schatten als die übrigen, will nur auf die Dauer keine Trokkenheit bei hellem Stand. Das Gleiche gilt vom Leberblümchen und allen ſeinen reizvollen Schmuckſorten.

Gefülltblühende farbige niedrige Primeln gibt es häufiger in Gartenſorten, teils engliſcher Herkunft. Die hier abgebildete dagegen ſtammt aus einem Apothekergarten in Schmalkalden, wo ſie ſeit Jahrzehnten Einfaſſungen abgab und nie Schutz genoß, untermiſcht mit einer ebenſo harten weißen gefüllten wirkt ſie zur Blütezeit, als wäre der Boden mit gefüllten Mandel- oder Kirſchblüten überſtreut.

Bilder K. F.

vorläufig mit Beerenobst, Einjahrsblumen und Rasen bestellt wurde. Aber schon im August 1925, also noch im Jahre des Baubeginns, hatte der eifrige Gartenfreund den größten Teil der ihm im Plan vorliegenden Richtlinien mit Hilfe eigenen Personals und eines Gärtners fertiggestellt. Wer an der inzwischen durch den Architekten errichteten Mauer vorüberging, sah durch die vergitterte Öffnung in einen verträumten blumenreichen Garten. Im Wasserbecken plätscherte der Springstrahl, auf den Rosenbeeten blühten köstliche Rosen, und unter erhaltenen Obstbäumen, die durch sorgfältige Bodenbearbeitung zu neuem Leben angeregt wurden, feierte der Hochsommer Feste in einem Farbenrausch prächtig entfalteter Stauden. Voll verständlicher Freude übersandte mir der Besitzer die Lichtbilder des Gartens. Es ist erstaunlich, was hier durch *Selbsthilfe* und sorgsamste Beobachtung aller Vorschriften für ein Gartenleben in so kurzer Zeit erwuchs. »Es ist mir gelungen fast die ganze Anlage noch in diesem Frühjahr fertig zu stellen, und es gedeiht alles so prächtig, daß wir alle wirklich unsere Freude an diesem Garten haben,« hieß es in einem Brief. Und wäre seine Fertigstellung erst in drei Jahren gelungen, — hier ist ein Weg gewiesen, wie wir alle schließlich unsere Gartenträume einmal verwirklicht sehen können.

KARL FOERSTER / GARTENUMGANG MIT FRÜHJAHRSBLUMEN

Veilchen

DIE meisten Gärten haben keine netten Plätze für Veilchen. Überhaupt ist bei ihrer Anlage die Verwendung herzhaften Pflanzenlebens ein wenig als quantité négligeable behandelt worden.
Frühlingsgärten ohne Veilchen sind lächerlich, aber sehr häufig. Man muß diese an sonnige Stellen in harten Sorten, die im Herbst noch ein zweites Mal lange und reich blühen, in großen Massen pflanzen, sodaß man drei Wochen lang im Vorbeigehen immer die Duftwellen kühler, warmer und heißer Veilchendüfte atmet.
Durch Pflanzung der beiden Sorten Charlotte und Augusta zieht man den Flor lange hin. Die Pflanzung kann zwischen März und September geschehen. Pflanzt man noch später im Herbst, so muß man im ersten Winter gut mit Tannenreisig schützen.
Die Veilchen vertragen unendliche Trockenheit und Hitze. Nur pflanzt man die Fläche nicht zu breit, sondern etwas buchtenreich, damit die Pflanzen sich nicht gegenseitig die Nahrung wegnehmen. An manchen Plätzen ist der Winteranblick der halb kahlen Veilchenstellen nicht erwünscht. Man muß dort mit kleinblättrigem Efeu, Zwergnadelgehölzen Seidelbast, Schneeglöckchen, Immergrün und Haselwurz nachhelfen.
»Ja, wo soll ich denn nun in meinem Garten noch rechte Veilchenplätze schaffen?«
»Werfen Sie doch aus ihrer sonnigen Gartenecke dort drüben die verruchten Schneebeeren und Thuja heraus! Dann überhöhen Sie die ganze Ecke in der Größe eines großen Zimmers, stützen die Überhöhung mit einer kleinen rohen Haussteinfuttermauer ab, um die Sie noch etwas Beetstreifen und Weg herumführen, pflanzen in die Ecke, neben ein Sitzplätzchen, Haselnüsse, Birken, Hainbuchen, Wildrosen, kleinblättrigen Efeu, der in die Gehölze hinaufwächst, schwingen den Boden ein klein wenig, sodaß die Gehölze immer an den höchsten Stellen stehen, führen einen kleinen Tretpfad durchs Ganze zum Sitzplatz und zwar durch die ausgemuldeten Stellen und bepflanzen den Boden mit breiten, locker ausstrahlenden und miteinander verflochtenen Horsten von Veilchen, niedrigen gelben Primeln, immergrünen Farnen, Maiglöckchen, Leberblümchen. Die kleine Stützmauer besetzen Sie auch mit Veilchen. Und die kleinen Pflanzplätzchen unter der Mauer ebenfalls.«
Den Boden für die Überhöhung gewinnen Sie am besten auf folgende Weise. Die ganze Gartenecke, an welcher der Weg rund vorbeiführt, hebt sich ein bischen. Wenn Sie diesen Weg, da, wo er beginnt, ganz leicht zu steigen, in der Horizontale durchführten, also allen ansteigenden Boden herausnähmen, sodaß flach ansteigende Hohlwegränder entstehen, so gewinnen sie den nötigen Boden und haben durch die Hohlwegränder auch noch reichlichen Platz für reizenden Frühlingsflor.
Zu den eigentlichen duftenden Veilchen passen die niedrigen gelben Primula acaulis, zu den reizenden duftlosen Hundsveilchen später die hochwachsenden Himmelsschlüssel, Primula elatior.
Es gibt noch so viel reizende wilde Veilchenarten, die den Duft des Veilchens geheimnisvoll variieren; den Duft von Viola Jooi kann man nie vergessen und doch nie im Kopf behalten. Man kann den Begriff dieser Besonderheit so wenig in seiner Tiefe und Eigenart im Gedächtnis halten, wie den manches Menschengesichtes. Trifft uns der Duft des Veilchens, so überrascht er uns meistens irgendwie vertraut und fremdartig, etwa wie manche bekannte unerkannte Stimme am Telefon. Man muß auch die winterharten weißen und rosa Veilchen in seinem Garten haben, ob man nun Kind oder erwachsen ist. Dann braucht man aber auch noch die großblumigen, noch stärker und zum Teil noch edler duftenden Züchtungen an einem besonderen Plätzchen, über das man im Winter ein paar Tannenzweige legt, die nicht zu früh weggenommen werden dürfen, da ja diese Veilchen auch meistens später blühen.
Das Kapitel der riesenblumigen, langgestielten Veilchen ist gartenmäßig noch nicht genügend durchforscht. Manche machen riesige Blätter und kaum Blüten. Andere gedeihen hier in der Berliner Gegend gut, in der Münchener dagegen versagen sie. Erst wer einmal diese kostbaren Steigerungen der Duftschönheit des Veilchens kennen gelernt hat, beginnt sich für die Veilchenveredelung zu interessieren.
Es ist überhaupt noch wenig bekannt, welche Stockwerke wun-

Soldanella montana läßt Anfang April ein lilafarbenes Gerinsel der Knospenstiele erscheinen, das sich langsam zu kleinen 12 Centimeter hohen Blumen emporreckt. Die Pflanze braucht in trockenen Gegenden eine kleine Schattennordwand, und harrt dann in solch kleinem frischem Felsennestchen jahrelang freudig aus.

Corydalis lutea, der gelbe Lerchenſporn, blüht von April bis Oktober, hat lauter reizende Eigenſchaften für Sonne u. Schatten, Steingärten und Naturgärten, ſowie Vorfrühlingsgärten, muß nur in der Jugend ein bischen im Zaum gehalten werden, um nicht an unerwünſchten Stellen üppig zu werden.

derbar bereicherter Duftſchönheit ſich über dem bekannten Urdüften von Flieder, Lilien, Phlox, Veilchen und ähnlichem erheben und zwar in eine vergeiſtigte Vielgeſtaltigkeit hinaus, neben der jene altbekannten Düfte faſt dumpf wirken.

Frühlingsanemonen

IHRE Plätze im Garten müſſen auf dieſe Blumen abgeſtimmt ſein. Vorfrühlingsgärtchen, Naturgärtchen und Steingärten ſind ihre Stätten im Garten, ſoweit es ſich um die abſolut unverwüſtlichen und zähe ausdauernden Frühlingsanemonen handelt.

Die prunkenden italieniſchen Anemonen gehören dagegen auf regelmäßige Beete oder füllen auch Beete allein aus. Dieſe Anemone coronaria ſind nur nicht eigentliche echte Perennen, ſondern halten nur zwei, drei Jahre aus und blühen erſt ſpät im Mai. Sie werden im Herbſt gelegt und zwar zehn Centimeter tief und wie geſagt, alle drei Jahre erneuert.

Von ihnen aber ſoll hier nicht die Rede ſein, ſondern nur von den feſt mit dem Garten verwachſenden. Die Zuverläſſigkeit dieſer zarten Geſchöpfe läßt ſie uns ganz beſonders ans Herz wachſen. Alle knöllchenbildenden, wie blanda und apennina, können in der Zeit zwiſchen Juli und Oktober gepflanzt werden, wobei die Knöllchen etwa acht bis zehn Centimeter tief gelegt werden. Alle von der nemorosa-Gruppe, die bekanntlich längliche Rhizome bildet, können zwiſchen Juli und Mitte März geſetzt werden, das heißt man ſtreut einfach die Rhizome ziemlich dicht an die betreffenden Stellen, um ſie dann zwei bis drei Centimeter hoch mit Erde zu bedecken. Mitte März gelegt, können ſie oft ſchon vierzehn Tage ſpäter mit der Blüte einſetzen.

Die Anemonen der patens und Pulsatilla-Gruppe ſind etwas kitzlich in der Verpflanzung. Das Beſte iſt, wie bei Gentiana asclepiadea, die jüngeren Sämlinge in Töpfe zu pflanzen und ſie ſpäterhin mit feſtem Topfballen anzuſiedeln. Dieſe beiden Gruppen vertragen die größte Trockenheit unter allen Anemonen.

Aber auch die bisher genannten anderen brauchen durchaus nicht feucht zu ſtehen, halten ſogar an ſonnigen, oft ziemlich trocken werdenden Plätzen recht dauerhaft aus, obgleich ſie auch ziemlichem Laubſchatten angepaßt ſind.

Anemone Hepatica, das Leberblümchen, unſtreitig die wichtigſte und ſchönſte aller frühen Anemonen, kann von März Anfang bis Herbſt immer gepflanzt werden; entgegen der verbreiteten Meinung hält ſie auch an ſonnigen, durchaus in keiner Weiſe feuchtfriſchen Plätzen jahr-

Asperula odorata, der Waldmeiſter, findet wohl in jedem Garten ein kleines Schattenplätzchen, an dem er ſeinen weißdichten ſpäten Aprilflor, ſeine waldhaften, weit umherſtreifenden Düfte entfaltet. Schön ſind eingeſprengte dichte Trupps der Anchusa myosotidiflora dazwiſchen.

Dentaria digitata, die Tyroler Zahnwurz, gehört mit ihrem energischen Flor lilafarbener Dolden auf 30 Centimeter hohen Stielen zu den wesentlichen Frühlingsblumen um die Mitte des April. Kleine spitzige Klauen, die bald farbige Knospen halten, strecken sich aus dem Boden und entfalten sich zu Blättern.

zehntelang aus. Es ist erstaunlich, wie sich da an einer Weg- und Steinecke irgend ein kleines Pflänzchen, das man vor dem Weltkrieg gepflanzt hat, in einem Jahrzehnt großgehungert hat und bald im Konfirmandenalter angekommen, wie zufällig dort eben erst entstanden, seine kleinen schüchternen Frühlingsgebärden schon Ende Februar entfaltet, nachdem inzwischen Papiere vergilbt und Bücher aus dem Einband gegangen sind, in denen man schon vor acht Jahren etwas gerade über diese gleiche Pflanze an der Steinecke schrieb.

Wer irgend ein paar Quadratmeter in seinem Garten übrig hat, braucht unbedingt alle diese Anemonen in ihren Urarten und in ihren weiß, rosafarbigen Spielarten, ihren gefüllten später blühenden Abarten; man braucht sechs bis acht Anemone nemorosa-Sorten, sechs Leberblümchen-Züchtungen, drei Anemone blanda-Züchtungen. Sie alle vermitteln wesentliche Garten- und Blumenerlebnisse und benötigen nur einmalige Anschaffung.

Wer es nicht glauben will, dem ist nicht zu helfen. Er muß eben weiter sein kümmerliches, anemonenloses Dasein fristen und die Anemonenseite seines Wesens unentwickelt lassen.

Denkt man nun zum Beispiel, daß die Menschen, die aus allen solchen Möglichkeiten ihres schönen Gartens und Lebens nichts machen, von zuviel anderen Glücksempfänglichkeiten geplagt werden, so irrt man. Es sind alles Menschen, die trotz aller Empfänglichkeit hungernde Seelen haben, nach ganz anderem, ganz neuem Glück verlangend, in unzähligen Fällen sogar etwas kunstmüde geworden; aber alle in der Erweiterung ihrer Lebens- und Glückskreise geheimnisvollen Hemmungsgesetzen unterworfen. Mit all diesen neuen Blumen bekommen wir neue Zauberkräfte des Frühlings in unseren Garten, die sein Geheimnis vertiefen und den Born der Frische bereichern, mit welcher uns der Vorfrühling stärker als irgend eine andere Jahreszeit durchhaucht.

Anemone silvestris bildet kleine kriechende Polster mit dreißig Centimeter hohen Blütenstielen. Sie wirkt besonders reizend zwischen Pfingstveilchen. Die Züchtung Frühlingszauber ist viel starkwüchsiger, paßt aber auch nur für Naturgärten und Steingärten oder besondere Frühlingsbeete. Für die unverwüstliche, dreißig Centimeter hohe Anemone narcissiflora paßt dagegen nur der Steingarten. Aber im Steingarten muß dieses treue Gewächs, das die meisten von uns wohl zuerst im Riesengebirge kennen gelernt haben, unbedingt seine Stätte haben.

Die späteste aller Frühanemonen ist Anemone pennsylvanica oder canadensis. Ihre Pflanzung in gewöhnlichen Gartenbeeten oder zwischen anderen

Vinca minor, das Immergrün, blüht bläulich stumpfrot oder weiß hat auch eine wirklich reizende buntblättrige Form, verträgt Sonne, Dürre, Schatten, kann in Naturgärten wuchern oder auch im Formgarten mit festem Spatenstich im Zaum gehalten werden, bildet Teppiche, die kleine andere Stauden schonen.

kleineren Gewächſen müßte ſtrafgeſetzlich verfolgt werden, denn ſie wuchert und wandert und ſproßt mit einer Geſchwindigkeit und Fülle, daß man alle Hände voll zu tun hat, ſie herauszujäten. Es gibt ſehr wenig ſo ausgeſprochen edle Gewächſe von einer ſolchen Zudringlichkeit. Sie paßt alſo nur als Unterpflanzung in einen Park, wo ſie mit ihrem üppigen, vierzig Centimeter hohen Flor ganz überraſchend wirkt.

Dieſen März hindurch kamen während der letzten zwölf Froſttage allerlei Telefonfragen, ob man die Blumen gegen Fröſte ſchützen ſollte. Eine Dame erzählte ſogar, daß ihre Tochter eine kleine Primel- und Krokus-Gruppe des abends noch ſchnell mit einem Seidenſchal zugedeckt hätte.

Ein Gartengang am 20. März nach achttägigen Fröſten, die morgens immer bis ſechs Grad unter Null heruntergingen, iſt für den Neuling ſelbſt faſt ebenſo überraſchend wie für den langjährigen Gartenbeobachter. Ganz unbeeinflußt vom Froſte blühen weiter und ſehen jeden Tag ſtrahlend ſchön aus alle Krokus, die üppig im Beet ohne Raſen wuchſen. Jeden Morgen der gleiche Anblick gefrorener Waſſerbecken, umblüht von leuchtend bunten Blumen. — Rauhreif im Schattenſtreifen neben ſonnenoffnen Blumen. Veilchen in harten Sorten laſſen ſich vom Froſt meiſt nicht viel merken; in mancher Lage können ſie aber alle 15 Jahre um ihren Hauptflor kommen. Schneeheide iſt jetzt auf der Höhe ihrer Schönheit.

Iris reticulata, der Fremdling aus dem Süden, ſteht in reiner unverſehrter Schönheit neben etwas froſtzerzauſten einheimiſchen Blumen, Frühlingslichtblumen des Nordens, Bulbocodium vernum.

Allen Scilla und Chionodoxa ſind dieſe Froſtzeiten ganz gleichgültig geblieben. Als die ſchönſte dieſer reinblauen Vorfrühlingsblumen erweiſt ſich wieder Chionodoxa sardensis. Ch. Tmolusii und gigantea haben ſich ohne Abſchied zwei Jahre nach der Pflanzung empfohlen. Ch. Luciliae treibt ſich noch irgendwo umher als Folie für die ſo ſehr viel ſchönere sardensis, die ſich ja auch reichlich vermehrt und ausbreitet.

Die drei ſchönſten frühen Lungenkrautformen, Pulmonaria azurea, reinblau, P. saccharata Miß Moon, rot und blau, und P. rubra, rot, ſtehen völlig unberührt zwiſchen weiß knoſpender Arabis.

Saxifraga Elisabethae (Burseriana×Sancta), der blaßgelbe Eliſabeth-Steinbrech, iſt einer der klaſſiſchen Formen des Vorfrühlings. Durch die Baſtardierung wird in den Vorfrühlingsſteinbrech die Kraft und Blühſicherheit gebracht, durch die nun dieſe früher zarte und ſchwierige Pflanzengruppe zu den dienſtbereiteſten Anfängerpflanzen aufrückte.

Die Blattſchöpfe der Kaiſerkronen ſind etwas verrenkt. Bunte Schneeroſenſtiele machen auch ihre Verneigung vor dem Froſt. Adonis amurensis fl. pl., der gefüllte frühe Adonis, ſteht auch in Knoſpe, um den diesmal doch etwas verunglückten Flor des einfachen Adonis amurensis fortzuſetzen. Die Füllung ſcheint der Natur viel Arbeit zu machen, denn er blüht ſechs Wochen nach dem einfachen.

Die frühen Tulpen aus der Kaufmanni-Gruppe haben ſchon farbige Knoſpen zwiſchen üppigem Blattwerk. Froſt ließ ſie kalt. Neben ihnen recken ſich die lila Synthiris reniformis in üppigen kleinen Dickichten aus dem Boden, denen der Froſt gleichfalls gar nicht imponieren konnte, obgleich ſie ſchon ſeit vierzehn Tagen in Farbe ſtehen. Muscari azureus, die früheſte der frühen Perlhyacinthen, die nirgend reizender ausſieht wie zwiſchen rotbeerigen Gaultherien oder Hängefelſenmiſpeln, verhält ſich auch völlig heroiſch gegen die Fröſte.

Alle die neuen Erdraucharten, Corydalis densiflora, die wichtigſte aller neuen, ſchon ſeit Wochen in Blüte, und angustifolia die früheſte aller, die ſchon im Februar in vollem weißen Flor ſteht, haben auch alle Examina beſtanden. Primeln nehmen die Froſtſtrapazen ſehr verſchieden auf; je nach Farbe und Standort und Art wirkt jede Pflanze wieder irgendwie überraſchend. Acaulis, Helenae und Sibthorpi ſind nur wenig verſchnupft. P. denticulata hat an mancher Pflanze etwas blinde Blüten, während die Nachbarpflanzen ganz ungeſtört ſind. Erythronium, der Hundszahn, ſteht in Knoſpen; ſie ſind in dieſen acht Froſttagen immer größer und ſchöner geworden.

Anemone patens in 15 Jahre altem Exemplar, deſſen Blütenmenge in ausbrütender Mittagsſonne bald einen Quadratfuß einnimmt, gehört zu den ſtärkſten Blütenanblicken des frühen April. Anemone patens und pulsatilla bieten je nach Entfaltung und Sonnenſtand dem Auge beſtändig überraſchende Schönheit durch ihre ſich immer verändernde Haltung der Blumenblätter dar.

Die ganzen Frühlingsbeete ſind durchſetzt mit alten Büſcheln von Frühlingspflanzen, die ſchon vor dem Weltkrieg geſetzt wurden. Herkommende Beſucher ſtehen kopfſchüttelnd vor dieſer Tatſache, noch verwunderter aber davor, hier nach dieſen froſtumdrohten Frühjahrswochen reiche bunte Frühlingsbeete zu ſehen, beſetzt mit 100 Sorten willigſter Pflanzen, von denen man in der übrigen Welt ſo gut wie nichts wahrnimmt. Die Vorfrühlingsſteinbreche bieten dasſelbe merkwürdige Bild wie manche Primeln. Eine Pflanze läßt die Blütenköpfe hängen, während die Nachbarpflanze völlig ungeſtört blüht. Die Natur gibt gar zu

Obſtbaumblüte in Dahlem

gern Vexirrätſel auf. Man geht auf gänzlich hart gefrorenem Boden und ſieht Blumen von Bienen umſummt, bemüht ſich vergeblich, ab und zu einen kleinen Veilchenduft zu atmen oder Hyazinthengeruch. Für beides iſt die Luft zu kalt. Weiße Hyazinthen ſtehen etwas froſtgebeugt, farbige ganz ſtraff und ungeſtört. Völlig vom Froſt verdorben ſind wieder einmal die weißen Knoſpenpakete der Bergenia Strachei, der früheſten aller Bergenien. In voller Knoſpe ſtehen daneben Hutschinsia Auerswaldi, mit den zierlich geſtickten Polſtern; ſie blüht ſchon zwei Wochen vor Hutschinsia alpina auf. Außerordentlich iſt das Verhalten der ſüdgeborenen frühen Anemonen blanda und apennina, die wahrſcheinlich aus hohen Lagen ihrer Heimatländer auch allerlei Fröſte gewöhnt ſind.

KURT PÖTHIG / DAS GARTENTHEATER

NACHDEM die Menſchen die Gärten und Parkanlagen nicht mehr als reine Schmuck- und Zieranlagen auffaſſen, die nur von den Wegen aus betrachtet werden dürfen, ſondern Wohngärten und Zweckparkanlagen ſchaffen, beginnen die Gartentheater, die gegen Ende des 18. Jahrhunderts in den Gärten der Fürſten und Adeligen ſelten fehlten, auch bei uns wieder eine Rolle zu ſpielen. Wir finden dieſe alten Gartentheater noch heute in vielen Anlagen zwiſchen alten Bäumen und dichten Strauchgruppen verſteckt, und der Beſchauer kann ſich dem Reize ihrer verwunſchenen Einſamkeit und teilweiſen Verwilderung wohl nie entziehen, zumal wenn die Phantaſie dieſe Räume mit jener bunten, ſorgloſen Geſellſchaft des Rokoko bevölkert.

Wir können heute folgende Typen für Theater im Freien unterſcheiden:

1. Das *Freilichttheater,* wie es jetzt in vielen *öffentlichen* Parkanlagen, zum Beiſpiel vom Gartendirektor E. Barth in der Charlottenburger Jungfernheide geſchaffen wird. Es ſoll große Zuſchauermengen aufnehmen und wird daher am beſten in der Art der alten griechiſchen und römiſchen Amphietheater geſtaltet.

2. Das *Gartentheater* der *Privatgärten.* Es iſt nur für einen kleinen Kreis von Zuſchauern beſtimmt und hat eine erhöhte tiefe Bühne und einen in der Bühnenachſe entwickelten Zuſchauerraum wie die Theater des Rokoko.

3. Das *Naturtheater.* Hier bildet eine nicht von Menſchenhand geſchaffene romantiſche Naturſzenerie mit Felſen, alten Bäumen und dergleichen den Bühnenhintergrund. Ein ſolches Theater zeigt die Abbildung (Seite 98) von dem Naturtheater in Oybin im Lauſitzer Gebirge. Mächtige Sandſteinfelſen mit Fichtenwald bewachſen, geben die Szenerie. Durch einfache Holzbänke iſt Platz für etwa 600 Zuſchauer geſchaffen. Das Theater iſt eine beliebte Unterhaltungsſtätte der Sommergäſte.

Amphitheater

BÜHNE.

Die anderen Abbildungen und der Grundplan, der nach dem »Handbuch für Architektur« gezeichnet iſt, zeigen den jetzigen, beziehungsweiſe einſtmaligen Zuſtand des Gartentheaters im Großen Garten in Dresden. Der Zuſchauerraum (A) iſt durch Raſenböſchungen in acht Terraſſen von ungefähr 30 Centimeter Höhe gegliedert. Zur Bühne (B), deren Fußboden ebenfalls von Raſen gebildet wird, führen zwei Treppen empor. An den Außenſeiten der Treppen befinden ſich zwei große Poſtamente (E) für

Naturtheater in Oybin

Figurengruppen. Sechs Heckenkulissen (C), in der typisch theatermäßigen Anordnung, mit Figuren an der Stirnseite bilden den seitlichen Abschluß der Szenerie. Den Hintergrund schließt ein kleiner Tempel (D) ab, der von mehreren Ringwällen umzogen ist. Von dieser ganzen Herrlichkeit, die der alte Grundplan darstellt, sind nur noch der Zuschauerraum, die Treppenanlagen und auf der Bühne die Figurenpostamente an den Stirnseiten der Heckenkulissen übrig geblieben.

Im Allgemeinen ist über die Anlage von Gartentheatern folgendes zu sagen: Die der Bühne zunächst liegende Hälfte des Zuschauerraumes wird man in das Gelände einschneiden, um die Bühne herauszuheben und die Bodenmassen für die Zuschauerterrassen zu gewinnen. Der über dem ursprünglichen Terrain liegende Teil des Zuschauerraumes ist also ein Wall, welcher der Grundrißform dieses Raumes folgt. Die Form ist so zu gestalten, daß man von allen Zuschauerplätzen aus gut sehen und hören kann. Er darf also gegen die Bühne keine allzu große Tiefenausdehnung haben. Als Grenze des deutlichen Sehens und vor allem Hörens im Freien darf eine Entfernung von 20 bis 30 Meter angenommen werden. Dichter Gehölzbestand um das Theater herum begünstigt die Akustik. Weil die Theateraufführungen wohl meistens nachmittags stattfinden, muß der Zuschauerraum möglichst nach Westen zu liegen, damit der Zuschauer die Sonne im Rücken hat. Für die Terrassen sind 30 Centimeter Höhenunterschied und 100 bis 150 Centimeter Breite genügend, wenn sie im Rasen ausgeführt werden. Sollen Sitzbänke angebracht werden, ist der Höhenunterschied der Terrassen durch Futtermauern zu überwinden, auf denen die Sitzbänke angebracht werden. Diese Mauern werden zweckmäßig nach vorn übergeneigt gebaut, damit man beim Sitzen die Beine anziehen kann, um Vorübergehenden Platz zu machen. Die Sitzhöhe beträgt 40 bis 45 Centimeter, die Sitztiefe 30 bis 40 Centimeter, die Mindestsitzbreite 50 Centimeter und der lichte Abstand von Bank zu Bank 60 bis 80 Centimeter. Das Anbringen von Banklehnen ist nur bei großen Höhenunterschieden der Terrassen — etwa von 60 bis 80 Centimeter — empfehlenswert, weil sonst häßliche Überschneidungen erfolgen. Zwischen der vordersten Sitzreihe und der Bühne muß ein genügender breiter Abstand vorhanden sein, damit die in dieser Reihe Sitzenden die Bühne noch gut übersehen können. Hier kann, wie beim richtigen Theater, in einer Vertiefung der Orchesterraum untergebracht werden.

Die Höhe der Bühne über dem Fußpunkt der vorderen Sitzreihe muß durch Querschnittzeichnung festgestellt werden: sie dürfte im allgemeinen etwa ein Meter betragen. Die Bühne erhält nach hinten eine Steigung von vier bis fünf Centimeter auf den Meter. Die Kulissen werden von geschorenen Hekken gebildet, die sich eben »kulissenartig« übereinanderschieben. Den hinteren Abschluß der Bühne wird ein Tempel, eine Laube, ein Brunnen oder irgend ein Architekturstück bilden. Oder man verzichtet auf Kulissen und Architektur und schließt die Bühne durch einen gleichmäßig grünen Heckenhintergrund mit Zugängen für die Schauspieler ab, auf dem die Spielenden sich gut abheben.

Derartige Gartentheater sollten sich in unseren Privatgärten wieder einbürgern, weil sie geeignet sind, das Gartenleben wesentlich zu bereichern. Nicht nur Theatervorstellungen, sondern auch Tanz- und Reigenvorführungen, Turnspiele und Konzerte können hier mit guter Wirkung aufgeführt werden.

Alter Plan und Bilder vom Gartentheater im Großen Garten in Dresden

Bei der Ulmenblüte ist das feine Gezweig umwoben von einem im Sonnenschein purpurn aufglühenden Schimmer, besonders um die Staubbeutel. Das Bild zeigt Ulmus glabra pendula.

Unter den Zierjohannisbeeren ist Ribes rubrum eine der auffälligsten im Frühling, wenn die jung belaubten Triebe sich mit den so lebhaft rotgefärbten Blütentrauben schmücken.

Blütensträucher des April

Nur langsam läßt sich Viburnum Lantana aus dem Winterschlafe wecken. In ornamentaler Straffheit breitet sie ihr Gezweig und in wohlabgewogener Gegensätzlichkeit schieben sich die Blätter hervor. – Bilder C. S.

PAUL LANDAU / VOM GARTENGLÜCK DER RENAISSANCE

SEITDEM Jakob Burckhardt in ſeiner »Kultur der Renaiſſance in Italien« die Entdeckung der landſchaftlichen Schönheit als eine der Großtaten dieſer Epoche gefeiert, beginnt man mit dieſem »Völkerfrühling« auch die Geſchichte des modernen Naturgefühls. Aber man hat dabei ſtets das größere Gewicht auf die »Eroberung der Natur« gelegt, wie ſie ſich in der Wiedergabe durch die Kunſt, in der wiſſenſchaftlichen Erforſchung, der architektoniſchen Formung offenbart, als auf die intimen Zeugniſſe jenes innigſten Menſchenglücks, das aus der vertrauten Zwieſprache mit den Wundern der Schöpfung, aus dem ſtillen Heimiſchwerden in Feld und Aue quillt. Hier ſollen nicht die großartigen Leiſtungen der Naturerkenntnis, der Naturgeſtaltung in Malerei, Bau- und Gartenkunſt, ſondern die verſchwiegeneren Züge des Zeitalters beachtet werden, die uns die neue Stimmung, das neue Schauen mitfühlen laſſen, das ſich damals ſo reich entfaltete. Daß dem Mittelalter die Natur tot und leer war, iſt eine Anſchauung, die man heute — zum mindeſten für ſeine Blütezeit — längſt aufgegeben hat. Die Betrachtung der Natur iſt aber beim mittelalterlichen Menſchen ſtets ſubjektiv und zweckbeſtimmt; er jubelt über Maienwonne und Sommerglanz, weil ſie ihm Wärme, Luſt und Freude bringen; er vertieft ſich in die Natur, weil er in ihr das Abbild der Gottheit erblickt. Dieſe perſönliche Beziehung des Menſchen zur Landſchaft beginnt gegen Ende des Trecento zurückzutreten: die Natur wird befreit von den engen Feſſeln, in die ſie der Menſchengeiſt geſchlagen; ſie tritt mit der üppigen Fülle ihres Wachstums, mit der ungebändigten Gewalt ihrer Kräfte in Gegenſatz zu den Regeln und Aufgaben, die man in ihr zu finden meinte. Man bekommt eine Ahnung von dem Dämoniſchen, dem Grandioſen und Unbegreiflichen der »Mutter Natur«, wie ſie Lorenzo Valla genannt hat, und man ſpürt ihren Geheimniſſen in den Einzelerſcheinungen nach. Mit dem dunklen Gefühl der Ehrfurcht verbindet ſich die ungemeſſene Wißbegierde der Epoche, die durch eine vertiefte, umfaſſende Naturbeobachtung den Grund für eine reichere, beſeeltere Naturempfindung legt. Dieſes Naturſtudium zeigt ſich ebenſo in der Malerei, die allmählich den Reichtum der Einzelerſcheinungen in ihre Bilder bannt, wie in der Botanik, die neben den Heilpflanzen auch die ſeltnen Blumen und Sträucher in den erſten botaniſchen Gärten ſammelt, und in der Philoſophie, die ſtatt der ſtarren Begriffe die bunte Vielheit der Einzeldinge zu erfaſſen trachtet. Man durchforſcht die Umwelt nicht mehr um des praktiſchen Nutzens willen, ſondern berauſcht ſich an den Formen und Sachen um ihrer ſelbſt willen, kommt vom luſtvollen Betrachten der charakteriſtiſchen Merkmale zu einem »intereſſeloſen« Wohlgefallen an den Wundern und Geheimniſſen der Schöpfung. Die erſtaunlichen Entdeckungen, die das ſpähende und ſich ſchärfende Auge auf Schritt und Tritt macht, werden in genauen Aufzeichnungen der Einzelgegenſtände feſtgehalten, in einem Gewirr von Details, aus dem erſt allmählich ein allgemeines Grundgefühl ſich entwickelt.

Man hat früher den Durchbruch dieſer neuen Naturanſchauung bei *Petrarca* zuerſt finden wollen; neuere Beurteiler betonen aber bei ihm wie bei Boccaccio mehr die ſpätgotiſchen, mittelalterlichen Züge. Nun iſt freilich das Subjektive in den Naturſchilderungen ſeiner Dichtungen noch vorherrſchend, aber andrerſeits iſt bei dieſem großen Geiſt, der als Erfüller und Ahner »zwiſchen den Zeiten« ſtand, eine ſo ſtarke Aufnahmefähigkeit zu ſpüren, ein ſo intimes Mitleben mit der Natur, daß er das Bild der Landſchaft außerordentlich bereichert. Die Natur wird ihm in einer Weiſe zur Freundin und Vertrauten, wie keinem Menſchen des Mittelalters. In ſeinem weltberühmten Landaufenthalt zu Vaucluſe genießt er die Freuden der unberührten Einſamkeit, noch ein wenig durch die Brille der Antike ſchauend, aber doch mit aufgeſchloſſenen Sinnen für alle Schönheiten. Mit eignen Händen beſtellt er ſeinen Garten und hat handſchriftliche Notizen über ſeine Gartenarbeiten hinterlaſſen, die ihn auch auf dem Gebiete des Gartenbaus als Bahnbrecher zeigen. Dieſe Aufzeichnungen, die aus Parma vom Jahre 1348 ſtammen, laſſen erkennen, daß er außer dem eigentlichen Garten noch einen Baumgarten mit Rebenkultur beſaß, er teilt allerlei Beobachtungen mit über die Behandlung der Reben, des Apfelbaums und Pfirſich. Beſonders liebt er den Lorbeer, den Baum des Apoll, dies Sinnbild des Ruhmes und der Liebe, der beiden Mittelpunkte, um die ſein Leben ſich rundet, und bis an ſein Ende hat er geliebt

Die Kühlung, die aus ſüßem Lorbeer quillet,
Hauch, Schatten, Duft und Blühen froher Stunden...

Iſt Petrarca noch »ſentimentaliſch« in dem Sinne, daß er ſein eignes Weſen in der Natur ſpiegelt, ſind die Naturſchilderungen Boccaccios noch ganz als Hintergrund menſchlicher Geſelligkeit gedacht — ſo verſenkt ſich der geniale Humaniſt *Enea Silvio Piccolomini*, der ſpätere Papſt Pius IV., in ſeinen autobiographiſchen »Denkwürdigkeiten« ganz unbefangen und ſachlich in die Schönheiten der Landſchaft, mag er nur von hohen Gipfeln die Wälder, Felder und Flüſſe vor ſich liegen ſehen, oder zu der Stadt hinaufblicken, die über Weinbergen und Ölbäumen thront. Ein »Liebhaber der Wälder und Verſchiedenartiges zu ſehen begierig«, wie er ſich ſelbſt nennt, hält er Sitzungen und Audienzen unter alten Rieſenkaſtanien, auf grüner Wieſe, an ſprudelnden Quellen, und ſein Auge verweilt auf jeder Einzelheit mit Entzücken: auf den blauwogenden Flachsfeldern, dem gelben Ginſter, der die Hügel überzieht, auf dem wilden Geſtrüpp jeder Art, bei den prächtigen Bäumen und Quellen, die ihm wie Naturwunder erſcheinen. Bei Enea Silvio fehlt zum erſten Mal der ſentimentale Gegenſatz des mittelalterlichen Menſchen zur Natur, der ſich ihr gegenüber als etwas Anderes fühlt und ſeine Empfindungen in die Dinge hineinträgt; es regt ſich vielmehr die antike Art, die die Naturformen vermenſchlicht, weil ſie in ihnen ähnliche dunkle Triebe und Regungen ahnt. Dieſe mythologiſche Verlebendigung der Landſchaft, die der Kunſt der Renaiſſance ſo tief innewohnt, erwächſt aus einem mehr unbewußten Verwandtſchafts- und Gemeinſchaftsgefühl, aus einem engen Verbundenſein mit der Natur und allen Einzelgeſchöpfen in ihr.

Aus ſolcher neuen Naturnähe und einem ſo geſteigerten Naturerleben iſt nun die Stellung der Renaiſſance zum Garten zu erfaſſen. Dem Menſchen des Mittelalters iſt der Garten der Hintergrund ſeiner ſommerlichen Geſellſchaften und Freuden, die Blumenwieſe iſt der Feſtplatz für Mahlzeiten, Spiele und Tänze, der »Wurzgarten« liefert die Heilkräuter, Obſt- und Gemüſegarten nützliche Frucht. Dem Gartenfreunde der Renaiſſance ſteht das Feſtliche und das Praktiſche erſt in zweiter Linie; ſein Grundgefühl iſt das Intereſſe für die reiche Pflanzenwelt, die er um ſich anſammelt, die wiſſenſchaftliche Freude an jeder Einzelheit und Merkwürdigkeit, ſodann das Entzücken über die Schönheit dieſer Wunder, denen er ſich irgendwie verwandt fühlt. Der erſte große Gartentheoretiker und Gartengeſtalter der Renaiſſance, der geniale Architekt und univerſale Forſcher, *Leo Battiſta Alberti*, iſt dafür bezeichnend. Sein Biograph erzählt von ihm, daß er beim Schauen prächtiger Bäume bis zum Weinen ergriffen wurde. »Der Anblick von geſchnittenen Steinen, Blumen, beſonders aber von lieblichen Gegenden, gab ihm bisweilen, wenn er krank war, die Geſundheit wieder«. Die Luſt des Italieners der Frührenaiſſance am Landleben und an der Natur hat Alberti in ſeinem Dialog vom häuslichen Leben geſchildert. Er ſpricht hier von dem Kranz ſchöner Landhäuſer rings um Florenz: »Um Florenz liegen viele Villen in kriſtallheller Luft, in heiterer Landſchaft mit herrlicher Ausſicht; da iſt wenig Nebel, kein verderblicher Wind; alles iſt gut, auch das reine, geſunde Waſſer; und von den zahlloſen Bauten ſind manche wie Fürſtenpaläſte, manche wie Schlöſſer anzuſchauen, prachtvoll und koſtbar«. Hier um Florenz entfaltet ſich das erſte reine Gartenglück der Renaiſſance. Einer der Auftraggeber Albertis, der reiche Kaufmann *Giovanni Rucellai*, der ſich von ihm ſein Landhaus Quaracchi und den Garten anlegen ließ, gibt in einem erhaltenen Tagebuch Auskunft über »alle ſchönen und angenehmen Teile des Gartens«. Der

Phantaſiegarten der Frührenaiſſance
Aus der Hypnerotomachia Poliſili

Hauptteil hatte drei Pergolen, die den Wegen Schatten verliehen und teils tonnenförmig aus immergrünen Eichen, teils spitz aus Haselnuß geschnitten waren. Die offenen Wege waren von Lattenwerk begleitet, an dem edler Wein sich emporrankte, dazwischen weiße Rosenstöcke, »die zur Zeit der Blüte so herrlich sind, daß die Feder die Befriedigung nie wiedergeben kann, die das Auge beim Schauen empfängt«. Ein kleineres Gärtchen enthielt Beete, mit Scherben umgeben, in denen Damaszenerveilchen, Majoran und Basilikum nebst vielen wohlriechenden Kräutern gepflanzt waren. Der Fruchtgarten, von breiter Hecke umsäumt, war mit den verschiedenartigsten Obstbäumen besetzt, auch ausländischen, wie einer Sykomore, die Rucellai selbst aus Palästina mitgebracht hatte. Alberti forderte überhaupt die Anpflanzung seltener Bäume und Sträucher.

Ein andres Gartenbild findet sich bei einem der feinsten Naturschilderer jener Zeit, dem Neapler Dichter und Humanisten *Pontan*. In den Hexametern seines Gedichtes »über die Gärten der Hesperiden« singt er: »Wenn Dich nicht so sehr der Eifer nach Ertrag, noch die Sorge um die Einkünfte des Gartens bewegen, sondern Du allein das Vergnügen suchst und den schattigen Aufenthalt, so wähle vor allem einen Ort, bei dem eine Quelle oder ein gleitender Fluß fließt, damit ein Bach hineingeleitet werden kann oder ein Brunnen sprudelt, daß nicht etwa während der Hitze der Garten welkend hinschmachte oder durch die rauhe Kälte Mühe und Anlage der prächtigen Boskette verderbe. Umgib ihn dann mit Mauern, wodurch Du zukünftige Stürme abhältst, lege Quadrate an, ziehe Gräben, disponiere den Ort und umgürte die ganze Anlage mit Erdwällen; pflanze darauf zarte Sprossen und ordne sie in bestimmte Reihen, befestige sie mit Bast, damit sie von Anfang an lernen, was ihres Amtes ist. Sobald dann der Baum bei beständiger Pflege und Mühe des Gärtners seine Zweige erhebt und das Laub entfaltet, so wähle für jeden sein Geschäft und rufe mit dankbarer Mühe die ungestalte Schar zur Schönheit!« Pontan umschreibt auch die Kunst des Baumschnitts, bei der der Mensch »den Baum wie einen Wollfaden gebraucht, damit im Garten aus Blättern und Zweigen in verschiedenen Geweben Du den Teppich in neuen Figuren erglänzen sehen möchtest«.

Immer feiner durchgebildet, reicher gegliedert, bisweilen auch ins Spielerisch-Gezierte stilisiert, wird der Garten in jener Spätzeit der Frührenaissance, da mit *Lorenzo Magnifico* und Polizian eine neue schönheitsselige Schwärmerei anhebt. Vor allem *Polizians* Naturgefühl ist von einer Feinheit und Zartheit, daß für ihn Mädchen und Blumen zusammenschmelzen, daß er das Sichentfalten und Blühen, das Welken und Zerfallen der Rosen mit der nervösen Innerlichkeit Botticellis erfaßt. Dieser Kreis um Lorenzo, der sich zur platonischen Akademie auf der offenen Loggia der Villa Careggi versammelte und die köstliche Aussicht auf Florenz genoß, besaß eine Hellhörigkeit und Gefühlsdifferenziertheit im Erleben der Natur, die die leisesten Nüancen der Anordnung und Durchbildung würdigen ließen. Damals durchdrang das Gar-

Aus dem Blumengarten der Literatur

Der Liebesgarten

Ein Gärtchen nenn' ich mein, das mir im Busen
Die schon erloschne Flamme neu entfacht
Und an vergangner Zeiten süße Seufzer
Mich still gemahnt. – Wie wonnig ist's darinnen,
Mag sich im Frühling bunt die Wiese färben,
Mag dir in Sommers Mitten, wenn die Sonne
Dich scheitelrecht bestrahlt, das kühle Dunkel,
Mag dir im Herbste süße Frucht behagen
Und lauer Sonnenschein bei Winterskälte, –
Mag höher dich der Vögel süßes Flöten,
Das lieblich aus dem Dickicht schallt, entzücken
Und ihrer Federn buntes Kleid. –
Hier singt
Die Nachtigall, von allen Waldessängern
Die Königin, – laut übertönt den Chor
Mit honigsüßem Schall das kleine Vöglein.
Oft schleich' ich durch das Dickicht und erspähe,
Wie sie auf hochbelaubtem Ast sich birgt. –
Entzückend schaut ein andrer Vogel aus!
Den wahren Namen kann ich dir nicht nennen,
Laß ihn dir schildern, du erkennst ihn wohl!
Sein Kopf ist schwarz und bläulichgrau die Brust,
Meist unterm Laub der Rebe spielt er froh.
Wie spricht aus kleinem Körper so gewaltig
Ein Feuergeist! Wie schmeicheln sich dem Ohre
Die vollen Töne ein!
Das alles schürt
Des Herzens leise Gluten unablässig,
Und voller Beben spür' ich schon das Feuer,
Das wohlbekannte. – Hatt' ich doch entsagt!
Es war ja Zeit! Und dennoch rüstet wieder
Mit allen Waffen, goldgezierten Pfeilen
Sich gegen mich der Schmerzenbringer Amor . . .
Denn alles steht ihm bei; es wirkt für ihn
Des stillen Platzes wonnevoller Anblick;
Den Sang der Vögel unterstützt das Flüstern
Des leisen Lufthauchs; zarte Farben ringen
Mit süßen Düften um den Preis; es wollen
Die schmucken Blätter nicht der Blütenpracht,
Die Blüten nicht der grünen Wiese weichen,
Und Ros' und Veilchen, Lilie und Narzisse,
Sie streiten mit um diesen Schönheitspreis.
Und ach! wie wohlig ruht sich's auf dem Grase
In Ufers Grün! Wie naht der Schlummer leicht
Auf weichem Rasenbett! Wie rauscht der Bach
So schnell dahin! Welch tiefer Wohllaut tönt
Aus seinen Wirbeln! – – Doch wer schildert sie,
Die holde Nymphe und ihr Zauberlied,
Das sie von Baches Ufer aus erhebt,
Mit engelgleichem Ton, in stiller Nacht,
Und wenn die Sonne naht und wenn sie sinkt?
Sie kann die Götter selbst im Himmel rühren,
Dem Donnergott den Keil entwinden, kann
Den spröden Strahl mit sanften Blicken sprengen
Mit diesen Augen, d'rin die Allgewalt
Der Liebe wohnt, die jedes Herz verwundet,
Die stille Glut, geheimes Sehnen anfacht.
Aus ihnen sendet seine Feuerflammen,
In Glut getauchte Pfeile jener Knabe,
Der leicht beschwingt um meinen Garten flattert.
Und davon träum' ich, träume voller Wonne, –
Wozu das führt – ist nur zu wohl bekannt!

Aus: Petrarca
Poetische Briefe, übertragen von F. Friedersdorff

tenglück ganz Italien und legte überall um die Städte den Kranz von Landhäuſern, den Alberti ſchon um Florenz geprieſen. Den flüchtigen Reiz der Jugend und Schönheit, der Blüte und Frucht, hinter dem das ungewiſſe Morgen lauert, ſchlürfte man in vollen Zügen. Man beſuchte ſich auf den Villen, in deren Gärten eine ewige Heiterkeit grünte. Eine ſolche »Villen-Wanderung« erzählt ein Akademiker aus Peſaro, *Ludovico Agoſtino,* der — allerdings ſchon in der Spätrenaiſſance — mit ſechs Freunden eine ſolche Reiſe in die Umgegend der Stadt unternahm, »um ſich von ſchweren Sorgen, die ſein Leben verwirrten, frei zu machen«. Überall werden ſie mit Freude empfangen, überall finden ſie frohe Gaſtlichkeit und glänzende Geſelligkeit; ſie tafeln zwiſchen Blumenbeeten, luſtwandeln durch ſchöne Alleen, plaudern auf weiten Terraſſen. Jede Villa, jeder Garten hat ſeinen beſonderen Zauber, ſeine eigene Stimmung. In dieſem von dunklen Leidenſchaften durchwühlten, von grauſigen Schickſalen erfüllten Leben der Renaiſſance-Menſchen wird der Garten zu dem Glückseiland ſtillen und bewußten Genießens. So ſchildert ſeine Freuden der Philoſoph *Luigi Cornaro* in ſeiner berühmten Abhandlung »vom mäßigen Leben«, und denſelben Geiſt atmet die Begrüßungsinſchrift im Garten des großen Juriſten *Brenzoni* bei ſeiner Villa San Vigilio am Gardaſee:

Wer Du auch ſeiſt, der Du dieſes Landgut beſuchſt, bewahre dieſe zwölf Gebote:

Verehre den höchſten und beſten Gott in dieſem Heiligtum.
Laß die Sorgen in der Stadt zurück.
Dirnen und dergleichen ſeien verbannt.
Die Hände der Diener halte vom Garten fern.
Das Mahl ſei ohne Luxus bereitet.
Trinke die Becher, die den Durſt Dir vertreiben.
Weide Dein Gemüt an heiteren Dingen.
Entſpanne Deinen Geiſt durch ehrbare Spiele.
Zweige, Blumen und Früchte pflücke mit vollen Händen.
Kehre dann zurück zur Stadt und den Geſchäften.
Die Einladung möge dem Gaſtgeber nicht zum Schaden ſein.
Der Ruhm des Ortes ſei höchſtes Geſetz.

*

Die Schönheitswelt, die ſolchen Geiſt und ſolche Geſinnung im Garten ſchufen, dürfen wir uns nicht zu üppig und prunkvoll denken. Gewöhnlich ſind es die wenigen Prachtvillen, Werke der Meiſter der Hoch- und Spätrenaiſſance, deren hochaufgebaute Herrlichkeit mit Terraſſen, Kaskaden, Rondells, deren Volk von Bildwerken und Statuen uns vor Augen ſteht. Der Garten der Frührenaiſſance, in dem die erſte Blüte des modernen Naturgefühls ſich entfaltete, war einfacher, geſchloſſener, klarer, aber ohne die überwältigende Macht der großen Mittel. Die Natur war noch nicht in dem Maße umgeformt und ſtiliſiert wie in der Hochrenaiſſance, ſchmiegte ſich mehr dem Gelände an, fand erſt allmählich den engen Zuſammenſchluß zwiſchen Haus und Garten durch die harmoniſche architektoniſche Geſtaltung. Auch für die formale Anlage des Renaiſſance-Gartens iſt *Alberti* maßgebend, der in ſeinem Werk über die Befeſtigungsanlagen zuerſt davon ausführlicher ſpricht. Lichte Heiterkeit, ſonnige Klarheit ſollen aus dem Garten erſtrahlen; ringsum ſoll er von blühenden Wieſenflächen umgeben ſein, aus denen er wie ein Edelſtein aus einem Schmuck hervorleuchtet. Dieſe Helligkeit und Überſichtlichkeit iſt ein beſondres Merkmal des Frührenaiſſance-Gartens gegenüber der bunten Unruhe, der lauſchigen Intimität des Mittelalters. Alles, was Dunkelheit und Schwere bringen könnte, wird zurückgehalten. Die Zypreſſenalleen und -Kuliſſen, die mächtigen Baummaſſen dringen erſt mit der majeſtätiſchen Wucht der Barock ein; auch die Hochrenaiſſance duldet die Zypreſſe nur als Einzelbaum oder ſtreng verſchnitten. Der Baumgarten wird von dem Ziergarten getrennt, in dem nur wenige locker geordnete Bäume ihre ſchlanken, dünnäſtigen Silhouetten wiegen oder nach der Art der Alten Gewächſe in verzierten Kübeln aufgeſtellt ſind. Schutz vor der Sonne ſucht man in Tuffſteingrotten, im Portikus und der Pergola an den Seitenwegen. Die Wege und Beete ſollen mit Buchs, mit Lorbeer- oder Taxushecken eingefaßt ſein und die Umriſſe von Kreiſen und Halbkreiſen haben, wie ſie »auch einen Bauplan ſchön machen«. Deutlich tritt hier das harmoniſche Formgefühl der Renaiſſance zu Tage, das die krauſe, gezackte Einfaſſungen und verſchlungene Wege liebende Gartenkunſt der Gotik überwindet. Die Verehrung der Antike zeigt ſich in den korinthiſchen Säulen, die als Stützen der Weinlauben empfohlen werden, in den Inſchriften auf den Buchsbeeten, in der Vorliebe für Gartenſtatuen, die zwar komiſch, aber nicht obscön ſein dürfen. Auch in der Behandlung des Waſſers unterſcheidet ſich Alberti ebenſo ſtreng von der Gotik wie vom Barock. Der Garten ſoll von hellen, klaren Wäſſerlein durchzogen ſein, die wie ein feines durchſichtiges Geäder den Organismus der Pflanzenwelt ernähren und überall friſche, quellende Luft und rieſelndes Leben verbreiten. Die zierliche Beſeelung der Natur durch das Waſſer iſt etwas ganz anderes als die ſchematiſche Verteilung des Naſſes von einem im Mittelpunkt befindlichen Brunnen aus, der im Mittelalter das Herz des Gartens bildete, und als die grandioſen Kaskaden des Barocks, die eine brauſende Sinfonie des feuchten Elementes darſtellen.

Der Baumeiſter Alberti betont bereits den Zuſammenhang zwiſchen Haus und Garten; aber der Garten der Renaiſſance behält doch noch bis um 1500 in der Anlage weſentliche Züge des Mittelalters, beſchränkt ſich auf einen einfachen Grundriß und geht nicht von räumlichen Vorſtellungen aus. Hecken, Laubengänge und Baumverſchnitt ſorgen für eine freie und ſtrenge Gliederung, in der ſich das glückliche Gefühl dieſer Zeit für Harmonie offenbart. Dabei werden Garten und Haus doch immer mehr und mehr aufeinander abgeſtimmt; man verſucht die einzelnen Gartenteile ähnlich anzuordnen, wie die Zimmer, die nach Alberti als entſprechende Glieder ſymmetriſch zu einem Mittelraum gruppiert werden ſollen. Das architektoniſche Element tritt bedeutender hervor, und dazu trug viel das Verlangen nach einer Überſicht über die geſchmackvoll abgewogene Einteilung und nach einer ſchönen Ausſicht in die weite Landſchaft bei. Der antike Gedanke der Terraſſe, zunächſt nur literariſch ausgemalt, wird in die Wirklichkeit übertragen, und zwar war es bezeichnenderweiſe die Siebenhügelſtadt Rom, deren wechſelndes Gelände die Anlage von Terraſſen, Baluſtraden und Treppen erforderte. Erſt durch die Terraſſenbauten tritt die Architektur gleichſam in den Garten heraus und umſchließt, wie mit lebenden Armen, die Natur, mit der ſie ſich vereint. Die Treppe, die in den Garten und beſonders zu dem Blumenparterre des Mitteltraktes herunterführt, geſtaltet ſich zur ſymmetriſchen Doppeltreppe. Die mittleren Abſätze der vielfältig geſtuften Terraſſe, die in die Hauptachſe der Anlage gerückt werden, verlangen eine beſondere Ausſtattung durch Grotten und Brunnen. So entſteht nach und nach die ganz und gar in die Architektur eingefügte Gartenkunſt der Spätrenaiſſance, eine grandioſe künſtleriſche Geſtaltung und Umgeſtaltung der Landſchaft, die ſich von der idylliſch und zärtlich in die Landſchaft gebetteten Naturbeſeelung der Frührenaiſſance ſtark unterſcheidet. Nun waltet das Naturgefühl des Cinquecento, das das Organiſche der Schöpfung bis ins Kleinſte durchdringt und verlebendigt, das dem Menſchengeiſt alles Geſchaffene unterwirft und nach ſeinem Weſen formt. Die Natur wird zu einer ſtiliſierten Ideallandſchaft, die ein Heer von Kunſtwerken bevölkert.

Die erſten Humaniſten und Entdecker der Antike hatten im Jubel über die wiedergefundene Schönheit Statuen, die allenthalben dem alten Kulturboden entſtiegen, im Garten aufgeſtellt. Poggio, der um 1438 mit zwei antiken Plaſtiken ſein liebes Gärtchen ſchmückte, wurde deswegen verſpottet, und man warf ihm vor, er benutze dieſe Figuren an Stelle der fehlenden Ahnen, um ſich den Anſchein alter adliger Herkunft zu geben; er aber nimmt den Spott auf ſich: ſeinen Adel habe er ja durch Erforſchen und Sammeln der antiken Werke ſich erworben. Bald aber wurde das damals ſo ungewöhnliche Aufſtellen von Statuen in den Gärten allgemein beliebt, man baute für einzelne Bildwerke beſondere Lauben, die die Form von Tempeln hatten, und allmählich entſtanden jene großen Gartenmuſeen, wie in den mediceiſchen Gärten zu Florenz und den vatikaniſchen zu Rom. Antike Reliefs wurden in die Gartenmauern eingelaſſen, und klaſſiſche Inſchriften leuchteten aus dem Grün. Ja, die ehrwürdige, elegiſch-idylliſche Stimmung alter Ruinen verlockte dazu, Gärten in ihnen und um ſie herum anzulegen, und dann baute man auch künſtliche Ruinen auf, um das maleriſche Bild einer ſtolzen, aber verfallenen Vergangenheit inmitten des blühenden Lebens zu erhalten. Mit ſolchen Ruinen, die bisweilen in einzelnen Triumphbögen oder auch nur in Säulenſtümpfen beſtanden, verband ſich das vielgeſtaltige Niſchen- und Grottenwerk, das für die weitere Ausgeſtaltung der Gartenarchitektur ſo große Bedeutung gewinnen ſollte. Dieſe reiche und großartige Ausſchmückung, wie man ſie in den berühmten italieniſchen Gärten der Spätrenaiſſance findet, ſchafft jedoch ſchon eine ganz andere Stimmung, als das helle, heitere, zarte Gartenglück der Frührenaiſſance, wie es etwa in der Stanze aus Polizians »Gioſtra« erklingt:

Des ſchönen Gartens Laub kann nie erbleichen
Vom zarten Reif und friſch gefallnen Schnee.
Fremd iſt der eiſige Winter dieſen Reichen,
Kein Wind tut Kräutern oder Blumen weh.
Nie ſteht das Jahr hier unter trüben Zeichen,
Ein ewiger Lenz beherrſchet dieſe Höh',
Deß' blondgelocktes Haar die Luft durchglänzt,
Vom ſüßen Duft der Blumen reich umkränzt.

GARTENAUFGABEN / ALTE UND NEUE LÖSUNGEN

Treppenſtudien

BEI einem alten Schloß, das von einem Wallgraben umzogen wird, ſollte von der Brücke ein direkter Zugang in den Graben geſchaffen werden. Dieſer iſt bei Anlage des Parkes im letzten Viertel des vorigen Jahrhunderts mit in die Landſchaft einbezogen worden und hat ſeine ſtrengen Linien von einſt verloren. Das obere Bild links zeigt die alte Situation. Die Verbindung von der Brücke zum Graben fehlt, nur eine im Stile der damaligen Zeit »verzierte« Treppe führt vom Graben bis zum Fuß des Schloſſes. Sie ſtand weder zum Bau ſelbſt in Beziehung noch fügte ſie ſich paſſend in die Landſchaft ein.

Die Löſung der oberſten Treppe von der Brücke herab war durch die Lage gegeben. Sie ſollte in der einfachſten Weiſe ausgeführt werden und nur einen bequemen Abſtieg vermitteln. Das untere Bild läßt die Geſamtſituation und dieſe Treppe gut erkennen. Die Mauerflächen neben und an der Treppe werden noch berankt durch Wein und Wiſtarien.

Bei dem Aufbau der unteren Treppe, deren neue Geſtaltung das obere Bild rechts zeigt, war es erwünſcht, im Parke vorhandene Findlinge zu verwerten und auch für die Stufen Material zu verwenden, das ſich am Orte fand. Es ſollte Gelegenheit geboten werden, einige Felſenſträucher und üppigere Steingartenſtauden anzubringen, um ein Motiv zu erhalten, das ſich möglichſt harmoniſch in den beſtehenden Landſchaftscharakter einfügt. Zwiſchen die Findlinge ſind kriechende Cotoneaster, wie humi=fusa, adpressa und verſchiedene neue chineſiſche Formen, ferner Dryas octopetala und ähnliche ſich maſſig breitende, zu gewiſſen Zeiten durch Blüte oder Frucht wirkſame Gehölze gepflanzt, zu denen noch einige Stauden ähnlichen Charakters treten. Am Hange ſchließen ſich an die Felſen breite Wachholder an, auch eine maleriſche Zwergfichte vermittelt den Übergang. Gegen den Wallgrabengrund lagern ſich Bergenien und ähnliche Stauden dem Treppenausgang vor. Die Findlinge ſind mit ſma=ragdenen Moospolſtern überzogen. Sowie die Pflanzen ſich entwickelt haben, wird das Ganze ſich der Umgebung paſſend einfügen. *C. S.*

CAMILLO SCHNEIDER / NEUE FRÜHLINGSPRIMELN

Primula Wanda

DIE frühefte unter unferen Frühlingsprimeln ift P. acaulis, die Kiffenprimel, die wir auch in der Natur fo oft in Gemeinfchaft mit den blauen Leberblümchen finden, wie es unfer Farbenbild heute zeigt. Sie wird noch häufig als P. veris acaulis bezeichnet, auch als P. vulgaris. Der alte Linnéfche Name P. veris umfaßte aber alle drei Hauptarten unferer Frühlingsprimeln, alfo auch noch P. elatior und P. officinalis. Wenn man den Namen veris nicht für P. officinalis allein aufrecht erhalten will, fo muß man ihn fallen laffen. Jedenfalls follte man alle drei Wildarten gut fcheiden. In der Kultur freilich find die Grenzen zwifchen ihnen mehr oder weniger durch Hybriden vermifcht. Unter diefen befinden fich folche Formen, wie unfer zweites Farbenbild fie zeigt. P. acaulis ift nicht zuletzt wegen der Hybriden bedeutfam, an denen fie beteiligt ift. Sie umfaßt aber auch eine Reihe Varietäten und geographifche Formen. Zu den letzten zählt die heute ebenfalls an anderer Stelle fchon erwähnte P. acaulis var. rubra (P. Sibthorpii). Zwifchen acaulis var. coerulea und der fchönen kaukafifchen P. Juliae find eine ganze Reihe von Formen durch Kreuzung entftanden. Diefe gehen unter verfchiedenen Namen. Die ehemalige Dendrologifche Gefellfchaft für Öfterreich-Ungarn verbreitete 1918 eine folche in Pruhonitz entftandene Kreuzung als *P. pruhoniciana*. Eine fchöne Pflanze davon aus dem Garten eines großen Pflanzenfreundes, E. A. W. Hirfchfeld, in Bloemendaal bei Haarlem, zeigt das untere Bild. Die Pflanze blühte überreich und wochenlang, als ich fie im Mai letzten Jahres aufnahm. Gleichen Urfprungs wie P. pruhoniciana ift die von Georg Arends in den Handel gegebene P. Helenae. Beide Hybriden zeigen natürlich verfchiedene Formen, deren Farbentöne bald heller, bald intenfiver purpurrot find. Eine befonders dunkle Sorte geht als P. Helenae Purpurkiffen. Noch neuere Arendsfche Formen find Juwel, leuchtend rötlich-magenta, und Edelftein, von etwas kräftigerem Wuchs und ebenfalls leuchtend purpurner Farbe. Als fehr gut gilt auch die Goos & Koenemannfche Neuheit P. acaulis Magenta, die hierher gehört. Ganz ähnlichen Urfprungs wie pruhoniciana und Helenae dürfte die *P. Wanda* fein, von der ich auf der Haarlemer Schau die oben gezeigte Gruppe aufnahm. Ihr Farbenton fpielt ftark ins bläulich Purpurne.

Um den Wert diefer fo ähnlichen Primelbaftarde recht beurteilen zu können, müßte man fie Seite an Seite gepflanzt durch einige Jahre vergleichen können. Jedenfalls laffen fich fehr fchöne dunkle Farbenformen herauszüchten, deren einheitliche Benennung dann fehr erwünfcht wäre. Ich habe unter den Formen der pruhoniciana in Pruhonitz verfchiedene wertvolle Farbentöne beobachtet. Es geht aber nicht an, daß an den verfchiedenften Orten neue Sorten gleicher oder ähnlicher Abkunft ohne vergleichende Prüfung benannt werden.

Gerade diefe bunten Kiffenprimeln des Frühlings find auch für den kleinften Garten von fo hohem Werte. Beginnen fie doch in günftigen Jahren ihren Flor im März und fetzen ihn durch Wochen fort bis Ende April, in rauheren Lagen fpäter erfcheinend und erft im Mai abfchließend. Die typifche acaulis findet fich wild auf Wiefen und an Waldrändern, wie in lichtem Gebüfch, vor allem in der Bergregion. Sie ift in Deutfchland bei weitem nicht fo häufig, wie die höheren P. officinalis und P. elatior.

Primula pruhoniciana

Gartenarbeit und Blumenpflege

CAMILLO SCHNEIDER / DER GARTENBERATER V

NACH den bisher gegebenen allgemeinen Darlegungen will ich jetzt auf einige Einzelheiten näher eingehen, die für die rechte Gestaltung eines Gartens besonders wichtig erscheinen. Es ist, wie immer, sehr leicht, bestimmte Regeln aufzustellen, und ideale Zustände auszudenken. Um aber solche Regeln durchzuführen und solche Zustände zu schaffen, sind gewisse Vorbedingungen nötig, die nur sehr selten gegeben sind. Es geht dem Gärtner genau so wie dem Arzt, der einen Großstadtbewohner behandelt. Was nützt es dem, wenn man ihm verordnet, er soll naturgemäßer leben, sich stärker körperlich in frischer Luft betätigen, gesünder wohnen, besser sich nähren und dergleichen mehr. In der Umwelt, in der er zu leben gezwungen ist, unter dem Tätigkeitsdruck, der auf ihm lastet, kurz und gut unter all den Bedingungen, die ihm sein Leben vorschreiben, muß seine Existenz eine seine Entwicklung schädigende sein. So muß er lernen sich anzupassen und sein Arzt kann ihm diese Anpassung nur durch seine Ratschläge erleichtern. Auch der Gartengestalter kann zumeist dem Gartenbesitzer nur raten, was er unter den gegebenen Verhältnissen nicht tun darf und wie sie sich am erfolgreichsten ausnutzen lassen. Als Fachmann muß er das viel klarer erkennen, als es der Besitzer kann, mag er auch ein großer Gartenfreund sein. Gerade als solcher ist er doch nur zu leicht geneigt, zuviel zu wollen und dadurch Mißerfolge zu erzielen, die ihn verstimmen. Ist freilich der Besitzer ein erfahrener ernster Gartenfreund, so hat er den Gartengestalter vielleicht nicht nötig, aber auch er bedarf seiner in besonders schwierigen Fällen, wo eben Hausmittel nicht helfen, und der Kranke sich an den besten Spezialisten wenden muß. Solche Fälle sind aber auch im Garten Ausnahmen, für den Gartengestalter freilich von ganz besonderer Bedeutung.

Natürlich sollte die Tätigkeit des Gartenberaters schon bei der Wahl des Grundstückes beginnen. Schon von da ab sollte er mit den Erbauer des Hauses Hand in Hand arbeiten. Sehr oft jedoch wird selbst dieser vom Besitzer erst gefragt, wenn das Baugelände bereits gekauft wurde. Dann aber muß der Garten gleichzeitig mit dem Haus geplant werden. Dies kann nicht genug betont werden. Haben doch leider nur wenige Besitzer das rechte Verständnis und Gefühl für diese Notwendigkeit, ja überhaupt für die Wichtigkeit des Gartens. Noch immer ist er mehr oder weniger ein Anhängsel, etwas was man nicht missen möchte, das man dann aber so gut oder schlecht es geht ausführen läßt, wenn das Haus erst fertig ist. Wie falsch das ist, habe ich in meinen letzten Darlegungen im November ausgeführt.

Ein Zusammenarbeiten des baulichen und des gärtnerischen Beraters ist schon deshalb sehr erwünscht, weil man doch mit dem Erdaushub, der beim Hausbau notwendig wird, im Garten rechnen sollte. Disponiert in dieser Hinsicht nur der Architekt, so wird er selten das für den Garten Richtige treffen, jedenfalls vielfach eine andere Verwendungsweise vorschlagen, als es dem Gartengestalter erwünscht ist, der allein doch aus den gegebenen Bedingungen heraus im Einklang mit den erfüllbaren Wünschen des Besitzers die Formung des Gartengeländes durchführen kann. Findet eine derartige Zusammenarbeit statt, so ist es unmöglich, daß für den Garten Entwürfe gemacht werden, die lediglich Reisbrettarbeiten sind. Leider sind heute solche noch die Regel. Holen doch die Besitzer der Vorstadtvillen zumeist von verschiedenen Firmen Offerten ein, um dann nur zu oft die billigste auszuwählen. Doch selbst, wenn sie dies letzte nicht tun, so ist damit nicht gesagt, daß das gewählte Projekt, so bestechend es aus manchem Grunde erscheinen mag, auch für den besagten Fall paßt. Dem Entwurf muß eine geistige Zusammenarbeit des Gartengestalters mit dem Besitzer und dem Architekten vorausgehen. Erst daraus kann sich ein Vorschlag für den Garten ergeben, der mehr ist als eine geschickte Arbeit schöpferischer Phantasie. Wir haben heute in vielen gartentechnischen Büros sehr talentierte Zeichner, die höchst bestechende Entwürfe ausarbeiten und damit den Besitzer blenden können. Wenn es aber dann daran geht, diese Entwürfe auszuführen, so tritt die graue Theorie nur zu schnell zutage. So entstehen Gärten, die an und für sich oft sehr gut ausgedacht sind, die aber doch den Verhältnissen so unangemessen wirken. Das ist, wie ich nicht unterlassen möchte zu betonen, freilich auch mit der Mehrzahl der Häuser der Fall, wenngleich unter den Architekten die Zahl der ernst gestaltenden Künstler ungleich größer ist als unter den Gartengestaltern.

Die Gesichtspunkte, die ich eben entwickelt habe, finden heute im Kleingarten- und Kleinhausbau schon viel stärkere Beachtung, als bei der Villa oder dem Landhaus. Im ersten Falle zwingen die wirtschaftlichen Bedürfnisse Besitzer und Gestalter dazu, ganz einfach und zweckmäßig zu arbeiten. Beim größeren Hause herrscht mit den steigenden Mitteln größere Bewegungsfreiheit, man kann sich individueller geben und ist dann nur leicht geneigt, notwendige Vorbedingungen außer acht zu lassen. Gerade in den Gärten herrscht immer noch zu sehr die Atmosphäre des Jugendstiles, das heißt der unsachlichen Arbeit, der Unterschätzung der wirklichen Bedürfnisse und des Austobens papierener Verstandestätigkeit. Gewiß soll ein gut gestalteter Garten mehr sein, als ein Schrebergarten, bei dem jeder Quadratmeter Bodenfläche eine bestimmte Nutzmenge produzieren soll. Beim Garten geht es uns ähnlich, wie bei einem guten Auto, es soll nicht nur das Höchstmögliche technisch leisten, es soll uns auch ästhetisch befriedigen. Das wird aber nicht der Fall sein, wenn das »Schöne« am Auto gleichsam als Zutat wirkt, wie das eben für den Jugendstil so bezeichnend ist, sondern wenn es aus der ganzen Konstruktion herauswächst. So auch im Garten. Man soll ihn nicht mit Blumen aufputzen, er soll vom Pflanzenleben durchpulst, vom Blumenduft durchwebt, ein Ort zu täglicher Weckung und Steigerung der Daseinsfreude sein.

Die Bodengestaltung ist im kleinen Garten ganz besonders wichtig, will man möglichst viele wechselnde Standorte für Stauden und Kleingehölze schaffen, die dem Garten das reiche Leben geben. Deshalb muß man jeden Kubikmeter Erdreich, den man beim Hausbau gewinnt, sorglichst verwerten. Die Kunst liegt dann darin, einen wohltuenden Gesamtorganismus zu erzielen, der reich gegliedert erscheint, ohne sich in Einzelheiten aufzulösen. Die allermeisten Pflanzenkenner verlieren sich zu sehr in die Einzelheiten, berauschen sich am Kleinen und arbeiten die großen Züge im Bilde nicht genug heraus. Andrerseits pressen die, denen der Pflanzenstoff nicht recht vertraut ist, die nur das Architektonische empfinden, allzu leicht jedem Garten ein Schema auf, dessen Linienführung dann bei aller Wohlabgewogenheit der Verhältnisse doch nackt und kalt wirkt, weil eben die intimen Reize fehlen, die wir im Garten suchen und finden müssen. So geht es jetzt oft bei der Verwendung von Trockenmauern und Heckenmotiven. Beide sind sehr brauchbare, oft notwendige Elemente der Raumgestaltung gerade im kleineren Hausgarten. Beide müssen aber so verwertet werden, daß sie das pflanzliche Leben in sich aufnehmen, oder ihm als wohltuender Hintergrund dienen.

Was heute so vielen Gartengestaltern fehlt, die recht geschickt in der Raumgliederung sind, die starkes architektonisches Empfinden haben, ist eine gute Beherrschung des Technischen, namentlich der kulturellen Bedingungen. Die Pflanze ist in ihrem Gedeihen nun einmal an bestimmte Lebensbedingungen gebunden. Unter diesen spielen die Bodenverhältnisse eine sehr große Rolle. Worin aber bei nur zu vielen Anlagen stark gesündigt wird, ist die nicht genügende Bodenvorbereitung. Meist aus dem sehr einfachen Grunde, weil dies kostspielig zu sein pflegt. Die Beschaffung guten Bodens und Düngers ist heute namentlich in der Umgebung der Großstädte keine leichte. Auch die Auflockerung zu schweren Bodens durch Torfmull und ähnliches, das hierzu notwendige, nicht zu flache Rigolen oder die Gartenfraisen in genügend großem Gelände, all das ergibt im Voranschlag große Posten, deren richtiges in Erscheinung Treten man scheut. Ist es doch auch recht selten, daß ein Bauherr, der es ganz selbstverständlich findet, daß sein Haus gut fundiert und tadellos im Rohbau ausgeführt wird, das gleiche für den Garten notwendig erachtet. Diese Arbeiten sind allerdings im Garten schwer kontrollierbar, und hierbei ist der Besitzer ganz und gar auf die Ehrlichkeit und Verläßlichkeit des Gartenunternehmers angewiesen. Die Bodenvorbereitung ist, dies sei ganz offen gesagt, ein sehr wunder Punkt in der sogenannten Landschaftsgärtnerei; mindestens so wichtig, wie die Beschaffung des Pflanzstoffes, von der noch die Rede sein wird. Was nützen die besten Pflanzen, wenn sie an dem ihnen gebotenen Standorte nicht gedeihen können. Es ist zwecklos, um ein wiederholt beobachtetes Beispiel zu nennen, Rhododendren in magerem Sande oder in zu schwerem Boden zu vergraben. Sie halten einige Zeit aus, um dann um so sicherer eines langsamen Todes zu sterben. Man braucht ihnen nun aber nicht gleich teuere oder schwer zu beschaffende Moor- oder gar noch Heide-

erde zu beſorgen. Im erſten Falle genügt Zuſatz von gewöhnlicher ſchwerer Erde mit Torfmull und etwas Dung, im zweiten Falle lockert man den ſchweren Boden mit Torfmull. So läßt ſich die Bodenvorbereitung meiſt auf ein vernünftiges Maß zurückführen, verlangt nur Bedachtſamkeit und Ausnutzung aller ſich bietenden Gelegenheiten. Bodenrezepte ſind meiſt unſinnig. Sie mögen für Glashauskulturen ihre Bedeutung haben. Im Freien wirken ſo viele andere Faktoren mit, daß der Boden allein nicht entſcheidend iſt. Können wir ihn nicht ſo ändern, wie wir es eigentlich für nötig halten, ſo müſſen wir durch Bewäſſerung, Bodenbelag und Düngung mit Miſt oder mit Kunſtdüngern helfend eingreifen. Hier ſpielen Sonnenlage, tieferer Untergrund und noch manch anderes Moment in dem gegebenen Falle mit. Deshalb kann auch niemand dieſe Dinge aus einem Buche lernen. Es liegt alles viel komplizierter wie etwa bei einem Hausbau. Eine Mauer iſt leichter gemauert als eine Hecke gepflanzt. Soll allerdings die Mauer der Pflanze dienen, ſo muß ſie einen anderen Charakter annehmen. Zumal die Trockenmauer, in die hinein ſich die Pflanzen verankern ſollen. Auch ſie muß indes ſolid gebaut werden, gerade weil wir ſie nicht mit Mörtel oder Zement verkitten. So ſtellt ſchon der Rohbau des Gartens in rein techniſcher Hinſicht ſehr viele Aufgaben, die mit Bedacht gelöſt werden müſſen. Der Plan kann erſt entworfen werden, wenn wir in jedem Falle wiſſen, wie wir den Rohaufbau durchführen können. Boden, Waſſer und Sonne ſind die Hauptpunkte, die wir kennen müſſen. Die Waſſerverſorgung können wir meiſt am leichteſten unſeren Wünſchen anpaſſen, auch der Boden läßt ſich weitgehend beeinfluſſen. Die durch die Lage bedingte Intenſität und Dauer der Sonnenbeſtrahlung iſt ein Faktor, den wir als beſtimmt gegeben hinnehmen müſſen. Wir können wohl die Wirkung der Sonnenbeſtrahlung etwas verſtärken, auch etwas abſchwächen, aber die Verteilung von Licht und Schatten, die ſo ausſchlaggebend im Garten iſt, nicht grundſätzlich ändern. Wie oft werden aber dieſe Vorbedingungen, auf denen ſich doch alles Gartenleben aufbaut, ſo geprüft und ausgenutzt, wie es geſchehen ſollte?

ALEXANDER STEFFEN / GARTENGERÄTE III

Die Düngergabel

ES gibt noch unendlich viel verſchiedene Formen in Deutſchland, zum Beiſpiel ſolche mit dicken Zinken von quadratiſchem Querſchnitt, wie ſie ſchon vor 50 Jahren in Gebrauch waren. Daß ſie immer noch nicht ins alte Eiſen geworfen wurden, iſt ein Zeichen, daß die Notwendigkeit und Wichtigkeit des beſten Werkzeugs nicht allgemein erkannt iſt. Die aus Amerika eingeführte Drahtgabel iſt die beſte, und zwar nicht die dreizinkige, ſondern die vierzinkige. Für Heuladen kommt eine zweizinkige zur Verwendung. Eine gute vierzinkige Düngergabel wiegt mit Stiel bei einer Geſamtlänge von 165 Centimetern 1800 Gramm. Stiel und Zinken ſind leicht gebogen, um das Heben zu erleichtern, den Ladeſtoff von unten zu packen und ihn nicht heruntergleiten zu laſſen. Dadurch, daß die Zinken nach der Spitze ſich ſtark verjüngen — von 1 Centimeter Querſchnitt bis auf 0.6 Centimeter und ſchließlich in die Spitze — iſt das Einſtechen in Dünger- oder Krauthaufen und das Wiederherausziehen gegenüber den dickzinkigen Gabeln erleichtert. Durch Wahl eines nicht kreisrunden, ſondern eiförmigen Profils, deſſen längſte Achſe in der Druckrichtung liegt, iſt die Tragfähigeit verſtärkt, ſodaß die Gabeln trotz ihrer ſcheinbaren Dünne eine ſtarke Belaſtung durch Druck und Zug vertragen. Gegen Schlag ſind ſie empfindlich. Die genannte große Belaſtung macht es im Verein mit der verhältnismäßigen Dünne der Zinken nötig, daß dieſe aus beſtem Stahl gearbeitet ſind, keine Anbruchſtellen aufweiſen. Eine Gabel, von der ein Zinken weggebrochen iſt, läßt ſich ſchwer gut wieder ausbeſſern und bleibt dauernd Invalide. Eine heikle Stelle iſt der Verbindungsſteg zwiſchen Gabel und Tülle. Hier kommen öfter Brüche vor; eine erhebliche Verſtärkung, zum Beiſpiel durch umgelegte Eiſenringe, bedeutet unerwünſchte Steigerung des Gewichtes. Man muß alſo beim Kauf die Augen aufmachen.

Die Grabegabel und ihr Gebrauch

DIE Grabegabel dient der Bodenlockerung dort, wo der Boden nicht zu ſchwer iſt, wo Wurzeln zu ſchonen ſind, wo Unkräuter wie Quecken ausgeſchüttelt werden ſollen.

Daneben gebrauchen wir ſie wohl auch zum Laden und Werfen von Laub und Dünger, obgleich das nicht ihr eigentlicher Zweck iſt; ſie ſtellt ein Mittelding zwiſchen Düngergabel und Spaten vor. Es ſind von ihr nur wenig Formen verbreitet, es fehlt die große Mannigfaltigkeit der verſchiedenen Gegenden und Gebräuche. Das kommt daher, daß ſie in Europa ohne Überlieferung lebt und erſt verhältnismäßig ſpät — etwa 1880 — zu uns aus den Vereinigten Staaten von Amerika kam. Von dorther ſtammen alle Stücke der erſten Jahrzehnte. Erſt verhältnismäßig ſpät nahm Europa ſelbſt die Herſtellung auf.

Griff und Stiel entſprechen denen guter Spaten. Den Quergriff findet man häufig, doch auch den U-Griff, der trotz ſeines höheren Preiſes vorzuziehen iſt. Über Stiele im allgemeinen ſprach ich ſchon; über die Griffe bleibt für die Beſprechung des Spatens weiteres vorbehalten. Es kommen verſchiedene Längen vor, die um 110 Centimeter ſchwanken. Die Zahl trifft das Richtige für gute Mittelgröße des Arbeiters; ſie kann eher etwas größer als kleiner ſein. Da die dreizinkige Grabegabel weniger leiſtet, ſollte die vierzinkige bevorzugt werden. Die Zinkenbreite beträgt 2 Centimeter. Der Querſchnitt iſt dreieckig mit leicht gerundeter Hinterecke. Eine leicht bogige Neigung der Grabfläche nach vorn braucht nicht unbedingt verlangt werden; ich halte ſie aber für eine Verbeſſerung, weil man leichter in den Boden einſtechen, ihn vorwärts hochheben, bequemer unter Haufen faſſen kann; die Erdſtiche rutſchen nicht ſo leicht vorzeitig ab. Der Abſtand der Zinkenſpitzen von der verlängert gedachten Stielachſe wäre mit 9 Centimeter anzunehmen; die Ladefläche 20 : 30 Centimeter, weil wir mit der Grabegabel meiſt leichtere Stoffe heben, aufwerfen oder durchſchütteln.

Die Gabelform mit unten zugeſpitzten Zinken (Fig. 2) dringt reibungsloſer in den Erdboden ein als die breiter endenden (1); das ſpielt keine große Rolle bei ganz lockeren Boden, aber bei feſtem. Für letzteren müſſen wir zwar häufig zum Spaten greifen, aber es gibt doch Fälle genug, in denen die Grabegabel am Platze iſt, ſo beim Graben zwiſchen Erdbeeren, Himbeeren, Stauden, beim Lockern um Beerenſträucher herum und in allen Fällen, wo Wurzeln zu ſchonen ſind. Vier ſchmale Zinken laſſen ſich natürlich leichter in den Erdboden ſtoßen als eine geſchloſſene Spatenſcheide, zwiſchen ihren Abſtänden und an ihren Spitzen gleitet die Mehrzahl der Wurzeln unverſehrt hindurch. Weniger gut geht das Zerſchlagen der Erdklumpen mit der Grabegabel; ſie leiſtet auch nicht ſo tiefe Arbeit wie der Spaten, weil der aufgehobene Stich, an vier Einzelſtellen durchſtoßen, leichter von der Ladefläche herunterkrümelt, nicht mit dem Stich hochkommt, alſo den Grabegraben füllt. Der Spaten wirft den geſchloſſenen ganzen Stich vorwärts. Wo tief gegraben werden ſoll, zieht man den Spaten alſo vor. Die Grabegabel iſt trotz ihres Gewichtes von zwei Kilogramm ein leichtes Gerät, das weniger im Herbſt für die Winterlockerung und nicht auf ſchwerem

FIG. 1

FIG. 2

Boden in Tätigkeit gesetzt wird, sondern im Frühjahr und Sommer für leichtere Lockerungsarbeit, auf leichteren Bodenarten und mürben Kulturboden. Starke Grabearbeit, beim Herausnehmen von Ballenpflanzen und Klumpen, soll der Grabegabel nicht zugemutet werden. Fast alle besitzen nämlich einen Mangel, das ist die Art der Gabelbefestigung am Stiel. Es führt von der Gabel ein Dorn in den von einer Hülse umschnürten Stiel. Das Festhalten soll ein um das Stielende gelegter Ring, der auch auf den Querbalken übergreift, besorgen. (Fig. 1.) Diese Verbindung ist aber ungenügend. Die Gabel bricht, wenn nicht sehr gut gearbeitet, leicht an der Stoßstelle ab, Beweis, die vielen geradean jener Stelle zerbrochenen Grabegabeln.
Der Stiel verjüngt sich in der Tülle bis auf 3,5 Centimeter. Die Tülle der Grabegabel umschließt unten den Stiel völlig, nach oben läuft sie in 2 Zungen aus, von denen eine oben, die andere unten auf dem Stiel aufliegt. Der Ring greift vorn und hinten über auf den Querbalken der Gabelfläche (Fig. 1B). Ein Ring dicht über der Gabelfläche hält Stiel und Eisenteile zusammen. Wie Gabel und Zungen ineinander laufen, ist auf dem Bilde nicht sichtbar. Die Grabegabel, d. h. die Zinkenfläche läuft unter dem Ring in einen Dorn aus, der im Stiel steckt.
Gute Arbeit leistet die Grabegabel und arbeitet schonend beim Ausheben kleinerer Pflanzen wie Spargelsämlinge, Maiblumen, Erdbeeren, Jungpflanzen. Auch bietet sie dort dem Spaten gegenüber Vorteile, wo es sich um Einstich in Compost-, Misthaufen usw. handelt, da dringen vier einzelne Zinken in Zwischenräumen leicht ein, das geschlossene, breite Spatenblatt könnte nichts ausrichten, weil es überall auf nicht ausweichende Widerstände stößt.
Auch wo viel Steine im Boden arbeitet es sich mit der Grabegabel leichter, da sie den Widerständen ausweicht. — Wegen der Leichtigkeit der Arbeit erzielt sie dem Spaten gegenüber auch größere Flächenleistungen. Ganz lockrer Boden fällt in trocknem Zustand durch die Zinken durch. Da ist die Grabegabel schlecht brauchbar und kann den Spaten nicht ersetzen.

PAUL KACHE / ANZUCHT VON BLÜTENGEWÄCHSEN

DIE Vermehrung der Blütengewächse für den Garten erfolgt gewöhnlich in ganz sachlicher Weise. Auch das Heranwachsen der Sämlinge im Pikierkasten oder der Stecklinge in kleinen Töpfen geht noch richtig vor sich. Es ist noch genügend Zeit, Stoff und Raum da. Anders wird es aber, wenn die Pflanzen heranwachsen und nun weit mehr Pflege und Platz haben müssen als vorher. Dann tritt allzu oft ein Mangel ein, der eine normale Entwicklung der Pflanzen verhindert.
Zunächst sollen nicht Dinge begonnen werden, die doch nicht ganz durchgeführt werden können. Jeder weiß, mit welchen Mitteln er zu rechnen hat, der Umfang der vorhandenen Mistbeete oder Gewächshäuser wie auch der Arbeitskräfte umgrenzen die Anzucht der erforderlichen Beetpflanzen. Es hat gar keinen Zweck, etwa tausend Stück zu vermehren, wenn nur zwei Drittel dieser Zahl bis zur vollen Ausbildung herangezogen werden können, weil für das weitere Drittel durchaus kein Platz ist. Dann ist es besser, eine kleine Anzahl wirklich guter Pflanzen zu gewinnen.
Für alle hier in Frage kommenden Blütengewächse sind zur Anzucht Mistbeetkästen und Fenster unerläßlich. Auch Notkästen, leicht aus einigen Brettern, Pfählen und Nägeln zusammengeschlagen, werden oft errichtet werden müssen. Alle diese Beetpflanzen sind in ihrer Anzucht geeigneter in einem Kasten aufzustellen, als in einem Gewächshause. Dadurch, daß sie so hoch am Glase stehen, das vollste Licht erhalten, wachsen sie viel gedrungener, üppiger heran, als es im Glashause möglich ist. Dazu kommt die reichliche Lüftung. Durch die einfallenden Sonnenstrahlen wird auch die Erde im Kasten erwärmt, so daß die Wurzeln im leicht warmen Boden eine regere Tätigkeit entfalten als im kalten Boden. Nicht zu vergessen ist die leichte Möglichkeit einer guten Abhärtung der Pflanzen vor dem Auspflanzen auf die Gartenbeete. Werden an günstigen Tagen nach früherer hoher Lüftung die Fenster ganz von den Pflanzen genommen, so werden sie allmählich gut abgehärtet und an den späteren Stand im Freien gewöhnt. Auf dieses Abhärten der Pflanzen ist sehr großer Wert zu legen. Gerade in den letzten drei bis fünf Wochen vor dem Auspflanzen ins Freie finden diese Gewächse allzu oft nicht die erforderliche Behandlung, sei es, daß man ihnen nicht den notwendigen Raum gewähren kann, sei es, daß ihr weiteres Verpflanzen infolge Zeitmangels unterbleibt, die Folgen sind in fast allen Fällen schwache, fast verkrüppelte, schlecht blühende Pflanzen, die durchaus keinen Schmuck des Gartens darstellen.
Eine große Zahl der hier in Frage kommenden Blütengewächse, wie Calceolarien, Fuchsien, Margueriten, Pelargonien, Salvien müssen im Topf gehalten werden, bis sie zur Auspflanzung fertig sind. Bei diesen wird so oft das letzte Verpflanzen zu früh vorgenommen. Besser gesagt, man umgeht ein letztes Verpflanzen, das eigentlich stets drei bis vier Wochen vor der wahrscheinlichen Auspflanzzeit auf die Beete erfolgen sollte. Es wäre also etwa in der zweiten Aprilhälfte die Zeit zum letzten Verpflanzen gegeben. Eine gewisse Schwankung in dieser Zeit ist schon durch das Wurzelwerk der Pflanze angezeigt. Solche, wie Salvien, die eine sehr starke Wurzelbildung zeigen, auch leicht zum Verfilzen neigen, sollen unbedingt etwa drei bis vier Wochen vor dem Auspflanzen noch einmal verpflanzt werden. Erfolgt dieses nicht, bleiben die Pflanzen zu lange im alten Topf stehen, so tritt ein völliges Verfilzen des Wurzelballens und dadurch auch im Wachstum ein Stocken ein, die Triebe verhärten, bringen vor der Zeit Knospenstände und sehen dann auch infolge des kleinbleibenden, gelblichen Laubes verhungert aus. Selbst Jauchen hilft dann nur zum Teil. Es kommt hinzu, daß infolge des sehr stark durchwurzelten Topfballens eine zu schnelle Austrocknung erfolgt, was wiederum bei der Salvie den Befall durch die Spinnmilbe, die »Rote Spinne«, nach sich zieht. Solche Pflanzen sind dann besser dem Komposthaufen einzuverleiben als daß sie auf Beete gepflanzt werden. Es gibt gewisse Entwicklungsstadien, die für die Auspflanzung der Pflanzen den besten Zeitpunkt darstellen. Bei den Salvien wäre es dann, wenn das Wurzelwerk den Erdballen im Topf wohl durchdrungen und lose umsponnen, nicht aber verfilzt hat. Das wäre etwa drei bis vier Wochen nach einem Verpflanzen. Dabei soll die Pflanze selbst soweit entwickelt werden, daß die ersten Knospenstände soeben die ersten Blüten zur Entfaltung bringen. Man hüte sich vor dem Auspflanzen in voller Blüte stehender Sätze, das später stets eine längere blütenlose Zeit mit sich bringen wird. Ebenso verhalten sich auch mehr oder weniger die Margueriten.
Andere Gewächse, deren Wurzelwachstum langsamer, geringer ist, wie Pelargonien, sind hierin nicht so empfindlich. Gewiß ist es auch bei ihnen wie auch bei Fuchsien und Calceoldrien nicht gut, wenn der Ballen verfilzt ist, doch tritt dieser Zeitpunkt bei ihnen viel später ein als bei Salvien. Darum kann auch eine längere Spanne zwischen Verpflanzen und Auspflanzen liegen. Es ist hier auch durch reichliches Jauchen viel leichter über eine etwas fragliche Zeit hinweg zu kommen. Zumal selbst bei reichlicher Ernährung die Wurzelbildung nur langsam vor sich geht. Und doch ist auch hier die Pflege während der Anzucht so zu gestalten, daß das letzte Verpflanzen so spät erfolgt, daß bis zum Auspflanzen auf die Gartenbeete wohl der Topfballen gut durchwurzelt wird, doch nicht verfilzt. Es ist für die Pflanze sehr schwer und erfordert lange Zeit, ehe sie aus dem feinen, dünnen Wurzelgeflecht wieder normal starke, gesunde Wurzeln bildet, die weiter streichen und die Pflanze am neuen Standort nicht nur verankern, sondern ihr auch von neuem reichlich Nahrung zuführen. Ehe dieses dann eintritt, bleiben die Pflanzen fast ohne jede Entwicklung stehen, die wenigen Blüten, die vorhanden waren, verblühen und dann zeigt ein solches Beet auf lange Wochen hinaus ein trostloses Aussehen. Es wird Sommer, ehe sie wieder ein blütenreiches Bild bieten.
Einfacher ist ja die Anzucht einer Reihe anderer Gewächse, deren besondere Wurzelbildung es uns erlaubt, sie im Kasten direkt ausgepflanzt, bis zur Pflanzung auf die Blumenbeete heranzuziehen. Es sind dieses die kleinen Strauch- wie auch die Knollenbegonien, die Lobelien, auch das Ageratum und die guten Impatiens, fälschlich »Fleißiges Lieschen« genannt, können so behandelt werden. Hier genügt ein einfacher Kasten mit Fenster, eine Lage geeigneter Erdmasse zur guten Entwicklung der Pflanzen. Doch ist auch bei diesen Gewächsen ein letztes, weiteres Verpflanzen im Kasten oder in einen schnell errichteten Notkasten mindestens so spät erforderlich, daß die Pflanzen bis zur Auspflanzzeit eine ungestörte Entwicklung erreichen können. Einer guten Ballenbildung ist ein solch spätes Verpflanzen gleichfalls dienlich. Dabei sind die Pflanzen mit so weiten Abständen zu verpflanzen, daß ein Ineinanderwachsen unmöglich wird, ein enger Standort bringt auch hier schlimme Folgen.
Es muß bei diesen in den Kasten ausgepflanzten Beständen vor allem auch auf eine gute Ballenbildung hingearbeitet werden. Dazu ist eine geeignete Erde unerläßlich. Bei den Begonien wird man so wie so die Verwendung von Humusmassen, wie Torfmull oder Torfstreu, als üblich vorfinden, doch ist dieses ebenso für alle anderen Gewächse gut.

Es ift aber ratfam, Torfftreu oder Torfmull zuvor auf Haufen gefetzt zu kompoftieren und dabei ihnen reichlich kräftige Jauche zuzuführen. Diefe fo behandelte Maffe ift dann der Kaftenerde reichlich beizumifchen. Die prachtvolle Entwicklung der Pflanzen, befonders auch die ausgezeichnete Wurzel- und Ballenbildung beweifen den Wert diefer Torfmaffen.
Ganz befonders fei noch auf das dringend notwendige Abhärten aller Pflanzen hingewiefen, die etwa gegen Ende Mai, Anfang Juni ausgepflanzt werden follen. Schon von Anfang Mai an ift hoch zu lüften, und zwar ftets abwechfelnd, fo daß jede Fenfterfeite, auch die untere, einmal hoch gelüftet fteht. Ift dann das Wetter günftig, dann find die Fenfter mindeftens tagsüber ganz herunterzunehmen, befonders bei trübem, feuchtwarmen Wetter. Später ift die Pflanze auch an den völlig freien Stand in voller Sonne zu gewöhnen. Das muß allmählich vor fich gehen, damit die Pflanzen ohne jede Schädigung auf die Freibeete gepflanzt werden und dort freudig weiter gedeihen.

Die Pflanze in der Wohnung

Japanifche Miniaturgärten.

DIE Japaner fchaffen nicht nur im Freien Gärten, die in ihrer Formengebung uns zwerghaft anmuten, fie verfuchen diefe Formen fogar auf kleinem Raume, in flachen Tongefäßen, zu verkörpern, um fie auch im Zimmer unterbringen zu können. Derartige Miniaturgärten werden aus Japan vielfach importiert und bei uns auf Ausftellungen gezeigt. So können wir heute zwei folcher Gärtchen im Bilde wiedergeben, die auf der vorjährigen Frühjahrsfchau in Haarlem zu fehen waren. Die Hauptbeftandteile bilden immer Zwergkoniferen, vor allem Formen von Chamaecyparis obtusa, der Hinoki-Scheincypreffe, oder von Kiefernformen, wie Pinus densiflora und P. Thunbergii. Diefe Nadelhölzer werden in fehr grotesken Formen nach ganz beftimmten Vorbildern gezogen. Unterliegt doch im japanifchen Garten alles genauen, feit alters gültigen Regeln, deren tieferer Sinn uns Wefteuropäern kaum faßbar ift. So find denn auch die Formen diefer Miniaturgärten keine willkürlich gewählten, wenn fie von Japanern felbft hergeftellt wurden. Jedes Motiv und Motivchen ift auf das andere abgeftimmt und zum Ganzen in beftimmte Beziehung gefetzt. Wir empfinden ja nur den Gefamtreiz, die malerifche Wirkung der gefamten Anordnung. Wir ftaunen auch über die Fülle der Einzelheiten und wundern uns immer wieder, wie fo manches davon zuftande kam. Aber für die eigentliche Bedeutung des Ganzen fehlt uns der japanifche Gartenfinn. So ahmen wir denn im Garten, wie auch jetzt häufig bei Kakteen-Anordnungen in Schalen, diefe japanifchen Miniaturgärtchen nach. Es find aber ganz andere Motive, die uns bei der Anordnung leiten. Wir halten uns lediglich an das Formale. Für den Oftafiaten mit feiner viel älteren und viel durchgebildeteren Gartenkultur fprechen viel ftärker feelifche Momente, ja religiöfe Einflüffe mit. Dies dürfen wir nicht vergeffen, wenn wir diefe uns zunächft fpielerifch anmutenden Arrangements fehen. Sie werden auch bei uns zuweilen nachgeahmt, doch ift es hier nicht möglich, das echte alte Material dazu zu bekommen, das in Japan mühevoll herangezogen wird. Wer fich in die Einzelheiten vertieft und der Bedeutung all der kleinen Beigaben nachzugehen verfucht, dem erzählen diefe Miniaturgärten von einer anderen, uns leider nur zu fremden Welt, in der Blumen und Pflanzen eine weit ftärkere Rolle fpielen, als es bei uns der Fall ift. Dort find fie wirklich verwoben mit dem Denken und Fühlen des Volkes. *C. S.*

Bilder L. Blok

Auf dem Balkon

Arbeiten im April

WIE wollen wir diefes Jahr unferen Balkon fchmücken? Diefe Frage legt fich wohl mancher Blumenliebhaber vor. Er möchte gern mal etwas anderes, Apartes haben. Um ihm bei feiner Auswahl an die Hand zu gehen, geben wir im Nachftehenden eine Anzahl erprobter Zufammenftellungen, die wohl für alle Zwecke und Gefchmacksrichtungen etwas Paffendes bieten dürften. Wir müffen in erfter Linie unterfcheiden zwifchen Pflanzen für volle Sonne und folchen, die beffer im Halbfchatten und auch noch im Schatten gut gedeihen.
Für nach Süden und Südweften gelegene Balkons, Veranden und Fenfter, die fomit der vollen Sonne ausgefetzt find, kommen in erfter Linie Pelargonien und Epheupelargonien in Frage, die fich auch in voller Sonne zu ihrer vollen Schönheit entwickeln. Folgende Zufammenftellungen find in ihrer Farbenwirkung erprobt. Die allbekannte Zonalpelargonie Meteor mit den Efeupelargonien Etincelant, rot, oder Anna Pfitzer, rofa; Pelargonie Purpurkönig mit Efeupelargonie Cattleya, lila, oder Rheinland und Turner, beide violett; Pelargonie Mad. de la Rogue, lachsfarbig, oder Wunderkind und Poitiere, rofa, mit Vorbepflanzung von der Efeupelargonie Mad. Thouvenin, lachsrot.
Für größere Veranden oder Balkons, die auch überrankt werden follen, denke ich mir folgende Zufammenftellung fehr apart: Als Rankpflanze, die neue großblumige, himmelblaue Trichterwinde Ipomaea grandiflora praecox coerulea. Als Vorpflanzung lachsrofa Pelargonien und dunkel-

blaue Hänge-Lobelien oder die vorgenannte Ipomaea mit Vorpflanzung von knallroten Zonal- und Efeupelargonien. Größere Balkons müßten hiermit bepflanzt einen feenhaften Anblick geben.
In Gegenden mit viel Luftfeuchtigkeit und nicht zu trockenen Winden lassen sich auch die Knollenbegonien sehr gut in voller Sonne verwenden. Meine Mutter hatte jahrelang ihr Fensterbrett, das der vollen Sonne ausgesetzt war, mit Knollenbegonien bestellt; diese blühten bis tief in den Herbst hinein prachtvoll, ich höre immer noch die Nachbarn und Vorübergehende sagen: »Send dös aber schöne Bloma, kann i net a Ablegerle habe«.
Außer den großblumigen einfachen und gekrausten, sowie den gefüllten, eignen sich auch die sogenannten Gruppenbegonien, wie Helene Harms, gelb, Lafayette, dunkelrot, Graf Zeppelin, scharlach, die neue großblumige Rouget de L'Isle, leuchtendrot, die ziegelrote Unermüdliche und die etwas höher, etwa 30 Centimeter hoch wachsende, einfach blühende Bertini, knallrot; alles sind unermüdliche Dauerblüher. Eine Verbindung von Tropaeolum Lobbianum, rot oder gelb, mit Vorpflanzung von Begonia Bertini und Helene Harms ist sehr effektvoll.
Auch mit den billigen Einjahrsblumen lassen sich ganz reizende Wirkungen erzielen. Als besonders geeignet nennen wir Salvia splendens Feuerball, die niedrigen Tagetes Ehrenkreuz, braun, patula nana aurea fl. pl., gelb, die Balsaminen oder Impatiens, niedrigen Zinnien, wie Zinnia elegans pumila fl. pl. und Haageana fl. pl., sowie Antirrhinum majus nanum-Formen.
Als Rankpflanzen zur Begleitung der Fensterumrahmungen nennen wir außer den bereits erwähnten noch Cobaea scandens und die wohlriechenden Edelwicken, Lathyrus odoratus, sowie die Kapuzinerkresse, für kleinere Fensterkästen lassen sich auch die Begonia semperflorens sehr gut verwenden, wie Württembergia, Albert Martin, Luminosa, in Rot, Gruppenkönigin und Verbesserte Erfordia, in Rosa, Weiße Perle und Pfitzers Triumph, in Weiß.
Im Halbschatten, ich meine damit Balkons, die nach Osten oder Westen gerichtet sind, gedeihen außer den oben genannten Knollenbegonien (auch Zonal- und Epheupelargonien lassen sich gut verwenden) besonders noch die Fuchsien. Verbindet man die aufrechtwachsenden Fuchsien mit den hängenden, so lassen sich wundervolle Wirkungen damit erzielen. Einige gute Beispiele: Fuchsia Dollarprinzessin oder Garteninspektor Mönkemeier, violett, oder Königin der Frühen, oder Charming, beide einfach dunkelviolett, mit Marinka. Weiße Dollarprinzessin oder Theroigne de Mericourt, beide mit weißer, starkgefüllter Korolle, mit der einfachen, rosa Balkonkönigin. Auch die traubenblütigen Thalia oder Heinrich Henkel mit ihren orangefarbigen Dolden geben einen schönen Kontrast mit Balkonkönigin. Ferner die einfache, reichblühende orangerosa La Perle mit Balkonkönigin.
Eine reizende Sorte ist auch Vielliebchen mit ihren in Massen erscheinenden Glöckchen, wirkt gut mit Marinka. Reizend sind auch für Balkons die sogenannten Gebirgs- oder Napoleonsnelken, Dianthus Carthusianorum »Feuerkönigin«, mit ihrem satten Rot. Auch Campanula Mayi die hängende Glockenblume mit ihren lichtblauen Glocken ist wie geschaffen für Fensterbepflanzung.
Die Edel- oder engischen Pelargonien in ihren neueren remontierenden Sorten, besonders die Sorte Ostergruß, lassen sich ebenfalls sehr gut für Balkons verwenden.
Mit zu den brauchbarsten, effektvollsten Balkonpflanzen müssen auch die Hängepetunien, Petunia pendula, in den Farben: alba, weiß, rosea, rosa, violacea, violett, und purpurea, purpurn, gerechnet werden. Die violacea eignet sich sehr gut zu roten Backsteinwänden, auch zusammen mit pendula alba. Eine vornehme Wirkung erzielt man, wenn man die vier Farben gemischt anpflanzt. Man nehme dabei purpurea und rosea in die hintere Reihe, da diese nicht so stark ranken, die vordere Reihe mit violacea und alba; diese beiden ranken stärker, doch verwende man nicht zu viel weiß. Gerade im Halbschatten blühen diese Petunien unaufhörlich, und es läßt sich namentlich bei gemischter Pflanzung ein reizender Flor erzielen.
Als Rankpflanze für den Halbschatten ist Cobaea scandens gut geeignet, auch die großblumigen Clematis, wie Jackmanii, gedeihen gut, doch müßten diese mehrere Jahre stehen bleiben, um ihre Schönheit zu zeigen und brauchen deshalb auch größere Gefäße und im Winter etwas Schutz durch vorgebundene Tannenzweige.
Für ganz nach Norden gelegene Balkons ist die Auswahl der dort noch gedeihenden blühenden Pflanzen gering. Knollenbegonien und Fuchsien bringen noch leidlichen Flor, doch lassen sich die Balkonkästen auch mit grünen Pflanzen, beispielsweise an den Seiten Efeu und in der Mitte die reizenden harten Lonicera nitida oder pileata, schön ausfüllen. Auch Helxine Soleirolii mit ihrem kriechendem Wuchs und den kleinen runden Blättchen dürfte für die Sommermonate sich sehr gut eignen. Die Hortensien in den neueren lebhaft gefärbten Sorten lassen sich ebenfalls gut verwenden, nur dürfen die Pflanzen nicht aufgebunden verwendet werden, da sie sonst zu steif aussehen würden; es müßte auch für Wechsel gesorgt werden, da die Hortensien nicht den ganzen Sommer mit ihrer Blüte durchhalten.
Noch einiges über die weitere Pflege der Balkonpflanzen. Pelargonien aller Arten, auch Fuchsien und ähnliche Pflanzen sind nun bereits im besten Wachstum; soweit sie nicht verpflanzt wurden, ist dies sofort nachzuholen, öftere Dunggüsse sind jetzt angebracht. Die im letzten Monat ausgesäten Pflanzen, Einjahrsblumen oder Schlinggewächse müssen verstopft oder soweit dies nötig, in kleine Töpfe gepflanzt werden; die Schlingpflanzen gilt es aufzubinden. Knollenbegonien müssen nun in leichte Erde eingelegt und im warmen Frühbeet oder im Zimmer am Fenster zum Austreiben gebracht werden. Man sei zu Anfang sehr vorsichtig mit dem Gießen, erst wenn die Knollen kräftige Triebe entwickeln, kann reichlicher gegossen werden. Bei gutem Wetter gewöhne man die Pflanzen langsam an die Luft, damit sie nicht geil werden und kräftig und gesund heranwachsen. *H. Gehringer.*

Aus der Krankenstube der Pflanzen

Der Grauschimmel (Botrytis cinerea).

DIESER tritt bisweilen als schwerer Pflanzenschädiger auf, er befällt und vernichtet vieles, aber er verschont die Pflanzen, wenn sie sich in richtigem Kulturstand befinden. Die Botaniker nennen einen solchen Pilz einen Schwächeparasiten. Die völlig gesunde und tadellos entwickelte Pflanze, unter den richtigen Bedingungen kultiviert, leidet nicht unter ihm. — Man findet den Grauschimmel wohl überall; als ganz harmlosen Bürger kann man ihn in den Gewächshäusern beobachten: auf Vegetabilien, die auf dem Erdboden faulen, findet man die bis ein Centimeter hohen, grauen Schimmelrasen, welche bei plötzlicher Erschütterung, infolge Aufwirbeln der zahllosen Sporen, stark stäuben. Befindet sich aber eine Pflanze aus irgend einem Grund in einem geschwächten Zustand, so ist bei der Allgegenwart des Grauschimmel, stets die Möglichkeit eines gefährlichen Auftretens gegeben. Ich werde nachher eine Anzahl besonders wichtiger Fälle besprechen. Allgemein ist für denjenigen, der Schädigungen durch den Grauschimmel vermeiden will, folgendes zu beachten;

1. Feuchtigkeit und stagnierende Luft sind das Lebenselement des Grauschimmel. Man vermeide in Gewächshäusern zu starkes Gießen, besonders in Verbindung mit zu großer Wärme, und sorge für geeignete Lüftung. Im Freien achte man auf nicht zu engen Stand der Pflanzen, so daß Luft zwischen ihnen hindurchstreifen kann.
2. Übermäßige Stickstoffdüngung erzeugt weiche und anfällige Gewebe und ist zu vermeiden.
3. Durch zu schnelles Treiben werden die Gewebe verweichlicht. Freilandpflanzen, welche im Haus oder Kasten vorgetrieben worden sind, müssen vor dem Hinausbringen sorgfältig abgehärtet werden. In die trockene Zimmerluft dürfen die Pflanzen aus der feuchtwarmen Gewächshausluft nicht ohne vorherige Abhärtung gebracht werden.

Alle Pflanzenteile, die am Grauschimmel erkrankt sind, zeigen zunächst eine braune Verfärbung der befallenen Stelle und sinken häufig gleichzeitig mehr oder weniger zusammen. Bei feuchtwarmer Witterung erscheint auf den erkrankten Geweben der oben geschilderte graue Schimmelrasen, dem der Pilz seinen Namen verdankt. In Zweifelfällen lege man den erkrankten Gewebsteil in feuchtes Fließpapier gehüllt auf einen Teller, den man mit einer Glasscheibe oder einem etwas größeren Teller zudeckt, und lasse ihn 24 Stunden bei Zimmertemperatur stehen. Sind die Schädigungen durch den Grauschimmel verursacht, so haben sich in dieser Zeit die charakteristischen Schimmelrasen auf den kranken Pflanzenteilen entwickelt.
Aus der großen Zahl der Fälle, in denen der Grauschimmel als Krankheitserreger auftritt, seien folgende herausgegriffen:
In milden, regenreichen Wintern wird der Pilz an den verschiedensten Blumen der Kalthäuser: Primeln, Cyclamen, Calceolaria, Cineraria und anderen sehr lästig. Stengelteile, besonders der Stengelgrund, und

Blütenſtiele verfärben ſich, erweichen und verfaulen. An Goldlack, der zum Treiben in das Haus gebracht und zu ſchnell angetrieben worden iſt, beobachtet man häufig an den unterſten Verzweigungen braune Stellen, die ſich bald mit den grauen Schimmelraſen überziehen, nicht ſelten faulen die Triebe an dieſen Stellen glatt ab. Auch Blumenzwiebeln, beſonders Hyacinthen und Tulpen, zeigen bei zu ſchnellem Antreten ähnliche Störungen. Der Blütenſchaft erweicht am Grunde und die Blüte »kippt um«. In der Regel iſt die tiefere Urſache der letzteren Erſcheinung darin zu ſuchen, daß die Zwiebeln im Vorjahre nicht genügend ausgereift waren. Schweren Schaden durch den Grauſchimmel erleiden bisweilen die Schneeglöckchen. An Stelle der Blüten kommt ein unförmlicher, von den Schimmelraſen völlig überzogener Klumpen (Blüte und Blätter) aus der Erde hervor. Die Krankheit hat ſtellenweiſe großen Schaden angerichtet.
Auch eine Krankheit, die in den letzten Jahren immer mehr auf den Kugelbäumchen der Prunus triloba um ſich griff, iſt auf den Grauſchimmel zurückzuführen. Bald nach der Blüte ſterben mehr oder minder zahlreich die Blütenſpitzen ab, die Blätter vertrocknen, fallen aber nicht zu Boden, ſondern bleiben in verdorrtem Zuſtand an den Zweigen hängen. Das ganze Krankheitsbild erinnert lebhaft an die Monilia-Krankheit der Kirſchen. Beim Einlegen der abſterbenden Triebe in feuchtes Löſchpapier zeigen ſich ſchon innerhalb zwei Stunden die Grauſchimmelraſen, und laſſen erkennen, daß nichts anderes als Botrytis cinerea die Urſache der Krankheit iſt. Kopfſalat, Erdbeeren, Treibgurken, Roſenſämlinge, feucht aufbewahrte Küchenzwiebeln, Tomaten, Weintrauben und viele andere Pflanzen leiden unter dem Pilz, aber immer nur, wenn ſie ſich in ſchlechtem Kulturzuſtand befinden.
Durch Schaffung günſtiger Lebens- und Wachstumbedingungen und Abſtellung aller die Pflanzen ſchädigenden Verhältniſſe, durch peinliches Sauberhalten, Entfernen aller pflanzlichen Abfälle und Reſte, durch Vermeiden zu großer Feuchtigkeit, richtiges Lüften der Gewächshäuſer uſw. läßt ſich der Pilz in der Regel in Schranken halten. Eine unmittelbare Bekämpfung durch Spritzmittel erſcheint ausſichtslos.

M. Noack.

Aus der Werkſtatt der Pflanzenzüchter

Erfahrungen mit Lutea-Kreuzungen

DIE Lutea-Raſſe (Pernetroſen) iſt eine der unempfindlichſten für Befruchtungen, ſogar der Pollenſtaub iſt nach Dr. Krügers Meſſungen bis zu 96 Prozent krank, alſo höchſt unzuverläßlich, und damit muß der Züchter rechnen, wenn er Erfolg haben will. Auf wieviel Umwegen Dr. Müller ſein Ziel zu erreichen ſuchte, ſoll ein Kapitel für ſich werden. Daß Pernet in erſter Folge gleich Glück hatte und eine Soleil d'or erhielt, iſt ganz ſeltſam. Dieſe Roſe ſtammt von der Remontantroſe Antoine Ducher und Persian Yellow, erſte iſt die Samenträgerin geweſen. Wieviel Verſuche der Züchter gemacht hat, um ein Reſultat zu erzielen, hat niemand erfahren. Die Soleil d'or iſt ein echter Baſtard, demnach iſt ſie auch wie die meiſten Baſtarde ſteril, alſo zur Samenbildung nicht zu bewegen, ſie ſetzt nur Scheinfrüchte an. In ihrem Kolorit hat man eine ganze Farbenſkala vor ſich, alles kann aus ihr herausgeholt werden, nur eine reine weiße Farbe iſt bis jetzt noch nicht gelungen, aber vom Hellgelb bis zum tiefen Orange und vom zarten Roſa bis in die feurigſte Glutfarbe iſt ſie verläßlich, das beweiſen die vielen farbenreichen Lutea-Hybriden, die heute einen großen Prozentſatz des Roſenmarktes bilden. Früher meinte man, daß, wenn eine Kreuzung mit einigem Erfolg erwartet würde, ſo müßte notwendig einige Analogie zwiſchen beiden Eltern vorhanden ſein. Das iſt nun gründlich widerlegt durch Dr. Müller, Pernet, Geſchwind, P. Lambert, Kieſe, Kordes und durch mich ſelbſt. Ich will hier nur ein kleines Beiſpiel anführen. Schon in früheren Jahren, ehe ich durch die vielen Mißerfolge wußte, daß die Lutea-Klaſſe ſehr ſchwer zu kreuzen iſt, habe ich unendlich viel Mühe angewendet, um eine Kreuzung mit der Jaune Bicolore (R. foetida oder lutea var. bicolor) als Samenträgerin und mit einer Remontantroſe zu erzielen; doch Jahr für Jahr erfolglos. Die Früchte ſtanden längere Zeit an der Pflanze, doch ſpäter fielen ſie ab, niemals habe ich einen Samen darin gefunden. Nun befruchtete ich die Remontantroſe Princesse de Béarn mit den Pollen der Jaune Bicolore, und da erhielt ich ſchließlich nach vielen Mißerfolgen doch einen Sämling, der die Eigenſchaften beider Eltern in ſich vereinigte. Der Wuchs iſt der einer langtriebigen Remontantroſe, die Stacheln ſind in jungem Zuſtand der Lutea verwandt.
Die Farbe der Blumenblätter iſt am Nagel dunkelgelb (kapuzinergelb), im oberen Teile feurigrot, dabei iſt die Blume ziemlich gefüllt, hat auch feinen Duft. Alſo von jedem Elter hat ſie etwas. Dieſe Roſe iſt unter dem Namen »Johannisfeuer« in den Handel gekommen. Ich habe von Roſenfreunden mehrere zuſtimmende Berichte über ihre Farbenſchönheit erhalten, die Blume iſt ziemlich groß, die Pflanze auch hart. Als einmal ein recht heißer und trockener Sommer war, fand ich an der Jaune Bicolore einige Zufallfrüchte, die ich ausſäte, davon iſt ein Sämling gekeimt, den ich noch beſitze. Die Jaune Bicolorefarbe iſt bekanntlich kapuzinerrot auf kapuzinergelbem Grunde, die einzige Farbe, die in ihrer Leuchtkraft noch nicht übertroffen iſt, wenn auch andere reichgefärbte Roſen ihr ziemlich nahe kommen. Doch der Sämling blühte rein gelb, alſo iſt Jaune Bicolore jedenfalls ein Naturſpiel von der alten Austrian Yellow (Gérard 1596), wie die R. lutea oder foetida auch heißt. Oft finde ich auch an einer Pflanze Blumen, deren eine Hälfte rot und die andere gelb gefärbt iſt, manchmal auch reingelbe Blumen. Daß es den Züchtern gelingen wird, die leidige Blattfallkrankheit hinweg zu züchten, iſt klar, denn unſere jetzigen Lutea-Hybriden beweiſen das. Allerdings haben ſie eine ſtarke Miſchung anderer Klaſſen in ihrem Blute, doch an Farbenſchönheit ſtehen ſie in ihrer Art einzig da, man denke nur an Sorten wie Adolf Koſchel, Wilhelm Kordes und andere Farbenwunder. Einige, wie Adolf Kärger, beſitzen faſt ganz Teehybriden-Charakter. Wie ich ſchon eingangs erwähnte, gibt es noch keine reinweiße Lutea-Hybride, auch noch keine dunkelrote. Ich beſitze einen Sämling, der wohl rot iſt, aber nicht dunkel, es iſt eine Kreuzung zwiſchen Princesse de Béarn und Mad. Edouard Herriot. Als Verſuchspflanze benutze ich gern die Princesse de Béarn; ſie iſt ja als Mutterroſe nicht einwandfrei, aber für mich doch ein guter Farbentopf, ſie vererbt recht gut ihre dunkle Farbe, die Sämlinge bläuen nicht.

Robert Türke.

Am Wege

Aus dem Pruhonitzer Verſuchsgarten

ROSA PRUHONICIANA. Wer im letzten Jahre den Pruhonitzer Vereinsgarten beſuchte, dem fiel im Juni gewiß gleich beim Eingang vom Parke aus hinter einer Gruppe herrlich leuchtend ziegelroter Primula Bullesiana ein etwa zwei Meter hoher, breitbuſchiger Wildroſenſtrauch auf, der von einer Fülle eigenartig roter Blüten überſät war. Dies war Rosa pruhoniciana, eine von Inſpektor Zeman erzogene Kreuzung zwiſchen Rosa Moyesii und der zarter gebauten R. Willmottiae. Die guten Eigenſchaften der Eltern ſind in dieſer Roſe glücklich vereinigt. Die Blütenfarbe entſpricht genau dem ſeltſamen glänzenden, an ſonnendurchglühten Wein erinnernden Rot der Moyesii, doch iſt die Blüte nur halb ſo groß. Im niedrigen Wuchs und der kleinen Belaubung zeigt ſich der Einfluß der Mutter, R. Willmottiae. Auch zur Fruchtzeit iſt ſie gleich dieſer ſehr reich mit Früchten behangen, die aber bei R. pruhoniciana ſchmuckvoller ſind als bei R. Willmottiae. So macht der gefällige, nicht wie bei R. Moyesii ſparrige Wuchs, verbunden mit reichem Blühen und völliger Winterhärte, dieſe Kreuzung zu einer der hübſcheſten und ausſichtreichſten Parkroſen.

EINE KOREANISCHE WILDROSE. Im Pruhonitzer Verſuchsgarten befindet ſich eine hübſche Roſe, die als Rosa spec. Korea geht und zurzeit noch nicht im Handel iſt, es aber bald ſein dürfte. Ihr Hauptvorzug iſt ihr reiches wunderbares Blühen. Der niedrige, etwa 1,25 Meter hohe Strauch iſt im Juni-Juli von zierlichen reinweißen Blüten ganz überzogen. Dieſe gleichen ſehr denen der echten R. multiflora, von der die Pruhonitzer Roſe wohl nur eine Form darſtellt. Auch ſie dürfte ſich wie R. multiflora im Park vorteilhaft verwenden laſſen. Ihre kleinen roten Früchte halten ſich bis tief in den Winter hinein.

W. K.

Gartenrundschau

NEUES AUS ALLER WELT

Jubiläums-Gartenbau-Ausstellung in Dresden

AM Freitag, den 23. April eröffnet die große Dresdner Gartenbauschau ihre Pforten. Bei der eifrigen Tätigkeit, die in den letzten Monaten entfaltet wurde, darf man hoffen, daß schon am Eröffnungstage alles in vollstem Schmuck prangen wird. Die erste Sonderschau, die bis 2. Mai dauert, zeigt Frühlingsblumen, unter denen naturgemäß Azaleen, Rhododendren und Camellien, neben mancherlei Treibpflanzen vorherrschen werden. Erwartungsvoll blicken alle, die sich nach einer großen deutschen Blumenschau sehnen und auf eine von künstlerischer Hand in neue Bahnen gelenkte Ausstellung hoffen, nach Dresden. Dort haben früher so bedeutsame Schauen stattgefunden, daß die Hoffnung nur zu berechtigt ist, daß auch die diesjährige etwas außerordentliches bieten wird. Wir brauchen das nach all den kleinen Versuchen der letzten Nachkriegsjahre, die uns immer nur bruchstückweise zeigen konnten, wie es jetzt um unseren Gartenbau steht. Neben der Pflanzenerzeugung und Pflanzenverwendung werden auch die Wissenschaft und die Technik stark zu Worte kommen. Beide Gebiete sind heute für den rationellen Gartenbau ganz besonders wichtig. Möge sich vom »grünen Dom«, der zwischen den alten Eichen des großen Garten aufragt, allezeit ein prächtiger Ausblick auf reiche Blumenpracht und frohe Besucherscharen, die sie bewundern, ergeben. Strömt nach Dresden, Ihr Gärtner und Gartenfreunde!

Die fünfzig besten Steingartenpflanzen

EIN ausgezeichneter Pflanzenkenner, R. Lloyd Praeger, versucht in *The Garden* (no 2828/29) eine Auswahl der fünfzig besten Pflanzen für Steingarten und Alpinum zu geben. Er hält es mit Recht für nötig, zwei Listen aufzustellen. Die eine ist für den Liebhaber bestimmt, dem es in erster Linie darauf ankommt, farbige Wirkungen zu erzielen. Die andere Liste enthält solche Arten, die der erfahrene Freund seltener Pflanzen in seinem Alpinum haben möchte. Wenn nun auch die von Praeger gegebene Auswahl sich auf englische Verhältnisse bezieht, so lehrt doch namentlich die erste Liste, die wir zunächst allein geben, was dort für Massenverwendung im Steingarten am meisten geschätzt wird. Freilich ist auch hier sehr im Auge zu behalten, daß jede solche Auswahl ganz subjektiv ist. Sie kann aber als Grundliste dienen. Die Gattungen werden in alphabetischer Folge gegeben: Arabis albida und var. fl. pl., Alyssum saxatile und var. citrinum, Aubrietia nach Wahl, Armeria, besonders plantaginea und maritima Laucheana, Achillea, solche wie moschata und umbellata, Arenaria montana und balearica, Androsace lanuginosa und sarmentosa, Acaena, kleine Formen wie Novae Zealandiae, Anemone nemorosa var. Robinsoniana, Campanula, solche wie garganica und var. hirsuta, Portenschlagiana, pusilla und rotundifolia-Formen, Coronilla cappadocica, Dianthus, wie caesius, petraeus, plumarius, suavis und Varietäten, Dryas octopetala, Erodium Manescavii, trichomanaefolium, macradenum und andere, Geum montanum, Globularia cordifolia, Horminum pyrenaicum, Hypericum reptans, olympicum und andere, Oxalis rosea, Phlox subulata-Formen, Saxifraga: rote, rosa und weiße Moosformen, silberige wie Cotyledon und Aizoon, die üppigsten Kabschias, wie apiculata und var. alba, sowie sancta, umbrosa var. primuloides, Andrewsii und eine Bergenia oder zwei, Sedum, eine Auswahl, wie etwa Ewersii, populifolium, sexangulare, purpureum, spurium splendens, roseum, Ellacombianum, kamtschaticum, stoloniferum, Sempervivum in verschiedenen Arten, wie arachnoideum, hirtum, ciliosum, calcareum, Thymus Serpyllum var. coccineum und var. album, Veronica prostrata, filiformis und einige der niedrigen strauchigen neuseeländischen Arten. Abgesehen von diesen letzten und einigen wenigen anderen Arten können alle diese Felsenpflanzen auch bei uns empfohlen werden.

Primula malacoides

WER diese Pflanze aus ihrer westindischen Heimat kennt, wo sie zuerst von Père Delavay in der Umgebung von Tali fu gefunden wurde, der blickt mit Staunen auf die Ergebnisse der Züchtungsversuche. Ist doch die Art erst seit 1908 in Kultur, und schon ist es gelungen, aus den unscheinbaren Formen der Heimat, die dort an Reisfeldrändern, am Wege und auch sonst an den mannigfachsten Orten unkrautartig sich breit machen, solche zu gewinnen, die den hochgezüchteten P. obconica fast den Rang streitig zu machen beginnen. Eine der letzten Neuheiten aus diesem Formenkreise ist die englische Varietät »Dwarf Eclipse« der bekannten Firma Sutton & Sons. Einem Bild in »The Gardener's Chronicle« vom 3. April nach zu urteilen, übertrifft sie an Blütenfülle alle bisherigen malacoides-Formen und liefert schöne gedrungene Topfpflanzen. Die Farbe wird als lebhaft mauvefarben mit kleinem orange Schlundring angegeben. So bietet diese Primel ein sehr schönes Beispiel für die Möglichkeit von Herauszüchtung hochveredelter Kulturformen aus unscheinbaren Wildnisanfängen.

Rosen für rauchige Industriegegenden

IM Missouri Botanical Garden in St. Louis, Nordamerika, hat man Versuche angestellt, welche Rosen gegen Rauch möglichst unempfindlich sind. Dieser Garten liegt nahe an Fabriken und Eisenbahnen, und es wurde festgestellt, daß gewisse Rosen nicht wachsen wollten. So beispielsweise Harison's Yellow und Persian Yellow, ebenso die schöne neue R. Hugonis. Folgende Sorten können jedoch für solche Lagen am ehesten empfohlen werden:
Teehybriden: Etoile de France, Florence Pemberton, Francis Scott Key, Gruß an Teplitz, La Toska, Lady Ursula, Mme. Jules Bouché, Mrs. Arthur Robert Waddell, Radiance, Souvenir de President Carnot. *Remontantrosen:* Baroness Rothschild, Captain Hayward, Clio, Frau Karl Druschki, Général Jacqueminot, Georg Arends, Mrs. John Laing, Mrs. R. G. Sharman-Crawford, Paul Neyron, Prince Camille de Rohan. *Rankrosen:* Aviateur Blériot, Christine Wright, Dorothy Perkins, Dr. W. van Fleet, Excelsa, Gardenia, Lady Gay, Paul's Scarlet Climber, Silver Moon, Tausendschön. *Rugosa:* Conrad Ferdinand Meyer, F. J. Grootendorst, Nova Zembla, Rugosa alba, Rugosa rubroplena. *Polyanthas:* Katharina Zeimet, Chlotilde Soupert, Marie Pavic, Miß Edith Cavell, Orleans.

Nordlandrosen

EIN baltischer Rosenfreund berichtet in der »Rosenzeitung des Vereins deutscher Rosenfreunde (Nr. 1)« über die folgenden in Dorpat ganz winterharten Parkrosen, die ohne Winterschutz eine Kälte bis zu 25 Grad Celsius vertragen. Er nennt an erster Stelle Persian Yellow, die Rosa foetida oder lutea var. Persiana, eine der Stammeltern unserer modernen Pernetrosen. Die zweite ist eine jener sehr nahe stehende Form, die Jaune Bicolor, die alte Kapuziner- oder Fuchsrose, R. foetida oder lutea var. bicolor, auch als R. punicea bekannt. Solange sie im Winter etwas geschützt wurde, wollte sie in Dorpat nicht blühen, erst als sie ganz schutzlos durch den Winter ging, hat sie in jedem Jahr überreich geblüht. Ein Zeichen, wie wohl auch die Winterkälte zum Ausreifen des Holzes beiträgt. Als dritte Form wird genannt Maiden's Blush, eine alte gallische Rose mit gefüllten, köstlich duftenden, zartrosa Blüten. Ferner erwies sich als ganz hart R. spinosissima oder pimpinellifolia und ihre Wildformen. Eine weitere alte weiße Gartenrose, die in den Gutsgärten des Baltikums häufig ist, konnte in ihrer Zugehörigkeit noch nicht ganz sicher gestellt werden. Vielleicht handelt es sich um die alte Rosa alba, deren Herkunft noch ungeklärt ist. *C. S.*

Neue Bücher

FESTSCHRIFT DER FLORA: Die aus Anlaß des hundertjährigen Bestehens der Sächsischen Gesellschaft für Botanik und Gartenbau in Dresden herausgegebene Festschrift, auf die wir bereits wiederholt hinwiesen, liegt in sehr schmucken Gewande vor. Der Herausgeber, Walter Dänhardt, hat es verstanden, nicht nur einen trefflichen und eingehenden Überblick über die geschichtliche Entwicklung der »Flora« zu geben, sondern auch den sonstigen Inhalt interessant und wechselreich zu gestalten. Heinrich Seidel, der Chef einer der ältesten Dresdner Firmen schreibt über Hundert Jahre Dresdner Sonderkulturen. Die dann folgenden Ausführungen seines Neffen, des Rhododendronzüchters in Grüngräbchen, hätte man etwas eingehender gewünscht. Über die geschichtliche Entwicklung der sächsischen Baumschulen spricht Paul Hauber. Auch der sächsische Obstbau und Weinbau werden behandelt, welch letzter hoffentlich wieder aufleben wird. Die botanische Entwicklung in Dresden kommt zu ihrem Rechte in einer Darstellung O. Drudes, der den jetzigen botanischen Garten geschaffen hat. Das Gartenleben in Pillnitz, wo die Höhere Staatslehranstalt und die staat-

Verſuchsanſtalt und Beiſpielsgärtnerei ſich befinden, wird gleichfalls geſchildert. Das die größten ſtaatlichen Gärten, wie der Große Garten, der Zwingergarten, der Palaisgarten, die Anlagen in Pillnitz, Moritzburg und Großſedlitz erwähnt werden, iſt ſelbſtverſtändlich. Daneben auch die ſtädtiſchen Anlagen Dresdens. Doch auch andere Beiträge ſind eingeſchaltet. So von Heinrich Sulze über den römiſchen Gärtner und ſein Werk, von Fr. Tobler aus Steppe und Wald Weſt-Uſambaras. So gibt das Buch ein gutes Spiegelbild der Tätigkeit der Flora, die ihre höchſte Blütezeit hatte, als Männer aus allen Kreiſen der Geſellſchaft ſich rege in ihr betätigten. Möge ihr ein fortſchrittsreicheres neues Jahrhundert beſchieden ſein.

KAKTEENSTAMMBAUM: Bei der regen Teilnahme, die heute weite Kreiſe der in vieler Hinſicht ſo eigenartigen Familie der Kaktusgewächſe entgegenbringen, darf eine ſoeben im Verlag von Guſtav Fiſcher, Jena, erſchienene Schrift auf das größte Intereſſe rechnen, worin kein Geringerer als *Alwin Berger* »Die Entwicklungslinien der Kakteen« ſtreng wiſſenſchaftlich unterſucht. Es iſt hier nicht der Ort, auf die Einzelheiten ſeiner Darlegungen einzugehen. Jeder aber, der es mit dem wiſſenſchaftlichen Studium dieſer Pflanzengruppe ernſt meint, wird durch dieſe Schrift auch in den phylogenetiſchen Werdegang der Kakteen eingeweiht werden, ſoweit die heutige Forſchung imſtande iſt, das über den erſten Urſprüngen dieſer Pflanzen lagernde Dunkel aufzuhellen. Der ernſte Kakteenfreund wird dann auch verſtehen, warum es notwendig iſt, die großen Sammelgattungen, wie vor allen Cereus in eine Reihe wohlgeſchiedener Gattungen aufzulöſen, wie dies in der Hauptſache durch Britton und Roſe in ihrem großen, leider ſehr ſchwer zugänglichen Werke »The Cactaceae« geſchehen iſt. In ihrem Urſprung haben die Kakteen, deren älteſte Glieder die Gruppen der Peireskien und Opuntien ſind, Beziehungen vornehmlich zu den Aizoaceen und insbeſondere zur Gattung Meſembryanthemum, von der G. Schwantes verſchiedenfach an dieſer Stelle geſprochen hat. Auch dieſe Gattung wird jetzt mit Recht in vieſe kleinere Genera zerlegt. Erſt dadurch läßt ſich ein guter Einblick in die Entwicklung gewinnen. Berger betont, daß ſeine Darlegungen noch nichts Endgültiges bieten können. Sie bedeuten aber einen wertvollen Fortſchritt in der Erkenntnis der Entwicklungsgeſchichte dieſer Familie und mithin auch in der Beurteilung ihrer wiſſenſchaftlichen Gliederung.

VOGELSCHUTZ: Soeben erſchien im Verlag von J. Neumann, Neudamm, das bekannte Buch von *Hans Freiherrn von Berlepſch,* »der geſamte Vogelſchutz ſeine Begründung und Ausführung auf wiſſenſchaftlicher, natürlicher Grundlage« in 11. Auflage. Dieſe iſt gegen die vor kaum zwei Jahren herausgegebene 10. nicht verändert. Es iſt erfreulich, daß dies ausgezeichnete Buch immer ſchneller weite Verbreitung findet. Jeder Beſitzer eines größeren Gartens und Parks ſollte es kennen und die Berlepſchen Lehren beherzigen.

KERAMISCHE GARTENPLASTIK. Im letzten Jahrgang zeigten wir auf Seite 48a einige Gartenplaſtiken von *Werner Gothein.* Dieſer hat in einer kleinen Schrift im Verlage der Toninduſtriezeitung, Berlin, »die Aufgaben der Keramik in der Gartenarchitektur« behandelt. Dieſe Anregungen eines Künſtlers, der Neuartiges zu bieten verſteht, ſind zu begrüßen, da es unſeren Gärten viel zu ſehr an plaſtiſchem Schmuck fehlt. Der eigenartige Farbenreiz dieſer Schöpfungen kommt auf unſeren Bildern gut zum Ausdruck.

DIE GARTENFLORA: Dieſe altbekannte deutſche Gartenbauzeitſchrift erſcheint jetzt in ihrem 75. Jahrgange. Sie iſt das älteſte der beſtehenden deutſchen Gartenblätter. Ihr Gründer war der um die Botanik wie den Gartenbau gleich hoch verdiente Profeſſor Eduard Regel. Er prägte ihr den Stempel ſeiner Perſönlichkeit auf und machte ſie zu einem Fachblatte, in dem Botanik und Gartenbau in glücklichem Verein zu Worte kamen. Nach Regels Tode zehrte ſie noch manches Jahr von dem Geiſte ihres Begründers, doch geriet ſie allmählich in ein anderes Fahrwaſſer. Es iſt daher mit großer Freude zu begrüßen, daß der jetzige Herausgeber Paul Kache wieder ähnliche Ziele anſtrebt, wie Regel. Die Zeitſchrift ſoll wieder ein Sammelpunkt gärtneriſch-botaniſcher Pflanzenkunde werden. Dann erfüllt ſie auch heute noch eine wichtige Miſſion auf dem Gebiete des Gartenbaues.

WOHNUNGSAUSGESTALTUNG: In dem ſchönen von *Alexander Koch,* Darmſtadt, herausgegebenen Bildbande »1000 Ideen zur künſtleriſchen Ausgeſtaltung der Wohnung« finden ſich auch einige Motive, die für den Garten von Wert ſind, wie Vorbilder für Eingänge, Keramiken, Pavillons, Brunnen und Baſſins. Auch ſonſt iſt es für den Gartengeſtalter nützlich, in ſolchen Büchern zu blättern, um zu ſehen, mit welcher Liebe und welchem Sachverſtändnis der Architekt arbeitet auf, daß auch im Garten ähnliches geſchehe. *C. S.*

Chronik

DIE früher ſo regen Beziehungen des deutſchen Gartenbaues zum engliſchen bahnen ſich jetzt wieder an. Als Beweis kann gelten, das ſoeben die *Royal Horticultural Society* in London, die führende Geſellſchaft des engliſchen Gartenbaues, auch einen Deutſchen, unſeren Mitherausgeber *Camillo Schneider,* zum *Ehrenmitgliede* ernannt hat. Eine perſönliche Fühlungnahme der führenden Kreiſe des Gartenbaues beider Länder iſt im beiderſeitigen Intereſſe nur zu begrüßen.

Zeitſchriften

BELGIEN

In no. 483 von *La Tribune Horticole* werden die Arten der Gattung Buddleja kurz behandelt. In no. 486 wird eine Überſicht über die Ziergehölze gegeben, die vom Dezember bis Februar in Mittel- und Nordweſtfrankreich durch Blüten oder ſonſtwie auffallen.

CZECHOSLOWAKEI

In den Januarheften 9 bis 10 des *Pritel Zahrad* finden ſich zahlreiche kurze Notizen über Blumen und Gehölze, ſowie Obſt- und Gemüſebau. Zwei Farbentafeln zeigen Apfelſorten.

DÄNEMARK

Im Januarheft der *Havekunſt* werden an der Hand guter Bilder Siedlungs-Gartenprobleme behandelt. Ferner das für Bepflanzungsfragen ſo wichtige Thema der Baumgeſtalt, des Kronenumriſſes und Durchmeſſers. Dieſe Ausführungen ſetzen ſich im Februar fort.

ENGLAND

Das Märzheft der *Orchid Review* enthält einige Bilder ſchöner Odontogloſſum criſpum-Varietäten: Duke of Montroſe, Leonard Perfect, Diana. Auch die wundervolle Braſſocattleya Mrs. Robert Paterſon, die aus Cattleya Trianae Upland's Var. und B. C. Digbyano-Moſſiae hervorging, wird abgebildet. – In no. 2832 von *The Garden* behandeln der Herausgeber und J. Mac Gregor das heikle Thema der Namengebung gärtneriſcher Formen. Wir geben die Ausführungen des letzten an anderer Stelle wieder. In einem Artikel über Primeln, der ſich ſpäter fortſetzt, werden ſolche Arten abgebildet wie Primula Reidii, P. ſuffruteſcens, P. Veitchii, P. Mooreana und P. conica. In no. 2834 beginnt der bekannte Gehölzkenner W. J. Bean eine Artikelreihe über Gehölze für Mauern. Ferner finden wir hier wichtige Gladiolennotizen. In no. 2835 werden in einem Roſenartikel die Sorten Sovereign, Florence M. Izzard und Angèle Pernet abgebildet. – Je weiter die Artikelreihe von N. J. Brown über Meſembryanthemum in *The Gardener's Chronicle* fortſchreitet, deſto mehr ſtaunt man über der Fülle des Intereſſanten und Neuen, was dieſer ausgezeichnete Forſcher bringt. In no. 2045 wird die neue Gattung Gibbaeum behandelt. Eine der intereſſanteſten neuen Orchideenhybriden iſt Vuylſtkeeara Melba, von Charlesworth. In einer der Fortſetzungen ſeiner Reiſeſchilderungen gibt in no. 2046 F. Kingdon Ward eine Auswahl der von ihm jüngſt gefundenen Gehölze, die er für die Gärten am beſten hält. Sie ſind noch nicht endgiltig benannt. Von großem Intereſſe ſind immer Schilderungen von Beſant aus Glasnevin. Die Tafel in no. 2047 zeigt eine der ſchönſten Cymbidium-Hybriden, C. Flamingo vor. roſeum. Der Leitartikel behandelt die Verbreitung von Spartina Townſendii in Frankreich.

FRANKREICH

Im Märzheft der *Revue Horticole* wird die Tätigkeit von Jean de La Quintine, des berühmten Gärtner Ludwig XIV, zur Feier ſeines 300 jährigen Geburtstages geſchildert; er lebte von 1626–1688. Die Farbentafel zeigt die Pernetroſen Ville de Paris und Gooiland Beauty. Die letzte wurde in Holland aus Sunburſt mit Golden Emblem gezogen, man kann ſich aber auf Grund des Bildes kein Urteil bilden.

HOLLAND

No. 35 von *Onze Tuinen* beginnt mit einem intereſſanten Orchideenartikel. In no. 36 ſetzt F. A. Hanſen ſeine Betrachtungen über Gehölzſchnitt fort. Das nächſte Heft hat einen Aufſatz über Schattenpflanzen. Auch die *Floralia* führt die Artikelreihe von Bleeker über Gehölzſchnitt fort in no. 7 und den folgenden, wobei in no. 8 eine alphabetiſche Liſte beginnt. Die Farbentafel in no. 8 zeigt Buddleja variabilis var. Veitchiana. No. 9 iſt eine Gehölzſondernummer.

NORDAMERIKA

In no. 1 des 7. Bandes des *Journal of the Arnold Arboretum* bringt zunächſt C. S. Sargent eine Aufzählung der Änderungen und Zuſätze in der Neuausgabe ſeines Manual of the Trees of North America. Dann ſetzt A. Rehder ſeine Aufzählung neuer Formen von Gehölzen fort. E. H. Wilſon beſpricht die Taxaceen und Koniferen von Yunnan. – Eine Notiz in no. 4 von *The Horticulture* zeigt, daß auch in Amerika die Kakteenliebhaberei langſam Fuß zu faſſen beginnt. No. 5 enthält eine Notiz von Correvon über die Anzucht von Alpinen, die in der neuen Welt auch noch nicht allgemein geſchätzt werden. – Im Februarheft von *The Gardener's Chronicle of America* wird über Roſen in England geſprochen. Ferner über Einjahrsblumen aus der Neuen Welt, die wir in den Gärten der Alten verwenden. *C. S.*

VERLAG DER GARTENSCHÖNHEIT G. m. b. H. in Berlin-Weſtend / Verantwortlich für die Schriftleitung OSKAR KÜHL in Berlin-Weſtend, für den Anzeigenteil DOROTHEA KLETT, Berlin-Lichterfelde / Druck von W. SOMMER, Buch- und Kunſtdruckerei in Berlin-Schöneberg.

Sammelmappe

ZIERPFLANZENBENENNUNG

ÜBER dies wichtige Thema schreibt J. Mac Gregor in *The Garden* in sehr anregender Weise folgendes: Man muß sich mit Recht wundern, wie irgend jemand die Namen behalten kann, die den mannigfaltigen Varietäten von Rosen, Chrysanthemen, Stiefmütterchen, Dahlien, überhaupt allen gärtnerischen Zierblumen erteilt werden. Wahrscheinlich kann es niemand. Diese Namen bilden solch monotone Liste. Der ganze Zweck der Namengebung dient nicht nur der Bezeichnung, sonst würde jeder Name so gut wie jede Nummer genügen. Was gewünscht wird, ist daß wir imstande sein sollen, schnell und leicht mit Hilfe des Namens zwischen bestimmten Sorten zu unterscheiden. Wenn von einer Blume Formen in größerer Zahl, ja selbst zu Hunderten existieren, so kann eine Konfusion nicht verhütet werden, falls die individuellen Namen nicht durchaus verschiedenartig im Charakter sind. Nur ein ganz außerordentliches Gedächtnis kann sich daran erinnern, welcher Name eine gewisse Varietät bezeichnet, wenn alle Varietäten Personennamen tragen. Die meisten von uns werden dann zum Notizbuche greifen müssen. Der Gebrauch von Personennamen ist besonders dann ungeschickt, wenn verschiedene Sorten so benannt sind, daß der Unterschied nur im Vornamen liegt.

Nicht der Personenname als solcher ist es, gegen den ich mich wende, sondern der übermäßige Gebrauch solcher. Die gleiche Unwirksamkeit ergibt sich bei wie immer gearteten Namen, wenn sie Glieder einer Reihe sind. Allwoodiis beispielsweise sind unangemessen benannt. Es mag gut sein, eine Form Rufus zu nennen, aber wenn noch andere all die Vornamen im christlichen Kalender tragen — Mary, Betty, Harold, Dorothy und so weiter — so sind wohl die Varietäten benannt, aber sie sind untereinander nicht genügend gekennzeichnet. Man vergißt, ob es Betty ist, die weiß ist, oder Harold. Wie verschieden ist es, wenn die weiße etwa Bleichgesicht heißt, und

W. KORDES' SÖHNE

ROSEN

FÜR PARK UND GARTEN IN ALLEN FORMEN UND VIELEN SORTEN EINSCHLIESSLICH NEUHEITEN

ROSEN

SPARRIESHOOP / HOLSTEIN

ROSEN

niedrige und hochstämmige

Rhododendron, Taxus, Clematis, Glycinen usw. :: Wildlinge, Obstbäume, Beerensträucher, Heckenpflanzen

Ausführliches Preisverzeichnis auf Wunsch frei zu Diensten

FIRMA C. VOIGT
UETERSEN-M. IN HOLSTEIN

Jahresschau Dresden 1926

Jubiläums-Gartenbau-Ausstellung

23. April bis Anfang Oktober 1926

Dauerausstellung:

Pflanzen-Erzeugung — Wissenschaft
Pflanzen-Verwendung — Industrie und Technik

Sonderschauen:

23. 4.—2. 5.: Die Frühjahrsblumen-Eröffnungsschau
11. 6.—14. 6.: Erste Blumenschmuck- mit Raumkunst-Ausstellung
10. 7.—13. 7.: Erste Rosenschau, Kirschen-, Frühobst- und Frühgemüseschau
7. 8.—10. 8.: Sommerblumen- und Liebhaberschau
3. 9.—6. 9.: Herbstblumenschau, zweite Blumenschmuck- und Raumkunst-Ausstellung
7. 10.—10. 10.: Obst-, Gemüse- und Chrysanthemumschau

! KONIFEREN

Wüchsige **Jungware** sowie gut geformte **Ballenpflanzen** in reichster Sortenwahl.

Verlangen Sie kostenlos Sonderangebot!

HERM · A · HESSE
BAUMSCHULEN · WEENER/EMS

Levkojen

sind seit **1836** die weltberühmte Spezialität meines Hauses

Preisliste und Kulturanweisung auf Wunsch umsonst und postfrei

PAUL TEICHER
STRIEGAU/SCHLESIEN
SAMENZUCHT / GROSSGÄRTNEREI

Beton-Gartenvasen

liefert

Albert Kretzschmar
Charlottenburg 4
Schillerstraße 22
Fernsprecher: Steinplatz 1752

Schnitt-, Schmuck- und Felsenstauden

Heidekräuter, Freilandfarne
Moorbeetsträucher, alpine Gehölze

Georg Arends
Ronsdorf bei Elberfeld
Preisliste auf Anfrage

GARTENPLASTIK

Figuren / Vasen / Brunnen / Säulen / Blumenschalen / Bänke / Tische / Sonnenuhren.

HERMANN TOCHTERMANN
BERLIN - MARIENDORF
Eisenacher Straße 16. :: Telephon: Südring 333.

GARTENGESTALTUNG
J. SCHWEIZER, GLARUS

Kakteen und Sukkulenten

Spezial - Kultur

ADOLPH HAHN
BERLIN-LICHTERFELDE-SÜD
Feldstraße 1 / Fernsprecher: Lichterfelde 2539

empfiehlt sein reichhaltiges Sortiment.

Preisliste auf Wunsch kostenfrei.

eine satt rosafarbene als rosa Morgendämmerung bezeichnet wird. Wir finden vielleicht Moseley Perfection originell, aber dann werden weitere Bezeichnungen wie Porlock Perfection oder Paisley Perfection wertlos. Weiße Dame ist brauchbar, wenn dann aber totsicher Weiße Gräfin, Weiße Königin, Weißer Sklave, Weiße Nonne folgen, so verliert der erste Name seinen Wert. Es gibt zu viele Edelsteine, Sterne, Bräute, Embleme, Könige und Königinnen in der Namengebung der Floristen. Warum soll man immer auf den gleichen abgedroschenen Metaphern bestehen? Wir können doch andere Namen für weiße Blumen haben, als solche, die hinweisen auf ihre Aehnlichkeit mit Schnee — Schneekönigin, Schneegestöber, Schneeflocke, Schneeball und Boule de Neige. Dasselbe gilt für gelbe Formen. Wir haben zu viele Hinweise auf Gold, die Sonne und den Kanarienvogel.

Was ist dann aber, mag man fragen, ein guter und ausreichender Name für eine neue Sorte einer Blume, deren Varietäten zahlreich sind? Zu allererst, Originalität muß sein. Der Name soll für sich selbst stehen, nicht Glied einer Reihe sein. Dies ist ein sine qua non.

Abgesehen davon, gibt es vielleicht nur noch eine andere Hauptbedingung, was auch sonst wünschenswert sein mag, und die ist, daß der Name sich leicht behalten läßt. Aus einem Rosenkataloge alter und neuer Sorten kann man wohl folgende Namen als leicht merkbar und dabei sehr bezeichnend anführen: Hebe's Lip, The Garland, Rambling Rector, Modesty, Noblesse, Austrian Copper, Village Maid, Colleen, La Tosca, Autumn Tints, Bardou Job, Lady Gay, Janet's Pride, My Sweetheart, Maiden's Blush, York and Lancaster, Independence Day, Crusader, Swiss Boy, Rosa Mundi, Glowworm,

Apothecary's Rose, Nova Zembla und Magna Charta. Wer je einmal von der Rose Spineless Virgin (Schwache Jungfer) gehört hat, kann hoffen den Namen zu vergessen? Ein Name ist vortrefflich, wenn er einem leicht einfällt.
Aber weshalb haftet ein Name leicht im Gedächtnis? Hier betreten wir ein schwieriges Gebiet und können keine endgültige Antwort geben. Natürlicherweise ist jeder einzigartige Name gut merkbar, wie etwa 2LO, Brigthest und Best, Cottager's Scarlet. Doch das ist nicht immer der Fall. Es gibt aber, abgesehen von dieser Seite der Frage, zwei Namentypen, die zur Kategorie der leicht merkbaren gehören. In erster Linie der beschreibende Name. Wenn gut gewählt, ist dieser von Dauer und läßt sich nicht vergessen. Der Anblick der Blume ruft uns sofort den Namen zurück; Beispiele sind Namen wie Wolkenblau und Feuerflamme. Der andere Typ ist der bizarre und zuweilen weithergeholte. Gerade seine Wunderlichkeit fixiert ihn, wie im Fall der Spineless Virgin. Mit solchen Namen hadert man nicht, solange sie nicht hoffnungslos grotesk sind; da aber gärtnernde Brüderschaft alle Volksklassen einschließt, so sollte ein Name offenbar nicht zu schwierig sein. Eine einfache Bezeichnung wird weniger leicht als eine absonderliche oder geheimnisvolle volkstümlich werden. Man soll die Möglichkeit von Verballhornungen vermeiden, wie »Glory of John« für Gloire de Dijon, oder »Thursday Morning« für Desdemona.

HINWEIS. Der Aprilnummer liegt ein Prospekt der Verlagsbuchhandlung **Paul Parey**, Berlin, bei, der besonderer Beachtung empfohlen sei.

Ein Name mag zuweilen aus anderem Grunde Wert haben, nicht nur weil er treffend und nützlich ist. Es ist schon wertvoll, wenn es ein hübscher Name ist, der gut klingt oder etwas gut symbolisiert. Unsere Vorfahren erreichten Poesie in der Namengebung ihrer Garten- und Feldblumen. Sie haben uns solch unvergeßliche Namen überliefert wie Sweet William, love in-a-mist, Stern von Bethlehem, Schnee-im-Sommer, Mönchskappe, ragged robin, love-lies-bleeding, des Reisenden Freude, Frauenhemd, London pride, sea holly, Vergißmeinnicht, lily of the valley und Salomons Siegel. Aber die Einbildungskraft, die solche Namen anregte, scheint heute zu fehlen. Man mag sie bis zu einem gewissen Grade bei den Narzissenzüchtern finden, die mehr als andere zuzeiten den Versuch zu machen scheinen, einer schönen Blume auch einen schönen Namen zu geben.

Unter irgend einem anderen Namen, sagt der Poet, mag die Blume eben so gut duften und so hübsch aussehen, er ist doch falsch. Für jede eindrucksfähige Person ist gerade der Name zu sehr ein Teil der Blume, als daß er ganz vernachlässigt werden dürfte. Ein guter Name mag allein keine mittelmäßige Blume verkaufen helfen und ein übler eine wertvolle Blume nicht für immer verdammen, aber doch wird der Name auch in dieser Hinsicht stark mitsprechen.

(Uebersetzt C. S.)

Koniferen / Nadelhölzer / Buxus / Immergrüne Gehölze

In allen Größen und Stärken in prima Ware. Beste Pflanzzeit April-Mai.

PREISABBAU vom Frühjahr 1925 zum Frühjahr 1926 20—50 Prozent.

Auszug aus meiner Preisliste. Bei Bedarf größerer Posten bitte Preise brieflich einfordern.

Wiederverkäufer und Großabnehmer erhalten Rabatt. • Bitte Preise einfordern!

	Höhe cm	1 St. ℳ	10 St. ℳ
Abies concolor (Kalif. Weißtanne)	60/80	19.—	180.—
	80/100	22.—	210.—
	100/125	28.—	260.—
	125/150	42.—	400.—
	150/175	51.—	490.—
Abies Nordmanniana (Nordmanns Tanne)	60/80	13.—	100.—
	80/100	15.—	120.—
Abies numidica	60/80	15.—	120.—
Abies pectinata (Edeltanne)	40/60	4.—	35.—
	60/80	5.—	45.—
Chamaecypar. Laws. Alumii	30/40	2.50	22.—
	60/70	6.—	57.—
	70/80	7.50	72.—
	80/90	9.—	85.—
	90/100	10.—	98.—
	110/120	12.—	116.—
	175/200	27.—	265.—
	200/225	35.—	—.—
Cham. Laws. Fraseri	60/80	6.—	57.—
	175/200	27.—	265.—
Cham. Laws. Tr. de Boskoop	80/100	10.—	98.—
	100/120	15.—	145.—
Cham. obtusa nana, zierliche Zwergform	50/60	14.—	130.—
	60/70	15.—	140.—
Cham. pisifera aurea	30/50	2.25	20.—
	50/60	3.50	30.—
Cham. pisifera plumosa	40/60	3.50	32.—
Buxus zur Einfassung pro lfd. Meter 0.70 ℳ, pro 100 Meter 60.— ℳ			
Buxus-Büsche	40/50	5.—	40.—
	50/60	7.—	60.—
	60/70	9.—	80.—
	100/120	13.—	110.—
	120/140	15.—	130.—
Buxus-Pyramiden	70/80	9.—	80.—
	80/90	10.—	90.—
	90/100	11.—	100.—
	100/120	14.	130.—
	120/130	17.—	150.—
	130/140	20.—	180.—
Buxus-Kugeln	25/30	6.—	50.—
	30/35	7.—	60.—
	35/40	9.—	80.—
	40/50	12.—	100.—
Buxus japonica aurea gelbbunt, kugelartig	25/30	5.—	45.—
	30/40	7.—	65.—
Buxus-Würfel	35/40	8.—	70.—
Buxus-Kronenbäumchen	30/40	6.—	50.—
	40/50	7.—	60.—
	60/70	10.—	90.—
Buxus-Spiralen	80/90	17.—	160.—
	100/120	20.—	180.—
Buxus-Kreuze	35/40	15.—	—.—
	40/45	19.—	—.—
Ilex, grün	80/100	12.—	110.—
Juniperus hib. erecta (Säulenwacholder)	50/60	7.50	73.—
	60/70	8.75	85.—
	70/80	12.—	110.—
Juniperus repens, schönste Zwergform, breit	35/45	14.—	132.—
Juniperus sabina	35/45	7.50	72.—
Picea pung., grün	60/80	4.50	40.—
Picea pung., gl. Kosteri (tiefblaue Färbung)	40/50	11.—	100.—
	50/60	13.—	120.—
	60/70	16.—	150.—
	70/80	20.—	190.—
	80/90	27.—	260.—
Pinus montana (Zwergkiefer, breit)	40/50	6.—	55.—
	100/120	13.—	120.—
	120/150	14.—	125.—
Pseudotsuga Douglasi u. glauca (Douglastanne)	100/120	11.—	100.—
	120/140	14.—	130.—
	150/170	19.—	175.—
Taxus bacc., Eibe o. B.	25/40	2.50	20.—
m. B.	60/70	9.—	80.—
	70/80	10.—	90.—
	80/100	11.—	100.—
	100/120	14.—	120.—
	120/140	19.—	180.—
	150/175	27.—	250.—
Taxus bacc. erecta	60/80	9.—	80.—
Taxus hib. fastig. (Säulentaxus)	60/80	11.—	100.—
	80/100	14.—	130.—
	100/120	16.—	150.—
Taxus hib. fastig. aurea (gelbbunter Taxus)	40/60	6.—	55.—
	80/100	14.—	130.—
Thuja occid. Lebensbaum	60/80	3.—	25.—
	80/100	4.50	40.—
	100/120	5.—	45.—
	120/140	7.—	60.—
	140/160	11.—	95.—
	200/250	22.—	200.—
Thuja occ. fastig. (columna), auch im Winter grünbl., schönster Pyramiden-Thuja, auch für Hecken geeignet.	60/80	5.—	45.—
	80/100	7.—	65.—
	100/120	10.—	90.—
Thuja occ. gigant. aurea	60/80	5.—	45.—
	80/100	6.—	50.—
Thuja occ. Rosenthali dunkelgrüne Säulenf.	40/60	4.—	30.—
	60/80	5.—	40.—
	80/100	7.—	60.—
Tsuga canad. Hemlockst.	80/100	12.—	110.—
	100/120	16.—	150.—
	140/160	23.—	210.—

Picea excelsa 4 jähr. verpfl. 20/45 cm 10 St. 0.50 ℳ 100 St. 3.50 ℳ

Azalea und Rhododendron

	Höhe cm	1 St. ℳ	10 St. ℳ
Azalea mollis u. van Tol (mit vielen Knospen, winterhart	30/40	4.50	40.—
	40/50	5.—	45.—
Azalea pontica (winterhart i. versch. Farben, Pyramiden mit vielen Knospen)	90/120	22.—	200.—
Rhododendron Catawb. (winterhart m. v. Knospen, lila blühend)	35/40	5.50	50.—
	50/60	7.—	65.—
	60/70	9.—	82.—
	80/100	19.—	180.—
Rhododendron Hybr.	30/40	6.—	55.—
	80/90	20.—	190.—
	90/100	25.—	230.—
	100/120	35.—	320.—

Große Schaupflanzen Preise auf Wunsch.

Rosen

aus kühlen Einschlägen, Ueberwinterungsräumen zirka 4000 qm Grundfläche

auf Canina-Sämlingstämme, in Sorten meiner Wahl, mit vorzüglicher Bewurzelung, in strengster Qualitätssortierung.

	Höhe cm	1 St. ℳ	10 St. ℳ
Rosen-H. I. Wahl	100/140	4.—	36.—
" " "	120/140	4.50	40.—
" " "	75/100	2.75	25.—
Trauerrosen u. Niel 1. Wahl	120/140	4.70	43.—
	140/160	5.50	50.—

mittlere W. 20 %, 2. W. 40 % billiger.

10 niedrige Remontant- und Teehybriden, beste Sorten in allen Farben, 1. Wahl 6.—

25 niedrige Remontant und Teehybriden in besten Sorten und allen Farben, 1. Wahl 15.—

10 niedrige Polyantha-Rosen, 1. Wahl 8.—

10 Schlingrosen in drei Sorten meiner Wahl, 1. Wahl 7,—

10 Schlingrosen in fünf Sorten meiner Wahl, 1. Wahl 8.—

mittlere 25 %, 2. W. 50 % billiger.

Aus kühlen Einschlägen zurückgehaltene Obst- und andere Baumschulartikel.

Obstbäume

	1 St. ℳ	10 St. ℳ
Apfel-H., 1. Wahl	4.—	36.—
Birnen-H., 1. Wahl	4.30	39.—
Kirschen-H., 1. Wahl	3.50	32.—
Pflaumen- und Zwetschen-H. 1.	5.—	48.—
Walnuß-H., 1. Wahl	4.50	40.—
Apfel-Halbst., 1. Wahl	2.75	25.—
Pflaumen- und Zwetschenhalbstämme, 1. Wahl	3.80	34.—

Buschobst, Pyramiden, Spaliere, Fächer, schöne Bäume in allen Größen und Preislagen. Beerenobst in allen Preislagen.

Allee-Bäume in allen Arten

Trauerbäume

		1 St.	10 St.
Betula alba pend. youngii (Trauerbirke)		20-23	—
Fraxinus excels. pend. (Traueresche)		6.—	55.—

Schlingpflanzen

		1 St.	10 St.
Ampelopsis quinquef., extra lang 2/3 Ranken		—.40	3.50
Ampel. Engelmanni, extra lang 6/8 Ranken		1.—	9.—
extra lang 3/5 Ranken		—.75	6.—
Vitis Veitchi, selbstkl. wilder Wein, efeuartig, 1. W.		1.—	9.—
Aristol. Sipho, großblättr. Pfeifenwinde, 1. W.		5.50	50.—
	m. W.	4.50	40.—
Clematis veredelt, großblumig inkl. Jackmanni, 1. W.		3.50	30.—
	m. W.	2.75	25.—
Hedera helix, Efeu, großbl. a. d. fr. Lande	150/180	2.50	20.—
	80/120	—.90	8.—
großbl. in Töpfen	80/100	1.50	14.—
Polyganum baldschuanicum, Knöterich, 4 m hoher Schlingstrauch, 1. W.		4.50	40.—
Wistaria chinensis Glycine blaublühend	1. W.	4.50	40.—
	m. W.	4.—	35.—
Ziergehölze in allen Art.	1. W.	—.75	6.50

Heckenpflanzen in allen Arten, Stauden reiche Auswahl, man verlange Preisangebot.

Dahlien in allen Arten, man verlange Preisliste.

Zum Besuche lade ein. • Gleichzeitig auch zum Besuche der JUBILÄUMS-GARTENBAU-AUSSTELLUNG, Dresden. • Großer eigener Sondergarten. Zugang von der Herkules-Allee.

Baum- u. Rosenschulen VICTOR TESCHENDORFF, Cossebaude-Dresden

Gartenschönheit

eine Zeitschrift mit Bildern

für Garten- und Blumenfreund · für Liebhaber und Fachmann

Mai 1926

in Gemeinschaft mit Karl Foerster und Camillo Schneider

herausgegeben von · Oskar Kühl

Verlag der Gartenschönheit G.m.b.H. Berlin-Westend

7. JAHR / HEFT 5 MAI 1926

GARTENSCHÖNHEIT

eine Zeitschrift mit Bildern für Garten- und Blumenfreund für Liebhaber und Fachmann in Gemeinschaft mit Karl Foerster und Camillo Schneider herausgegeben von Oskar Kühl

Inhalt des Maiheftes:

Seite

Schmuckanlage am Poelzig-Brunnen / Bild 113
Camillo Schneider / Dresdens Gartenbau-Ausstellung / Mit 12 Bildern und Zeichnung 113
E. Nußbaumer und Friedrich Bauer / Iris der Gruppen Regelia und Oncocyclus / Mit 5 Bildern . . . 120
Camillo Schneider / Neue Rhododendron-Wildarten / Mit 5 Bildern . . . 123
Rudolf Bergfeld / Haus und Garten / Mit 3 Bildern . . . 125
Georg Lenz / Keramische Gartenplastiken / Mit 5 Bildern . . . 127
A. J. van Laren / Pflanzen und Gärten in Algerien . . . 129

Aus dem Blumengarten der Literatur
Frühlingslieder der Vaganten . . . 129

Gartenaufgaben
Harry Maaß / Ziegelsteinplastik / Bild und Zeichnung . . . 131
Th. Hoog jr. / Eremurus / Mit Bild . . . 132

GARTENARBEIT UND BLUMENPFLEGE
C. R. Jelitto / Primel-Erfahrungen: I. Arten für Staudengarten und Park . . . 133
Paul Kache / Rosenpflege im Sommer . . . 135
Henry B. Goodwin / Abfall und Dünger / Mit Bild . . . 136

Bepflanzungspläne
Kurt Pöthig / Schattenrabatte / Mit Zeichnung . . . 137

Auf dem Balkon
H. Gehringer / Im Mai. . . . 138

Am Wege
Dr. Liebnitz / Kakteen am Fenster . . . 138

GARTENRUNDSCHAU

Neues aus aller Welt
Neue großblumige Canna / Eine Rosa Hugonis-Hybride / Meconopsis-Kultur . . 139

Neue Bücher
Allgemeines Gartenbuch / Amerikanisches Rosenjahrbuch 1926 / Gartenblumen / Die Kakteen / Pillnitz / Schädlingsbekämpfung 140

Zeitschriften . . . 140

BILDBEILAGE
Glycine, Wistaria multijuga im Botanischen Garten zu Dahlem

FARBIGE BILDBEILAGEN
Zwergelfenbeinginster / Azalee Brillant Red Darwintulpe Raphael / Regeliocyclus-Iris Artemis und Baucis

Monatlich ein Heft

Bezugspreis für das Vierteljahr
in *Deutschland* 4 G.-M. und 0.75 G.-M. Versandkosten (Postscheckkonto Berlin 76290), im *Ausland* einschließlich Versandkosten: 5.25 Goldmark = 1,25 U.S.A.-$ oder entsprechend in der Landeswährung.

Preis des Einzelheftes
1.50 Goldmark zuzüglich Versandkosten

Verlag der Gartenschönheit G.m.b.H.
Berlin-Westend / Akazien-Allee 14.

Gegen Ende April erblüht der Zwergelstenbeinginster Cytisus Kewensis, an dieser Südlehne oft schon früher. Das blasse Gelb links oben ist Alyssum saxatile citrinum, das Orangerotbraun gehört der sibirischen Erdwurz, Geum sibiricum, an. Die Treppe links ist mit Potentilla chrysocraspeda besetzt. Das Weiß rechts oben unter dem rotbraunen Zwergahorn ist Achillea macedonica. Rechts daneben steht Alyssum saxatile flore pleno. – Bild K. F.

Unter den vielen Azaleenformen, die im vorigen Frühjahr in Haarlem gezeigt wurden, war die von M. Koster & Zonen aus Boskoop ausgestellte Sorte Kosters Brillant Red vielleicht die leuchtendste. – Bild I. Blok

Die große Schmuckanlage am Poelzig-Brunnen *Im Mai*

C. SCHNEIDER / DRESDENS GARTENBAU-AUSSTELLUNG

DRESDENS großer Ruf als Gartenstadt ist nicht zuletzt begründet worden durch seine Gartenbau-Ausstellungen großen Stils. Das was auf diesen in den Jahren 1887, 1896 und 1907 gezeigt wurde, gehörte zu den bedeutsamsten Darbietungen des deutschen Gartenbaues. So sahen Gärtner und Gartenfreunde auch der Jubiläums-Ausstellung mit großen Erwartungen entgegen. Konnten aber die früheren Ausstellungen emporwachsen aus einem blühenden Gartenbauleben, so lagerten über dieser neuen Schau noch immer die Schatten des Weltkrieges mit seinen für die gesamte deutsche Volkswirtschaft so unheilvollen Folgen. Der Gartenbau hat schwerste Krisenjahre hinter sich und beginnt eben erst, sich ein wenig zu erholen. Würde es ihm möglich sein, schon jetzt wieder zu bekunden, daß er noch immer gedeiht?
Als die Ausstellung anläßlich des hundertjährigen Jubiläums der Gesellschaft Flora geplant wurde, war man sich in den maßgebenden Kreisen sicherlich der Schwierigkeit bewußt, diese Schau auf das kulturtechnische Niveau der vorhergegangenen zu bringen. Man hat deshalb mit vollem Recht etwas andere Richtlinien aufgestellt. Die Frage des künstlerischen Aufbaues trat in den Vordergrund. Man wußte, daß bei aller Opferwilligkeit und allem Arbeitsmut der deutsche Gartenbau nicht mehr wie früher in der Qualität seiner Erzeugnisse mit dem begünstigten Auslande, wie England oder Holland, wetteifern könnte. Allein diese beiden so hochstehenden Zentren der Gartenbaukultur haben bisher noch nicht vermocht, Ausstellungen zu bieten, in denen ein großzügiger künstlerischer Aufbau in Erscheinung trat.
Daher suchte die Ausstellungs-Leitung zunächst durch einen Wettbewerb einen Plan und eine Persönlichkeit zu gewinnen, durch die ein künstlerischer Ausbau gesichert wurde. Aus diesem Wettbewerb ging Gartenarchitekt *Gustav Allinger* im Verein mit Architekt Joseph Wentzler mit seinen Vorschlägen als erster Preisträger hervor. Er wurde zum gartenkünstlerischen Berater der Jubiläums-Ausstellung gewählt. Diese Tatsache ist für die Schau von ausschlaggebender Bedeutung. Zum ersten Male wurde hier einem Gartenkünstler Gelegenheit geboten, eine solche Ausstellung in großzügiger Weise zu gestalten. Allinger hat treffliche Mitarbeiter gefunden. So entstand ein von einem künstlerischen Persönlichkeitswillen durchpulster Ausstellungsorganismus, wie er bisher weder in Deutschland noch im Auslande ins Leben gerufen worden ist.
Dresden besitzt seit dreißig Jahren in seinem Ausstellungspalast mit dem Gelände für die Jahresschauen, in deren Rahmen auch die Gartenbau-Ausstellung fällt, ein sehr günstig gelegenes Ausstellungsterrain. Dies ist aber für eine große, lange dauernde Gartenbauschau viel zu klein. Es konnte jedoch durch Einbeziehung angrenzender Teile des Großen Gartens erheblich erweitert werden, sodaß die Ausstellung eine Fläche von nicht weniger als 30 Hektar umfaßt. Diese Möglichkeit, einen alten Park zu benutzen, hat zunächst etwas Bestechendes. Allein sie bringt auch viel Erschwerendes mit sich, da der alte Baumbestand geschont werden mußte. Ganz besonders mißlich war hier in Dresden der Umstand, daß zwei mächtige Alleen, die Herkules-Allee und die Haupt-Allee, wie der Plan zeigt, das Gelände am Ausstellungspalast von den großen Flächen trennen, die sich südlich der Hauptallee und bis zum Zoologischen Garten erstrecken. Auch die Tatsache, daß der Ausstellungspalast in seinem architektonischen Aufbau unserem heutigen Kunstempfinden in keiner Weise entspricht und an sich in seinen Massen ungünstig entwickelt ist, bildet ein schweres Hemmnis für eine großzügige moderne Lösung des Ausstellungsgedankens. Diese Nachteile können durch die Vorzüge, die sich aus der Verwendung der Parkflächen mit ihrem wundervollen alten Baumbestande ergeben, nicht ausgeglichen werden. Der Gartengestalter sah sich hier also vor Tatsachen gestellt, die eine einheitliche einwandfreie Durchführung der Aufteilung der Ausstellungsfläche unmöglich machten. Daß es ihm trotzdem geglückt ist, große räumliche Wirkungen zu erzielen, verdient doppelte Anerkennung. Auf dem Plane erscheint so manches einheitlicher, als es in der Tat möglich ist. Beispielsweise kann die Verbindung vom Hauptgebäude zum grünen Dom, also die Nordost-Südwest-Achse, die die alten Parkalleen senkrecht schneidet, in Wirklichkeit so gut wie nicht in Erscheinung treten.
Der *Grüne Dom* ist der Mittelpunkt der Ausstellung. Von ihm strahlt der belebende Rhythmus aus. Die große Achse nach Südosten mit dem Rosenhof als Abschluß und die kleinere nach Südwesten mit der geschickt gefaßten Ulme als Blickpunkt am Ende des Ritterspornparterres bilden für die künstlerische Gestaltung entscheidende Momente. Alles andere sind Einzelheiten, an sich oft sehr bedeutungsvoll, aber für die Gesamtwirkung kaum mitbestimmend.
Sofort beim Eintritt von der Lennéstraße lenkt die große Schmuckanlage am Poelzig-Brunnen, der von früher steht, in ihrer ungemein farbenprächtigen Frühjahrsbepflanzung aus Tulpen, Narzissen und Stiefmütterchen alle Blicke auf sich. Es war ein Farbenteppich aus Gold und leuchtendstem Rot mit eingesponnener Kontrastzeichnung gegen den Rand. Ein nachahmenswertes Beispiel für Stadtgartenverwaltungen. Auch die danebenliegende kleine Schmuckanlage wirkte gut.
Hier schließen sich nun im eigentlichen Ausstellungsraum die Hallen der wissenschaftlichen Abteilung sowie der Abteilungen für Gartenkunst, Technik und Industrie an. Am bemerkenswertesten erschienen uns die Einzelheiten der historischen Abteilung. Das, was in der Plan- und Mo-

Abſchnitt I

1 Die große Schmuckanlage
2 Die kleine Schmuckanlage
3 Der kleine Hausgarten
4 Der Gartenhof
5 Wiſſenſchaftliche Abteilung im Freien
6 Hausgarten am Ingolſtädter-Haus
7 Siedler-Garten
8 Städtiſcher Ausſtellungs-Palaſt
9 Neue Ausſtellungs-Hallen, Vergnügungspark, Planetarium
10 Verwaltungsgebäude

Abſchnitt II

11 Sondergarten mit Teehaus
12 Sondergarten Paul Hauber,
13 Sommer-Blumen-Rabatten der Sächſiſchen Samenzucht-Geſellſchaft
14 Sonder-Garten der Dresdner Gartengeſtalter
15 Sondergarten Teſchendorf
16 Heil- und Giftpflanzen-Garten
17 Gehölz-Garten Poſcharsky

Abſchnitt III

18 Sondergärten Ziegenbalg
19 Schulgärten
20 Ausſtellung von Baumſchul-Erzeugniſſen
21 Bienengarten
22 Formobſt-Garten Hauber
23 Gewächshaus-Abteilung
24 Gelände für Induſtrie
25 Obſtbaumanlage Stöckert
26 Kleingarten-Kolonie

Abſchnitt IV

27 Rhododendronweg
28 Brücke über die Hauptallee
29 Terraſſe am Grünen Dom
30 Der Grüne Dom
31 Der rieſengroße Roſengarten
32 Roſenhof mit Leuchtfontäne
33 Café-Reſtaurant und Pavillons am Roſenhof
34 Garten der Roſenfreundin
35 I. Garten der Roſenneuheiten
36 II. Garten der Roſenneuheiten
37 Farbenfelder der Dahlien
38 Garten des Dahlienfreundes
39 Garten zum blauen Ritterſporn
40 Farbenfelder der Einjahrsblumen
41 Eichenhof mit Architekturen
42 Parktheater und Theatergebäude
43 Der kommende Garten
44 Der Friedhof

dellſchau ſonſt geboten wird, zeigt die übliche Anordnung und erfordert ein langwieriges vergleichendes Studium, um dem Beſchauer einen Begriff der heutigen Tätigkeit der Gartengeſtalter und ſtädtiſchen Gartenverwaltungen zu geben. In der Gartenkunſt-Abteilung ſucht man vergebens nach neuen Geſichtspunkten bei der Anordnung des im einzelnen teilweiſe ſehr intereſſanten Stoffes. Von den Städten fiel das Fehlen von Berlin auf, und unter den Gartengeſtaltern vermißte man ebenfalls einige der tüchtigſten.

Im Gelände zwiſchen Herkulesallee und Hauptallee, wohin uns nun unſer Weg führt, ſtoßen wir auf eine Reihe von Sondergärten verſchiedener Ausſteller. Der bemerkenswerteſte darunter iſt der Roſengarten der Firma Münch & Haufe, den Heinz Wichmann geſtaltet hat. Von ihm ſtammt auch das Teehaus. In dem Bildhauer G. K. Bauch hat ſich ihm ein Künſtler geſellt, deſſen modern bewegte Plaſtiken ſich trefflich für den Garten eignen. Was Wichmann in dem Garten zeigen will, wird erſt dann deutlich in Erſcheinung treten, wenn die Roſen blühen. Höchſt eigenartig iſt die farbige Unterwaſſerbeleuchtung im Baſſin, die am Abend den Aufenthalt in dem hübſchen Teehaus noch reizvoller macht. Wichmann hatte die noch kahlen Roſenflächen mit Stiefmütterchen und anderem belebt. Dieſe erſte naturgemäß etwas mageren Farbenverſuche weckten nur das Verlangen nach den hoffentlich ſtarken Farbenwirkungen der Roſen. Erſt dann wird ſich Entſcheidendes über den Garten ſagen laſſen, deſſen Gliederung ſehr geſchickt iſt. Man erkennt, daß Wichmann durch die Gropius-Schule des ehemaligen Bauhauſes in Weimar gegangen iſt.

Von den übrigen Sondergärten dieſes Teils bekommt man wohl erſt ſpäter ſtärkere Eindrücke. Sie gehen im allgemeinen nicht über den heute üblichen guten Durchſchnitt hinaus; der »Wohnhausgarten« der vereinigten Dresdener Gartengeſtalter erreicht nicht einmal dieſen. Anſprechende Einzelheiten finden ſich ſowohl im Sondergarten von Hauber wie in dem von Teſchendorff, in welch letztem J. Gabriel eine nachahmenswerte Heckenlöſung bietet, die für mannigfache Staudenverwendung vortrefflich iſt. Im Heilkräuter- und Giftpflanzengarten war naturgemäß noch nichts zu ſehen, doch verrät die Geſtaltung ſofort Allingers geſchickte Hand. Auch im Sondergarten von Ziegenbalg, der von Reinhold Roſe ſtammt, ſpricht ſich ein kräftiges Wollen aus, doch iſt das Ganze zu ſehr auf das Schaumäßige geſtellt und entbehrt des wohnlichen Gartencharakters. Das von Max Herfurth entworfene Café Palmenterraſſe bildet einen glücklichen Abſchluß der Herkulesallee.

Nun ſchließen ſich nach der Stübelallee zu die Baumſchulerzeugniſſe und

Der rieſengroße Roſengarten mit Blick auf den Grünen Dom

Glashäuſer an. Es iſt tief bedauerlich, daß keine der in Deutſchland doch zahlreichen leiſtungsfähigen Glashausfirmen es fertig gebracht hat, eine gute moderne Glashausanlage für einen Privatgarten oder auch nur einen Wintergarten auszuſtellen. Auf dieſem Gebiete ſind wir vorläufig noch ganz rückſtändig. Möge ſolche Anregung, wie ſie Profeſſor Peter Behrens in Paris gegeben hat (Band VI, Seite 221) doch noch auf fruchtbaren Boden fallen. Erwähnenswert iſt in dieſem Teile vor allem der Schulgarten und die Kleingartenanlage.

Nach Überſchreiten der Brücke in der Hauptallee, die Architekt O. W. Wulle mit Geſchick unter dem Zwange der örtlichen Notwendigkeiten erbaut hat, kommt man ins Hauptgelände der Ausſtellung zwiſchen Hauptallee und Zoo. Was hier geboten wird, iſt entſcheidend für die Bewertung der Schau als künſtleriſche Leiſtung. Hier konnte und mußte Allinger ſeine Kunſt zeigen. Nur hier war es möglich, großzügig vorzugehen und außergewöhnliche Raumwirkungen anzuſtreben. Hier ragt der *Grüne Dom* als das Wahrzeichen der Ausſtellung. Bei der Eröffnung ſtand er gewiſſermaßen noch im Rohbau da, denn die Begrünung muß erſt im Laufe des Mai und Juni ſich vollziehen. Aber zur Roſenſchau, wenn die im April noch toten Flächen, in denen nur das allererſte Raſengrün noch ſchüchtern auf Farbe deutet, ſich wirklich gefärbt haben, dann wird ſich zeigen, ob die Hoffnungen, die das Ganze jetzt in ſeiner Formengebung erweckt, ſich voll erfüllen. Der *rieſengroße Roſengarten* und der ſich daran anſchließende *Roſenhof mit der Leuchtfontäne*, den Teſſenows geſchmackvolles Café am Roſenhof als Gegenſtück zum Grünen Dom abſchließt, verheißen ſchon jetzt ſehr viel. Zumal wenn im Dunkel die elektriſchen Flammenbänder die Formen ſo ſtreng und doch lebendig herausheben. Was zunächſt etwas ſtört, ſind die knallweißen Bänke und die ebenſo ſtark ſich abhebenden, wohl viel zu zahlreichen und zu ſehr hervortretenden Schilder der Ausſteller. Gewiß haben alle die Firmen, die gerade um die Bepflanzung dieſer rieſigen Roſenanlagen ſich ſo opfermutig bemüht haben, Außergewöhnliches geleiſtet. Aber gerade in einer ſolchen Schau, wo das äſthetiſche Moment alles beherrſcht und das Einzelne ſich dem Ganzen durchaus fügen muß, darf dieſes nicht durch ſo leicht zu vermeidende Dinge geſtört werden. Hoffentlich werden ſpäter die Farbenwellen der Roſen alles andere überſtrömen und eine reſtloſe Harmonie in die Geſtaltung hineintragen. Hübſch iſt die Gliederung des leicht vertieften Stückes vor dem Naturtheater, wo durch geringe Höhenunterſchiede ſtarke Wirkungen erzielt werden.

Wenden wir uns zunächſt der zweiten Hauptachſe zu, die vom Grünen Dom ausſtrahlt, dem *Garten zum blauen Ritterſporn* mit dem ihn abſchließenden Platz unter der Ulme. Dieſer Ritterſporngarten iſt außerordentlich geſchickt gegliedert. Seine Formenſprache mahnt ſofort an das, was wir in der Ziegenbalg-Halle im Ausſtellungspalaſt ſahen. Dies Motiv der Formengebung im Grundriß iſt ein ſehr glücklicher Gedanke Allingers. Der figürliche Altmeißener Schmuck trägt ſehr zur Belebung bei. Wenn dann die Ritterſporne, die Karl Foerſter gepflanzt hat und für die Allinger eine den Eindruck ſehr ſteigernde Bodenplaſtik herausgearbeitet hat, wirklich ſo werden, wie man es wünſchen muß, ſo wird dieſer Garten zum blauen Ritterſporn vielleicht »die Sehenswürdigkeit« der Ausſtellung werden. An ihn ſchließen ſich die Farbenfelder der Einjahrsblumen an. Vom *Platz unter der Ulme* müſſen ſich von Ende Juni ab Ausblicke nach allen Seiten bieten, die ſelbſt das farbenhungrigſte Auge befriedigen dürfen, wenn die Witterung günſtig iſt.

Nördlich vom Ritterſporngarten iſt an der Lennéſtraßengrenze der Friedhof eingegliedert. Um ihn haben ſich Oswin Hempel und Wilhelm Röhnick bemüht. Als Ganzes hätte man ſich die Anlage weit wirkungsvoller denken können. So gibt ſie in den Einzelheiten ein Spiegelbild der heutigen künſtleriſchen Bemühungen um die Geſtaltung von Friedhof und Grab mit Denkmal. Der gute Wille iſt überall erkennbar, das Gelingen nur ſelten befriedigend.

Auf alle die bedeutungsvollen Einzelheiten dieſes Hauptteiles der Ausſtellung bietet ſich vom Grünen Dom ein ganz großartiger Überblick. Von ſeiner Höhe aus überſchauen wir nicht nur voll freudiger Überraſchung die großen Achſen der Ausſtellung mit ihrem herrlichen Baumrahmen des Großen Gartens, ein ſchier unendliches Panorama tut ſich auf. Über Dresdens bewegtes Häuſermeer ſchweift der Blick gen Norden zu den Höhen von Loſchwitz und gen Süden zu fein bewegten Fernen, um ſchließlich im Oſten zu haften an der wirklich unvergleichbaren Silhouette der Sächſiſchen Schweiz. Und wenn Flora den Roſen und Ritterſpornen, den Einjahrsblumen und Dahlien hold iſt, ſo wird von Ende Juni bis in

Kaffeehaus am Roſenhof

Kaffeehaus Palmenterraſſe

Der warme Ton, welchen der tiefrotbraune Ziegelgrusbelag dem Platz verleiht, iſt wirkungsvoll, doch dürfte er ſich zu ſehr in Mehlſtaub auflöſen. Das hübſche *Parktheater* mit dem Gebäude iſt ebenfalls eine Schöpfung Allingers. Vom oberſten Umgang, auf dem eine ſchöne Bronzeplaſtik von L. Albrecht ſteht, überblickt man nach Oſten den *zweiten Garten der Roſenneuheiten.* Auch dieſe Raumlöſung iſt zweckentſprechend.
Doch erſt die Roſenblütezeit kann uns lehren, welche Reize ſich in dieſen kleineren Roſengärten offenbaren.
Der Hauptweg führt uns nun über den *Brunnenplatz* mit Pölzigs wundervollem Moſaikbrunnen zu Allingers reifſter Gartenſchöpfung, welche er den *kommenden Garten* nennt. Sie lehnt ſich an ein kleines Sommerhaus der Deutſchen Werkſtätten in Hellerau an. Dieſer kommende Garten iſt ein Programm, ein Wegweiſer für die Gartengeſtaltung von heute. Er fällt nicht nur in ſeiner Formengebung aus dem üblichen vom Barock oder Biedermeier übernommenen oder inſpirierten Gartenſchema heraus, er bietet vor allem auch in der Verwertung eines reichen und gut gewählten Pflanzenſtoffes einen bisher ſonſt nur ſelten erreichten Höhepunkt der Hausgarten-Geſtaltung. Die Formenſprache dieſes Gartens zeigt ſehr deutlich, wie banal die heutigen Raumlöſungen bei allem Streben nach wohltuender Gliederung zumeiſt ſind. Wer ſich in den Geſamtorganismus des Gartens recht hineindenkt, der wird bald ſpüren,

den Herbſt vom Grünen Dom aus ſich das Farbenwunder der Ausſtellung voll auswirken. Seine Erbauung war dazu notwendig.
Von den *Farbenfeldern der Dahlien,* die den Herbſteindruck der Ausſtellung beſtimmen ſollen, ſpürt man ſelbſtverſtändlich im Frühjahr noch nicht einmal einen grünen Hauch. Um ſo eindrucksvoller iſt hoffentlich ihr Hervortreten im Spätſommer und Herbſt.
Wenn wir vom Roſenhofe aus zurück zur Brücke gehen, ſo durchſchreiten wir zwiſchen dem rieſengroßen Roſengarten und der Hauptallee ein Parkgelände mit prächtigem alten Eichenbeſtand, in das mit großer Umſicht eine Reihe bemerkenswerter Einzelſchöpfungen eingegliedert iſt. Da iſt zunächſt der *Garten der Roſenfreundin* mit dem Nebenteil am Waſſerlauf und dem erhöhten Schaukelplatz, einem der beſtgelungenen Sitzplätze der Ausſtellung. Auch der Abſchluß gegen den Eichenhof mit dem Wand-Brunnen und den Baukeramiken iſt ſehr geſchickt und voller farbiger Reize. Der *Eichenhof mit Architekturen,* der ſich ſo glücklich zwiſchen den verſenkten Teil des rieſengroßen Roſengartens und das Park-Theater einfügt, ſtellt eine ſehr befriedigende Löſung dar. Hier treten die Vorzüge der vorhandenen Parkbeſtände ins rechte Licht. Aber ſie in der Weiſe architektoniſch einzufangen und zu verwerten, iſt ein Beweis für das ſtarke Raumgefühl und die Geſtaltungskraft des gartenkünſtleriſchen Leiters.

Naturtheater

Glycine Wistaria multijuga im Botanischen Garten zu Dahlem

Der kommende Garten

daß er einer wohlge- bändigten Lebendig- keit voll iſt. Er wird immer neue Reize in der Linienführung und Raumgliederung ent- decken und dadurch Anregungen empfan- gen, ſelbſt neue Lö- ſungen zu verſuchen. Daß Allinger dieſe An- regungen in ſeinen Schöpfungen gibt, iſt ſein Hauptverdienſt. Er ſtellt keine kopier- baren Schemata auf. Er bietet nichts ohne weiteres Übertragba- res. Er beweiſt, daß es neue Möglichkeiten gibt, bisher noch nicht verbrauchte Faſſun- gen für die Edelſteine des Gartens. Was Al- lingers Gärten aus- zeichnet, iſt die künſt- leriſch durchgebildete originelle Formenſpra- che, der neue Rahmen, den er dem Pflanz- ſtoff gibt. Allinger iſt nicht Wiſſenſchaftler, und wohl auch noch zu wenig Pflanzenkenner. Er hat aber das rechte Kunſtempfinden und die Fähigkeit, ihm Ausdruck zu verleihen. Und darauf kommt es bei der Gartengeſtaltung an. Wer den Garten mit neuem Raumgeiſt zu durchdringen verſteht, der wird leicht Helfer finden, um den Raum mit den rechten Gewächſen auszufüllen. Aber alle Pflanzenkenntnis und Liebe zur Natur hilft dem nichts, der des künſtleriſchen Geſtaltens ermangelt. Ein ſolches iſt immer ſelbſtſchöpferiſch, wenn es echt iſt. Wir haben in der Gartengeſtaltung und freilich auch in der Baukunſt zu viele Pſeudo- künſtler, die nur übernehmen, nur nachſchaffen. Um ſo mehr müſſen wir es begrüßen, wenn wir dem Wirken eines wahrhaften Geſtalters begegnen. Der Wert und die Bedeutung der Dresdener Schau liegen in ihrem künſtleriſchen Aufbau und Ausbau. Darin können wir dem Auslande Nachahmenswertes zeigen. Die Jubiläums-Ausſtellung bedeutet einen weſentlichen Fortſchritt auf dem Gebiete der Gartenbau-Ausſtellungen. Das lehrt ſchon der erſte Eindruck. Inwieweit ſich dieſer verſtärken, welche Höhepunkte ſich zur Roſen- und Dahlienzeit ergeben werden, das läßt ſich jetzt nur ahnen. Wir dürfen Großes und Schönes erhoffen.

Die Frühjahrsblumenſchau

DIE Ausſtellung umfaßt neben den Dauerdarbietungen in den wiſ- ſenſchaftlichen und techniſch-induſtriellen Teilen der Hallen und im freien Gelände noch ſechs Sonderſchauen in den Hallen des Aus- ſtellungspalaſtes. Vom 23. April bis 2. Mai gab es den farbigen Auf- takt der Frühjahrs- blumenſchau. Sie trug den Charakter einer normalen Gartenbau- Ausſtellung, wie wir ſie gerade von Dres- den gewohnt ſind. Al- lein auch hier zeigte ſich der Wille des lei- tenden Künſtlers in der ganzen Art, wie die einzelnen Räume aus- geſtaltet und die Pflan- zen darin geordnet waren.

Nicht alle Hallen wa- ren gut geeignet, die Pflanzen richtig zur Schau zu bringen. Die ſchmale Halle, in der die Staatliche Ver- ſuchs- und Beiſpiels- gärtnerei in Pillnitz ihre intereſſante Stau- den- und Gehölz-

Kanal im kommenden Garten

ſammlung und die leuchtend rote Pracht der Azalee Hexe vorführte, war reichlich dunkel. Am ſchönſten war das Arrangement in der Ziegenbalg-Halle, wo die Gliederung des Mittelteils wie der Seitenteile ebenſo eigenartig wie anſprechend wirkte. Die Farbenverteilung war eine ſehr glückliche, und die Verwendung von Plaſtik und Figurenwerk aus Porzellan belebte das Ganze ungemein. Die Seidel-Halle war ſtrenger und nicht ſo apart ausgeſtaltet. Hier war namentlich das Mittelſtück zu wenig gegliedert und wirkte trotz aller Farbenfreudigkeit der Rho-

Ziegenbalg-Halle

dodendren etwas flach. Eine leichte Betonung der Endteile und deren grüne Ablöſung von einem Mittelteil hätte etwas mehr Rhythmus hineingebracht. Immerhin war die Behandlung der Wandflächen und der Niſchen eindrucksvoll. Recht gut wirkte als Ganzes der Eckraum mit den Hortenſien mit der hübſchen Plaſtik in der Mitte. Auch der ſchmale Raum zwiſchen dieſer Halle und der Eckhalle von Neubert war ſehr geſchickt ausgenutzt, um verſchiedene Kulturen gut zur Schau zu bringen. Die Anordnung des Materials in der Gemüſehalle war ſehr anſprechend. Die pflanzlichen Darbietungen waren zum Teil recht gut, wenn auch als Ganzes das Vorkriegsniveau noch nicht wieder erreicht iſt. Es fehlte ſehr an guten Neuheiten, das Intereſſanteſte bot neben den neuen holländiſchen Rhododendron von Koſter & Söhne wohl G. Arends in ſeinen winterharten Azaleen, obwohl ſich deren Zierwert nach der gezeigten Gruppe, die noch nicht vollſtändig aufgeblüht war, noch nicht beurteilen läßt.

Neubert-Halle

Seidel-Halle

Bilder C. S.

I. iberica iſt eine der härteſten Arten der Oncocyclus aus den Gebirgen von Armenien bis zum Kaukaſus und Perſien. Sie hat ſehr ſchmale Blätter und der Gegenſatz in ihren Blüten zwiſchen den hellbraunen, dunkel gezeichneten Hängeblättern und den faſt ſchneeweißen Domblättern iſt hübſch.

Die prächtige Färbung der hier gezeigten Blüten von Iris Bismarckiana wird auf Seite 121 genau beſchrieben. Die Art ſtammt aus Paläſtina und wurde von Dammann eingeführt. Sie galt erſt als eine Form der I. iberica nahe ſtehenden I. Saari (I. Sari) und ging als I. Sari var. nazarena. – Bilder Bauer.

IRIS DER GRUPPEN REGELIA UND ONCOCYCLUS

VON den ſo farbenprächtigen Iris-Arten ſind die Angehörigen der Gruppen Oncocyclus und Regelia recht ſelten in unſern Gärten zu treffen, obwohl ſie den Vergleich mit keinen anderen Arten ihrer Gattung zu ſcheuen haben, dieſe an feiner Zeichnung, Farbenpracht und Blumengröße ſogar vielfach übertreffen. Für den Liebhaber ſchöner Blumen ſind ſie jedenfalls zu empfehlen; die Mehrarbeit, die ihre Kultur gegenüber den Apogon und Pogoniris verurſacht, wird reichlich aufgewogen durch die Freude, welche die prächtigen Blüten auslöſen. Jeder, der hier die Arten susiana, Bismarckiana, paradoxa, Koroſkowi, Hoogiana und die Kreuzungen (Regelio-cyclus) in Blüte geſehen hat, war erſtaunt und entzückt von dieſen Meiſterſtücken der Natur.

Die Oncocyclus-Iris unterſcheiden ſich von den Pogoniris und den andern Gruppen durch kurze Rhizome, verhältnismäßig ſchmale, graugrüne Blätter, einköpfigen und einblütigen Stengel. Die Blüte iſt meiſt ſehr groß und von ſchöner, geſchloſſener Form. Die unteren Blumenblätter ſind über das ganze Mittelfeld und am Grunde mehr oder weniger dicht behaart. Die lederfarbenen oder braunroten Samen beſitzen einen Arillus, der faſt ſo groß wie der Same iſt.

Die Regelia-Iris ſtimmen im Rhizom, Blättern und Samen mit den Oncocyclus faſt überein, unterſcheiden ſich aber leicht durch ſchlankere Blüten und dadurch, daß die Blütenſcheide zwei, oft ſogar drei Blüten birgt. Die Behaarung der unteren Blumenblätter beſchränkt ſich auf einen ſchmalen Strich von der Mitte bis zum Grunde. Ein anderer, mehr gärtneriſcher Unterſchied iſt, daß, wie W. R. Dykes in ſeinem Buche »The Genus Iris« richtig ſagt, die Regelia-Iris mit größerer Sicherheit und leichter zu kultivieren ſind als die Oncocyclus-Arten. Die Regelia-Arten ſind in Turkeſtan und Armenien zu Hauſe, die Oncocyclus-Arten ſtammen meiſt aus Kleinaſien, Paläſtina, Syrien, Kaukaſus und Perſien. Die Herkunft aus dieſen trockenen, warmen Gegenden ſoll bei der Kultur berückſichtigt werden, ſonſt wird der Züchter nur über Mißerfolge zu klagen haben. Um eine reiche Blüte zu erzielen, muß dafür geſorgt werden, daß die Rhizome gut ausreifen und daß die Pflanzen nicht mit eben ausgetriebenen Blättern in den Winter kommen.

Für unſere klimatiſchen Verhältniſſe iſt die beſte Pflanzzeit von Mitte Oktober bis Anfang November. Die Rhizome ſollen in warmer, geſchützter Lage in nahrhaften (nicht friſch gedüngten), möglichſt kalkhaltigen, recht durchläſſigen Boden, mit den Spitzen nicht tiefer als 5 bis 7 Centimeter unter der Oberfläche liegend, gepflanzt werden. Leichte trockene Deckung iſt bei unſerm wechſelnden Winterwetter zu empfehlen. Gegen Spätfröſte ſind die Blätter nicht empfindlich, hier haben in dieſem Frühjahr die bereits 20 – 25 Centimeter hohen Pflanzen noch Temperaturen bis – 11 Grad Celſius ohne Deckung gut überſtanden. Nach der Blüte, aber nicht früher als Mitte Juli, werden die Pflanzen aus der Erde genommen und an trockenem, warmen Orte aufbewahrt bis zur Neupflanzung. Bei zu frühem Herausnehmen aus der Erde ſchrumpfen Wurzeln und Rhizome zu ſehr ein, wodurch die Blüte ſehr beeinträchtigt wird.

Will man Dauerpflanzung haben, ſo müſſen die auf gut zubereiteten, mit feinem Bauſchutt durchſetzten Beeten ſtehenden Pflanzen kurz nach der Blüte mit Fenſtern abgedeckt werden. Die Fenſter liegen in 45 bis 50 Centimeter Höhe, ſo daß die Luft frei von allen Seiten Zutritt hat. Die Fenſter bleiben bis im Oktober liegen. Durch das Abhalten des Regens reifen die Rhizome genügend aus und treiben auch nicht zu früh. Als Dünger bei ſolchen Pflanzungen miſche man vor dem Pflanzen der Erde Knochenmehl bei.

Bei den oben angegebenen Kulturverfahren gedeihen die Regelia-Iris Korolkowi mit Formen, Hoogiana, stolonifera ſehr gut und blühen bei guter Behandlung reicher als Iris germanica. Zur erfolgreichen Kultur der beſſeren Oncocyclus-Arten gehört aber immerhin etwas Glück, die Pflanzen gehen nach einigen Jahren leicht ein und müſſen daher immer wieder aus der Heimat oder aus dem warmen Südeuropa eingeführt werden. Dies hat van Tubergen in Haarlem bewogen, durch Kreuzung von Oncocyclus mit Regelia-Iris eine härtere Raſſe heranzu-

*Welche Farbenreize den ſpätblühenden Tulpen innewohnen, iſt noch viel zu wenig bekannt. Man muß eine gute Sammlung ſolcher Tulpen ge=
ſehen haben, um ſie richtig kennen und ſchätzen zu lernen. Unſer Bild zeigt die Darwintulpe Raphael.*

*Neben den allbekannten Schwertlilien der Iris germanica= und pumila=
Gruppe gibt es unter den Regelia und Oncocyclus weſentlich verſchie=
dene Formen von nicht minder hohem Reize. Die hier gezeigten Regelio=
cyclus=Hybriden Artemis, links, und Baucis, rechts, wurden ebenſo wie
die Darwintulpen bei C. G. van Tubergen jr. aufgenommen. – Bilder C. S.*

züchten. Es ſind dies die Regeliocyclus-Iris, die in der Pflege mit Iris Korolkowi gleich ſtehen und in den Blüten, in Bezug auf Größe zwiſchen Regelia und Oncocyclus in der Mitte ſtehend, ein wundervolles Farbenſpiel entfaltend. Die Grundfarbe der Blumenblätter geht über weiß, oder rahmfarben, hellviolett, purpurfarben bis rotbraun. Darüber breitet ſich ein Netz von dunkleren Adern und Punkten. Der Mittelfleck in den unteren Blumenblättern iſt meiſt ſchwarzviolett oder ſchwarzbraun. Eine faſt ebenſo dunkelgetönte Farbe haben die oberſeits ſcharf gekielten Griffeläſte, die im Sonnenſchein bei Sorten wie Ismene und Corinna wie Kupfer leuchten. Warmes Rot ſchimmert bei Sonne auch durch die faſt braunſchwarzen oder ſchwarzvioletten Hängeblätter der Sorte Clotho. Die Narbenabſchnitte zeigen meiſt die Farbe der Hängeblätter. Nachſtehend ſeien noch einige der beſten Arten und Formen der verſchiedenen Gruppen aufgeführt:

Ismene

Irma

Oncocyclus-Iris. Die bekannteſte iſt wohl die »Dame in Trauer«, Iris susiana. Sie ſoll ſchon ſeit 1753 in Kultur ſein und kann als Typus für dieſe Gruppe gelten. Die Blüte hat bis über zwölf Centimeter im Durchmeſſer. Grundfarbe graubläulich mit ſchwarzbläulichen Adern und Punkten; behaarter Mittelfleck der unteren Blumenblätter ſchwarz. Die am leichteſten zu kultivierende Oncocyclus-Art. — *Iris Bismarckiana.* Blüte ebenfalls ſo groß wie bei voriger Art. Hängeblätter von ſtrohgelber Grundfarbe, dicht mit dunkelbraunroten Adern und Punkten überzogen; Fleck ſchwarzbraun, Domblätter bläulichviolett mit dunkel- oder braunvioletten Adern durchzogen. *Iris Lortetii.* Blüte groß, Grundfarbe der Hängeblätter hellgrau-lila, dicht mit feinen rotbraunen Punkten und Stricheln beſetzt, der Mittelfleck dunkelbraun punktiert. Domblätter hellroſa, rötlichbraun geadert. *Iris Gatesi* hat wohl die größten Blumen von allen. Sie ſind ſeidig rahmweiß, roſa überlaufen, mit zarten ſilbergrauen Adern und Punkten.

Regelia-Iris. Als Typus kann wohl Iris Korolkowi gelten, ſeit 1870 in Kultur. Blüten milchweiß mit blaugrauen oder rotbraunen Adern. Die Färbung iſt ſehr verſchieden, wie die Aufſtellung von mehreren Varietäten zeigt, wie Korolkowi atropurpurea, concolor, Leichtliniana, venosa, violacea. — In neuerer Zeit wurde von van Tubergen aus Turkeſtan die der Korolkowi naheſtehende Iris Hoogiana eingeführt. Die Blüten ſind einheitlich hell lavendelblau, ohne Flecken und abweichende gefärbte Aderung und ſtrömen einen angenehmen Duft aus. Eine ſehr leicht und gut blühende Art, die bereits in Band II, Seite 103 im Bilde gezeigt wurde.

Regeliocyclus-Iris. Da über die Zeichnung der Blüten dieſer Hybriden ſchon berichtet wurde, gebe ich nur die Hauptfarben an. Die beſten Sorten ſind wohl: *Artemis:* Auf langen Stengeln ſehr reichblühend, violett-purpur und dunkel-violett geadert ſowie ſchwarzer Fleck. (Iris Korolkowi violacea × Iris Mariae). *Charon:* Die Blüten ſind auf bronzefarbigem bis mahagonifarbigem Untergrund prächtig altgold und braun geadert. (I. Korolkowi venosa × I. atropurpurea). *Clotho:* Eine I. paradoxa-Hybride, hat ſamtig dunkelbraunviolette Hängeblätter, ſehr dunklen Fleck und dunkelblaue, faſt ſchwarzgeaderte Domblätter. Blüte kleiner als bei den anderen Sorten. — *Clytemnestra:* Hängeblätter weißlich, violett verwaſchen und dunkelviolett geadert, Fleck ſamtig ſchwarzviolett, Domblätter rein veilchenfarbig mit dunkeln Adern. Guter Blüher. (I. Korolkowi atropurp. × I. paradoxa.) — *Corinna:* Sehr große Blume, Hängeblätter ſatt rahmfarben, ſtark rotbraun geadert und gefleckt, Fleck in gelblicher Zone ſchwarzſamtig. Die Domblätter ſind weißlila, purpur geadert und punktiert. (I. Korolkowi violacea × I. urmiensis). Leider

ist die Form der Blume nicht immer ganz einwandfrei. Im Aufblühen stehen die Domblätter zu weit offen und in Vollblüte rollen sich die Hängeblätter etwas nach rückwärts. — *Irma:* Einheitlich perlweiß mit violetten Adern und dunkelviolettem Fleck. — *Ismene:* Hat satte rahmfarbene, purpurbraun geaderte Hängeblätter mit samtig schwarzbraunem Mittelfleck und bläulichweiße purpurviolett geaderte Domblätter (I. Korolkowi typica×I. iberica van Houttei). — *Luna:* Besonders große und schön geformte Blume, auf weißlichem Grunde zart gezeichnet. — *Turkoman:* Keine echte Regelio-cyclus, sondern eine Kreuzung zwischen I. stolonifera×Korolkowi. Sie zeigt auf rötlichmalvenfarbigem Grunde einen auffallenden blauen Bart. *E. Nußbaumer.*

Iris susiana

SEIT 1573 ist die Susa-Schwertlilie in Europa bekannt; damals wurde ihre Knolle aus der kleinasiatischen Heimat zum ersten Male nach Holland gebracht, und sie wird seitdem im Laufe der Jahrhunderte auch immer wieder, wenn auch stets nur vereinzelt, in gärtnerischen Betrieben des Inlandes aufgetaucht sein. Doch diese vornehme und seltsam anmutende Blumenerscheinung konnte niemals heimisch werden bei uns. Ihre große Empfindlichkeit gegenüber unseren klimatischen Einflüssen verhinderte stets ein häufiges Begegnen mit ihr, selbst in Sonderkulturen wollte ihre Knollenreife kaum jemals gelingen, und nur aus holländischen Kulturen überführte Knollen vermittelten vereinzelt die Bekanntschaft mit einer Blume, deren selten starke Reize in zahllosen Buchbeschreibungen immer aufs Neue wieder rühmend hervorgehoben wurden, die aber trotzdem auch heutigentags noch immer als wenig bekannter Fremdling angesehen werden muß.

Eine rührige Einführung von gut ausgebildeten Knospen aus Holland oder südlichen Ländern brachte zwar zu Anfang dieses Jahrhunderts diese merkwürdige Blume während einiger Frühlingswochen in die Schaufenster großstädtischer Blumenläden; doch dürfte gerade hier, aus noch später zu erörternden Gründen, die Susa-Iris kaum die ihr gebührende Beachtung und Bewunderung erfahren haben. Auch ist von dieser Einfuhr wohl schon vor der Kriegszeit wieder Abstand genommen worden.

Als ich nach viele Jahre langem gelegentlichem Streben in solcher Richtung, nach zahllosen Miß- oder Halberfolgen, endlich ein einziges Mal diese Wunder-Iris in der vollen Pracht bester Entwicklung schauen, erleben durfte, da zog ein feierliches Gefühl von Erfurcht vor einem Äußersten herrlicher Naturoffenbarung durch mein Inneres und ich erlebte in Freude und Dankbarkeit wohl den schönsten Tag, den mir mein damaliger kleiner Garten zur Frühlingszeit jemals geboten hat. Denn damals erkannte ich erst, was in diesem vielgelesenen und vielgehörten Namen: Iris susiana sich verbirgt, und was nur eine besondere Gunst des Augenblicks und der Entstehungsverhältnisse hervorzaubern kann.

Schon die Größe ging über alles Maß hinaus, daß ich vorher beobachten konnte. Das Charakteristische der Form trat in ausgeprägtester Reinheit zutage und die oberen Ränder der Petalen (der inneren Perigonblätter oder Domblätter) zeigten mir zum ersten Male eine restlos vollständige Breitenentfaltung durch liniengerechten, unverengten Auslauf der Abschlußstellen des Adernetzes. Bei allen vor dem Erblühen abgeschnittenen Knospen war nämlich nach dem Erschließen die Randentwicklung dieser obersten Teile stets unvollständig geblieben. Damit war auch gleichzeitig die streng kreisrunde Formung der Petalen Tatsache geworden.

Das ideal schöne, gleichmäßig sonnige Frühlingswetter, das diese Prachtblume sich bilden ließ (Sonnenwärme ist bei der Entfaltung sehr wichtig!), verhinderte auch jegliche äußere Beschädigung des zarten Blumenkörpers und dehnte auch seine Lebensdauer auf fast fünf volle Tage aus; sonst halten die Blüten der Oncocyclus-Iris erfahrungsgemäß vier Tage.

Ich erkannte auch bei ihr mit aller Deutlichkeit, daß das Besondere und sie vom germanica-Typus Unterscheidende ihrer Gestalt sich mit dem Bau einer halbgeöffneten Tulpe etwa vergleichen läßt, weil die riesigen Petalen (der sonst bei der Iris-Blüte gebrauchte Ausdruck »Dom« trifft hier nicht zu) im Höhepunkt des Blütenstadiums glockenartig auseinanderstreben, während die stark an den tragenden Stengel angepreßten Sepalen (äußeren Perigonblätter oder Hängeblätter) den luftigen Oberbau gewissermaßen konsolartig stützen.

Iris susiana
Bilder Nußbaumer

Ihre Schwestern, I. Sari var. nazarena (oder I. Bismarckiana) und I. iberica, die zum Vergleiche im Bilde gebracht werden, zeigen neben mancher Ähnlichkeit der Bildung doch starke Unterschiedlichkeiten insofern, als neben Eigentümlichkeiten in Zeichnung und Färbung vor allem bei ihnen mehr Gleichgewicht in der Größe der Perigonblätter herrscht. Der Nachdruck bei ihrer Erscheinung liegt nicht auf den Petalen wie bei I. susiana.

Aber der imposante Bau des Perigons und des sie vollständig überspinnenden unvergleichlich reizvollen Netzwerkes ist es ja nicht allein, was diese Blume so sehr auszeichnet. Die pomphaft und außergewöhnlich stark ausgebildeten blumenblattartigen Stempel mit den Narbenansätzen machen erst die Harmonie vollkommen. Ja, hierbei erweist sich die offene Kelchform sogar in schönheitlicher Beziehung als unerläßlich, damit eben das Gynaeceum in wundersamen Dreiklang — in sich und im Verein mit den in so köstlicher Weise gefältelten und geknitterten Kronenblättern sich voll auswirken kann; denn wäre der »Dom« geschlossen, so könnte man nur wenig oder nichts von der Formen- und Farbenpracht des Inneren genießen!

Die letzte und vielleicht die Hauptbedingung zum schrankenlosen Erfassen dieser Schönheit ohnegleichen liegt jedoch in dem meist nicht genügend erkannten Umstand, daß eine besondere Beachtung der vorzüglichen Transparenz des feinen Blumenkörpers geschenkt werden muß. Wer diesen nur flüchtig und oberflächlich vor mattem Hintergrund bei rückseitig einfallender Beleuchtung gewahrt, hält ihn zunächst überhaupt für farblos, für bleigrau und schwarz. Noch heute klingt mir ein Urteil aus Kindermund im Ohr, als ich vor einem Blumenladen in Frankfurt a. M. stehend, einen Vasenstrauß mit Susa-Iris betrachtete: »Ach, guck emol, Mama, was for e garstig (garstig) *schwarz'* Blum'!« — Die Transparenz weist auch überdies noch den Weg zu einer nicht unwichtigen Nebenentdeckung. Sie zeigt augenfällig die bewunderungswürdige Tatsache, daß die herrliche Netzzeichnung nur der Oberhaut der zarten Perigonblätter eigentümlich ist, also bei genauer Beobachtung des Durchschimmerns zwei völlig getrennte Sonderzeichnungen sich gegenüberstehen, die damit den Reichtum und Reiz des erlesenen Schmuckes noch steigern. *Friedrich Bauer*

Rhododendron cheilanthum

CAMILLO SCHNEIDER / NEUE RHODODENDRON-WILDARTEN

WER in den letzten Jahren Gelegenheit hatte, nach England zu kommen, dem werden unter den neuen Pflanzen, die er ſowohl in botaniſchen Gärten wie Kew und Edinburgh, als auch bei Firmen wie G. Reuthe, H. Perry oder H. White ſehen kann, die zahlreichen Rhododendren aufgefallen ſein, die durch Wilſon, Forreſt, Farrer, Ward und andere Sammler aus Weſtchina zu uns gebracht worden ſind. Ich ſelbſt konnte während meines Aufenthaltes in Nordweſt-Yunnan einige Arten in ihrer Heimat kennen lernen, doch war natürlich mein Aufenthalt von einem Jahre viel zu kurz, um einen guten Einblick in dieſe formenreiche und ſchwierige Pflanzengruppe zu gewinnen. Als ich im Mai letzten Jahres mich wieder in Kew aufhielt, konnte ich einige Arten im Bilde feſthalten und möchte deshalb heute auf verſchiedene hinweiſen, deren verſuchsweiſe Anpflanzung bei uns mir wertvoll erſcheint. Auch ich teile bis zu einem gewiſſen Grade den von A. Steffen (II. Band, Seite 124) vertretenen Standpunkt, daß man ſich dieſen neuen Dingen gegenüber zunächſt abwartend verhalten und ſie in aller Ruhe prüfen muß. Immerhin gibt ja auch Steffen zu, daß Pillnitz kein geeigneter Ort iſt, um ſolche Prüfungen vorzunehmen, da dort ein zu trockenes Binnenlandklima herrſcht. Nordweſt- und Weſtdeutſchland bieten ſelbſtverſtändlich weit beſſere Gelegenheit dazu. Aber es iſt doch notwendig, gerade in Mitteldeutſchland ſolche Verſuche anzuſtellen, da hier ſchon von den bekannten Hybriden, die in Nordweſtdeutſchland ſo gut gedeihen, ſehr viele verſagen. Wir müſſen Sorten und Arten finden, die auch in einem lufttrockeneren Klima gehen. Daß es ſolche gibt, beweiſen die Erfolge, die durch Rudolf Seidels Initiative in Grüngräbchen in Sachſen erzielt worden ſind. An dieſem Orte müſſen auch die Verſuche mit den neuen Wildarten in großem Maßſtabe begonnen und durchgeführt werden. Aber noch an gar manchem anderen Orte. Einzelnes läßt ſich ja in botaniſchen Gärten beobachten, aber an dieſen Orten können größere Verſuche ſchon aus Mangel an Raum nicht begonnen und durch Jahre fortgeſetzt werden. Einzelbeobachtungen beſagen ja

Rhododendron impeditum

recht wenig. Es müſſen harte Raſſen herausgezüchtet werden, was Zeit beanſprucht. Das gilt aber nicht nur für Rhododendren, ſondern für ſehr viele andere Gehölzgattungen auch. Seit dem Kriege hat die Gehölzzucht bei uns ſtagniert, und auch heute haben wir noch nicht wieder begonnen, uns rationell damit zu beſchäftigen. Mit der Gehölzliebhaberei im alten Sinne, mit der Dendrologie, kommen wir nicht weiter. Aber die Gartengeſtaltung bedarf neuen Materiales. Dazu gehören auch die Rhododendren.

Unter den Formen, auf die ich heute kurz hinweiſen will, ſind es beſonders die Arten der Gruppe um R. lapponicum, die als Kinder der Hochgebirge und als kleine, auch für den Felſengarten geeignete Sträucher uns gar manches verſprechen.

Rhododendron yanthinum

Rhododendron lapponicum ſelbſt, das ſich in Nordeuropa und Nordkanada findet, iſt längſt als hart bekannt, leider nur recht ſelten bei uns zu finden. Meiſt trifft man ſtatt ſeiner das höhere R. parvifolium aus Sibirien bis Japan. Von den chineſiſchen Arten iſt bisher R. intricatum aus Szetchuan am bekannteſten geworden, da es ſchon ſeit über zwanzig Jahren in Kultur iſt. Es bildet etwas ſteife, kaum je einen Meter Höhe erreichende Büſche, die ſich im Mai mit lilapurpurnen Blüten bedecken. In England ſind jetzt ſehr viele chineſiſche Arten aus dieſem Verwandtſchaftskreiſe in Kultur, von denen man über fünfzig beſchrieben hat. Zwei davon kann ich heute im Bilde zeigen: R. cheilanthum und R. impeditum. Forrest entdeckte beide zuerſt auf dem Oſthange der Schneeberge bei Lichiang Fu. Ich ſelbſt habe dieſe Standorte auch kennen gelernt. Es ſind hochalpine Wieſen von zum Teil etwas moorigem Charakter, doch treten dieſe Rhododendren auch zwiſchen anderem lockerem Gebüſche auf. Vielfach überziehen ſie weite Flächen von noch viel größerer Ausdehnung, als es durch hirsutum und ferrugineum in den Alpen geſchieht. Auf den Lichiang-Schneebergen wachſen eine große Anzahl Arten, die ſich zum Teil ſehr ähneln und deren Einzelmerkmale erſt bei uns im Garten deutlich in Erſcheinung treten. Die Tracht von *R. cheilanthum* iſt aus dem Bilde gut erſichtlich. Es bildet lockere breite Sträuchlein, die bis gegen einen Meter hoch werden können. Die Triebe ſind braunbeſchuppt, auch die Blattunterſeiten tragen eine etwas glänzende gelbbraune Schuppendecke, während die Oberſeiten infolge alter verwitterter Schuppen etwas bleich und trübgrün ſind. Die zu drei bis ſechs vereinten, bis zwei Centimeter breiten Blüten zeigen ein hübſches ziemlich ſattes Roſa und erſcheinen, wie das Bild beweiſt, in reicher Fülle. Dies iſt in noch höherem Grade bei *R. impeditum* der Fall, der einen ziemlich abweichenden Charakter trägt. Er iſt noch ausgeſprochener ein echter Hochgebirgs-Strauch, der breite, flache Matten bildet und ſeine Triebe nur 15 bis 30 Centimeter hoch emporſendet. Ob er dieſen Charakter dauernd bei uns beibehalten wird, iſt noch fraglich. Jedenfalls bildet ſolche Blütenmatte einen reizenden Schmuck im Steingarten. Die Farbe der bis über drei Centimeter breiten Blüten iſt ein hübſches Lila-purpur, das ſtark ins Blaue ſpielt. Dieſer Ton herrſcht bei vielen Arten aus dieſer Gegend vor. Das Blau iſt oft ſo ausgeprägt, daß die Maſſenwirkung eine von den bekannten Rhododendren ſo verſchiedene iſt. Sie erinnert an die Färbung der Azaleen der R. yedoense-Gruppe, die ja bei uns leider noch ſo gut wie unbekannt ſind. Bei einigen Formen des vielgeſtaltigen R. hippophaeoides, den ich vielfach ſammelte, ſind die blauen Töne am ausgeſprochenſten. Hier kommen rein lavendelblaue Nüancen vor. Dieſe Art bildet je nach Lage kleinere Sträucher, teils wird ſie bis faſt anderthalb Meter hoch, verzweigt ſich ſehr reich, mehr nach Art des intricatum. Sie vertreten, wie Cox ſehr richtig bemerkt, eigentlich die Heidekrautarten unſerer Zone in ihrer alpinen Heimat. Wie ihr Name ſagt, erinnert die letzte Art etwas an eine Hippophaë in der grauen Tönung des ſchuppenhaarigen Laubes. Alle dieſe Arten blühen je nach Höhenlage von Ende Mai bis in den Juli, ja faſt bis Auguſt. In den Niederungen bei uns natürlich früher. Man pflanze ſie im Steingarten in gegen die Südſonne geſchützten Lagen in torfigen Boden, der immer genügend friſch ſein ſoll. Setzt man ſie nicht in dichten Maſſen zuſammen, ſo muß der Boden durch andere niedrige Gewächſe beſchattet ſein. Kann man im Steingarten während der

Rhododendron charianthum

heißen Tagesſtunden durch Waſſerverſtäubung Nebel erzeugen, ſo gefällt das dieſen Alpenroſen auch. Sie haben in der Heimat ſehr feuchte, nebel- und regenreiche Sommer und eine lange dichte Schneedecke im Winter. In wie weit ſie ſich in kontinentalen Klimaten gut anpaſſen, iſt noch zu erproben. Sie laſſen ſich ſehr leicht durch Stecklinge vermehren und blühen ſchon als recht kleine Pflanzen. Man ſollte ſie in Maſſe heranziehen. Außer den genannten ſcheinen noch Arten wie R. faſtigiatum, R. rupicolum und R. ſcintillans ſehr verſuchswert.

Rhododendron ambiguum

Zu einer anderen Gruppe gehören die drei weiteren im Bilde gezeigten Arten. Es handelt ſich hier um Angehörige der Triflorum-Reihe. Von ihnen wurde *R. yanthinum* (R. Benthamianum) ſchon 1901 von Wilſon aus Mittelchina eingeführt. Die Art geht auch als R. concinnum, iſt aber mit dem echten älteſten concinnum nicht identiſch, ſteht ihm nur nahe. Die Färbung iſt bald mehr hell purpurn, bald mehr ins Mauvefarbene gehend. Zweige und Blattunterſeiten ſind braun beſchuppt, ſonſt iſt das Laub ſatt grün. Ältere Pflanzen werden bis 1,5 Meter hoch und entfalten im Mai einen reichen Flor. Im ſchwarzen Bild kommt die Blütenpracht nicht ſehr zur Geltung, da ſich der rötliche Ton nicht ſo gut wiedergeben läßt. Die Blüten ſind etwa fünf Centimeter breit. Hellgelb mit grünlicher Zeichnung ſind die etwas früher erſcheinenden Blüten von *R. ambiguum,* das in der Heimat in Bezug auf den Standort nicht wähleriſch iſt, wie Wilſon, der die Art 1904 einführte, berichtet. Es dürfte demnach für die Kultur gewiſſe Vorzüge haben, doch iſt die Farbe nicht ſehr ausdrucksvoll. Eine andere hellgelbe, um die gleiche Zeit eingeführte Art iſt R. luteſcens, das aber nach den bisherigen Erfahrungen ſich nicht ſehr zu empfehlen ſcheint. Verſuche mit Kreuzungen ſind wegen der gelben Farbe erwünſcht. Sehr hübſch wirkte in Blüte *R. charianthum,* das roſafarbene, dunkler rot gefleckte Blüten hat. Es gilt als eines der härteſten und verträgt auch trocknere Lagen. Auch die Arten dieſer Gruppe wachſen leicht aus Stecklingen. Man kann ſie tüchtig zurückſchneiden, wenn ſie Neigung zeigen, locker und ſparrig zu werden. In großen Steingärten und an geeigneten Orten im Park ſollte man ſie ſtets in Maſſe anbringen. Nur dann wirken ſie in der rechten Weiſe. Bei der großen Variabilität der meiſten in Bezug auf die Abtönung der Blüten iſt es ſicherlich nicht ſchwer, gute Farbenraſſen herauszuzüchten. So wird beiſpielsweiſe bei dem ſeit längerer Zeit ſchon in Kultur befindlichen R. Auguſtinii dieſer Gruppe das Variieren der Farbentöne ſehr betont, und Cox, der Verfaſſer des hübſchen Buches »Rhododendrons of Amateurs« gibt an, daß ſich ganz weißlila Töne bis zum faſt reinen Blau beobachten laſſen. Es gilt nun, die unangenehmen lilaroſa Töne auszuſchalten und die mehr purpurnen oder mehr blauen auszuleſen. Ähnliches kommt ja bei Primeln vor, wie etwa bei roſea, bei Juliae und anderen. Hier hat die Arbeit des Züchters ſchon eingeſetzt, auch bei uns. Von dieſen neuen kleinen Rhododendren wiſſen unſere Züchter noch nichts, geſchweige denn, daß ſie ſchon begonnen hätten, eine Formenausleſe zu treffen. R. Auguſtinii tritt in der Heimat in Mittelchina auch in ſehr ſonnigen Lagen auf. Ob es auch bei uns ſich für ſolche Lagen eignen mag, bleibt zu erproben. Hoffentlich regt die ſtändig noch wachſende Vorliebe für Steingärten dazu an, auch dieſe hier behandelten Kleinſträucher heranzuziehen. Sie könnten in vielen kleinen Hausgärten eine Rolle ſpielen, wo es heute recht langweilig ausſieht. Aber freilich, wo ſollen unſere Gartengeſtalter dieſe Dinge kennen lernen, da ſie ſie in den Baumſchulen nicht bekommen und da ſich ihr Fuß ſelten oder nie in einen botaniſchen Garten verirrt. Wer in Nymphenburg oder Dahlem mit offenem Auge herumgeht, könnte ſich genügend Anregungen holen. Auch kleinere Gärten, wie Darmſtadt, Göttingen und andere bieten Proben von neuem Gartenwerkſtoff, den die Geſtalter dann von den Baumſchulen verlangen müſſen. Das brauchbare Neue muß aber zur Maſſenware werden. Noch verſtehen wir nicht, das Neue in der rechten Weiſe uns nutzbar zu machen.

RUDOLF BERGFELD / HAUS UND GARTEN

DIE Einheitlichkeit des überdachten und offenen Teiles eines bewohnten Grundſtücks iſt eine der wichtigſten Aufgaben neuer Wohnkunſt. Wenn das eigentliche Problem der Vereinigung von Haus und Garten zwar auch von den verſchiedenſten Möglichkeiten aus zu erfaſſen verſucht worden iſt, ſo wird man die bisherigen Löſungen immerhin erſt als Stationen auf dem Wege zu einer vollkommenen Bewältigung des Gegenſtandes aufzufaſſen haben. Das Haus ſoll in den Garten mehr hineingreifen, der Garten, ideell, in das Haus treten. Eine derartige, kurzumſchriebene Forderung weiſt von vornherein auf die Notwendigkeit hin, daß der geſamte Wohnorganismus aus einem Guß geſchaffen werden muß. Vielleicht auch darauf, daß der Architekt des Hauſes gleichzeitig derjenige des Gartens zu ſein habe? Die Architektenſchaft iſt vielfach von dieſem im Prinzip ſo berechtigten Verlangen in ſolchem Maße überzeugt, daß ſie die Planung des Gartens als ihre künſtleriſche Pflicht in Anſpruch nimmt.

Wenn ich nun bedenke, daß die Leiſtungen von Architekten auf dem Gebiet der Gartenkunſt bisher doch im allgemeinen ſehr enttäuſcht haben, ſo mag es dem Gartengeſtalter von Beruf nicht verübelt werden, wenn er ſeinerſeits den Hausbau zu ſeinen Obliegenheiten rechnet. Weil die Kompetenz auch in dieſem Falle eine Sache des Könnens iſt, bietet die Rivalität hier zu Erörterungen keinen Grund. Immerhin wird es im Intereſſe einer Förderung unſerer Wohnungskunſt mehr als wünſchenswert ſein, daß die Schöpfer von Haus und Garten in gegenſeitigem Sichverſtehenwollen, unter Zurückſtellung perſönlichen Ehrgeizes und von Beginn der Arbeit an zuſammengehen.

Leider ſtellt die Wirklichkeit in der Mehrzahl der Fälle den Gartengeſtalter vor die vollendete Tatſache, alſo vor das vollendete Haus, und überläßt ihm die Sorge, aus dem vom Zufall noch übriggelaſſenen Möglichkeiten das Beſte herauszuholen. Der Baukörper, von der Umgebung losgelöſt, iſt für ſich da und will ſchon etwas für ſich vorſtellen. Der große, ruhige Zug in der Außenarchitektur des Hauſes, welcher oft ſo notwendig iſt für einen heiteren und bewegten Rhythmus im Garten, wird am häufigſten vermißt, ſo daß dem Garten dann die wenig erwünſchte Aufgabe zugewieſen iſt, durch eine großzügige Maſſenverteilung und Ruhe die auf das Haus geleitete Steigerung zu bändigen. Es iſt geradezu unmöglich, eine gute Hausarchitektur zu ſchaffen, ohne gleichzeitig die Überleitungen vom Hauſe in den Garten zu durchdenken. Beſonders augenfällig zeigt ſich dies in bewegten Geländen mit Terraſſierungen, wenn der eingeſchoſſige Baukörper durch ſtarke Überſchneidungen zurücktretend nur als integrierender Beſtandteil des Ganzen

erſcheint, wie es unvergleichlich in der Bekrönung der Terraſſen von Sansſouci durch das Schloß erreicht worden iſt.

Das alles klingt heute ſchon ſo ſelbſtverſtändlich, und doch war es vor ungefähr fünfzehn Jahren noch ebenſo ſelbſtverſtändlich, daß der Gedanke an den Garten erſt nach der inneren und äußeren Fertigſtellung des Hauſes aufgenommen wurde, vorausgeſetzt, daß dann überhaupt noch Mittel genug vorhanden waren, um den Garten wirklich als ſolchen anzulegen. In dem vorliegenden Fall zweier benachbarter Grundſtücke in Horn bei Bremen waren die Häuſer auch bereits fertig, als ich an die Planung des Gartens herantrat. Eine ſtattliche Ulmenallee teilte die Hintergärten ungefähr in der Mitte. Auch befanden ſich an einer Längsgrenze ſchöne Eichen und eine prachtvolle Platane in dem Vorgarten, der hier abgebildet iſt. Die ganze Lage führte mich zu einer ländlichen Auffaſſung ohne direkte Anlehnung an den Bauerngarten. Beſonders durch die freiere Bepflanzung der Rabatten und Verwendung der rabattenumſäumten Quartiere zur Gemüſepflanzung wurde ein wechſelnder, maleriſcher Charakter ſehr gefördert.

Der Ausblick aus dem Eßzimmer des erſten Gebäudes war beſonders weſentlich und beſtimmte die Richtung einer Axe, die das Bild vor einem elliptiſchen Raſen aufgenommen zeigt. Ein Raum entſtand hier durch die Aufſtellung mehrerer Scheinzypreſſen, ohne jedoch die Wirkung eines ſtreng in ſich abgeſchloſſenen Gartenteiles aufkommen zu laſſen. Die Freitreppe, welche von der Terraſſe herabführt, wurde erſt mit Rückſicht auf den Garten gebaut, denn urſprünglich hatte der Architekt einen ſeitlichen Abſtieg geplant. Nur durch dieſen an ſich unbedeutenden Eingriff wurde erſt ein Zuſammenſchluß des Hauſes mit dem Garten ermöglicht. Weil die Rückfront des Hauſes eine verhältnismäßig ruhige und anſpruchsloſe Geſtalt zeigt, ſo kam hier der Garten als formale Steigerung und Ergänzung des Hauſes noch zur Geltung.

Das Nachbarhaus bot dem Gartengeſtalter wieder ganz andere Geſichtspunkte. Ein reichgegliederter Bau, der lebhaft an den engliſchen Cottageſtil erinnert, verlangte nach einer Beſänftigung der Aufregung, nach einer Einfügung in ruhigere Geſamtwirkung. Der ſehr wohnlichen, überdachten Sitzterraſſe lagerte ich eine große, ungeteilte Obſtwieſe vor und griff erſt jenſeits der erwähnten Ulmenreihe zu den Mitteln einer bewegteren Geſtaltung. Von dieſem Teil aus gibt das Bild den Blick auf das Haus wieder. Durch den Wildroſenbogen ſieht man über einen Kinderſpielplatz hinweg auf die Obſtwieſe und das im Hintergrunde befindliche Haus.

Die Anlage des Vorgartens iſt wiederum durch die Façade des Hauſes, ich möchte ſagen, provoziert worden. Etwas Repräſentatives iſt da hineingekommen. Ein großer Raſenplatz liegt gegen die Straße und trägt als Schmuck eine ſchön gebildete Platane. Die Herbſtzeitloſe hat ſich hier im Raſen vortrefflich eingewöhnt.

GEORG LENZ / KERAMISCHE GARTENPLASTIKEN

Jean Gauguin

Stier

MIT den Problemen der Gartengeſtaltung iſt das der Gartenplaſtik immer untrennbar verbunden geweſen. Ihre Berechtigung und ihre Bedeutung ſind in der Geſchichte der Gartenkunſt eigentlich nie beſtritten worden. Dem Renaiſſance- und Barockgarten hat ſie geradezu das Gepräge gegeben, und dem empfindſamen Garten der romantiſchen Zeit verlieh ſie ſeine gefühlvollen Stimmungswerte. Hier im landſchaftlichem Park, wo ſie nur die Aufgabe hatte, reizvolle Punkte überraſchend zu beleben und den willkürlich ſich ſchlängelnden Pfaden hier und da ein Ziel zu weiſen, empfinden wir ihre künſtleriſche Notwendigkeit freilich nicht annähernd ſo ſtark wie bei den ausgeprägten hiſtoriſchen Stilformen des Gartens, wo ſie die Gliederung und Linienführung der Anlagen an den entſcheidenden Punkten betont. Und auch im modernen Garten dient die Plaſtik nicht lediglich dekorativen Zwecken, ſondern ſie erfüllt eine Forderung, die ſich mit zwingender Notwendigkeit aus ſeinem architektoniſchen Charakter ergibt. Denn wenn wir auch nicht mehr ſo hart und ſcharf wie in jenen alten Gärten die Konturen herausarbeiten, ſondern im Gegenteil bemüht ſind, dieſe durch die weichen weiblichen Elemente des Laubwerks aufzulockern, ſo fordert doch das feine Netz unſichtbarer Linien, das den Aufbau des Gartens heute beſtimmt, ebenſo unabweislich wie jene die Betonung gewiſſer Punkte von gefühlsmäßiger oder funktioneller Wichtigkeit. Unterläßt man es, dieſelben beſonders hervorzuheben, ſo wird die künſtleriſche Idee des Gartens zerſtört, er fällt auseinander, die Linien verirren ſich, verlieren ihr Ziel. Erſt die Plaſtik oder doch ein entſprechend dekorierendes Motiv gibt auch heute dem Garten die Struktur.

Die Gartenplaſtik ſtellt zugleich ein meiſt unentbehrliches Bindeglied zwiſchen Haus und Garten dar, das den engen Zuſammenhang zwiſchen beiden wirkſam unterſtreicht. Um ihre Einheit, die der Künſtler anzuſtreben hat, nicht zu zerreißen, muß ſie ſich ihnen anpaſſen und als ein dienendes, jedenfalls niemals herrſchendes Glied eine gewiſſe Zurückhaltung bewahren. Es bedarf alſo bei ihrer Wahl eines beſonderen Taktes. Die beſcheidenen Ausmaße des kleinen Hausgartens verbieten wohl unter allen Umſtänden die Aufſtellung von größeren monumentalen Bildwerken. Als plaſtiſcher Schmuck für dieſe kommen in der Regel mehr kleine Geſtaltungen heiteren oder ſpieleriſchen Charakters in Frage, die von ſeinen eigenen Schönheitswerten nicht ablenken, ſondern ſie ohne Aufdringlichkeit ſteigern. In der näheren Umgebung des Hauſes, auch auf der Gartenterraſſe und im kleinen intimen Sondergarten, pflegen Tierplaſtiken, die ja meiſt Gefühle des Behagens und des Wohlwollens auslöſen und gewiſſermaßen etwas Neutrales haben, das Problem recht glücklich zu löſen. Ihre Verwendung in dieſem Sinne hat wohl Auguſt Gaul mit ſeinen meiſterlichen kleinen Tierdarſtellungen, die die Geſchöpfe ohne Pathos in ruhiger Exiſtenz ſo überzeugend wahr und dabei oft ſo humorvoll wiedergegeben, entſcheidend beeinflußt.

Wir möchten heute die Aufmerkſamkeit der Gartenfreunde auf die temperamentvollen Arbeiten eines noch wenig bekannten Bildhauers lenken, die zu den künſtleriſchen Abſichten des modernen kleinen Hausgartens uns nicht weniger gut als die ruhigen kultivierten Arbeiten Gauls zu ſtimmen ſcheinen, nämlich auf die mit bachantiſcher Laune geſtalteten, an die chineſiſche Tangplaſtik erinnernden grotesken Tierbildnereien Jean Gauguins, eines Sohnes des berühmten franzöſiſchen Malers Paul Gauguin und ſeiner däniſchen Gattin Nette Sophie geb. Gad. Schon durch ihr Material verlocken dieſelben zur Aufſtellung im Garten. Jean Gauguin, der von der *Kopenhagener Porzellanmanufaktur* von Bing & Grøndahl mit ſicherem Inſtinkt für ſeine außergewöhnliche Begabung gewonnen worden iſt, hat, unterſtützt von den Chemikern der Fabrik, aus dem Ton von Brennkapſeln, die ja in jeder Porzellanmanufaktur in Unmengen zur Verfügung ſtehen, eine rauhe grobkörnige Maſſe komponiert, aus der er unmittelbar ſeine Skulpturen formt, die dann ohne einen Kapſelſchutz als mechaniſch nicht wiederholbare Einzelſtücke bei hoher Temperatur gebrannt werden. Dieſer Werkſtoff, der ſogenannte »rocher ceramique«, den der Künſtler zuweilen mit einer dickflüſſigen grünlichen Glaſur belebt, hält allen Witterungseinflüſſen ſtand und fügt ſich auch ſonſt mit ſeiner groben erdigen Farbe harmoniſch in eine gärtneriſche Umgebung ein.

Eva

Auch die große Naturnähe und Urſprünglichkeit, die Gauguins Bildwerken ihren eigenen Reiz verleiht, rechtfertigen ihre Aufſtellung im Freien. Er hat, wie er ſelbſt in einer autobiographiſchen Skizze mitteilt, (Tilskueren Maanedsſkrift 1918, 35. aargang, Seite 348) eine große Liebe zur Tierwelt, mit der er ſich beſonders als eifriger Gaſt des Kopenhagener Zoologiſchen Gartens

Silen

Europa

vertraut gemacht hat. Und zwar interessieren ihn in erster Linie die Bewegungen und Affekte der Tiere. Mit feinem Verständnis für das seltsam spontane Triebleben stark erregter Tiere, sowie für den Humor, den ihre unverhüllte Leidenschaftlichkeit bei den Menschen auslöst, wählt er gern Motive, die diese elementaren Eigenschaften lebendig hervortreten lassen. Der kraftstrotzende, unter der süßen Last der Europa bockig widerstrebende *Stier*, den das Stockholmer Schwedische Nationalmuseum erworben hat, ist köstlich aufgefaßt mit viel gutmütigem Spott und bewahrt trotz seiner Formenwucht eine gewisse spielerische Grazie. Und noch überzeugender hat der Künstler in dem den trunkenen *Silen* tragenden Esel und einem abgekämpft zusammenbrechenden Stier die von den stärksten Affekten gepackten Kreaturen in eine gebändigte Form gezwungen. Diese künstlerische Bändigung der aufgeregtesten Zustände der Tierseele, die seit Kändler in der Keramik niemand künstlerisch bewältigt hat, zeigt die souverän schaffende Hand des großen Künstlers, der alles Kleinliche abgestreift hat. Die gleiche Großzügigkeit und dasselbe sichere Formgefühl bewundern wir auch in Gauguins ebenfalls für die Aufstellung im Garten geeigneten schweren Deckelgefäßen, auf die er so witzig gewissermaßen als lauernde Wächter phantastische Tierdämonen gesetzt hat.
Er arbeitet stets aus dem Gedächtnis: »Ich sehe nur, ich zeichne nie draußen«, berichtete er, »die vielen Einzeleindrücke würden das Gesamtbild trüben. Ich nehme lieber eine gute Momentaufnahme zu Hilfe; ich will ja nicht die Tiere selbst geben, sondern die Empfindungen, die ihre Bewegungen bei mir auslösen«. Aber auch um die Bewegungen ist es ihm nicht allein zu tun, sondern vielmehr darum, sie seiner künstlerischen Idee dienstbar zu machen. Sein höchstes Ziel ist es, den Eindruck der Ruhe aus ihrem Gegensatz zur Bewegung zu entwickeln. »Keine Bewegung wird so voll und kräftig sein wie eine, die die Ruhe als Kontrast hat, und umgekehrt wird keine Ruhe so stark sein wie die durch die Bewegung gemessene.« Der Stier veranschaulicht in schlagender Weise diese Auffassung.
Die Söhne großer Künstler, die sich gleichfalls der Kunst zuwenden, fordern stets zu Vergleichen mit dem Vater heraus, die ihren Weg besonders im Anfang oft erschweren. Jean Gauguin ist sich dessen bewußt gewesen. An eine künstlerische Ausbildung hat er anfangs garnicht gedacht, vielmehr das Tischlerhandwerk erlernt und auf großen Reisen in Süd-Amerika, Griechenland, Süd-Frankreich, »sich selbst ganz einfach ausgelebt« und »leidenschaftlich viel getanzt«. Den Entschluß zur eigenen künstlerischen Betätigung fand er erst im dreißigsten Lebensjahre, nachdem es ihm zur inneren Gewißheit geworden war, daß er selber »etwas zu sagen hatte«. In der Tat erscheint die Persönlichkeit dieses außergewöhnlich begabten Plastikers stark genug, um auf eigenen Wegen sich durchzusetzen. Dennoch verleugnet er nicht das Blut seines Vaters, des impulsiven trotzigen Naturmenschen, der außerhalb der ihn störenden Zivilisation sich seine eigene phantastische Kunst aufbaute und einer ganzen Künstlergeneration neue Wege wies. Aber während in den Gemälden ein lyrisches Element überwiegt, das ihnen etwas traumhaft Visionäres gibt, sind die Schöpfungen des Sohnes mit elementarer Kraft und Lebensfülle förmlich geladen. Doch mit dieser derbsinnlichen Eigenart verbindet sich auch bei ihm ein starkes poetisches Empfinden. »Mit Ton und Glasur«, sagt er, »kann man Mythen gestalten.« Und dieses poetische Empfinden, das ihn trotz seiner gesättigten Naturanschauung vor jeder Abhängigkeit vom Naturvorbild bewahrt, ist es wohl, das seinen phantasievollen Schöpfungen jenen eigenen Zauber verleiht, der gut mit den Reizen des intimen Gartens zu harmonieren scheint.

A. J. VAN LAREN / PFLANZEN UND GÄRTEN IN ALGERIEN

DEN meisten Gärtnern unserer nördlichen Länder ist Algerien ein wenig bekanntes Land. Wohl haben Botaniker verschiedener Nationalität Nordafrika besucht und die Flora der Küstenländer und Gebirge, der Wüste und der Hochebenen beschrieben, aber seitens der Gärtner wurde Algerien bis jetzt nur wenig Aufmerksamkeit geschenkt. Deshalb möchte ich versuchen, bei den Lesern durch Mitteilung einiger meiner Beobachtungen in Algerien Interesse für das Pflanzenkleid Algeriens und die dortige Gartenkunst zu erwecken.

Nordafrika gleicht floristisch in vieler Hinsicht Südeuropa. Die Küsten- und Bergflora Nordafrikas zeigt das gleiche Bild wie die Flora von Südeuropa, und seine Pflanzenwelt gehört dieser völlig an. Denn Nordafrika ist durch die große Wüste, die Sahara, vom gewaltigen afrikanischen Hinterland vollständig abgeschlossen, und die Gebirge Nordafrikas schließen sich geologisch den Bergen Spaniens, Süd-Frankreichs und Italiens an, bilden sozusagen einen Kreis um das westliche Mittelmeerbecken mit einer übereinstimmenden Pflanzenwelt, von der viele Pflanzen in europäischen Gärten und Gewächshäusern kultiviert werden. Mitteleuropa gegenüber ist das Mediterrangebiet durch höhere Temperaturen und abweichende Niederschlagsverhältnisse ausgezeichnet. Mit zunehmender südlicher Breitenlage verschärfen sich diese Unterschiede immer mehr. Übrigens zeigt die jährliche Regenmenge recht erhebliche Schwankungen; sie nimmt in Algerien mit lokalen Ausnahmen einerseits von Westen nach Osten, andrerseits von Norden nach Süden ab, was von großem Einfluß auf das Charakterbild der Pflanzenwelt ist.

Die Wärmeverhältnisse stimmen mit denen von Südeuropa überein. Das Küstenland besitzt im Winter und Frühling das herrliche Klima

Aus dem Blumengarten der Literatur

Fühlingslieder der Vaganten

Der Bann, den der dem Jenseits zugewandte Sinn des Mittelalters auf die Natur gelegt hatte, wird zum ersten Mal gebrochen in den Liedern der Vaganten, der fahrenden Schüler, deren lateinische Verse wie ein Jubelruf des Frühlings die Poesie des Minnesanges einleiteten. In diesen im 13. Jahrhundert entstandenen „Carmina Burana", wie sie nach der wichtigsten Quelle, einer aus Benediktbeuren stammenden Handschrift, genannt werden, ertönt der früheste feurige Preis der Wonnezeit des Lenzes, und besonders packend sind einzelne deutsche Worte, die als ein Bekenntnis zu Natur und Heimat die internationale Sprachform der geistlichen Sänger durchbrachen. Drei bezeichnende Proben dieser ältesten Lenzesdichtung der neueren Zeit seien hier in der Übersetzung von Ludwig Laistner wiedergegeben.

Frühlingslied

Uns ist von der Sonne Schein
Botschaft heut ergangen:
Frühling dringt mit Macht herein,
Will den Sieg erlangen.
Auf! der Held der Flur und Hain
Weckt zu neuem Prangen,
Soll auch mit Gesange sein
Freudenvoll empfangen.
Drum erhebt euch, Alt und Jung,
Grüßet ihn mit Reigensprung
Und mit süßen Weisen.

Seit der Winter aus der Welt
Ward gejagt, der rauhe;
Haucht des Äthers stilles Zelt
Lüftchen linde, laue;
Wundersam vom Himmel fällt
Maienkraft im Taue,
Und der feuchte Segen schwellt
Strotzend Feld und Aue.
Drum erhebt ...

Wieder strahlt, der lang verschwand,
Und das Licht der Sonnen,
Und der Schnee, der alles Land
Traurig übersponnen –
Von dem heißen Sommerbrand
Ist er nun zerronnen,
Hat sogar der Heidesand
Frisches Grün gewonnen.
Drum erhebt ...

Horch, Frau Nachtigall beginnt
Ihren Sang, den süßen;
Lerche steigt, die Lüfte lind
Jubelnd zu begrüßen.
Und die Alte selbst – geschwind
Juckt ihrs in den Füßen,
Seit im Reigen sie das Kind
Seine Lust sah büßen.
Drum erhebt ...

Frühlingsgruß

Auf, zu grüßen
Lenz den süßen!
Freude hat er wiederbracht.
Blumen sprießen
Auf den Wiesen
Und die liebe Sonne lacht.
Nimmer sei des Leids gedacht!
Von dem jungen
Lenz bezwungen
Weicht des Winters grimme Macht.

Von der linden
Tauluft schwinden
Hagel, Schnee und all der Wust;
Frost entweichet,
Sommer reichet
Schon dem Lenz die Mutterbrust.
Armer Mann, der jetzt in Dust
Bleibt vergraben,
Sich nicht laben
Mag an sommerlicher Lust.

Wie sie springen
Und lobsingen
In dem holden Zauberkreis,
Die da dringen,
Werbend ringen
Nach Cupidos Lorberreis.
Laßt auf Cyprias Geheiß
Und auch springen
Und lobsingen
Unserm Parisparadeis.

Guter Rat im Lenze

Frühling kommt gegangen,
O frohe Zeit!
Läßt in Purpur prangen
Sein Blütenkleid.
Und der Vöglein Lieder
So wonniglich!
Alle Knospen springen,
Und ich kann nur singen:
Wie sonniglich!

Bad' in Frühlingslüften,
Du junges Blut;
Wenn die Blumen düften,
Das tut dir gut.
Nimm dir eine Schöne
Bedächtiglich,
Wandlet nach den Wiesen,
Wo die Blumen sprießen,
Einträchtiglich!

der Riviera; im Sommer ist es sehr warm. Auf der Hochebene, wo es im Winter stark frieren kann (während unseres Besuchs im Anfang April waren die hohen Berggipfel noch ganz von Schnee überdeckt), herrscht im Sommer große Wärme, und auf den südlichen Abhängen des Aurès-gebirges und in der Wüste bei Biskra sind Wärmegrade von 50 Grad Celsius dann nicht selten. Das milde Winterklima macht es möglich, neben den einheimischen Gewächsen viele Tropenpflanzen zu kultivieren, die auch im Winter fortwachsen können und kräftig bleiben bis zum neuen Sommer; und daher kommt es, daß viele Gärten und Parkanlagen oft ein ausgesprochenes tropisches Charakterbild erlangen. Aber, wie üppig und trefflich der Anblick vieler dieser Anlagen und Gärten sein möge, sie können unsere nördlichen Gärten mit den grünen Rasenflächen und ihrem farbenreichen Blumenschmuck nicht ersetzen. Diese Gärten wirken viel erfrischender als die Halb-Tropengärten, in denen der ungemein starke Wuchs der tropischen Bäume das Gemütliche überwältigt und unterdrückt. Zarter Blumenschmuck fehlt hier; die Kräuter können sich auf dem von Tropenbäumen in Anspruch genommenen Boden nicht recht halten.

Auch der Anblick der Straßenpflanzungen ist oft ein ganz anderer als in unseren nördlichen Ländern. In der Stadt Algier sind unsere bekannten winterkahlen Bäume vielfach ersetzt durch immergrüne Arten. Man sieht kleinblättrige Ficus-Arten angepflanzt, wie F. rubiginosa und andere, während in Parkanlagen und Gärten großblättrige Ficus-Arten vorherrschen, wie F. macrophylla oder F. altissima. Mit den Dattel- und anderen Palmen bilden die immergrünen Feigenbäume die Hauptbestände der Gärten und öffentlichen Parkanlagen. Sie bilden hoch in den Kronen ein reiches, kräftiges, lederartiges Laubwerk; aber unten, in der Nähe des Bodens, ist alles kahl und durchsichtig. Man sieht da nur die kräftigen Stämme und Äste der Bäume, mit wenig Grün von jungen Palmen und anderen immergrünen Pflanzen, die als Unterholz dienen. Für saftige Grasfluren ist es in diesen Gärten manchmal zu dunkel und auch zu trocken; auch Blütenpflanzen haben es da schwierig; ich sah gelb- und weißblütige Richardia, Antholyza aethiopica und Pelargonien. In den Privatgärten werden vielfach Sukkulenten zum Schmuck verwendet; so sah ich im Garten des Universitätsgebäudes in Algier eine üppige Vegetation von Opuntien, Cereen, Euphorbien, Agaven und viele Crassulaceen; die Pflanzen standen dicht aneinander in üppigem und kräftigem Wuchs und boten einen für unsere Augen ungewöhnlichen Gartenanblick.

Der Pflanzenschmuck der Garten- und Parkanlagen Algeriens besteht also aus anderen Gewächsen als in den mittel- und nordeuropäischen Ländern. Wir wählen unsere Ziergewächse hauptsächlich aus den Vegetationen der nördlichen Hemisphäre; in Nordafrika sind es größtenteils Pflanzen der südlichen Halbkugel, wie Akazien und Eukalypten aus Australien, Schinus molle und Magnolia grandiflora aus dem gemäßigten Amerika, Opuntien, Yucca und Agaven aus Mexiko, und mehrere Palmen aus Zentralamerika, Afrika, Australien oder Asien. Eine der schönsten Pflanzen, die zum Schmuck von Gärten und Parkanlagen in der Stadt Algier verwendet wird, ist Strelitzia augusta aus Südafrika, die dort üppige, dichte Gruppen bildet, indem ihre dunklen Stämme zusammenwachsen und oben sich auswachsen in große zweireihig gestellte, glattgrüne, lange, fächerförmige Blattspreiten. Die seitwärts ausbrechende Blüte ist unansehnlich, aber sehr merkwürdig. Die äußeren, schmalen, weißen Perigonblätter sind frei, lang zugespitzt, die seitlichen hohl; die zwei seitenständigen umschließen die Staubgefäße und sind am freien Rande mit flügelartigem Anhang versehen; die Scheiden sind dunkelbraun. Die Blüten der stammlosen Arten, wie S. ovata, S. Reginae, S. angustifolia sind kleiner, aber von schöner Färbung; die äußeren Perigonteile sind orange, die inneren blau. Sie gehören den ornithophilen Blüten an, die von Honigvögelchen besucht werden, wobei der Pollen der einen Pflanze auf den Griffel einer anderen gebracht wird.

Als wiederholt vorkommende Blütensträucher erwähne ich die aus Madagaskar stammende Buddleya madagascariensis, mit runzligen, gestielten, eilanzettlichen Blättern, die unterseits dicht grau- bis rostfarbenfilzig sind, und reichblütigen, lockeren, schlaffen, orangefarbenen Blütentrauben, die herrlich duften; dieser Strauch kann eine Höhe von drei bis vier Metern erreichen und ist sehr ansehnlich. Allgemein ist auch der japanische Mispelbaum, Eriobotrya japonica, als beliebter Schmuck- und Obstbaum. Mit seinen harten, glänzend dunkelgrünen, lederartigen, grob gesägten, am Ende verbreiterten Blättern und den kleinen, runden, gelben Früchten hat er für Gärten großen Schmuckwert. Die Früchte sind leicht sauer und von angenehmem Geschmack; sie werden beim Mahl häufig mit Feigen, Datteln, Apfelsinen und Nüssen gegessen.

Neben der Glycine, Wistaria chinensis, die man oft an Häusern verwendet sieht, ist als eine der häufigsten Schlingpflanzen die Bougainvillea zu betrachten, die in ihrem purpurnen Blumenschmuck eine der schönsten Gartenpflanzen ist. Aber immer sind es die Palmen, die einheimische Zwergpalme, Chamaerops humilis, die japanische C. excelsa, die Dattelpalmen und andere Phoenix-Arten, unter denen P. canariensis und P. tenuis mit den dicken plumpen Stämmen wohl die imponierendsten sind, deren Blätterpracht den Gärten großen Reiz verleiht. Daneben sieht man immer wieder Agaven, Opuntien, Akazien, Eukalypten und Magnolia grandiflora. Aber auch laubabwerfende Bäume sind häufig in Gärten und Parks, an Straßen und Wegen, wie beispielsweise Silberpappeln, Platanen, Eichen, Weiden, Eschen, daneben immer wieder Eukalypten, Oliven und Pinus halepensis.

Der wichtigste und größte Garten in Algier ist der Versuchsgarten (Jardin d'Essai du Hama), den die Franzosen bald nach der Eroberung von Algerien, 1830, angelegt haben. In diesem 80 Hektar großen Garten werden Tausende von Bäumen, Sträuchern, Palmen, Bambusen und Stauden aus allen Teilen der Welt kultiviert, um zu erforschen, welche Arten für erfolgreiche Kultur in Algerien und anderswo verwendbar sind. Unser Besuch lehrte uns rasch, daß dank dem gesegneten Klima des nordafrikanischen Küstenlandes eine bunte Menge von Gewächsen aus gemäßigten und warmen Ländern in üppiger Weise fortkommen, wenn nur ein guter Boden und Wasser in hinreichender Menge zur Verfügung steht. Jedesmal glaubt man sich in die Tropen versetzt. Schöne, ausgedehnte Alleen von Dracaena Draco, Fächer- und Fiederpalmen, Ficus und Bambus, üppige, prachtvolle Gruppen von Strelitzia augusta und immergrünen Laubhölzern verleihen dem Garten oft tropische Züge.

Einen tiefen Eindruck macht auf uns die Allee von Drachenblutbäumen, Dracaena Draco, einer baumartigen Liliaceae vom Kanarischen Archipel. Dieser merkwürdige Baum kann sehr alt werden; es sind auf Teneriffa noch spärliche Exemplare nachzuweisen, deren Alter auf einige tausend Jahre geschätzt wird. Im »Jardin d'Essai« sind es alles noch ziemlich junge Exemplare; kurz und gedrungen sind die plumpen Stämme und Äste, die sich allmählich gabelförmig zerteilen, bis endlich die Gipfel auswachsen in eine Rosette von zähen, graugrünen, schmalen Blättern. Jedesmal, wenn solch eine Rosette zur Blüte gelangt und einen breiten Büschel von grünlichen Blümchen entwickelt, kommt auch für diese Gipfel die Zeit zur Gabelung, und zwei oder drei neue Sprosse kommen zur Entfaltung, welch jeder wieder zu einer Rosette auswächst und als Vegetationspunkt eines neuen Astes dient. Mit der Bildung der Blumenrispe wird jedesmal der Längenwuchs eines Astes abgeschlossen. Demzufolge bildet die Krone eines Drachenblutbaumes, deren Blätterrosetten alle in gleicher Höhe dicht neben einander wachsen, ein geschlossenes, gewölbtes oder schirmförmiges Dach von Blättern. Und so stand in dieser Allee eine lange Doppelreihe von kräftigen, jungen Drachenblutbäumen von stark imponierender Wirkung.

Eine andere Allee war wieder aus Livistona chinensis gebildet, der herrliche Fächerpalme aus China mit breiten, runden, regelmäßig gefalteten Blättern, die aus kräftigem Stamme entspringen und Kolben mit Blumen oder blaugrünen Früchten trugen.

Von ganz anderer Wirkung war die »Allée de Caoutchouc« aus hohen, breit verästelten Bäumen von Ficus macrophylla und F. elastica, einen rein tropischen Anblick bildend. Von erstgenannter Art sah ich Riesenbäume mit mehreren mächtigen Stämmen und Luftwurzeln, die bisweilen mit den Stämmen zusammengewachsen oder von den Ästen aus geradezu zum Boden niedergegangen waren und sich darin festgewurzelt hatten, wodurch die Nahrungszufuhr des Baumes erheblich gesteigert wird.

Einen reizvollen tropischen Anblick bot auch die Bambusen-Allee. Die Bambusen stellen die höchsten Gräser dar. Zierlich, bis zu größter Höhe strecken sich die schlanken, baumartigen Stengel empor, die hier am Boden nicht selten einen Durchmesser von zehn Centimetern erreichten und sich in dichte Wolken von länglichen, grünen Blättchen auflösten. In dieser imposanten Allee könnte man sich auf Java, oder irgendwo im heißen Osten, wähnen. Natürlich gab es auch Alleen und Gruppen von Dattelpalmen und anderen Phoenix-Arten.

Der Garten ist in große viereckige Quartiere abgeteilt, alle von den erwähnten Alleen umschlossen, und besonders die Alleen mit Aussicht auf das Mittelmeer sind von großartiger Wirkung. Daneben gibt es auch landschaftlich angelegte Partien mit Teichen und Kanälen, überschattet von zauberhaften Gruppen von Strelitzia Augusta, Kokospalmen, Cocos plumosa, C. Romanzoffiana und C. Yatay, die ihre reizenden fieder- und fächerförmigen Wedel hoch in der Luft ausbreiten. Beträchtlich ist die Sammlung von Cycadineen oder Palmfarnen. Ich sah unter diesen die schönsten Arten mit Früchten. Die Gattung Encephalartos war ver-

Ziegelſteinplaſtik

DIE Umänderungsarbeiten eines Hausgartens waren ſo weit vorangeſchritten, daß an die Ausbildung der Details und an die Einfügung beſonderen Schmuckes gedacht werden konnte.
Während der Prüfungen ſtellte ſich heraus, daß die Mitte des Roſenraumes, ein ſchlichter, von Ziegelſteinpfaden durchkreuzter, langgezogener, mehreckiger Raſenplatz einer beſtimmten Betonung bedürfe, etwa in Geſtalt einer Plaſtik, zumal auf dieſe Mitte ein breiter, mit Staudenrabatten umſäumter Raſenweg mündete.
Da es dem Inhaber des Gartens, einem Ziegeleibeſitzer, keine ſonderlichen Koſten verurſachte, Arbeitskraft und Material ſeines Werkes bereitzuſtellen, entſchloß ich mich zum Entwurf der in Skizze und Lichtbild veranſchaulichten Plaſtik.
Schwierigkeiten bot allein der Brand einer krönenden Blumenſchale, denn darauf waren die Öfen nicht eingerichtet. Dieſe wurde denn aus Kunſtmuſchelkalk gefertigt. Beide Materialien vereinen ſich, durch üppiges Blüten- und Blattwerk, ſowie durch breite gelbliche Fugenlagerung zwiſchen den Ziegelſchichten unterſtützt, ſehr wirkungsvoll.

Harry Maaß

treten in mehreren Arten; auch von Zamia, Ceratozamia, Dioon und Cycas gab es verſchiedene ſchöne Striche. Die Blätter der Cycas-Arten werden bei uns häufig zu Kränzen verwendet; die Pflanze hatte hier in ihrem wolligen Blütenſcheitel rote Früchtchen entwickelt, während das ſeltenere Dioon edule, das ebenfalls in Blüte ſtand, eine feſte, dicht behaarte Krone trägt. Prächtig ſind auch die ſcharfbeſtachelten, blauen Blattfiedern von Encephalartos horridus.

In üppigem Flor prangte eine Raphiolepis indica, ein kleiner Baum mit breiter Krone, gänzlich überdeckt von Tauſenden von kleinen, weißen Blüten; glänzend leuchteten daneben die Blumen von Strelitzia ovata und S. reginae mit orangegelben und blauen Blumenblättern. Die blauen inneren Perigonblätter umſchließen, wie oben erwähnt, die Antheren, weichen aber bei leichtem Druck zurück, wodurch die Staubbeutel ganz unbedeckt nach außen zu liegen kommen. Dieſe Blumen werden von kleinen Honigvögeln beſucht, und dabei werden die blauen Perigonblätter niedergedrückt, ſodaß der Pollen in Berührung mit den Bruſtfederchen der Vögel kommt. Beim Beſuch weiterer Blumen werden alſo die Tierchen zunächſt deren klebrige Narbe berühren, wodurch die Beſtäubung ſtattfindet und die Befruchtung der Blüte geſichert wird.

Sehr hübſch war auch ein ſymmetriſch angelegter Blumengarten mit breitem Teich, umgeben von Blumenparterren, Ziergehölzen und Bäumen, mit ſchöner Ausſicht auf das Meer. Man könnte ſich hier wieder nach Europa verſetzt glauben, wenn nicht die ſchlanken Palmen wären.

(Ein Schlußartikel folgt.)

TH. HOOG JR. / EREMURUS

DIE ſtolzen Formen des Lilienſchweifs oder der Kleopatranadel überragen im Mai-Juni buchſtäblich alle andern Gewächſe des Ziergartens. Ihre Wirkung iſt nicht leicht zu übertreffen, zumal wenn Hunderte zu gleicher Zeit blühen, wie auf unſerem Bilde aus Haarlem. Da dieſe ſchönen Pflanzen in unſeren Gärten immer noch viel zu ſelten anzutreffen ſind, ſei ein kurzer Überblick über die beſten Arten und ihre Kultur gegeben.

Als erſte kommen Mitte Mai in Blüte E. Elwesianus und ſeine Form albus. Sie bilden bis zwei Meter hohe Blütenſtände, die beim Typ dicht mit roſa Blüten beſetzt ſind, die ſich weit über das hellgrüne Laub erheben. Die Varietät grandis iſt eine Form mit noch höherem Stengel. Etwas ſpäter blüht E. himalaicus, der etwa 1,25 Meter hoch wird und deſſen weiße Blüten ſchöne orange Staubfäden haben. Er bildet mit den noch zu erwähnenden E. robustus und E. Bungei folgende Hybriden. E. himrob (E. himalaicus mit E. robustus), der auch als robustus ſuperbus geht und eine ſchöne reichblühende Hybride darſtellt, die in der Tracht an Elwesianus gemahnt, ſich aber davon durch die weißlich-roſa Farbe und ſchmälere Riſpen unterſcheidet. E. Tubergenii (E. himalaicus mit E. Bungei) entſtand als Zufallshybride bei Tubergen und iſt wichtig als die erſtblühende gelbe mit großen zitronengelben Blüten.

Unter den im Juni blühenden Arten iſt die prächtigſte E. robuſtus, die bis zwei und einen halben Meter hohe Stengel bildet, die roſa Blüten tragen. Das Laub iſt graugrün, wodurch ſie ſich von dem einen Monat früher blühenden Elwesianus unterſcheidet. E. Bungei iſt eine elegante Art mit hellgelben Blüten und ſchmäleren Blättern, als die der genannten Arten. Die Stengel werden bis 1,25 Meter hoch. Als E. Bungei perfectus geht eine höhere, reicher blühende Form.

Am ſpäteſten blüht E. Olgae, eine ziemlich unbedeutende Art mit locker ſtehenden roſa Blüten an mäßig hohem Stengel. Sie bildet mit E. Bungei die Hybride E. Shelford, die in der Tracht an Bungei gemahnt und ſich mit braunorange und terracottafarbenen Blüten ſchmückt. Daneben ſind nun in zweiter und dritter Generation Hybriden mit roſa Blüten, aber ſonſt an Bungei gemahnend, entſtanden; ferner weiße Formen und blaßgelbe ſpätblühende, alſo Olgae näher ſtehende. Alle dieſe Hybriden blühen ſehr willig und ältere Pflanzen bringen oft bis zu drei Stengel. Selten iſt die Hybride E. robuſtus mit E. Bungei, die als E. Warei geht und bronzefarbene Blüten hat; ſie ſteht in Blütengröße, Höhe und Laub zwiſchen den Eltern.

Einige gelegentlich angebotene Arten, wie E. altaicus, E. Kaufmannii, E. spectabilis erinnern in der Blüte an einen Rieſen-Wegerich und haben für Gartenkultur keinen Wert.

Die Kultur iſt verhältnismäßig leicht. Die eigenartigen Rhizome mit den fleiſchigen Wurzeln werden im Oktober bis Dezember in guten, nahrhaften, tiefgründigen und durchläſſigen Boden ſechs bis zehn Centimeter tief gepflanzt. Die Wurzeln ſind flach auszubreiten, man macht daher etwa fünfzig Centimeter breite Scheiben und achtet darauf, daß die Knoſpe in die angegebene Tiefe kommt. Im Winter iſt eine Schutzdecke gegen Froſt ratſam, die im Frühjahr allmählich entfernt wird.

Die Vermehrung erfolgt am leichteſten durch Ausſaat. Die Samen gelangen in jedem Jahre in größerer Menge zur Reife und werden nach der Ernte und Reinigung im Oktober in ſandigen Boden geſät. Im Frühjahr keimen ſie, im Sommer ziehen die jungen Blätter wieder ein. Im Juli nimmt man dann die jungen Pflänzchen mit einer Knoſpe und ein bis zwei fleiſchigen Blättchen aus dem früher bezeichneten Standort auf und bewahrt ſie in trockenem Sand bis zur Pflanzzeit. Im Herbſte ſetzt man ſie drei bis fünf Centimeter tief und erhält ſo von Elwesianus und robustus nach fünf bis ſechs Jahren große Rhizome reich blühender Pflanzen; bei E. Bungei, E. Shelford dauert es nur drei bis vier Jahre. Sie laſſen ſich dann im Sommer teilen, wobei zu jeder Knoſpe einige Rhizome kommen müſſen.

Gartenarbeit und Blumenpflege

C. R. JELITTO / PRIMEL-ERFAHRUNGEN

I. Arten für Staudengarten und Park

DEM Beobachter dürfte im Vorfrühling und Frühling auffallen, selten einen Garten ohne Himmelschlüssel zu treffen. Es ist auch recht so. Denn die Primeln gehören zum Frühling, und einen Frühling ohne Himmelschlüssel zu erleben, wäre einfach undenkbar, wenigstens für uns Kulturmenschen der gemäßigten Zone. Die Primeln gehören zum Frühlingsgarten, ebenso wie die Schneeglöckchen, Märzbecher, Buschröschen, Lerchensporn, wie Hasel- und Weidenkätzchen. Gerade von allen diesen Frühlingsblumen müßte jeder Garten haben, und wenn es auch nur einige wenige sind.

Ist nun im allgemeinen der weitaus größte Teil der Primelarten nicht als Sorgenkinder zu betrachten, so wäre es dennoch verkehrt, sie alle in der Behandlung über einen Kamm zu scheren. So verschieden wie ihr heimatliches Vorkommen ist, so verschieden wird natürlich auch ihre Behandlung sein müssen. Ein geübtes Auge wird der Pflanze (nicht nur bei Primeln) meist auch schon äußerlich ansehen, welche Bedingungen sie beansprucht. Zum wenigsten wird es aber doch Anhaltspunkte finden, ob die Pflanze von Natur aus einen sonnig-trockenen oder feuchten oder schattigen Standort mit dementsprechendem Boden verlangt. In zweifelhaften Fällen wird man nach einigen Versuchen schon nach und nach den richtigen Weg finden. Bei den Primeln ist das weniger ängstlich, da wir es mit einer Gattung zu tun haben, die wenig physiologisch entgegengesetzte Arten enthält. Die meisten, zum mindesten der größte Teil der asiatischen Primeln, sind Wiesenpflanzen, die immer mehr feuchtere Bodenverhältnisse verlangen; nur der geringste Teil sind Gehölz- oder Felsbewohner. Auffallend ist, daß auch bei den Primeln die Vorfrühlingsblüher vorwiegend Gehölzbewohner sind, wie etwa P. acaulis, und var. iberica, oder P. elatior. Diese Arten aus der Sektion Vernales werden daher auch in der Kultur im Garten einen halbschattigen, humosen Standort bevorzugen; am Rande der Gehölze oder zwischen diesen. Alle, wie acaulis, var. iberica, elatior und officinalis sind wohl die bestgeeigneten zum Verwildern. Wir haben jedenfalls keine anderen Primeln, die in den Gärten so natürlich verwildern wie diese. Das leichte Verwildern durch Selbstaussaat gerade dieser Arten ist auch nicht schwer zu erklären. Sie sind alle heimisch bis auf die kleinasiatische iberica. Finden sie in den Gärten ihre natürlichen Bedingungen, so fühlen sie sich dann gleichsam nicht als Kulturpflanze, sondern glauben draußen in ihrer Freiheit zu sein, die sie dann auch gründlich ausnützen. Namentlich P. officinalis ist im Freiheitsdrang unaufhaltsam. Hat sie genügend große Wiesenflächen im landschaftlichen Garten oder Park, so sieht man schon nach einigen Jahren im Frühling die Wiesen voll von ihr bedeckt. Es ist ein reizender Anblick um die Osterzeit, überall wo das Auge schaut, Himmelschlüssel zu erblicken. Je stärker die Grasnarbe ist, um so wohler wird sich die officinalis auf ihr fühlen. P. acaulis und var. iberica, sowie P. elatior siedle man in dem Humus zwischen lichtem Gehölz oder im Halbschatten vor diesem an. Schon nach zwei bis drei Jahren werden auch sie an Zahl und Ausdehnung zugenommen, sich frisch und fröhlich, vielleicht für immer ihre neue Heimat erobert haben. Alljährlich im Frühling werden sie zusammen mit Leberblümchen und Haselkätzchen, Lungenkraut und Lerchensporn in immer stärkerem Maße unser Herz erfreuen. Nur muß das Gehölz, in dem sie stehen, unberührt bleiben. Es wäre grundverkehrt hier ordnungshalber das Laub herauszuharken, dadurch wird jeglicher gepflanzter und natürlicher Unterwuchs zerstört. Man überlasse das Gehölz nur sich selbst und lichte allenfalls etwas aus, wenn es zu dicht wird. P. acaulis iberica trägt verschiedene Namen. Der wissenschaftlich korrekte ist P. acaulis var. rubra. Sonst geht sie noch als P. Sibthorpii und wurde unter diesem Namen in Band II, Seite 49a und 75 abgebildet.

Zur gleichen Sektion gehört und ebenfalls ein Vorfrühlingsblüher ist P. Juliae aus dem Kaukasus, deren Bild in Band IV, Seite 45 gegeben wurde. Sie ist bis jetzt die einzige, rasenbildende Primel von zufriedenstellender Wüchsigkeit und fürs Alpinum wundervoll geeignet. Gerade dadurch, daß sie ganz niedrig, nur fünf Centimeter über dem Erdboden dahinkriecht, ist sie so wertvoll und auch die unzähligen Blüten gehen in ihrer Höhe kaum über das Laub hinaus. Sie verlangt aber einen absonnigen Standort mit etwas schwerem, feuchtem Boden. Hier wird sie schon im ersten Jahr bei richtiger Pflege die ganze Pflanzfläche ausfüllen und jedes Jahr um die Osterzeit einen Teppich purpurroter Samtblüten bringen. Zu empfehlen ist jedoch bei großen Flächen ihr nach drei bis fünf Jahren den Boden zu erneuern, sie umzupflanzen, da sie sonst im Blütenreichtum nachläßt. Oder aber man muß alljährlich die Fläche im Winter *ganz dünn* mit vollkommen *kurzem* Dünger (Dungerde) bestreuen und diesen, sobald die Vegetation beginnt, wieder leicht abharken. Gute nahrhafte, unkrautfreie Mistbeeterde wird die gleichen Dienste tun. So erhält der Boden für ein Jahr wieder genügende Nährstoffe. Ein Notbehelf bleibt dies aber immerhin, und das beste ist es schon die Primel umzupflanzen. Als Vermehrungsform ist bei P. Juliae die Teilung die beste; sie soll gleich beim Umpflanzen vorgenommen werden. Samen setzt diese Primel nur sehr wenig an. Sie ist erst in den neunziger Jahren in Transkaukasien von *Kusnetzow* gefunden worden, der sie nach seiner Frau benannte.

In die Zeit der letzten regelmäßigen Nachtfröste fällt auch die Blütezeit der beiden Himalaya-Primeln P. denticulata und P. rosea, die in keinem Staudengarten fehlen dürfen. P. denticulata erscheint mit ihren blauen Blütenbällen etwas vor P. rosea. Halbschattige Lage wird ihr am besten zusagen, oder aber sie muß feucht stehen, an Bach- oder Teichufern, wenn ihr Standort in voller Sonne liegt. Ist jedoch keine natürliche Feuchtigkeit bei sonnigem Standort vorhanden, so wird ein regelmäßiges, reichliches Bewässern bei heißem Wetter unerläßlich sein. Die Gartenformen, wie etwa „Rubin" und andere sind ganz natürliche alltägliche Farbenabweichungen, wie sie ein jeder bei seinen eignen Pflanzenbeständen dieser Art beobachten kann. P. denticulata wurde schon um 1800 aufgefunden, und im Laufe der Zeit stellte sich heraus, daß ihr Verbreitungsgebiet sich über die ganzen Provinzen südöstlich, südlich und südwestlich des Himalaya erstreckt. In die Kultur hat sie die englische Firma Veitch 1842 eingeführt. Die Vermehrung dieser wundervollen Primeln kann durch Teilung älterer Exemplare, sowie durch Samen, den sie stets reichlich ansetzt, erfolgen.

Die gleichen Forderungen an Standort und Boden stellt die schöne P. rosea. Sie gibt zusammen mit der denticulata als Uferbepflanzung im Frühling ein malerisches, farbenfreudiges Bild, und die Leuchtkraft der rosea, ganz gleich, ob bei trübem oder hellem Wetter, ist jetzt noch von keiner anderen Primel übertroffen worden. Steht P. rosea am Wasser, dann werden sich dort die Pflanzen kräftig entwickeln, und sich selber überlassen jahrelang halten, ohne daß sich eine Müdigkeit bemerkbar macht, wie dies sonst bei den Primeln fast allgemein der Fall ist. Gänzlich falsch ist es, P. rosea in die Nähe von Gehölzen zu bringen, wo sie von den Wurzeln noch erreicht wird. Hier verschwindet sie schon im ersten Jahr wieder. Sie ist in dem westlichen Himalayagebiet, besonders in der Provinz Kashmir heimisch, wo sie in der alpinen Region in 3 bis 4000 Meter Höhe auf feuchten Wiesen vorkommt. In Kultur war sie zuerst bei Thomas Ware, Tottenham. Die Vermehrung wird am besten durch Samen vorgenommen; die Sämlinge wachsen sehr rasch und schon im zweiten Jahre hat man blühbare Pflanzen. Die Tracht der beiden Primeln, denticulata und rosea, ist bekannt. Die erste wurde in Band IV, Seite 68a im Farbenbilde gezeigt.

Als nächste in der Blütenfolge kämen wohl drei japanische Primel-Arten in Frage: P. cortusoides, P. Sieboldii und P. japonica. *P. cortusoides* ist in den Bergwäldern vom Ural bis zum Altai, im Amurland und Japan verbreitet und seit 1794 in Kultur. Sie wird sehr leicht mit Cortusa Matthioli verwechselt; diese hat aber die Staubfäden am Grunde eingefügt, während sie bei der Primel in der Blumenkronröhre sitzen. Wenn cortusoides auch in ihrer Heimat in Bergwäldern vorkommt, so kann man sie doch nicht so ganz ohne weiteres auch im Garten zwischen Gehölze pflanzen, wo eine rücksichtslose Wurzelkonkurrenz herrscht. Dies kann sie absolut nicht vertragen, wenn sie sich einigermaßen gut entwickeln soll. Auch in der Heimat wird sie sicherlich nur an Stellen vorkommen, wo ein lockerer Laubhumusboden ohne jeden Wurzelkampf vorhanden ist. Solche schattigen Stellen mit lockerer Lauberde wird man ihr im Garten geben müssen, um sich an der schönen drüsigbehaarten Primel mit den tiefrosa Blüten zu erfreuen, deren Bild in Band II, Seite 75, zu finden ist. Bei dieser Art sorge man jedoch immer für genügenden Nachwuchs, da eine Vermehrung durch Teilung

bei ihr nicht in Frage kommt, und ſie durch Samen auch nicht ſo leicht wie andere Arten anzuziehen iſt.

Obwohl *P. Sieboldii* in ihrer Heimat, Japan, auf ſumpfigen Wieſen in voller Sonne vorkommt, wird ſie hier nur ganz ſchattig, in lockerer, leichter Laub- und Heideerde kultiviert. Noch nie habe ich je einen Verſuch geſehen, dieſe Art etwas ſumpfig an Bach- und Teichrändern gleich roſea anzupflanzen. Reizend und immer wieder lieblich iſt P. Sieboldii mit ihren weiß-wolligen Blattſpitzen beſonders im Austrieb. Die Blüten ſind ſehr groß, weiß, roſa bis purpurn, doch überwiegt bei weitem die roſa Farbe; die ganze Pflanze wird ungefähr bis 20 Centimeter hoch. Man wird meiſt nicht umhin können, den gekauften Pflanzen einen ſchattigen Platz mit vollkommen lockeren Boden (Laubhumus) zu geben, da ſie in den Anzuchtgärtnereien meiſt unter Schattenſtellagen herangezogen werden. Die reine, echte Art wird man allerdings ſehr ſelten erhalten. Als Vermehrungsart kommen hier Teilung wie auch Ausſaat in Frage. Hat man einen alten Beſtand, ſo iſt die Teilung nach der Blüte und der Samenernte jedoch die beſte Art der Vermehrung.

Als nächſter der Frühlingsjapaner käme dann noch die robuste und unverwüſtliche *P. japonica,* die ebenfalls in Band II, Seite 74, gezeigt wurde. Sie iſt wohl in der Kultur eine der zäheſten und urwüchſigſten von unſeren fremdländiſchen Primeln. In einem etwas ſchweren, feuchten Boden, in halbſchattiger Lage werden ſich die Pflanzen ſehr gut entwickeln und jahrelang ohne jegliches Zutun halten. Auch für ihren genügenden Nachwuchs ſorgt dieſe Art ſelbſt; alljährlich werden im Frühjahr Hunderte von Sämlingen um die Mutterpflanzen aufgehen, wenn auch der Samen im Herbſt geſammelt wurde. Der dabei zu Boden fallende Samen genügte vollauf für ſolche zahlreiche Nachkommenſchaft. Die Art wird bis 50 Centimeter hoch, hat ein üppiges Wachstum, die Farbe der Blüten iſt ein ſammtenes Karmin bis Purpur. Die Blätter ſind glänzend und ſtark runzelig. Im Jahre 1871 erzog ſie Bull in Chelsea in England zum erſten Mal aus Samen, und von hier aus hat ſie ſich raſch verbreitet. Auch bei den Japanern ſelbſt iſt ſie als Heimatpflanze in Kultur. Dort kommt ſie in den ſchattigen Gebirgstälern der montanen Region an feuchten Plätzen vor.

Das wären die wichtigſten Staudenprimeln des Vorfrühlings, die als Schmuckpflanzen für uns in Frage kommen. Gewiß gibt es deren noch mehr; dieſe beſitzen jedoch mehr botaniſchen und Liebhaberwert, ſind meiſtens garnicht in Kultur, ſondern gewöhnlich nur in der Literatur und Herbarien vorhanden. Die alpinen Felſenprimeln wollen wir weiter unten noch durchgehen.

Unter den Staudenprimeln des Frühlings und Vorſommers haben wir ebenfalls wundervolle Arten. Dieſe ſind jedoch zum größten Teil oſtaſiatiſch und vor nicht allzulanger Zeit erſt in die Kultur eingeführt. Bei ihnen kommen in der Blüte Farbentöne vor, wie wir ſie bei den außeraſiatiſchen kaum antreffen. Ich erinnere nur an P. Beesiana, Bulleyana, burmanica oder Littoniana. Davon hat vor allen Dingen P. Bulleyana alle warmen und zarten Abſtufungen in Orange; und gerade ſie variiert in ihren Farbentönen wie keine zweite Primel. Mit dieſen Sommerprimeln ſind darum auch eine Menge Kreuzungen verſucht worden, jedoch den Rang und Vorzug der reinen Arten haben ſie bis jetzt noch kaum ſtreitig machen können. Die Garten- und Zuchtformen fallen doch nie ganz rein aus Samen, ſodaß man ſchon bei der Vermehrung durch Ausſaat ein reines Sammelſurium von Farben bekommt, und infolgedeſſen auf Teilung angewieſen iſt. Damit ſoll nicht etwa geſagt ſein, daß Zuchtverſuche mit Primeln zu verurteilen ſind oder nicht gut geheißen werden ſollen.

Auch von den Staudenprimeln des Vorſommers wollen wir nur die bekannteſten, als Gartenſchmuck in Frage kommenden, hier angeben. Eine der älteren iſt *P. sikkimensis.* W. H. Hooker brachte ſie 1851 aus Sikkim, wo ſie in 4000 bis 5000 Meter Höhe an feuchten Orten vorkommt, nach dem Botaniſchen Garten in Kew, von hier aus wurde ſie verbreitet. Ihre Blütenſchäfte werden 40 bis 50 Centimeter hoch und tragen im Mai bis Juni Büſchel von 5 bis 8 ſchwefelgelben, hängenden Blüten. Die Blätter ſind länglich. In der Kultur will ſie etwas ſorgfältig behandelt werden; vor allen Dingen verlangt ſie friſchen Boden, einen geſchützten feucht-kühlen Standort. Von den gelben Staudenprimeln des Vorſommers wird ſie neben der luteola, die nebenbei geſagt, jetzt in der Kultur ſehr ſelten geworden iſt, jedenfalls immer noch die beſte ſein. Die Vermehrung kann durch Teilung und Samen geſchehen.

Primula pulverulenta ähnelt der japonica in der Farbe ſehr. Die Blütenſtiele und Kelche ſind jedoch hier dicht weißmehlig, auch baut ſich pulverulenta im ganzen viel eleganter und die Blätter ſind bei ihr im Gegenſatz zu japonica matt und etwas länglicher. In der Blüte iſt ſie jedes Jahr unverwüſtlich, und wird ſich immer dankbar erweiſen, wenn ſie einen Standort und eine Behandlung hat, die ihr zuſagen. Wilſon hat ſie in Weſt Szetchuan in China gefunden, wo ſie in einer Höhe von ungefähr 3000 Meter feuchte, offen-ſonnige Wieſen beſiedelt. Sie verträgt bei uns in der Kultur die volle Sonne ohne weiteres, vorausgeſetzt natürlich, daß ſie immer feuchten Boden hat. Der guten Eigenſchaften wegen, die dieſe Art beſitzt, ſollte ſie mehr Freunde finden. In der Vermehrung, ſei es Teilung oder Ausſaat, iſt ſie gleich willig.

Etwas neueren Datums iſt *Primula Veitchii* aus Central-China, die ebenfalls Wilſon 1905 auf ſeiner Sammelreiſe an felſigen, mehr ſonnigen Abhängen in 2000 bis 3000 Meter Höhe fand. Ihre Verbreitung erſtreckt ſich jedoch noch weſtlich bis in die Provinz Szetchuan. Sie gehört in die Sinenſis-Gruppe und ähnelt cortusoides. Die Blüten ſind bei ihr tiefroſa mit einem orangenen Schlundring. Die Blätter ſind rundlich herzförmig, ſtark ausgebuchtet und behaart. Sie kann einen etwas mehr ſonnigen, weniger feuchten Standort vertragen, jedoch ſoll der Boden immer humos und locker ſein. Mit ihrem edlen Bau wird ſie als Nachbarn ebenfalls wertvolle Pflanzen verlangen. An Blütenreichtum kann ſie mit japonica, pulverulenta oder Bulleyana nicht wetteifern, was nicht immer nötig iſt. Den Samen ſammele man jedoch ſorgfältig, weil ſie ihn nicht übermäßig reich anſetzt, auch die Anzucht iſt etwas ſchwierig.

In den Jahren nach 1903 bis zum Ausbruch des Krieges war neben Wilſon noch G. Forreſt auf ſeinen Sammelreiſen in Oſt-Aſien von ſeltenen Erfolgen begünſtigt. Immer wieder brachte er uns wertvolle Pflanzen von damals ungeahnter Schönheit; nicht nur krautartige, ſondern auch Gehölze. Und welche Pflanzenſchätze mögen noch in dieſem ſchier unerſchöpflichen Teil des weſtlichen Chinas ſchlummern. Was hat uns Forreſt allein ſchon von der Gattung Primula und Rhododendron gebracht. Mit demſelben Eifer war er bis vor kurzem wieder draußen tätig und auch aus jüngſter Zeit haben wir ſchon ganz gut eingebürgerte Neuheiten in Kultur. Aus der Vorkriegszeit von Forreſt ſtammt auch die *P. Bulleyana.* Ohne Zweifel hat ſie von den neueren Primeleinführungen als Schmuckſtaude den größten Wert. Ich ſage ausdrücklich von den neueren, denn P. roſea und P. denticulata, die ja ältere Einführungen ſind, werden wohl kaum von irgend einer anderen in ihren überaus glücklichen Geſamteigenſchaften übertroffen. Doch von den Sommerprimeln wird P. Bulleyana immer als eine der beſten gelten. In ihrer Tracht kommt ſie pulverulenta ſehr nahe, ebenfalls im Blütenreichtum. Doch in der Farbe übertrifft ſie wohl alle Sommerprimeln. Die warmen zarten Töne gehen bei ihr vom Orangegelb und Braun bis zum Karmin über. Selten trifft man zwei Pflanzen mit genau demſelben Farbenton. Dazu kommt der zarte Duft. Sie iſt ſicherlich eine Art, die hervorragende Kreuzungswerte birgt und von der die Neuheitenzüchter noch manchen guten Erfolg erwarten können. Ich möchte für dieſen Zweck auf P. grandis hinweiſen. Die bis 70 Centimeter hohen Stiele mit den elegant überhängenden Blüten in den Farben der Bulleyana oder auch japonica und der Tracht der grandis wären ſicherlich etwas dankbares. P. Bulleyana kommt in ihrer Heimat auf feuchten, offenen Alpenwieſen vor. Dementſprechend wird auch ihr Standort hier in der Kultur ſein. Kräftiger, nicht zu leichter humoſer Boden und reichliche Feuchtigkeit, wenn ſie nicht am Waſſer ſteht, wird eine üppige Entwicklung der Pflanzen zeitigen.

Aus den gleichen Sammelreiſen Forreſt's ſtammt auch die ſchöne *P. Beesiana,* die Forreſt ſelbſt in Gardener's Chronicle 1911 beſchreibt. Er ſagt darin, ſie in den Bergen bei Lichianfu in einer Höhe von ungefähr 3 bis 4000 Meter auf feuchten, kieſigen Wieſen und an kleinen Gebirgsbächen gefunden zu haben. Immer dort, wo friſches, reines Quellwaſſer den Boden durchfeuchtete und auch immer in großen Trupps, niemals einzeln. Er empfiehlt auch, ſie in der Kultur möglichſt in größeren Mengen zuſammenzupflanzen. Dies iſt eine alte Kulturerfahrung, daß gerade Primeln im Garten zu mehreren gepflanzt, ſtets beſſer gedeihen als einzeln. Vielleicht geht es manchen Pflanzen ebenſo wie vielen Tierarten, die nur geſellig leben wollen. P. Beesiana gleicht im Blattbau der P. Bulleyana, doch die Blütenfarbe iſt hier ein Sammtpurpur mit deutlich gelbem Auge. Über Boden und Standort in der Kultur braucht wohl nichts mehr geſagt zu werden, das ergibt ſich aus dem obenerwähnten Vorkommen dieſer Art. Jedenfalls gedeiht ſie wie auch Bulleyana, pulverulenta und Wilsonii ſehr leicht; man hat abſolut keine Schwierigkeiten mit dieſen Arten, ſolange ſie regelmäßig gewartet werden. Samen ſetzt Beesiana ſehr willig an. Forreſt hat ſie Frau Bees zu Ehren benannt, der Gattin des Beſitzers der bekannten Firma Bees in Liverpool, die ſich um den Gartenbau ſehr verdient gemacht hat.

Aus ebenſo feuchten Lagen und aus der ſelben Heimat wie die beiden vorhergehenden kommt *P. Wilsonii.* Auch ſie gehört zur Sektion Cankrienia, wächſt aber etwas üppiger, hat glänzend grüne Blätter und die

Blütenschäfte kommen bei ihr zu mehreren aus dem Trieb. Die einzelne violett-purpurne Blüte hat einen Durchmesser bis zu 2,5 Centimeter. Alle die vorher genannten Arten dieser Sektion, haben die Blüten in Etagenquirlen angeordnet, die von unten hinauf abblühen, also ist die Blütendauer bei diesen Arten länger als bei denen anderer Sektionen.

Das wären von den Staudenprimeln für unsere Gärten die empfehlenswertesten, die auch für den Laien leicht umgänglich sind, ihm viel Freude bereiten und für die dargebrachte Mühe und Pflege stets dankbar sein werden. Es gibt unter den asiatischen Primeln freilich noch andere schöne Arten, die hier unerwähnt bleiben, da ihre Kultur für den allgemeinen Gebrauch meist zu schwierig ist oder da man mit den Kulturversuchen noch nicht so weit vorgeschritten ist, daß sie als Schmuckstauden empfohlen werden könnten. Es sei nur kurz auf P. Cockburniana, Littoniana, capitata, involucrata und andere hingewiesen. P. Littoniana, deren Farbenbild bereits im allerersten Bande der Gartenschönheit gezeigt wurde, ist unter den echten Primeln sicherlich die eigenartigste, die wir bis jetzt besitzen, mit Blütenähren von zartlila und tiefviolettpurpurner Farbe, ein wenig an einen Tritomablütenschaft erinnernd. Wenn sie im vergangenen Jahr auf der Temple Show in London in prachtvollen Exemplaren gezeigt worden sein soll, so war das eine rühmliche Ausnahme; im allgemeinen hat man mit ihr in der Kultur noch sehr zu kämpfen. Da sie in Zentral- und Westchina in denselben Höhenlagen und Standorten wie die meisten anderen schon in Kultur eingebürgerten Arten vorkommt, so hofft man, auch sie noch für den Gartenschmuck zu gewinnen. Anders ist es schon mit solchen ostasiatischen Felsenprimeln, wie P. dryadifolia, P. Forrestii und ähnlichen. Das sind hochalpine Arten, die wir vielleicht mit unserem Eritrichium nanum, Androsace glacialis vergleichen könnten, also für Kulturen von allergrößter Schwierigkeit. Über P. dryadifolia schreibt Forrest: »Ich fand sie im Lichiangtal, in ungefähr 4500 Meter Höhe zwischen Kalkstücken .... Es ist diejenige Art, die am spätesten zu blühen anfangen und wieder am frühesten Samen ansetzen muß. Nicht vor Juni ist sie frei von Eis und Schnee und sobald der Oktober da ist, ist sie auch schon wieder begraben unter reichem fußhohen Schnee. Während dieser kurzen Vegetationszeit ist sie auch noch den extremsten Naturelementen ausgesetzt. Bald ist sie bedeckt mit Schnee und Hagel, bald darauf wieder dem strahlendsten Sonnenschein ausgesetzt; dies alles in ein und derselben Stunde. Dann wieder Tag um Tag schwere, undurchsichtige Nebel oder ebensolcher eisiger Regen. Andere Härten für sie wieder sind die eiskalten Nächte ...«

Da ist es ja nun selbstverständlich, daß man Pflanzen aus solchen Höhen und unter solchen Verhältnissen lebend nicht so ganz einfach für die Ebene in Kultur nehmen kann. P. Forrestii, die etwa um 1000 Meter niedriger vorkommt, läßt sich vielleicht eher akklimatisieren. Forrest fand sie mit 75 Centimeter langen, verholzenden Wurzelrhizomen und doldigen, schwefelgelben Blüten an sonnigen und trockenen Kalkfelsen. Solche Arten kämen wohl nur für Steingärten in höheren, rauhen Gebirgslagen in Frage, wie im Alpengarten am Schachen, am Brocken und in denen der Schweiz. Bei uns in der Ebene werden sie in der Kultur leider wohl für immer ohne Erfolg bleiben.

Die hier angeführten Staudenprimeln sind alle winterhart. Doch ist es ratsam, sie im Winter mit trockenem Laub, Kiefernadeln oder dergleichen zu decken, um ihnen den Schneeschutz, den sie alle an ihren heimatlichen Standorten haben, zu ersetzen.

Die Aussaat geschieht am besten sofort im Herbst nach der Ernte in lockere Humuserde mit reichlichem Sandzusatz. Man läß die Aussaatgefäße den Winter hindurch ruhig draußen einfrieren, um so besser werden die Samen keimen. Nach dem Keimen werden sie in den gleichen Boden pikiert und dann im Frühherbst desselben Jahres noch draußen auf vorbereitete Beete aufgepflanzt, wo sie erst erstarken müssen, um an Ort und Stelle zu kommen. *(Ein zweiter Aufsatz folgt.)*

PAUL KACHE / ROSENPFLEGE IM SOMMER

So oft werden Klagen laut über ungenügenden Wuchs, über mangelhafte Blühwilligkeit unserer Edelrosen. Es hört sich dann bisweilen so an, als ob diese Rosen all ihre guten Eigenschaften verloren hätten. Die Gründe dieser Erscheinung können sehr verschieden sein. Sehr oft liegen ungünstige Verhältnisse vor, die eine natürliche Entwicklung der Rosen unmöglich machen. So sind im Schatten, im Druck hoher Bäume liegende Rosenbeete niemals imstande, uns den Blütenflor zu bringen, den sie sonst bringen möchten. Es kann nicht oft genug wiederholt werden, daß die Rosen Sonnenkinder sind. Ohne Sonne können sie ganz unmöglich reichen Blütenflor bringen. Ebenso ungünstig wirkt aber auch ungeeigneter Erdboden. Sehr kräftige, schwere Lehmböden geben die üppigste Rosenblüte. Je leichter, ärmer die Böden sind, umso weniger können die Rosen gute Leistungen zeigen. Also auch hier muß man mit einer geringeren Blüte zufrieden sein, kann allerdings durch sehr sorgsame Pflege vieles ausgleichen.

Ein so hoch gezüchtetes Kulturgewächs wie unsere Edelrose kann nur zur vollkommensten Entwicklung gelangen, wenn all ihre Wünsche in vollster Weise Erfüllung finden. Je mehr der Pfleger es versteht, der Rose alles das zu bieten, was sie zum Dasein benötigt, umso vollkommener wird die Rose diese Pflege durch einen reichen, farbenfrohen Blütenflor lohnen.

So ganz selbstverständlich der Gartenfreund es findet, die Karotten-, Erbsen-, Zwiebelbeete zu hacken, sie locker und durchlüftet zu halten, ebenso selbstverständlich fast wird das bei Rosenbeeten unterlassen. Auch die Rosenbeete müssen aber unbedingt sorgsame Bodenpflege erhalten, denn die Pflanzen fordern das. Es ist ganz selbstverständlich, daß auch hier der Erdboden oberflächlich dauernd locker, brüchig gehalten wird, um so eine Durchlüftung zu sichern. Vor allem ist das in schweren Böden der Fall, die nach einem Regen, nach einer starken Wässerung oberflächlich sofort abbinden, sich schließen, und die bei einsetzender Trockenheit so fest werden, daß sie Risse erhalten. Bei ihnen kann kaum zu oft die Hacke betätigt werden. Es ist gewöhnlich auch eine Kleinigkeit, die an sich wenig umfangreichen Rosenbeete einmal durchzuhacken oder mittels eines kleinen Zinkenhäckchens aufzulockern.

Die stete Bodenlockerung hat bekanntlich noch den Zweck, die Feuchtigkeit des Bodens besser zu halten. Ist durch dauernde Bearbeitung des Bodens an der Oberfläche eine schwache Krümelschicht geschaffen, so wirkt diese zwischen der Luft und den unteren Bodenschichten ausgleichend. Sie verhindert in erster Linie das zu starke Austrocknen der unteren Bodenlagen. Unterstützt kann dies noch durch ein Bedecken der Beete werden. Steht ein recht kurzer, halb verrotteter Dung zur Verfügung, so ist dieser in einer bis zwei Finger starken Lage gleichmäßig über die Beetfläche zwischen die Pflanzen zu verteilen. Somit erhält das Beet eine lockere Deckung, die es wohl gegen die direkte Einwirkung von Wind und Sonne schützt, ohne jedoch die Durchlüftung des Bodens auszuschließen. Wohl jeder wird erstaunt sein zu finden, daß sich unter einer solchen Bodendeckung die Regen- und Gießfeuchtigkeit überaus lange hält. Die Feuchtigkeit wird so viel länger gespeichert und kommt so den Pflanzen ausreichend zugute. Es ist ja auch zu bedenken, daß eine solche Decke den Boden vor dem Verkrusten völlig schützt. Nur muß mit dem Schlauch etwas sorglich gearbeitet werden, um ein Wegspülen des Deckmaterials zu verhindern. Neben dem stets vorzuziehenden kurzen Dung sind aber noch andere Stoffe als Bodendecke verwendbar. Man benütze dazu einmal das junge Gras, das beim Schnitt der Rasenflächen gewonnen wird. Es muß ganz gleichmäßig zwischen die Rosen aufgebracht und sollte dann mittels einer Wässerung mit dem Schlauch etwas festgeschlagen werden. Bei Bedarf ist diese Deckung in einiger Zeit zu ergänzen. Auch dieses Deckmaterial wird seine Schuldigkeit vollkommen tun, wenn es nur richtige Verwendung findet. Selbst das junge Grün, das beim Heckenschnitt gesammelt wird, kann in gleicher Weise benützt werden. Es kommt nur auf die gleichmäßige Verteilung dieser Massen an. Wird es geschickt gemacht, so sieht es auch nicht schlecht aus. Denn der bessere Wuchs der Rosen, der durch die bessere Bodenpflege erzielt wird, verdeckt durch die vollere Belaubung bald, was zwischen die Pflanzen gebracht wurde.

In den weitaus meisten Fällen leiden unsere Edelrosen an Unterernährung. Ist seit einiger Zeit dem Boden kein Dung zugeführt worden, dann wäre zunächst mittels einer Abdeckung der Beete mit halb verrottetem Dung schon viel getan. Jede Wässerung, jeder Regenfall führt dann aus dieser Dungecke den Wurzeln Nährstoffe zu. Das wäre noch ein weiterer Vorteil einer solchen Bodendecke. Doch auch durch gelegentliches Jauchen sollte den Rosen stets von neuem Nahrung zugeführt werden. Die Rosen können kaum je überdüngt werden. Sie vertragen reichlich und auch kräftige Jauche. Die beste ist wohl eine recht gute Stalljauche oder eine aus strohfreiem Rinderdung gewonnene. Doch auch Hühner- und Taubendung geben wirksam Jauche. Nur muß diese gut vergärt und auch genügend verdünnt werden, bevor sie verwendet wird. Wo solche organische Jauche nicht erreichbar ist, genügen auch Auflösungen von Düngesalzen. Man verschaffe sich von einer recht zuverlässigen Stelle, gewöhnlich sind dies Samenfirmen, gute Düngesalzmischungen

für Gärten. Solche wie Lierke-, Naumann-, Wagner-Nährſalzmiſchungen ſind bekannt. Dieſe ſind nach Vorſchrift zu verwenden. Die gute Wirkung ſolcher Jauchegüſſe, die vom Frühjahr an bis Mitte Sommer gegeben werden ſollen, wird man ſehr bald an ſeinen Roſen ſehen. Doch ſei dringend gewarnt, trockene Roſenbeete zu jauchen. Die Erde muß genügend feucht ſein. Auch ſoll vorſichtig gejaucht werden, ſodaß die Jauche nicht auf die Roſentriebe zu fließen kommt. Ein gutes Überbrauſen der Beete mit reinem Waſſer iſt nach dem Jauchen notwendig.
Ein Austrocknen der Roſenbeete iſt eigentlich während der ganzen Triebzeit zu vermeiden. Sobald als es notwendig erſcheint, muß gewäſſert werden. Trockene Böden, die leicht warm werden, unterbrechen nicht nur den Neuwuchs, ſie laſſen auch die Knoſpen nicht zur vollen Entwicklung kommen und begünſtigen weiterhin ein vorſchnelles Verblühen der Roſen. Die beſte Bodenpflege, Düngung, iſt ohne Erfolg, ſobald die erforderliche Feuchtigkeit im Boden fehlt. So iſt auch die Wäſſerung früh zu beginnen, bevor noch ein ſtärkeres Austrocknen eintritt. Je nach Notwendigkeit iſt ſie zu wiederholen, doch auch das nehme man ſich zur Grundlage der Wäſſerung, daß, wenn überhaupt gewäſſert wird, dies auch gründlich und durchdringend geſchehen muß. Ein nur oberflächliches Wäſſern iſt abſolut unwirkſam. Man ſei auch inſofern nicht zu ſparſam mit dem Waſſer, als man nicht nur die Fläche des Beetes wäſſern darf. Unbedingt erforderlich iſt es, auch die Fläche um die Beete feucht zu halten, um ſo die Beete nicht von den Seiten eintrocknen zu laſſen. Nur wenn eine größere Bodenmaſſe die kühle, feuchte Beſchaffenheit behält, vermag der Roſenflor in ſonſt trockenen Zeiten ſich zur herrlichſten Fülle zu entfalten. Sehr ſonnige, dem Wind ausgeſetzte, vielleicht auf ſchiefer Ebene liegende Beete erfordern zumal in leichteren Böden immer die nachhaltigſte Wäſſerung.
Sehr gut kann auch die Entwicklung der Roſe durch ein öfteres Überſprengen, Überbrauſen gefördert werden. Bei trockenem Wetter ſollte dieſes allabendlich erfolgen. Aber auch hier ſoll nicht das Roſenbeet allein, ſondern auch der Raſen, der Weg unmittelbar am Beet mitbefeuchtet werden. Dieſe nur oberflächliche Feuchtigkeit, die ſich mehr oder weniger durch die Nacht hindurch im Laubwerk der Roſen hält, iſt ihrem geſunden Wachstum außerordentlich fördernd. Eine richtige Pflege der Roſen kann auf die abendliche Beſprengung keineswegs verzichten.

HENRY B. GOODWIN / ABFALL UND DÜNGER

SEI unſer Garten groß oder klein, ſein Gedeihen wird zu nicht geringem Teile von der Aufmerkſamkeit abhängen, die wir der leider oft wenig wohlduftenden Quelle des Wohlſtandes und der Blumenſchönheit zuwenden, der bekanntlich oft aus dem Geſichts- und Geruchsfeld verwieſenen Abfall- und Düngergrube. Und doch braucht dieſe Schatzkammer von Pflanzennährſtoffen nicht einmal aus unſeren Augen verbannt und verſteckt zu werden. Im kleinwinzigen, aber um ſo mehr geliebten Gärtchen darf ſie ſogar einen Ehrenplatz einnehmen, wie ein Bild meiner Abfall- und Düngergrube zeigt, die von drei Seiten von Beerenſträuchern eingefaßt und auf dem Betonrand mit Sedum bepflanzt, kürzlich einem Beſprecher meines Anfängerbuches ſo gefiel, daß er ſie als höchſt poetiſche Kompoſtgrube in einer illuſtrierten Zeitſchrift abbildete!
Was dieſem Rezenſenten aber entgangen war, iſt die Abſicht und die Erfolge dieſer Abſicht, die mit dem Ehrenplatz meines nicht nur den Augen zuſagenden, ſondern die Naſe niemals verletzenden Kompoſtes von Anfang an verbunden war: hier entdeckt nämlich meine von den Wohlgerüchen der Blumen und der friſchen Seeluft verwöhnte Naſe ſofort jede, ſelbſt die allergeringſte Ungehörigkeit in der Form von Ausdünſtungen, die mir eben das verraten, was den Inhalt dieſer »Bedenken« bildet. Wir wiſſen alle, was das Ziel einer geordneten Kompoſtgrube iſt oder ſein ſollte: daß die bei der Verfaulung oder Gährung, alſo langſamen Verbrennung entſtehenden flüchtigen chemiſchen Verbindungen gebunden werden, um in der Form von hauptſächlich Stickſtoffverbindungen ſpäter unſeren Gewächſen zugute zu kommen. Der wohl unterrichtete Pfleger einer Düngergrube ſteht aber, je mehr er den bekannten Rat befolgt, den Kompoſt ſo vielſeitig zuſammenzuſetzen wie möglich, wie Hercules am Scheidewege: ſoll er vor allem die Fäulniserreger organiſcher oder lebloſer Art gewähren laſſen oder durch Beimengung gewiſſer Stoffe, auf die wir im Folgenden eingehen werden, die Fäulnis regeln? Durch zu einſeitiges Sorgen für die letzte Art von Kompoſtpflege werden aber Fehler der bedenklichſten Art begangen, Fehler, über die uns unſere Naſe, wenn ſie nur zu Rat gezogen wird, den beſten Aufſchluß gibt.
Da haben wir vor allem einmal die ſo beliebte Auflagerung oder Beimengung von Holzaſche, in der an ſich richtigen Erwägung, dadurch im Verein mit einer Art »Desinfektion« dem Dünger und mit ihm den Gewächſen das in der Aſche enthaltene Kalium zuzuführen. Dies Verfahren erhöht aber die Ausdünſtung dermaßen, daß man nicht im Zweifel ſein kann, daß hier in Gasform etwas Übelriechendes, alſo der Erfahrung nach gewiß Wertvolles verflüchtigt. Es tritt hierbei auch wirklich eine chemiſche Reaktion ein, bei der organiſche wertvolle Stoffe zerſtört werden; ſo werden durch die Aſchenlauge die wichtigen Aminogruppen der Eiweißſtoffe abgeſpalten und entweichen in Gasform als Ammoniak, eine chemiſche Verbindung, die wir es uns ſonſt ja ſo angelegen ſein laſſen, unſerem Erdreich zuzuführen. So lange das flüchtige Element an etwas in der Kompoſtmiſchung Vorhandenes gebunden bleibt, verletzt es erſtens unſere Naſe nicht, zweitens bleibt es uns erhalten, beſonders wenn wir den alten Rat befolgen, der Kompoſtgrube eine gehörige Erddecke aufzulegen, die auch den Zweck hat, gegen Licht (das ſtärkſte Desinfektionsmittel, das wir kennen) und Austrocknen zu ſchützen. Außerdem zerſtört aber die Aſchenlauge noch die wichtigen Enzyme oder Fäulniserreger, ohne welche der Kompoſt leblos und nutzlos iſt. Dieſe buchſtäbliche Auslaugung der Abfälle, die man ſo oft gedankenlos angehen läßt und Generationen hindurch gedanken- und kritiklos weiterempfiehlt und abdruckt, iſt eine Mißhaushaltung, von der man ſich eine Vorſtellung macht, wenn man bedenkt, daß beiſpielsweiſe Fette und Öle

animalischer oder vegetabilischer Herkunft dem Kompost, wo sie aus Küche und Garten einlaufen, große Nahrungswerte zuführen könnten, während sie in der Lauge verseifen und als Seifenwasser vielen zarten Würzelchen das Leben kosten können.
Ein hiermit übereinstimmender, überall beobachteter, allbekannter, aber offenbar nirgends eingesehener Fehler wird mit der Kalkung der Abfälle einer anderen wohlbekannten Kategorie begangen, die sich kein ländlicher Gartenpfleger entgehen läßt. Ästhetisch ist diese Ammoniakausdünstung ja an sich schon bedenklicher Natur. Worin soll aber ihr Nutzen bestehen? In der Tötung von Larven und Bakterien, möglicherweise! Aber für die hier in Frage kommenden Zwecke legt man sich mit dem Kalkzusatz nur zweck- und sinnlose Unannehmlichkeiten auf. In dem zuletzt genannten Falle wird hier die Stickstoffverbindung sofort und gründlich vertrieben. Streut man gebrannten Kalk oder trockengelöschten Kalk auf die Küchen- und Gartenabfälle, so wird die Verrottung zwar etwas beschleunigt, aber die Zerstörung, die oben das Werk der Asche war, wird hier von einem anderen rücksichtslosen Zerleger organischer Verbindungen besorgt, wobei der Mischung nichts Stickstoffbindendes zugeführt wird.
Der einmal Gewarnte greift am liebsten zu den alten bewährten Methoden, dem Torfmullzusatz, dem kohlensauren Kalk und der »groben« Kompostzusammensetzung, auf die wir hier nur kurz einzugehen brauchen.
Brauchbarer Torfmull, die zu Bauzwecken (Füllungen) schlechteste, für unsere Zwecke beste Art, die wie Erde riecht und sich anfühlt, saugt bis zum Neunfachen seines eigenen Volumens an Feuchtigkeit auf und ist deshalb das beste Aufbewahrungsmittel für die Nährstoffe. An sich ist aber der Torfmull, was man nicht genug betonen kann, keine pflanzennährende Zellulose, und es gibt Abarten, die als Erdzusatz ebenso schädlich sind wie die längst als gefährlich durchschauten Sägespäne und überhaupt Holzabfall aller Art, auch Holzkohle. Diese verwendet man ja in der Topfgewächszucht, um Erde recht frisch zu erhalten. Im Kompost ist sie ebenso wie Koniferennadeln, Papierabfälle, Baumwolle eine bedenkliche Verzögerin der Fäulnis. Schon wegen des Gehaltes an Holzkohle ist die Holzasche zu scheuen.
Persönlich verwende ich am liebsten Waldbodenerde und Moorerde von der Art, in der Heidegewächse wie Rhododendron gedeihen, als Zusatz zu den Abfällen. Ferner ist als schwerer Mineralzusatz zum Kompost kohlensaurer Kalk, in Form von zermahlenem Kalkstein oder grober Kreide vorzüglich. Sollte am Ende der ganze Irrtum mit der Kalkung der Gruben auf Verwechslung mit diesem Kalk beruhen? Denn der Erfolg mit Hinsicht auf Geruchlosigkeit der Abfallsgrube ist gewöhnlich überraschend. Die Kohlensäure im Kalk ist zwar chemisch gebunden, jedoch flüchtig genug, um im Beisein stärkerer Säuren abgespalten zu werden und in günstigen Fällen, etwa bei Luftabschluß, mit dem Ammoniak ein für uns wertvolles Salz, das Hirschhornsalz, zu bilden. Von Versuchen in dieser Richtung sehe ich nichts in der Literatur. Kohlensäure ist neben dem für die Verrottung wichtigen Sauerstoff auch in der Luft vorhanden, und um dieser den Zutritt zu erleichtern möchte ich allen Kompostbereitern im Kleinen raten, die Mischungen recht grob und locker zu machen. Es ist ein Fehler, die Abfälle von allen möglichen Kleinigkeiten, die nicht rasch faulen, wie lebenden Zweigen, groben Nägeln und anderen Eisenabfällen (Konservenbüchsen jedoch müssen fort), Steinen, Knochen, Schuhsohlen, Dachziegeln so ängstlich zu säubern, wie dies so oft zu geschehen pflegt. Vielmehr tun uns diese groben Bestandteile denselben Dienst im Kompost, wie die mäßig großen Steine und grober Sand im Gartenboden. Sie sorgen für Dränierung, für Luftzutritt und Zirkulation von Luft und Feuchtigkeit im Innern der Abfallvorräte. So ein »grober« Kompost läßt sich viel leichter mit der Grabgabel wenden und mit Erde vermengen als eine käseartige Masse, die man mit dem Spaten zerschneiden und, wenn sie ausgetrocknet ist, zerhacken muß. In den so entstehenden Hohlräumen haben die Gärungsprozesse Spielraum, und der Zutritt der Luft verringert die Entstehung von übelriechenden, besonders Kohlenwasserstoffgasen. Die im Beisein von Schwefel entstehenden Gase sind nicht nur die übelriechendsten, sondern sie sind schädlich. Es kommt zwar selten Schwefel in den Kompost, aber vor nichts wäre mehr zu warnen, als vor solchen Beimengungen etwa durch eine noch bedenklichere Aschensorte, die Koksasche.
Schließlich muß hier noch der energischste Fäulniserreger erwähnt werden, das ist der flüssige Abfall, der Tier- oder Menschennieren durchwandert hat und an Stickstoffverbindungen besonders reich ist. Man scheut sich oft, ihn beizumischen, weil es im übrigen an der rechten Kompostpflege fehlt und Gerüchen nicht vorgebeugt wird. Vor dem furchtbaren Unheil, daß die Abfälle einmal ein paar Wochen oder selbst Monate unter Wasser stehen, wird übertrieben gewarnt. Wenn nur die Überschwemmung nicht so groß ist, daß Torfmull und Erde das Wasser nicht mehr aufsaugen können, so geht, die oben erwähnte Dränierung vorausgesetzt, viel Nährstoff hierbei in Lösung, bekanntlich oft die beste Voraussetzung chemischer Reaktionen.

Bepflanzungspläne

Schattenrabatte

AUCH an schattigen Plätzen wird der Besitzer oft auf eine Staudenrabatte nicht verzichten wollen, die Farbenfreudigkeit in seinen Garten hineinbringt. Die Aufgabe bietet insofern Schwierigkeiten, als viele schattenliebende Stauden einen so ausgesprochenen Wildpflanzencharakter haben, daß sie, auf einer Rabatte verwendet, nicht befriedigen. Ferner ist zu unterscheiden, ob die Rabatte im Schatten von Bäumen oder eines Hauses liegt. In jenem Falle wird man noch eine Menge Stauden verwenden können, denen im unbelaubten Zustande der Bäume die Frühjahrssonne zu Gute kommt. Hier haben die ausgesprochenen Frühjahrsblüher wie Anemone nemorosa- und blanda-Sorten, die Primeln sowie die verschiedenen Blumenzwiebeln den rechten Platz. Sie können besonders als Zwischenpflanzung zwischen höheren Stauden verwendet werden, die nach dem »Einziehen« die kahlen Stellen mit ihrem Grün verdecken.
Anders ist aber der Schatten eines Hauses; er ist zu allen Jahreszeiten gleichmäßig und kühl. Außerdem bedingt die Nähe von Architektur eine Auswahl von Stauden, die sich bis in den Herbst hinein gut halten. Wird auf eine ununterbrochene Blütenfolge von Frühjahr bis Herbst zugunsten eines architektonischen Aufbaues der Rabatte verzichtet, so kann man vielleicht die ganze Fläche mit einer niedrig bleibenden Art unterpflanzen, aus der in rhythmischen Abständen straffgebaute Arten wie Anemone japonica, Astilbe oder Cimicifuga-Arten herauswachsen. Als Unterpflanzung seien empfohlen: Bergenia-Arten, Helleborus, Pachysandra terminalis oder niedrige Farne. Saxifraga umbrosa, buntblättrige, niedrige Funkien oder Epimedium können als Einfassung dienen. Viele der genannten Arten haben außerdem den Vorzug, wintergrün zu sein.
Im folgenden Bepflanzungsplan ist eine Rabatte zusammengestellt, die ohne viel Pflege und Arbeit eine ununterbrochene Blütenfolge von Frühjahr bis Herbst ergibt. Das Blühen beginnt mit Bergenien, Primula Sibthorpii, denen sich die Epimedien und Funkien anschließen; dann folgen Astrantia, Astilben und Funkien. Bis in den Herbst hinein blühen dann die Anemonen, das Polygonum, Aster tardiflorus, Rudbeckia Herbstsonne, die auch den Schatten noch verträgt. *Kurt Pöthig*

Bepflanzungsplan

1. Bergenia cordifolia
2. Primula Sibthorpii
3. Helleborus hybridus
4. Aspidium acrostichoides
5. Epimedium macranthum
6. Anchusa myosotidiflora
7. Funkia ovata albomarginata
8. Astrantia carniolica
9. Cimicifuga simplex
10. Astilbe Arendsi Opal
11. A. Arendsi Granat
12. Anemone japonica Luise Uhink
13. A. japonica Alice
14. Aconitum Wilsonii
15. Polygonum polystachyum
16. Rudbeckia nitida Herbstsonne
17. Aster tardiflorus, Finale

1 0 1 2 3 4 m

Auf dem Balkon

Im Mai

IM Aprilheft haben wir uns mit der Auswahl der für Balkonbepflanzung geeigneten Pflanzen beſchäftigt; im Laufe des Monats Mai ſollten die Balkonkäſten bepflanzt werden, je nach Lage und Witterung etwas früher oder ſpäter. In geſchützter Lage etwa Mitte Mai, in rauhen Lagen warte man lieber bis Ende des Monats, um nicht noch von Fröſten überraſcht zu werden.

Die Größe der Balkonkäſten richtet ſich nach dem verfügbaren Raum, im allgemeinen ſollten die Käſten eine innerliche Weite von achtzehn bis zwanzig Centimeter Tiefe und Breite haben und, um transportabel zu ſein, etwa achtzig Centimeter bis ein Meter Länge nicht überſchreiten. Ob die Käſten von Holz, verzinktem Eiſenblech oder Ton ſind, iſt nebenſächlich, immer müſſen jedoch am Boden Löcher für den Waſſerabzug angebracht ſein, da ſtauendes Waſſer unfehlbar den Tod der Pflanzen herbeiführen würde. Als Erdmiſchung verwende man eine gut verrottete Kompoſterde, mit etwas Lehm und Sand gemiſcht. Auf die Abzugslöcher lege man Topfſcherben, hierauf bringe man einige Centimeter Erde, dann eine Handvoll Hornſpäne und fülle alsdann die Käſten voll. Die unten im Kaſten befindlichen Hornſpäne verweſen ſehr langſam und die Pflanzen können ſich hieraus den ganzen Sommer hindurch ihre Nahrung holen; eine Düngung während des Sommers erübrigt ſich dann.

Die Pflanzen werden je nach Art und Stärke auf 15 bis 20 Centimeter Entfernung gepflanzt, die aufrechtwachſenden nach der Hausſeite, die hängenden nach der Straßenſeite. Will man Rankpflanzen anbringen, ſo pflanze man je links und rechts eine Rankpflanze und leite dieſe mit Stäben oder an Faden um die Fenſterrahmung. Balkons oder Fenſter, die den Blicken Neugieriger ausgeſetzt ſind, können auch ganz mit Rankpflanzen beſetzt werden und bilden in Blüte einen prächtigen Anblick. Größere Veranden mit größeren Fenſtern oder Bögen können durch Aufhängen von Ampeln ganz reizvoll geſchmückt werden. Als Ampelpflanzen eignen ſich Efeugeranien, Hängefuchſien, Begonia tuberosa pendula, Nepeta hederacea fol. var.; auch Ampelopsis Henryana mit ſeinem weiß und rotbraunen Laub iſt ſehr wirkungsvoll. Die erſte Zeit nach der Pflanzung ſei man etwas ſparſam mit dem Gießen, fangen die Pflanzen erſt an gut zu wachſen, gieße man reichlicher, und bei fortſchreitender Entwicklung und heißem Wetter muß, namentlich an der vollen Sonne ausgeſetzten Stellen, mehrere Male am Tage durchdringend gegoſſen werden, am beſten abends und morgens; man vermeide indes während der heißeſten Tagesſtunden zu gießen.

Vielleicht fragt der Laie: wie oft muß ich meine Pflanzen gießen? Eine feſte Norm läßt ſich hier nicht aufſtellen, die Art der Pflanzen, die Gefäße, die Witterung müſſen in Betracht gezogen werden. Der aufmerkſame Blumenliebhaber wird es bald heraushaben, wie oft er ſeine Lieblinge gießen muß. Immer aber gieße man durchdringend, alſo ſo, daß das Waſſer an den Abzuglöchern hervorkommt; vielfach kommt es vor, daß oft nur wenig gegoſſen wird, dabei wird wohl die Oberfläche angefeuchtet, die Wurzeln, die auf dem Grund der Käſten ihre Saugſpitzen haben, vertrocknen indes und die Pflanzen zeigen ein kümmerliches Ausſehen oder gehen ganz zu Grunde.

Bei Befolgung der angegebenen Ratſchläge wird der Blumenfreund vor Mißerfolgen bewahrt bleiben, vorausgeſetzt, daß er einwandfreie Pflanzen für ſeine Käſten verwendet hat. *H. Gehringer.*

Am Wege

Kakteen am Fenſter

DER ſchönſte Raum einer Wohnung im Sommer iſt der Balkon, einerlei, ob nach Süden oder Norden gelegen. Haben wir doch genug Pflanzen, denen auch die ſpärlichſte Beſonnung zur Entfaltung eines üppigen Blütenflors genügt. So ein ſchattiges Plätzchen, auf dem man nach getaner Arbeit ausruhen oder einer lieben Privatbeſchäftigung nachgehen kann, erſetzt dem Großſtädter das Glück des eigenen Gärtchens. Aber auch vor balkonloſen Fenſtern ſollte das Blumenbrett nicht fehlen und wenigſtens eins von ihnen mit Kakteen beſtellt werden. Beſonders die als Eßzimmer beliebten Hinterſtuben eignen ſich für ſolchen Schmuck, ſofern ihnen einige Stunden lang volles Sonnenlicht zuſtrahlt. Die ſtille »Hofluft« behagt dem etwas ſteifen Kakteengeſchlecht, das es nicht liebt, von jedem Sauſewind angeblaſen zu werden.

Und was für eine Augenweide ſind doch wohlgepflegte Kakteen! Vor dem elektriſch beleuchteten Kriſtallgärtchen in den Tropfſteingrotten von Rübeland und von Adersbach hört man bewundernde Rufe; wenige, die ſich dort entzücken, ahnen, daß ſie viel ſchönere — lebende — Kriſtallgärtchen zu Haus haben können, denn viele Kakteen-Formen kann man ohne große Übertreibung mit Kriſtallen vergleichen. Dabei ſind ſie weder ſehr teuer — mit geringem Aufwand beſtellt man ein großes Blumenbrett für Jahrzehnte! — noch ſchwierig zu pflegen. Die meiſten kommen ſogar mit einem wahren Minimum von Pflege aus, wenn man nicht gerade Blüten erzwingen will. Aber dieſe lebenden Kriſtalle wirken ſchön auch ohne Blüte. Wie das, wenn ſie gedrängt zuſammenſtehen, im Sonnenlicht — denn das gehört zur Entfaltung ihrer ganzen Schönheit — blitzt und funkelt, ein Wald bunter Stacheln, Dornen, Haken über ſattgrünem Sammet!

Nein, ſie brauchen nicht zu blühen, ſie ſchmücken genug mit ihren wunderlichen, *niemals* natürlicher Anmut entbehrenden Formen, ſie entzücken den Blick durch die prachtvolle Mannigfaltigkeit ihrer Beſtachelung. Ich habe einen Kaktus, Echinocactus Williamsii, der ausſieht wie ein großer Champignon, aber tiefgrün. Der weiße dicke Stiel ſteht im Flugſand und der große grüne Kopf ſchaut freundlich heraus. Freundlich? Er iſt freilich ganz unbewehrt, ganz ſtachellos, aber kein Tier wird ihn freſſen. Es iſt der einzige Kaktus, der ein böſes Gift enthält; aber tüchtig ſtechen kann faſt jeder, wenn man unachtſam zufaßt.

Zum Verſuch empfiehlt ſich Mamillaria Scheerii mit ihrem grasgrünen, üppig quellenden Warzen, oder die froſchgrüne Echinopsis Huottii, oder der Cereus Baumannii, der kaum mehr etwas Pflanzliches an ſich hat, ſondern wie ein Stacheligel ausſieht, ins Pflanzliche überſetzt. Aber was für prachtvolle Geſtalten ſind alle drei, wenn ſie, leicht überbrauſt, im Sonnenlicht glitzern. Wie abenteuerlich ſieht dann das Greiſenhaupt aus mit ſeinem langen weißen Haar, und wie vornehm der Echinocactus corniger mit ſeinen ſchneidig gebogenen Rippen und den weiß, gelb und rot ſchimmernden Hörnern. Und ein Wald von bunten Lanzen ſtarrt aus den jaspisgrünen Körper des Echinocactus uncinatus. Daneben leuchten die beliebte Mamillaria gracilis und der Cereus rhodoleucanthus, beide überdeckt mit rein weißen Stacheln, ſo daß ſie einem Mineral ähnlicher ſehen als einem Gewächs. Wie pittoresk macht ſich der Stenocactus grandicornis, deſſen fein beſtachelter Körper in vierzig dünne Lamellen aufgelöſt iſt. Dazwiſchen recht protzig der Echinocactus denudatus wie ein grüner Salzkuchen. Oh, er iſt nicht ſo ſtupide wie er ausſieht! Er hat ſich gegen Inſektenfraß dadurch geſchützt, daß er ſeine Stacheln wunderſam genug ſo ausgebildet hat, daß ſie ausſehen wie weiße Spinnen. Auch ein Kakteenkörper iſt eine »große Vernunft«. Ihn meiden die ſechsfüßigen Quälgeiſter, darum wird er ſo fett, der Burſche!

Um ein kleines Spalier windet ſich die »Königin der Nacht« mit ihren vierkantigen ſmaragdgrünen Zweigen. Sie iſt wirklich eine Königin. Faſt handgroß entfaltet ſich ihre Blüte, deren Blumenblätter vom zarteſten Braun in blendendes Weiß übergehen. Fünfzig lange Staubfäden quellen wie blondes Haar aus ihrem Kelch heraus, alle überragt der Stempel, der einen Chrysopras zu tragen ſcheint. Und nun ſieh die Blüte der Echinopsis Eyriesii oder gar die des Cereus triangularis — beide wie eine »Phantaſie in Weiß«. Aber während das ſchöne Bild Whiſtlers nach Ölfarben und Sikkativ riecht, entſtrömt dieſer weißen wie aus Mondſchein und Millefiori-Glas gewebten Glocke ein Duft von unbeſchreiblicher Feinheit und nervenerregender Kraft. Auch kleine Blüten entzücken. Der Spinnenkaktus treibt aus den Areolen — ſo nennt man die weißfilzigen Stellen, aus denen Stacheln und Blüten hervortreten, während die Punkte, an denen die Warzen und Lunkoln zuſammenſtoßen, als Axillen bezeichnet werden, goldgelbe Blüten, kaum fingerhutgroß und doch impoſant in ihrer ſtrahlenden Farbe. Wie fein ſehen die karminroten Blüten des Echinocereus Berlandieri aus mit roſenroten Staubfäden, zwiſchen denen ſieben ſmaragdgrünen Narben hervorlugen. Wie drollig macht ſich die Opuntia papyracantha mit ihren langen breiten papierdünnen weißen Stacheln oder der dicke Cereus Jusberti oder der feinſte Echinocactus multiflorus!

Und zwiſchen all dieſer Pracht ſteht der Felſenkaktus (Cereus Peruvianus forma monstruosa) wie ein moosbewachſener Felſen in einem Paradies glitzender Zierlichkeit und ſtrenger Anmut. *Dr. Liebnitz*

Gartenrundschau

NEUES AUS ALLER WELT

Neue großblumige Canna

UNTER den für größere blühende Gruppen geeigneten Pflanzen sind wohl die neuen großblumigen Canna mit die geeignetsten. Schon vor dem Kriege hatten fortschreitende Stadt- und Privatgärtnereien mit den obligaten gemischten Gruppen, Mitte Musa oder Rizinus, eine Reihe Hanf, eine Reihe kleinblumige Canna und als Einfassung Caladium esculentum, Perilla und dergleichen gebrochen und an Stelle dieses Sammelsuriums ganze Beete der neuen großblumigen, reichblühenden Canna ausgepflanzt.

Die Kriegsjahre mit ihren Nahrungssorgen brachten es mit sich, daß an Stelle dieser Zierpflanzen Gemüse gezogen wurde und jene größtenteils verloren gingen. Nur wenige Firmen, wie beispielsweise Wilhelm Pfitzer, haben diese schönen Pflanzen durchgehalten und das Farbenspiel durch eigene Neuzüchtungen und Neueinführungen bereichert. So haben denn in den letzten Jahren namentlich größere Stadtgärtnereien wieder angefangen, ihre öffentlichen Anlagen auch mit solchen Cannas zu schmükken. Es gibt ja kaum eine zweite Pflanze, mit der sich solch starke Wirkungen hervorbringen lassen. In ihrem stattlichen Laubwerk in grün oder rot, überragt von den großen, zahlreichen, bis zum Eintritt der Fröste erscheinenden Blütenrispen, sind sie zur Gartenschmückung von größtem Zierwert.

Wo und wie können nun Canna-Gruppen im Garten oder in der Anlage verwendet werden? An jedem sonnig und nicht zu sehr dem Winde ausgesetzten Platze, sei es in einer Farbe, oder auch in verschiedenen Farben gemischt, doch muß hierbei auf die Höhenunterschiede Rücksicht genommen werden. Die Knollen werden im Gewächshaus oder warmem Frühbeet angetrieben und nach dem Austreiben in Töpfe gepflanzt, um beim Auspflanzen feste Wurzelballen zu haben. Blumenliebhaber, die nicht über Vorrichtungen zum Antreiben verfügen, lassen sich am besten Mitte Mai, wenn keine Fröste mehr zu befürchten sind, die angetriebenen Pflanzen kommen. Um die Canna in ihrer ganzen Schönheit zu zeigen, ist es gut, das Beet etwa 40 Centimeter tief auszuheben, mit frischem warmen Pferdemist zu füllen und die ausgeworfene Erde wieder darauf zu bringen. Die warme Unterlage ist den Pflanzen zum raschen An- und Weiterwachsen sehr förderlich und dient gegen den Sommer den vielen gern in sie eindringenden Wurzeln als Nahrung, sehr reichliches Bewässern bei Trockenheit ist unbedingt nötig. Im Übrigen gedeihen die Canna auch in jeden in guter Dungkraft stehenden Gartenboden. Selbst in im Sommer nicht verwendeten Kalthäusern, Orangerien, luftigen Wintergärten lassen sich während dieser Zeit ganz prachtvolle Wirkungen mit ihnen erzielen. Im zeitigen Frühjahr ausgepflanzt, blühen die Cannas hier schon ab Juni bis November und gedeihen bei guter Pflege zu einer Üppigkeit und zeigen eine Farbenpracht, die nicht so leicht mit irgend einer anderen Pflanze erzielt werden kann. Um dem Gartengestalter und Liebhaber bei der Auswahl der Sorten an die Hand zu gehen, seien in Folgendem die besten neuen und älteren Sorten angeführt, mit den entsprechenden Angaben über Höhe und Blütenfarbe.

ROTLAUBIGE: *Feuerzauber*, 150 Centimeter, eine der effektvollsten, größtblumigen, die riesige scharlach-zinnoberrote Blütentrauben bringt. *Walhalla*, 120 Centimeter, bringt schön frei über dem braunroten Laub eine reiche Fülle mittelgroßer, dunkelorangegelber Trauben von größter Leuchtkraft, sehr früh und reich blühend; besonders für Gruppen geeignet, die auf weite Fernwirkung berechnet sind. *Vorwärts*, 130 Centimeter, Blattwerk dunkelbraunrot, die großen edlen Blumenrispen feurig scharlachrot. *Stadtrat Heidenreich*, 140 Centimeter, eine der besten älteren, Blätter braunrot, Blütentrauben mennigrot. *John Farquahr*, mit braunroten Blätter und salmrosa Blumen.

GRÜNLAUBIGE: *Dr. Ing. Dürr*, 70 Centimeter, eine sehr früh und äußerst reich blühende Gruppensorte mit großen, dunkellachsrosa Rispen. *Dr. Eckener*, 70 Centimeter ebenfalls eine vorzügliche Gruppensorte, von rein karminrosa Farbe der großen Blütenstände. *Gartenschönheit*, 90 Centimeter, auf äußerst kräftigen, massiven Blättern erheben sich riesige Rispentrauben von schöner lachsrosa Farbe. *Präsident*, 120 Centimeter, eine der besten grünblättrigen Sorten, gesundes, kräftiges Blattwerk, mächtige Trauben leuchtend-roter Blumen von großer Haltbarkeit stempeln diese Sorte zu einer der besten. *Melpomene*, 80 Centimeter, der Vorzug dieser ausgezeichneten Gruppensorte besteht in der ungemein reichen Verzweigung der enormen großen Blumendolden von prächtiger lachsorangerosa Farbe. Diese Sorte bedeckt infolge ihrer Reichblütigkeit und ihrer reichen Verzweigung das Blattwerk vollständig, vorzüglich, sowohl für Gruppen wie auch als Einzelpflanze. *Generalmajor von Teichmann*, 150 Centimeter, eine imposante Sorte mit rein goldgelben großen Blütenstauden. *R. Wallace*, 90 Centimeter, eine niedrige, reichblühende, gute Gruppensorte von schöner, canariengelber Farbe. *Meteor*, 100 Centimeter, eine ältere, jedoch treffliche Sorte für Gruppen, auf bläulichgrünen Blättern stehen die weitleuchtenden, mennigzinnoberroten straffen Blütentrauben.

Haben die ersten Fröste die Blütenpracht zerstört, so werden die Stiele etwa 30 Centimeter hoch abgeschnitten, die Blätter entfernt und die Klumpen mit der daran haftenden Erde herausgenommen, um sie im Kalthaus unter der Tablette, im Souterrain oder Keller den Winter über frostfrei aufzubewahren. *H. Gehringer*

Eine Rosa Hugonis-Hybride

UNTER den aus China neuerdings eingeführten Wildrosen ist Rosa Hugonis insofern eine der interessantesten, weil sie zu den wenigen gelbblühenden Wildformen gehört. Sie ist leider bei uns noch sehr selten anzutreffen, sollte aber stark vermehrt werden. Ich konnte sie durch Jahre hindurch im Arnold Arboretum in Amerika beobachten. Man hat ihr auch in den Vereinigten Staaten bereits als Zuchtrose für wertvolle Hybriden Beachtung geschenkt. So berichtet im »American Rose Annual 1926« dessen Herausgeber über eine von dem so erfolgreichen Züchter Van Fleet hinterlassene Hybride der R. Hugonis, die wahrscheinlich aus einer Kreuzung mit einer Form der R. rugosa hervorging. Sie wird beschrieben als ein früh blühender breiter Strauch von 0,8 bis 1 Meter Höhe, der in der Tracht und durch seine unterirdischen Ausläufer an die graziösen schottischen Rosen gemahnt. Die Belaubung ist klein und sattgrün, die jungen Triebe sind fast dornlos, das ältere Holz trägt scharfe gerade Dornen. Die Blüten sind 5 bis 6 Centimeter breit, leicht gefüllt, etwas kugelig in Form und erscheinen in reicher Fülle längs der übergebogenen Zweige. Ihre Farbe ist primelgelb mit leicht rosa Anhauch, der bei späteren Blumen deutlicher wird. Die Sorte trägt den Namen *Dr. E. M. Mills*, ist sehr wüchsig und eignet sich für Einzelpflanzen und Gruppen. Hoffentlich findet sie auch bald ihren Weg zu uns. Unsere Rosenzüchter sollten überhaupt den chinesischen Wildtypen viel mehr Beachtung schenken. Wir haben noch keinen Überfluß an guten harten Parkrosen.

Meconopsis-Kultur

DER bekannte Sammler *F. Kingdon Ward* schreibt in »The Gardeners' Chronicle« über Meconopsis, diese wunderschönen Mohngewächse aus den Hochgebirgen des westlichen China und Himalaya. Sie sind leider in unsere Steingärten, für die sie wie geschaffen erscheinen, noch immer nicht eingedrungen. Das liegt zum Teil daran, daß man ihnen nicht die richtigen Standorte zu bieten versteht. Wer die Pflanzen in der Heimat gesehen hat, weiß, daß sie in vollster Üppigkeit aus dem anscheinend sterilsten Steingeröll herauswachsen, in Lagen, in denen sie bald lange Zeit von feuchten Nebeln umhüllt, bald der brennendsten Sonne ausgesetzt sind. Sie brauchen einen tiefgründigen nährstoffreichen und frischen Boden. Ihre starken Wurzeln gehen überraschend tief in den Boden ein. Ward betont, daß er bei einigen Arten ein Wurzelsystem feststellte, daß dreimal so lang war, wie die oberirdischen Teile der Pflanze. Ähnliches konnte ich selbst auf den Hängen der Lichiang-Schneeberge beobachten. Es war oft ganz unmöglich, die Pflanzen mit den Wurzeln auszugraben. Wenn wir die aus Samen erzogenen Pflänzchen möglichst bald an solche Stellen im Steingarten und Alpinum setzen, wo sie sehr tief mit den Wurzeln gehen können und möglichst unten auf Schichten mit ständiger Feuchtigkeit stoßen, während die Erdoberfläche trocken sein kann, so werden sie leicht gedeihen und blühen. Sie säen sich unschwer selbst aus, können sich aber nur dort einbürgern, wo die Samen auf günstigen Boden fallen. Meist kommen sie bei uns an Stellen, an denen die Wurzeln nicht leicht und nicht tief genug in den Untergrund können. Zu den Arten, die sich in England und Schottland bisher am besten bewährt haben, zählen M. latifolia, M. paniculata, M. Prattii, M. pseudointegrifolia, M. simplicifolia und M. Wallichii. Leider sind sie fast alle nur zweijährig, säen sich aber an ihnen zusagen-

den Orten im Felsengarten selbst aus. Welch prächtige Wirkungen sich dann zur Blütezeit ergeben, konnte ich in verschiedenen englischen und schottischen Felsengärten beobachten. *C. S.*

Neue Bücher

ALLGEMEINES GARTENBUCH. Das unter diesem Titel bekannte Buch von *Theodor Lange* zählte früher zu den viel beachteten deutschen Gartenbüchern. Es ist jetzt im Verlage von Neufeld & Henius, Berlin, in neuer, sechster Auflage herausgebracht worden, wobei es durch die Bearbeiter *Zahn, Meermann* und *Mütze* zum Teil stark verändert wurde. Es ist ein zweibändiges, umfangreiches Werk, das gebunden den für heutige Verhältnisse recht hohen Preis von Mk. 30.— kostet. Dementsprechend muß man sich auch die Frage vorlegen, was dafür geboten wird. Beachtet man dabei zunächst die Ausstattung, so muß man von den über 800 Bildern beider Bände sagen, daß nur die allerwenigsten auch bescheidenen Ansprüchen genügen. Derartige veraltete Katalogbilder gehören nicht in ein so teures modernes Gartenbuch. Wir haben heute eine so reiche zeitgemäße Gartenbauliteratur, daß man sich fragen muß, ob es überhaupt Zweck hat, solche allgemeine Werke neu aufzulegen, wenn man sie nicht besser ausstatten und auch, das gilt namentlich von Band II, besser bearbeiten lassen kann. Der Durchschnittsgärtner und Gartenfreund kann sich solch teures Werk nicht kaufen, es sei denn, es wird ihm da etwas ganz Hervorragendes geboten. Aber gerade über die behandelten Themen gibt es gute und billige Bücher, die das gleiche, wenn nicht mehr bieten. Mit solchen Werken ist uns heute nicht gedient. Freilich fehlt uns in deutscher Sprache eine Encyclopaedie des Gartenbaues, wie sie etwa Amerika in Bailey's Standard Cyclopedia besitzt. Aber ein derartiges Buch können wir uns unter den obwaltenden Umständen nicht leisten. Mit Halbheiten in Form allgemeiner Gartenbücher ist uns nicht gedient.

AMERIKANISCHES ROSENJAHRBUCH 1926. The American Rose Society hat durch J. Horace McFarland auch für 1926 das *„American Rose Annual"* wieder in schöner Form herausgegeben. Derartige geschlossene Jahrbücher sind, wie auch das Beispiel der D. D. G. bei uns zeigt, viel wirkungsvoller und anschaulicher als Zeitschriften, die nur mit Not und Mühe von den betreffenden Gesellschaften erhalten werden. Die amerikanische Rosengesellschaft umfaßte Ende 1925 noch nicht ganz 4500 Mitglieder, eine, wie es uns scheint, für Nordamerika sehr bescheidene Zahl, und doch ist sie dabei eine der größten Blumengesellschaften, die es gibt. Ihre rege Tätigkeit spiegelt sich im Inhalt des mit farbigen und schwarzen Bildern geschmückten Jahrbuches wieder. Die Farbentafeln zeigen Blüten von Mrs. F. R. Pierson, einer neuen roten amerikanischen Teehybride, einen Strauch von Bloomfield Progress, einer ebenfalls roten Teehybride und einen solchen von Bloomfield Abundance, einer Zierrose vom Cécile Brunner-Typ, und Blüten der Rankrose Dr. Huey. Aus dem Inhalt seien noch hervorgehoben Artikel über The Crapo Catalogue, ein altes Verzeichnis aus dem Jahre 1847, einheimische Rosen der Dünen von Indiana, Nachreife und Keimung von Rosensamen, die Fortführung von Dr. Van Fleet's Werk, veredelte und wurzelechte Rosen, richtige Namengebung in öffentlichen Rosengärten, auf der Suche nach gelben Rosen, Rosenkatalog-Grundsätze, Urteile über Sorten aus dem Mitgliedskreise, Rosen in und für Florida, ein Pernetiana-Paradies und andere mehr. Auch eine genaue Übersicht der neuen Rosen aus aller Welt wird geboten, und viele kleine Notizen schließen den hübschen Band.

GARTENBLUMEN. Aus der Thaer-Bibliothek von Paul Parey, Berlin, ist das alte *Rümplersche* Büchlein »Die Gartenblumen, ihre Beschreibung, Anzucht und Pflege« jetzt wieder von *Otto Krauß*, dem Direktor des Frankfurter Palmengartens, in vierter Auflage neu bearbeitet worden. Es mutet in seiner Ausstattung mit den unscheinbaren Bildchen recht altertümlich an. Der Verfasser bemüht sich auch, auf engem Raume allzu viel zusammenzudrängen. Dabei kommt aber keine der behandelten Blumengruppen zu ihrem Rechte, wenn auch der Verfasser tat, was er in dem vorhandenen Rahmen tun konnte. Bücher dieser Art sind nun einmal nicht mehr zeitgemäß.

DIE KAKTEEN. Von der großangelegten Monographie *Friedrich Vaupels* liegt jetzt die zweite Lieferung vor. Sie bringt den Schluß der Gattung Rhipsalis, die 84 Arten umfaßt. Ihr schließt sich an Wittia mit zwei Arten und Epiphyllum mit sechs Species. Mit Aporocactus flagelliformis, dem wild angeblich noch nicht bekannten Peitschenkaktus, einer in Mexiko sehr verbreiteten Kulturpflanze, endet diese Lieferung, die auch wieder eine Anzahl sehr instruktiver Zeichnungen enthält.

PILLNITZ. Die so freudig aufstrebende Höhere Staatslehranstalt für Gartenbau in Pillnitz beweist ihre Existenzberechtigung durch einen von Direktor *Otto Schindler* und den Abteilungsleitern erstatteten, in hübscher Form dargebotenen Bericht über die von 1922 bis 1925 entfaltete Tätigkeit. Pillnitz entwickelt sich immer mehr zu einer bedeutsamen Kulturstätte des deutschen Gartenbaues, und für die Anstalt ist es sehr wesentlich, außer dem Schloßpark auch die so ausgezeichnet geleitete staatliche Versuchs- und Beispielsgärtnerei so nahe zur Hand zu haben.

SCHÄDLINGSBEKÄMPFUNG. Unter dem Titel »Nachrichten über Schädlingsbekämpfung« haben die in der I.-G. Farbenindustrie Aktiengesellschaft vereinigten deutschen Teerfarbenfabriken eine Zeitschrift ins Leben gerufen, deren erste Nummer im März erschien. Sie enthält wertvolle Artikel über Beizverfahren und Schädlingsbekämpfung, die für Landwirtschaft, Gartenbau und Forstwirtschaft gleichermaßen wichtig sind. Auch die Referate aus der einschlägigen Literatur sind willkommen. Man kann der weiteren Entwicklung dieses Blattes mit Interesse entgegensehen. *C. S.*

Zeitschriften

BELGIEN

In no. 487 von *„La Tribune Horticole"* schließt J. Havaux seine Betrachtungen über das, was man in kleinen Gärten pflanzen soll. In den weiteren Nummern werden besonders Zollfragen behandelt.

ENGLAND

Im Aprilheft der *„Orchid Review"* bespricht Broadway Orchideen aus Trinidad. Die schöne Odontioda Princess Mary wird abgebildet. Reichhaltige Ausstellungsnotizen schließen das Heft. — In no. 2048 von *„The Gardener's Chronicle"* werden zwei schöne Blütensträucher, Clethra alnifolia und Stachyurus chinensis, im Bilde gezeigt. F. Kingdon Ward setzt seine Reiseberichte fort. Er bespricht die besten Stauden, die er aus Westchina mitgebracht hat. Es sind vor allem Primel. Auch die Betrachtungen von H. Friend über klassische und legendäre Gärten und N. E. Brown über Mesembryanthemum werden weiter geführt. In no. 2049 beginnt Ward eine Artikelreihe über Meconopsis. Im folgenden Hefte fangt eine Schilderung des botanischen Gartens in Tjibodas, Java, an. No. 2050 enthält einen Bericht über die neue Halle der Royal Horticultural Society, deren Eröffnung für den englischen Gartenbau sehr bedeutsam ist, da es bisher in London an einem guten Ausstellungslokal mangelte. Wundervoll ist die neue Brasso-Cattleya Mary J. S. Hanbury, die in no. 2052 abgebildet wird. — No. 2836 von *„The Garden"* enthält mancherlei über Rhododendren und gute Schnittnelken. Wie schön Berberis Vernae wird zeigt ein Bild in no. 2837. Die hier dargestellte Pflanze aus dem Arnold Arboretum kannte ich vor Jahren als kleinste Neuheit. Jetzt gilt sie als eine der besten Zierhölzneuheiten der letzten Jahrzehnte. Über kapriziöse Pflanzen plaudert im gleichen Hefte F. Dysart. Harte Heidekräuter bespricht Macself in no. 2838. Bean setzt seine Notizen über Wandsträucher fort und vom verstorbenen Rev. J. Jacob stammen Betrachtungen über Gartentulpen. Als Zwergkoniferen für den Felsengarten bildet W. Dallimore im folgenden Hefte Picea excelsa globosa nana und Juniperus hibernica compressa ab. Auch Einfassungen für Staudenrabatten werden besprochen. Interessant ist eine Artikelreihe über Mähmaschinen, die in no. 2840 beginnt. E. H. Wilson bespricht eine berühmte Thuja orientalis aus Peking.

FRANKREICH

Das Aprilheft der *„Revue Horticole"* zeigt eine Farbentafel von Erigeron in den Formen Quakeress und hybridum mesagrande. Gérôme beginnt eine Artikelreihe über Kakteen. — In *„Le Jardinage"* wird die Artikelreihe über das Arboretum Allard fortgesetzt. Abies Pinsapo pendula und Sequoia gigantea pendula werden daraus im Bild gezeigt.

HOLLAND

No. 11 der *„Floralia"* ist eine Wasser- und Sumpfpflanzen-Nummer. Bleekers Artikel über Gehölzschnitt werden in no. 12 und 14 fortgesetzt. — No. 38 von *„Onze Tuinen"* zeigt mannigfache Frühlingsblüten-Bilder. In no. 40 sind unter anderem Notizen über Aloë und Agave und Freiland-Orchis. In no. 41 setzt Nansen seine Gehölzschnitt-Artikel fort. In no. 42 wird ein kleiner Vorgarten geschildert.

NORDAMERIKA

Über Frostballenpflanzung von Bäumen spricht J. D. Burford im Märzheft von *„The Gardener's Chronicle of America"*. — *„Horticulture"* ist wieder voll kleiner Mitteilungen. Im Märzheft wird die Dahlie Robert Ogden Fletcher empfohlen. Die Aprilnummer bringt das Ergebnis der Paeonien-Klassifizierung von 1925.

ÖSTERREICH

Im Aprilheft der *Gartenzeitung* wird über das 50jährige Bestehen des Gartenbauvereins in Hitzing berichtet, der in Wien immer eine Rolle gespielt hat. Die Österreichische Gartenbaugesellschaft wird übrigens 1927 gleichzeitig mit der Französischen Gartenbaugesellschaft ihr hundertjähriges Jubiläum feiern. *C. S.*

VERLAG DER GARTENSCHÖNHEIT G.m.b.H. in Berlin-Westend / Verantwortlich für die Schriftleitung OSKAR KÜHL in Berlin-Westend, für den Anzeigenteil DOROTHEA KLETT, Berlin-Lichterfelde / Druck von W. SOMMER, Buch- und Kunstdruckerei in Berlin-Schöneberg.

Staatliche Porzellan-Manufaktur Berlin

Gegründet 1763

Eigene Verkaufsstellen in Berlin

W 9, Leipziger Str. 2, am Potsdamer Platz,

NW 23, Wegelystr. 1 am Stadtbahnhof Tiergarten

KPM

KARL FOERSTER-Bornim-Potsdam

Anemone japonica Schneekönigin

Für Spätpflanzung

bis in den Sommer, in kräftigen, abgehärteten Topfpflanzen, in diesem Jahr schon reich blühend:

Chrysanthemum indicum in 40 bewährten win-
Staudenastern [terharten Gartensorten
Anemone japonica
Dahlien in 120 erlesenen Sorten.

Mein neuer STAUDENKATALOG, zugleich ein Wegweiser durch das Staudenreich, mit ca. 100 neuen schwarzen und farbigen Bildern wird gegen Voreinzahlung von 2 M. (Postscheckk. Berlin 30893) oder Nachnahme zugesandt. / Ausführliche Preisliste ohne Bilder kostenfrei.

Wilhelm Pfitzer

G. m. b. H.
gegr. 1844

Stuttgart 44

Spezialitäten:

Gladiolen

Dahlien, sämtliche Blumenzwiebeln und Knollengewächse; Rosen, Blütenstauden, Schlinggewächse sämtliche Gemüse- und Blumensamen.

Bei Bezugnahme auf die Gartenschönheit Kataloge (224 Seiten, 300 Abbildungen) umsonst und portofrei

---

Ihr Garten soll Ihre Erholung sein,

und wenn Sie nach der anstrengenden Berufsarbeit sich ein wenig mit ihm beschäftigen, dann wollen Sie nicht nur alle möglichen Gemüse- und Küchenkräuter ziehen, sondern auch an bunten Blumen Ihre Freude haben und zum Ausschmücken Ihres Heimes eigenhändig Sträuße pflücken.
Alle Gemüse- und Blumensämereien, Knollengewächse, Blumenzwiebeln u. Gartengeräte erhalten Sie in vorzüglichster Beschaffenheit in dem

Samenhaus

Pape & Bergmann

Quedlinburg 5

Das **neueste reichbebilderte Preisverzeichnis** wird Ihnen **kostenlos** zugesandt. Eine Postkarte genügt um es anzufordern.

Auf das dieser Ausgabe beiliegende Sonder-Angebot wird hiermit noch besonders aufmerksam gemacht.

Sammelmappe

DIE BLUMENUHR

UM 3 Uhr *morgens* öffnen sich die Blumen des Wiesenbockbarts, Tragopogon pratensis; des Taghammerstrauchs, Cestrum diurnum; der dreifarbigen Winde, Convolvulus tricolor. — Von 4—5 Uhr: des knolligen Löwenzahns, Leontodon tuberosum; des Dachpippaus, Crepis tectorum; der blauen Rasselblume, Catananche coerulea; der wilden Cichorie, Cichorium intybus.

5 Uhr morgens: der braunroten Tagblume, Hemerocallis fulva; der Sanddiestel, Sonchus oleraceus; des sibirischen Mohns.

5—6 Uhr morgens: des gemeinen Löwenzahns, Taraxacum officinale; der tuneranischen Gänsediestel, Picridium tingitanum; des Alpenpippaus, Crepis alpine; des gemeinen Sichelsalats, Ragadiolus edulis; des purpurroten Hasenlattichs, Prenanthes purpurea.

6 Uhr morgens: des gefleckten Ferkelkrauts, Hippuchaeris maculata; des doldenförmigen Habichtskrauts, Hieracium umbellatum.

6—7 Uhr morgens: des roten Pippaus, Crepis rubra; des kriechenden Hasenöhrchens Hieracium pilosella; des Mauer-Hasenöhrchens, Hieracium murorum; der Ackergänsediestel, Sonchus arvensis.

7 Uhr morgens: der gelben Seerose, Nuphar

lutea; der gemeinen Ringelblume, Calendula officinalis; des spießförmigen Löwenzahns, Leontodon hastile; des Kopfsalats, Lactuca sativa; der lappländischen Günsediestel, Sonchus laponicus; der ästigen Graslilie, Anthericum ramosum.

7—8 Uhr morgens: des schlauchförmigen Steinkrauts, Alyssum utriculatum; der bärtigen Zaserblume, Mesembrianthmum barbatum; der ansehnlichen Zaserblume, Mesembrianthmum spectabile.

8 Uhr morgens: des echten Hasenöhrchens Hieracium auricula; des Ackergauchheils, Anagallis arvensis; der sprossenden Nelke, Dianthus prolifer; der Regenringelblume, Calendula pluvialis.

9 Uhr vormittags: der levkojenförmigen Othonne, Othonna cheirifolia; der Ackerringelblume, Calendula arvensis.

9—10 Uhr vormittags: der eisartigen Zaserblume, Mesembrianthemum cristallinum; des rotblühenden Sandkrauts, Arenaria rubra. (Um diese Zeit schließen sich Tragogogon pratense und Cichorium intybus wieder.)

11 Uhr vormittags: der doldenblütigen Vogelmilch Ornithogalum umbellatum; der neapolitan. Zaserblume, Mesembrianthemum neapolitanum, fast aller Malvenarten und anderer.

Um *Mittagszeit* alle Pflanzen, welche das glänzende Tageslicht verlangen, um aufzublühen; sie erfreuen sich desselben bis 3 Uhr, wo sie sich schließen, oder wenig-

stens ihre Blumenblätter einander nähern, um die Wärme zu konzentrieren, die sie eingenommen haben. Nach 3 Uhr *nachmittags* fängt die Stundenreihe des nächtlichen Aufblühens der Blumen an. Es öffnen sich die Blumen um

4 Uhr der zweiteiligen Wunderblume, Mirabilis dichotoma; der Jalappa-Wunderblume, M. Jalappa; der langblühenden Wunderblume, M. longiflora.
6 Uhr nachmittags: des trauernden Kranichschnabels, Pelargonium triste; des möhrenblättrigen Storchschnabels, Geranium.
7 Uhr *abends:* des nächtlichen Hammerstrauchs, Cestrum nocturnum; der herzförmigen Nachtblume, Nycterium cordifolium.

8 Uhr abends: der nächtlichen Zaserblume, Mesembrianthemum noctiflorum.
9 Uhr abends: des indischen Trauerbaumes, Nyctanthes arbor tristis.
9—10 Uhr abends: der großblumigen Fackeldiestel, Cactus grandiflorus, die sich gegen Anbruch des Tages schließt, um sich nie wieder zu öffnen; der nächtlichen Silene, Silene nocturna.

Aus Hässlers Blumenzeitung, 1844, Nr. 50

*

Zur zweckmäßigen Aufstellung einer Blumenuhr hat man den Vorschlag gemacht, die hierzu dienenden Gewächse auf ein Kreisbeet, nach der Zeit des Oeffnens und Schließens der Blumenuhr geordnet, (mit dem Eingang nach der Nordseite) zu pflanzen. Hier die erforderlichen Angaben; wobei man freilich die Stunden nicht auf den Punkt des Zutreffens halten darf.

I. Pflanzen, deren Blüten sich *vormittags* öffnen: 3—5 Uhr: Tragopogon pratense. Von 4 bis 5 Uhr: Thrincia Leontodon) tuberosa, Helminthia (Pieris) echioides, Cichorium intybus, Hemerocallis fulva, Crepis tectorum. Von 4 bis 6 Uhr: Picridium (Scorconera) tingitanum. Von 5—6 Uhr: Sonchus oleraceus, Leontodon taraxacum, Barkhausia (Crepis) alpina, Tragopogon crocifolium, Rhagodiolus edulis (Lampsana rhag. odiolus), Convolvulus sepium. Nach 6 Uhr: Hieracium sabaudum, H. umbellatum. Von 6—7 Uhr: Hieracium murorum, Barkhausia rubra, Sonchus arvensis, S. palustris. Von 6—8 Uhr: Alyssum sinuatum, Leontodon autumnalis. Nach 7 Uhr: Lactuca sativa, Nymphaea alba, Anthericum ramosum. Von 7—8 Uhr: Geranium praemorsum, Sonchus alpinus, Hypochaeris maculata, Hedypnois rhagodioloides (Hyoseris hedypnois), Mesembrianthemum barbatum. Nach 8 Uhr: Hieracium pilosella, Anagallis arvensis, Dianthus prolifer, Hypochaeris glabra. Von 9—10 Uhr: Calendula arvensis, Portulaca oleracea (nach anderen 11 Uhr). Von 9—12 Uhr: Drosera rotundifolia. Nach 10 Uhr: Alsine rubra, Mesembrianthemum crystallinum. Von 10—11 Uhr: Mesembr. linguiforme, Paver nudicaule (nach anderen 4—5 Uhr), Hemerocallis flava und fulva. Nach 11 Uhr: Ornithogalum umbellatum, Calendula chrysanthemifolia. Von 11—12 Uhr: Tigridia pavonia (Ferraria tigridia).

II. Pflanzen, deren Blumen sich *abends* öffnen:

Um 5 Uhr: Mirabilis jalapa, Pelargonium triste. Von 6—7 Uhr: Cereus grandiflorus. Von 7—8 Uhr: Mesembrianthemum noctiflorum (nach anderen 10—11 Uhr).

III. Pflanzen, deren Blüten sich *vormittags schließen:* Um 8 Uhr: Leontodon taraxacum. Um 10 Uhr: Picridium tingitanum, Lactuca sativa. Von 10—12 Uhr: Cichorium intybus, Sonchus arvensis. Nach 11 Uhr: Tragopogon crocifolium. Von 11—12 Uhr: Sonchus oleraceus. Nach 12 Uhr: Sonchus alpinus.

IV. Pflanzen, deren Blüten sich *nachmittags*

und abends schließen: Von 1—2 Uhr: Hieracium umbellatum, Barkhausia rubra. Nach 2 Uhr: Helminthia echioides, Hieracium murorum, Hippochaeris maculata, Geranium praemorsum. Von 2—3 Uhr: Alsine rubra. Nach 3 Uhr: Thrincia tuberosa, Anagallis arvensis, Calendula arvensis, Calendula chrysanthemifolia. Von 3—4 Uhr: Anthericum ramosum. Nach 4 Uhr: Alyssum sinuatum, Nymphaea alba. Nach 5 Uhr: Hieracium sabaudum. Nach 7 Uhr: Leontodon autumnalis. Von 7—8 Uhr: Papaver nudicaule. Um 12 Uhr (Mitternacht): Cereus grandiflorus.

Nach Reichenbach »Die Pflanzenuhr«, Leipz. 1846.

Dr. R. Z.

*

ENGLISCH-JAPANISCHER BLUMENAUSTAUSCH

Eine eigenartige Verabredung wurde zwischen den Stadtverwaltungen von London und Tokio getroffen. Das große Erdbeben von 1923 vernichtete 14 300 von den 24 600 Bäumen, die man in Tokio durch viele Jahre systematisch angepflanzt hatte. Der Gartendirektor der japanischen Hauptstadt Inoschita, der sich gegenwärtig in London befindet, hat nun mit den Behörden der englischen Hauptstadt einen Austausch englischer und japanischer Bäume, Sträucher und Blumen vereinbart. Japan sendet gegen 1000 Bäume und Pflanzen, darunter 30 verschiedene Arten der Pflaumen- und Kirschbäume, die in Japan so herrlich blühen. Einige seltene Arten dieser japanischen Gaben sollen nicht in London selbst angepflanzt, sondern an die botanischen Gärten des Landes abgegeben werden. London versorgt dafür Tokio mit englischen Eichen und Fichten und sendet außerdem eine Auswahl altenglischer Blumen, die die japanischen Gärten nicht haben, so Wiesenraute, Fingerhut, Lupinen, Stockrosen, Rittersporn, Ringelblumen und Stiefmütterchen. Es ist beabsichtigt, daß der britische Gesandte in Japan einige dieser englischen Bäume und Blumen selbst in Tokio anpflanzen soll zur Feier dieses friedlichen Austausches zwischen den beiden Völkern.

Gartenschönheit

eine Zeitschrift mit Bildern

für Garten- und Blumenfreund · für Liebhaber und Fachmann

Juni 1926

in Gemeinschaft mit Karl Foerster und Camillo Schneider

herausgegeben von · Oskar Kühl

Verlag der Gartenschönheit G.m.b.H. Berlin-Westend

7. JAHR / HEFT 6 JUNI 1926

GARTENSCHÖNHEIT

eine Zeitschrift mit Bildern
für Garten- und Blumenfreund
für Liebhaber und Fachmann
in Gemeinschaft mit Karl Foerster
und Camillo Schneider
herausgegeben von Oskar Kühl

Inhalt des Juniheftes:

Seite

Karl Foerster / Orientalischer Mohn / Mit 6 Bildern 141
Schöne alte und neue Rosen / 6 Bilder . . 144
W. Schacht / Wildblumenschönheit / Mit 5 Bildern 146
Paul Landau / Naturgefühl und Garten 148
Carl Wagner / Das Recht im Garten . . 149
Camillo Schneider / Wildrosenschönheit / Mit 6 Bildern 150
Paul Kache / Blütengehölze des Juni / Mit 2 Bildern 152
Ein kalifornisches Gartenparadies / Mit 8 Bildern 154
A. J. van Laren / Pflanzen und Gärten in Algerien II 158

Gartenaufgaben

Von der Dresdener Jubiläums-Gartenbau-Ausstellung / Zwei Pläne von Gustav Allinger 159

Aus dem Blumengarten der Literatur

Aphorismen über Natur / Von Christian Morgenstern 160

GARTENARBEIT UND BLUMENPFLEGE

Alexander Steffen / Der Spaten und sein Gebrauch I / Mit Zeichnung 161
C. R. Jelitto / Primel-Erfahrungen II . . . 162
Paul Kache / Rosenpflege im Sommer II . . 163
Erich Wibiral / Schuttwurzler 164

Die Pflanze in der Wohnung

Neue Blumenvasen / Mit 3 Bildern 165
Johannes Köster / Blütennotizen 165

GARTENRUNDSCHAU

Neues aus aller Welt

Studienfahrt nach Köln / Gärtnerische Versuchsstation in Friesdorf / Deutsche Dendrologische Gesellschaft / Zwei Iris-Schriften 167

Neue Bücher

Aristokraten des Gartens / Der deutsche Park 168

Zeitschriften 168

BILDBEILAGE

Kletterrosen und Rittersporn

FARBIGE BILDBEILAGEN

Wasserloch-Flor im Steingarten
Genista dalmatica und Allium narcissiflorum
Paeonie Mme. Louis Henry
Papaver orientale Ethel Swete, Mme. of Orange

Monatlich ein Heft

Bezugspreis für das Vierteljahr
in *Deutschland* 4 G.-M. und 0.75 G.-M. Versandkosten (Postscheckkonto Berlin 76290),
im *Ausland* einschließlich Versandkosten: 5.25 Goldmark = 1,25 U.S. A.-$ oder entsprechend in der Landeswährung.

Preis des Einzelheftes
1.50 Goldmark zuzüglich Versandkosten

Verlag der Gartenschönheit G.m.b.H.
Berlin-Westend / Akazien-Allee 14.

Rot und blaßgelb blühen oben von Mai bis faſt Oktober Helianthemum amabile Rubin und Gelbe Perle. In dem kleinen kaum mehr als zwei Quadratmeter großen Waſſerloch blühen abwechſelnd weiße Calla, bunte Zwergwaſſerroſen, Vergißmeinnicht, ſibiriſche Schwertlilien, Pfeilkraut, am Rande Moos-Steinbrech, Primula rosea, Iris ochroleuca und Monspur. Epimedium hält Ordnung. – Bild K. F.

Der Gegenſatz zwiſchen den goldigen Genista dalmatica im Vordergrunde und dem Violett des Allium narcissiflorum dahinter wirkte an einem Abend ſo ſtark, daß es im Bilde feſtzuhalten verſucht wurde. Völlig laſſen ſich ſolche Reize jedoch nicht wiedergeben. – Bild C. S.

Papaver orientale Prinzess Victoria Luise. – Bild Kache *Im Juni*

KARL FOERSTER / ORIENTALISCHER MOHN

DER orientalische Riesenmohn ist ein Ding für sich auf der Welt, ein Ding für sich ohne hinleitende Übergänge in der übrigen Natur, so wie etwa das Rotkehlchen oder die Nachtigall oder die Magnolie. Die Natur hat bei vielen glänzenden Dingen die Hilfsgerüste abgebrochen, mit denen sie erbaut wurden, und läßt diese Wunderbauten sich unvermittelt vor uns erheben.

Um die großartigen Riesenmohnsorten zu erschaffen, hat es drei Jahrzehnte langer Züchtungsarbeit bedurft. Die Hilfsgerüste dieser Entwicklung, nämlich die mehr oder weniger fehlerreichen und noch mäßig schönen Riesenmohnsorten sind ziemlich bekannt und verbreitet, während die Schönheitsgipfel des Riesenmohnreiches den meisten Gartenfreunden noch verhüllt sind.

Wie merkwürdig sind die Gezeiten mancher Stauden, ihre explosive Vegetationsenergie, ihr totenähnlicher Sommerschlaf, ihr Munterwerden im Herbst, die Winter- und Frühlings-Trotzkraft ihres grünen Lebens. Anfang September erwacht nach dem Sommerschlaf das neue Leben des Mohnes. Die grünen Blattgeschöpfe arbeiten durch den ganzen Herbst, Winter und Frühling, um dann Ende Mai die größten Blumen in unserer Gartenwelt zu entfalten.

Nur gewisse Paeonien und Dahlien-Sorten sind in den großen Wettkampf eingetreten. Ende Juni vergilben die Stengel und verschwindet das Laub, und die Staudengärtnereien bekommen ihre altgewohnten Feuermohn-Reklamationen von den noch nicht erfahrenen Gartenfreunden. Diese Reklamationen, mit denen so sicher zu rechnen ist wie mit der Selbstmörderstatistik, könnte man schon mit kleinen Druckzetteln beantworten: Dein Feuermohn lebt und wird auferstehen!

Für die Zeiten der Sommerruhe, während welcher unliebsame Lücken an jenen Plätzen entstehen, muß mit andern Füllstauden gearbeitet werden, die ihre Hauptentwicklung während der Mohnruhe haben.

Der Riesenmohn will sonnig oder lichthalbschattig stehen, verträgt viel Trockenheit, haßt Wurzelfilz von Gehölzen und mag gern durch lange Reihen von Jahren ungestört am gleichen Platze stehen.

Die Wurzeln gehen in wenigen Jahren bis einen Meter tief hinunter und sichern der Pflanze die nötige Wasserversorgung. In den ersten 2 Jahren nach der Pflanzung soll man mindestens im kälteren Deutschland den Riesenmohn gegen Ausnahmefrost mit etwas Tannenreisig decken, auch leidlich trockene Laubschüttung

Wunderkind

Papaver orientale
Ethel Swete

ehe diese Schönheitsquelle in so viel Gärten aufgebohrt sein wird, wie dies der hohen Stellung dieser Staude in der Rangordnung aller schönen Dinge des Mai und Juni entspricht.

Die beiden schönsten dunkelroten Riesenmohne sind Württembergia und Großfürst, letzterer noch etwas dunkler im Rot. Beide unterscheiden sich von allen ähnlichen unter anderem dadurch, daß die Haltung der Blütenblätter bei bleigrauem Wetter nicht unschön wird. Die Haltung der mächtigen Stiele ist ganz einwandfrei. In der sonst so schönen Sorte Goliath, die als Schnittblume sehr beliebt ist, steckt leider der Fehler des Sichzusammenfaltens der Blume bei grauem Wetter. Ein merkwürdiger Sport der Sorte Württembergia ist Wunderkind in feurig carmin-lachsrote Farbe. Hiermit ist eine sehr wichtige Farbenprovinz gewonnen, welche den Mohn zu einem verträglichen Paeonien-Nachbarn macht.

Auf dem Gebiet der hell-lachsrosa Töne hat Prinzeß Victoria Luise alles in allem noch die Führung. In der weißen Farbe ist Perry's White wohl der edelste. Die Blume ist zwar nicht sehr groß, dafür aber ist die Pflanze sehr reichblühend.

In hellroten Tönen haben noch immer Lady Roscoe und der alte Royal Scarlet sowie der kleinblumigere Mohn Feuerzeichen einen guten Platz. Letzterer sowie die kleine Sorte Cerise Dwarf auch in Steingärten am Platze. Man tut sie da gern in die Nähe von Zwergkiefern, neben denen ihre sommerliche Unordnung nicht auffällt.

Die dunkelbraunrote Farbe der Züchtung Mahony ist schwer durch andere zu ersetzen, doch muß diese Sorte unbedingt halbschattig gepflanzt werden, denn in heißer Sonne entmischt sich die Farbe.

Es gibt mancherlei Versager unter den Mohnsorten und ihr wahrer Gartenwert ist oft erst nach Jahren einwandfrei zu entscheiden. Ich habe

schadet ihm nichts. Er will dann aber nicht sehr gern, im März aufgedeckt, acht Tage lang morgens sechs Grad Kälte haben, wie sich das unser Klima manchmal leistet. Man lasse also in schweren Märzfrösten luftiges Deckmaterial lieber etwas länger auf dem Mohn liegen. Das gilt auch besonders für Staudengärtnereien, die große Mengen junger Pflanzen im Erdboden in Töpfen eingefüttert bereithalten. Die schönsten und gesundesten Vorräte, die man im Winter ein wenig gedeckt hielt, können durch nichts leichter als durch solche Nachtfröste gestört werden. Es ist also auf alle Fälle gut, das Deckmaterial nicht gleich nach dem Abdecken ganz zu entfernen, sondern lieber der Sicherheit halber noch in Haufen liegen zu lassen. Aber, wie gesagt, bei der alt eingewurzelten Gartenpflanze ist keinerlei Ängstlichkeit mehr nötig. Wo einmal Mohn gestanden hat, treibt er aus großen Tiefen jahrelang immer wieder aus verbliebenen Wurzelresten empor. Er braucht aber dann zwischen andern Pflanzen nicht eigentlich lästig zu wirken, sondern zeigt sich bei weiterer Bekämpfung schließlich gutmütig und nachgiebig.

Die Staudengärtnereien beginnen mehr und mehr den Feuermohn in hohen Blumentöpfen als junge Pflanzen vorrätig zu halten, weil die Ansiedlung mit festem Wurzelballen so sehr viel schneller und sicherer verläuft.

Bei der Beurteilung der Sortenauswahl, die ich vorschlage, ist zu bedenken, daß auch die Blütezeit eine verschiedene ist, daß es frühe und späte Sorten gibt und daß die roten Farben außerordentlich verschieden sind, ohne daß man das eigentlich beschreiben kann. Auch in der Formenausgestaltung kommt die Pflanze auf unzählige Ideen, die schwer zu schildern sind.

Schweres, starkes Rot kann ein Garten nie genug haben. Um die Feuermohnzeit gibt es wenig dieser Art. Wer die gewaltigen Feuermohn-Farben recht lange in seinem Garten haben will, setzt frühe Sorten an die sonnigsten Stellen und späte an die beschatteten.

Feuermohnsträuße aus den zehn wesentlichst von einander verschiedenen Sorten bieten einen erstaunlichen Anblick. Es wird aber noch lange dauern,

Papaver orientale
Feuerzeichen, orangerot

Papaver orientale Württembergia

eine Schwäche für die tiefgefranzte schwarzfleckige rote Sorte Perry's Favorit. Leider scheint sie dieses Jahr infolge der unerhörten späten Nachtfröste blütenlos. Es wird also noch ziemlich langer Jahre bedürfen, bis man klar über sie sieht.

Die bisherige Sortenaufzählung mag vorläufig genügen. Kein Zweifel darüber, daß die genannten Sorten sehr wesentliche Etappen im bisherigen und kommenden Aufstieg des Feuermohns sind und daß wir hiermit doch erst an der Eingangspforte der Entwicklung stehen.

»Wo soll ich denn nun Feuermohn in meinem Garten hinsetzen?«

In Obstgärten kann man ziemlich schattige Wegrabatten damit bepflanzen. Es ist sehr schön, wenn Riesenmohn in langgestreckter rhythmischer Pflanzung weit durch einen ganzen Garten hinfeuert, zuweilen unterbrochen von mächtigen weißen Staudenlupinen oder der späten, weißen Schwertlilie Darwin oder großen Spiraea Aruncus-Büschen oder von mannshohen Eremurus. Alle die genannten sind klassische Nachbarn des Mohnes. Ich liebe besonders zwischen den großen Feuerschalen dicke Trupps von sehr hochwachsenden Iris, nämlich Forsete in hellblau, Mme. Chereau weiß und blau gestrichelt und Juniata mittelblau. Man versuche einmal eine Zusammensetzung von Papaver Württembergia und Iris Mme. Chereau. Ich stelle mich manchmal so in der Nähe von Pflanzen auf, daß ich auf die Ferne hin alle möglichen Überschneidungen ausprobieren kann. Dabei findet man durch Zufall oft erstaunliche Dinge. Das ist ja auch der ungeheure Reiz der Staudenrabatten, daß man in diesen langgestreckten Farbenwildnissen beständig so unerwartete Beziehungen zwischen Blumen findet, die einander ganz fremd schienen.

Was hat denn Chelone barbata coccinea mit dem weißen rotgeäugten Phlox Sommerkleid zu reden, der durch die roten Rispen hindurchschimmert. Gartenschönheit ist eine Sache, der wir mit viel klaren Gedanken nachzugehen suchen. Noch ein ganz anderes Ding aber ist Gartenmystik. Das ist ein Etwas, das sich nicht gestalten und nicht machen läßt, sondern in oft unerwarteter Weise aus den Dingen auch den anspricht, der die Schönheitsgrundlagen hierfür gestaltet hat. Wenn man so etwas im Gemälde darstellen wollte, so müßte man oft zu seltsamen Formaten greifen, beispielsweise 15 Centimeter hoch und 80 Centimeter lang; doch dies alles nebenbei.

»Wie soll ich denn in diesem kleinen Gartenteil mit Feuermohn arbeiten?«

Es genügt am Wegrand entlang ein 70 Centimeter breiter Beetstreifen, alle 80 Centimeter ein Feuermohn abwechselnd mit einer Dahlie. Wenn die Dahlien gelegt werden, so um den 20. April herum, kann man zwischen die Mohnschöpfe auch noch Massen von Hyacinthus candicans stecken.

An manchen Gartenplätzen ist Feuermohn eine besondere Wohltat, etwa dem Wasser gegenüber oder in der Nachbarschaft mancher Nadelhölzer. Endlos sind die Farbensensationen und Überraschungen, die man in den langen Mohnwochen an diesen Blumen erlebt.

Eben sah ich in ein Gartenlandhaus hinein, unter dessen Hängelampe ein Riesen-Mohnstrauß glühte. Den Hintergrund bildete ein blaßblaugrünes Fenster, das den Abendhimmel hinein ließ. Der Anblick beherrschte auf 80 Meter den Garten.

Prachtvoll machen diese großen Mohne alle Wetterstimmungen mit, graues Wetter und heißes Wetter. Gewissen strahlenden, fast übermäßig schönen Tagen wird durch den Mohn eine Würze verliehen, durch welche ein neues wohltuendes Gleichgewicht zwischen den Farben von Himmel und Erde hergestellt wird. Diese grandiose Blume wagt sich auf ihre Weise ein Wechselreden mit Wetter und Himmel, mit großen weißen Marmorwolken oder aufziehendem Gewitter. Das Unerhörte solcher Blumenwirkungen ist aber an die höchsten Sortenqualitäten und an die rechten raumgemäßen Mengen geknüpft; hierbei spielt das Alter der Pflanze auch eine große Rolle. Fünf Jahre alte Stöcke bringen 40 bis 50 Blütenstiele.

Papaver orientale Wm. of Orange
Bilder C. S.

Unter den älteren Remontantrosen ist die 1882 von Levet gezüchtete Ulrich Brunner Fils noch immer von Rosenfreunden geschätzt. Ihr aufrechter Wuchs, ihre vollen, großen kirschroten Blüten zeichnen sie aus.

Die Pernetrose Soleil d'or ist die von Pernet-Ducher 1900 herausgegebene erste Sorte ihrer Rasse. Sie stammt von Persian Yellow und Antoine Ducher. Ihre Farbe ist ein leicht orange überhauchtes Goldgelb.

Die hier gezeigte Lyon-Rose ist ein Abkömmling der Soleil d'or. Auch sie wurde von Pernet-Ducher 1907 erzogen. Sie ist eine der allerersten Sorten von eigenartig chromgelber und krabbenroter Färbung.

Kletterrosen und Rittersporn

Auch die Rayon d'or iſt eine prächtige Pernetiana, deren prachtvolle Farbentöne man vielleicht als licht kadmiumgelb mit kupfer und ſcharlach Anhauch bezeichnen kann. Sie blüht reich und duftet gut, bildet ſchöne breite Pflanzen mit glänzend grüner Belaubung. Pernet-Ducher gab ſie 1910 in den Handel, und für dieſe Roſengruppe gehört ſie heute ſchon zu den alten Sorten und iſt in den Gärten ziemlich ſelten.

Unter den weißen Teehybriden iſt British Queen ſehr geſchätzt. Mac Gredy brachte ſie 1912 heraus. Die Knoſpe iſt etwas roſa angehaucht, die volle große Blume aber rein weiß. Sie blüht reich und zeichnet ſich auch durch angenehmen Duft aus. Da ſie im allgemeinen gut wächſt und ſchöne geformte Blüten bildet, kann ſie als brauchbare Gruppenroſe wie auch für Schnitt empfohlen werden. Sie wird im Durchſchnitt 50 cm hoch.

Die noch neue J. G. Glassford, die Hugh Dickson 1921 herausgab, iſt eine Remontantroſe mit ſehr großen dunkel granatroten Blumen, die als ſehr haltbar gelten, nicht verblauen und gut duften. Sie wird bis 1,5 m hoch, verzweigt ſich reichlich und trägt eine hübſche ſattgrüne Belaubung. Alle dieſe Eigenſchaften machen ſie für ſolche Plätze wertvoll, wo derart üppige Roſen einen Platz im Garten haben. – Bilder C. S.

Die Wetterdistel, Carlina acaulis, sollte in keinem Steingarten, keinem Naturgarten deutscher Bergflur fehlen, ebenso wie auch Carlina caulescens, ihre hochwachsende Form, bei der die Schönheit alter Pflanzen monatelang außerordentlich groß ist. – Dasselbe gilt von dem im Bilde rechts dargestellten blaugrünen Steinbrech, Saxifraga caesia.

W. SCHACHT / WILDBLUMENSCHÖNHEIT

UEBERALL ist sie zu finden in dem weiten, großen Garten der Natur, überflutet die Wiesen und Hügel mit bunten Farben, leuchtet wie Edelgestein aus den Schatten der Wälder. Wo auch nur ein Fleckchen Erde, nur eine Steinritze frei ist, da läßt sie sich nieder, knospet und blüht dort auf engen Räumen in erstaunlichem Reichtum und inniger Schönheit, nur zu oft unsere Gärten ob ihrer Armut beschämend. Sie findet sich am Seestrand, wo sich die Möve mit gellem Jauchsen über die Brandung schwingt, das Blaugrau des Strandhafers die weiße Düne kleidet und das ewige Lied des Wellenschlages den Raum erfüllt, wo sich im Frühsommer das feingliedrige Gezweige der Dünenrose mit weißen Blüten bedeckt, in Brackwasser die Strandaster ihre blaßlila Blumenbüschel entfaltet, tausend und abertausend blühender Strandnelken die glühend rosigen Köpfchen auf dünnen Stengeln über dem Rasen wiegen, die bizarre Stranddistel zwischen Stein und Kies steht und orangegelbes Beerengezweige des Sanddorns monatelang in weiße Schneelandschaft ragt.

Im Moore klingt die wilde, üppige Schönheit der Blumen zusammen mit den vielen weichen, dunklen Farben von Erd und Wasser. Das Pflanzenleben baut sich hier neben und übereinander in solcher Fülle auf, wie kaum an einem andern Ort. Der Moosbeere zartes Gespinst überzieht die quellenden Polster üppigen Mooses, besetzt mit zahllosen fleischroten Blütchen, die in ihrer Form und Farbe winzigen Alpenveilchen gleichen. Darüber hängen und nicken an rötlichen Stielen die lieblichen Glöckchen der Rosmarineheide. Des Fieberklees dreilappiges Blattwerk wird überragt von feinen rötlichen Knospen und weißen dichtbärtigen Blüten. Auf dunklem Wasser liegt wie weißer Schaum die Blütenfülle des Hahnenfußes und daneben schweben, gleich duftig rosigen Wölkchen, über dem unter der Spiegelfläche geflochtenen Blattwerk die Blütendickichte der Wasserfeder. Wasserrose und Mummel gleisen in ihrer königlichen Schönheit und der Tannwedel bildet nicht weit davon mit seinen quirlig beblätterten Trieben aus dem Wasser ragende Wäldchen. Am Rande stehen zwischen geneigten, sich wiegenden und biegenden Gräsern und blühenden Binsen auf hohen Stielen weißrötliche Dolden der Schwanblume, glühende Blütenspeere des Blutweiderichs und stolze gelbe Schwerteln. Das Geflüster des Schilfes klingt zusammen mit dem Lied der Rohrammer, blaue Wasserjungfern gaukeln auf und ab, grünschillernde Libellen überkreuzen den Spiegel.

Wie soll man alle die großen Blumenfeste der wilden Natur schildern? Im Frühling, wenn aus den schlanken spitzen Knospen der Buchen die zartgrünen, silbrig behaarten Blättchen treiben und darüber hoch oben im unendlich blauen Äther mit jauchsenden Rufen die Bussarde spielen, ihre Kreise bald groß, bald klein ziehen, auf und ab schweben, oft in der Sonne silbrig glänzen und dann wieder wie dunkle Punkte erscheinen, schmückt sich der Waldboden mit unzähligen weißen Anemonen, blauen Leberblümchen und purpurnem Lerchensporn. Durch der Wiesen saftiges Grün wirkt sich das Gelb der Himmelschlüssel; dunkelblaue Kölbchen der Traubenhyazinthe stehen dazwischen, viele der honigsuchenden Falter durch ihren süßen Duft anlockend.

Die Säume der Bäche färben sich goldgelb mit den blanken Schälchen der Dotterblumen und in den pudrig hellgelben Blütenkätzchen der Salweiden waten und schmausen mit gelben Höschen bekleidete Bienen. Doch es gibt dann auch Wiesen, aus deren feuchtem Grund in wenigen Tagen ein blauer Teppich emporblüht. Der Frühlingsenzian vollbringt diesen Zauber. Sein Blau ist von solcher Tiefe und glühender Reinheit, wie es nur hier und da noch im Glanze einer Vogelfeder, oder im schillernden Blinken eines farbensatten Schmetterlings zu finden ist.

Der Frühsommer bringt Heckenrosenblüten in Fülle, und die Wiesen tragen ihr duftiges Spitzenkleid, das zusammengesetzt ist aus dem feinsten Gewebe der Schierlingsblüten, großen Margueritensternen, gelben Hahnenfußtüpfchen und blauseidenen Storchschnabelblüten. In luftigen Höhen der Gebirge setzt jetzt erst der Frühling, nachdem er schon wochenlang seine Vorläufer in Form von blauen Glockengehängen der Troddelblumen, einigen Steinbrechblüten und gelben Hungerblumen durch den tauenden Schnee vorausgesandt, in vollem Prunk ein. Köstlich duftende Orchideen, alle möglichen Enziane, farben- und formenreiche Glockenblumen, Silberwurzschalen und noch unzählig andere prächtige Blüten bedecken in ihrer Üppigkeit und Frische die so köstlich grünenden Matten.

Kleine rosadoldige Seidelbastbüschchen duften überall zwischen dem Farbenrausch der Alpenrosen, die weite Strecken mit Felsblöcken, Knieholzbüschen und Zirbelkiefern mit ihrem glühenden Rot umfluten. Selbst die scheinbar tote Geröllhalde ist manches Pflänzchens Heimat, an der es mit solcher Zähigkeit hängt, daß ein Verpflanzen seinen Tod bedeutet. Die Alpenmarguerite nestelt sich hier so tief in ihr hartes Bett, daß das

Die Alpenwucherblume, Leucanthemum alpinum, ist eine feine und sonderbare Abwandlung des Margeritenthemas, das natürlich nur im Steingarten seine volle Resonnanz findet.

Alpennelke, Dianthus alpinus, dieses Wildnelkenjuwel, ist in Gärten garnicht schwer zu kultivieren. Die niedrigen großblumigen Wildnelken wollen viel Sonne ohne zuviel Trockenheit.

kleine grüne Blatt nur wenig sichtbar ist, zumal es von den weißstrahligen Blütensonnen fast ganz verdeckt wird. Nicht viel anders machen es das Alpenhornkraut, dessen kriechende Stämmchen filzige Blätter und atlasweiße, feinnervige Blüten schmücken, der rohseidenfarbene Alpenmohn und das reizende blaue, mit orangeroter Lippe prahlende Alpenleinkraut. Im festen Fels oberhalb der Geröllformation sitzen in den Ritzen und Fugen, fast ohne Nahrung lebend, blaugraue Steinbrechpolster und steinharte weißgeblümte Mannsschildhorste. Auf unzugänglichen Grasbändern wehen von Sammlerhand verschont gebliebene Edelweißsterne im Winde, kleinblättrige Gebirgsweiden kriechen mit ihren Ästchen übers Gestein und ganz oben noch, fast an der Grenze des ewigen Schnees leuchten geheimnisvoll aus dem braunen Moos die kleinen ultramarinblauen Blüten des Schnee-Enzians. Das Gesumme der Herdenglocken, das weiter unten noch der Wind in das Alpenrosenreich hinauftrug, ist hier verstummt. Wolkenschatten und Lichtinseln huschen durch Täler und über Bergkämme hinweg, Rinnsale glitzern wie Silberadern zwischen den gigantischen Felsmassen; in der Ferne leuchten in krystallener Reinheit Schneefirnen und Gletschergefilde herüber. Ununterbrochen streift der Wind im Geklüfte die Äols-Harfe, brandet an Felswände und läßt die winzigen Blüten zu unseren Füßen erzittern. So ist denn überall, wohin wir in der Natur unsere Schritte auch lenken mögen, die Wildblume das ganze Jahr hindurch unsere Begleiterin. Selbst die trockenen Bahndämme besetzt sie mit ihren farbenfrohen Vertretern, die sich je nach Klima, Licht- und Bodenverhältnissen gegenseitig ablösen und mit freudigem Geblühe den Vorüberreisenden grüßen und winken.

Das Immenblatt, Melittis melissophyllum, bleibt jedem Naturgarten, in den es gesetzt wird, treu. Die scharf abgegrenzten rot-weißen Blumen sowie der Gesamtcharakter der ausgesprochen edlen Pflanze haben einen rätselhaften Wildnisreiz.

Man beginnt jetzt erst, nachdem man sah, daß die grellen Blütenmassen des Farbengartens den anspruchsvolleren Blumen- und Naturfreund weder Erfrischung noch Sättigung boten, vereinzelt mit der Anlage von Natur- und Steingärten. Deren Formenreichtum läßt sich auf immer neue Weise entfalten. Sie bieten Gelegenheit zu wechselvollster Gestaltung und Bepflanzung. Hierzu geben uns die Motive der Natur reiche Anregung.

Hier ist denn auch die Stelle, wo edle Wildblumenschönheit sich im Garten auswirken kann und damit neue Reize in dessen Räumlichkeiten und in unsere Nähe trägt.

PAUL LANDAU / NATURGEFÜHL UND GARTEN

DAS Naturgefühl, »der Reflex des durch die äußeren Sinne empfangenen Bildes der Natur auf die Empfindung und Einbildungskraft«, wie Alexander von Humboldt den Begriff definiert hat, äußert sich in zahlreichen Formen, in Dichtung, bildender Kunst und Musik, in wissenschaftlicher Forschung und beschreibender Reiseschilderung; auch in der Gestaltung und Umformung der Landschaft durch den Menschen zum Garten. In der Geschichte des Gartens aber ist das Naturgefühl wieder nur eins der bestimmenden Elemente neben anderen, die häufig wichtiger und beherrschender sind, neben dem wirtschaftlichen Gesichtspunkt, der lange Zeit allein maßgebend erscheint, neben dem wissenschaftlichen, der in den botanischen Gärten zum Ausdruck kommt, neben dem kulturgeschichtlichen, der die Natur als Festsaal und Wohnung, als Teil des Hauses einrichtet. Die Entfaltung des Naturgefühls in der Gartenkunst ist gleichsam die feinste und zarteste Blüte ihrer Entwicklung, da diese Kunst sich — schwieriger als manche andre — erst sehr allmählich aus den »Forderungen des Zweckes« befreit. Die Ansprüche der praktischen Nutzung herrschen viele Jahrhunderte uneingeschränkt, mag man nun Gemüse und Früchte, Heilpflanzen oder die zur Duftbereitung notwendigen Blumen bevorzugen, und auch heute spielen Fragen der Züchtung, des Ertrages, der vorteilhaften Anlage eine wichtige Rolle neben dem rein ästhetischen Genießen. Dazu kommt die »bauende« Arbeit beim Garten, die die »Gartenbaukunst« zu einem Anhang der Architekturgeschichte gemacht hat und eine Einordnung in die Psychologie der architektonischen Stile gestattet. Aus diesen mannigfach verflochtenen Anschauungen und Bedingungen, in die das gärtnerische Schaffen der Zeiten eingebettet ist, läßt sich der reizvollste, weil im Gemüt begründete Zug manchmal nur schwer herausschälen: die persönliche Stellung des Menschen zum Garten, der Reflex des Naturgefühls, der sich unter diesem bestimmten Gesichtswinkel spiegelt. Die Geschichte des Gartens als ein Ausschnitt aus der Geschichte des Naturgefühls ist noch wenig behandelt.

Das »Gartengefühl« ist nur ein Sonderfall des Naturgefühls; aber die Empfindung einer bestimmten Epoche prägt sich doch gerade hier besonders charakteristisch aus. Der Garten wird daher auch zur Aufhellung dieser allgemeinen Stimmungen beitragen. Als Hauptquelle für die Erkenntnis des Naturgefühls benutzt man nun, seit Humboldt in seinem »Kosmos« den ersten, viel bewunderten Grundriß des »Naturerlebnisses« zeichnete, die dichterischen und literarischen Zeugnisse. Dieser gewaltige Stoff ist es auch fast ausschließlich, den Alfred Biese in seinem kürzlich bei Quelle & Meyer in Leipzig erschienenen Werk »Das Naturgefühl im Wandel der Zeiten« verwertet. Biese lag als Literarhistoriker diese Begrenzung des Gebietes nahe; er hat daneben die bildenden Künste und den Gartenbau nur gelegentlich herangezogen. Die Dichter, die großen Schriftsteller, das Schrifttum im weitesten Sinne, sie bieten ja den klarsten Spiegel des Seelenzustandes der Zeiten und Völker, wobei zu berücksichtigen ist, daß der Genius dem Gefühlsleben der Allgemeinheit vorauseilt und man bei behaglichen Schilderern, bei gemütvollen Briefschreibern häufig bezeichnendere Äußerungen findet. Der Verfasser dieses inhaltsreichen Buches hat sich seit langem mit der Erforschung des Naturgefühls beschäftigt und bereits in den achtziger Jahren des vorigen Jahrhunderts eine dreibändige Geschichte seiner Entwicklung veröffentlicht, die ein weitschichtiges Material zusammenbrachte. Seitdem ist vieles auf diesem Gebiet gearbeitet worden, und eine zusammenfassende Darstellung war notwendig; sie sucht Analyse mit Synthese zu verbinden und will »nicht nur ein Beitrag zur Geschichte des Geschmacks und des Gefühlslebens sein, sondern auch literargeschichtlich den Wandlungen der Motive nachgehen und diese in die Bewegung des Zeitgeistes einordnen«. Von den alten Griechen bis zu den neuesten Dichtern wird hier zusammengetragen, was für Eindrücke und Regungen die Natur ausgelöst hat; wir können die allmähliche Eroberung der Formen, Farben und Landschaftsstimmungen durch das Auge miterleben, die Entdeckung der einzelnen Jahreszeiten und ihrer besonderen Reize, der Mondnacht und des Waldes, des Meeres und Gebirges; wir verfolgen den Wechsel des Geschmacks, der vom Klassischen ins Romantische umschlägt und statt der lange verherrlichten Idyllik der Ebene und des Hains das grandiose Pathos zerklüfteter Gebirgsformen und wilder Schluchten bevorzugt. Für jeden, der sich mit dieser interessanten, stets sich wieder neu formenden Entfaltung des Menschengeistes beschäftigt, wird Bieses Buch eine anregende Lektüre sein, wenngleich es freilich den höchsten Anforderungen nicht ganz entspricht. Es bleibt auch in der neuen Form mehr Stoffsammlung als psychologische Deutung, verzichtet dabei aber auf die größere Reichhaltigkeit und Ausführlichkeit der ersten Auflage. Die Details, die aneinander gereiht werden, ermüden, ohne daß das Neue, Originelle der einzelnen Erscheinung scharf hervortritt. Die großen Entwicklungslinien werden von einem Gewirr der Zitate überwuchert; auch die Zusammenhänge mit der allgemeinen Kultur ließen sich verbreitern und vertiefen. Immerhin muß man dem verdienten Verfasser für diesen Versuch, den nur er so vollbringen konnte, dankbar sein und jeden geistig interessierten Naturfreund darauf hinweisen.

Auf das engere Gartenproblem beschränkt, zeigt diese historische Darstellung deutlich, wie das verschieden geartete Naturgefühl der Völker ihre Gärten beeinflußte. Gewiß gibt es auch hier internationale Moden und Stile; aber selbst das allmächtige Vorbild von Versailles konnte die deutschen Gärten des Rokoko nicht ihrer Eigenart berauben; die Gartenkunst der italienischen Renaissance hat sich unter dem bewölkteren nordischen Himmel ganz anders ausgebildet, und der englische Landschaftsgarten wieder verliert in Frankreich und Italien seine Phantastik und Intimität. Die großen Sphären des Klassischen und Romantischen scheiden sich auch in der Gartenkunst in die nationalen Bedingtheiten südlichen und nordischen Wesens, die harmonische Klarheit und lichterfüllte Ordnung eines italienischen Renaissancegartens kann ebenso wenig in einer deutschen Anlage aufleben wie die monumentale Form Giorgiones in der idyllischen Begrenztheit Altdorfers oder die vollendet sich rundende Fülle Ariosts in der ungefüge getürmten Wucht Fischarts. Dem deutschen Wesen ist von Anfang an im Naturgefühl wie auch in seinem gärtnerischen Spiegel eine Freude am Einzelnen eigen, eine Vertiefung in die kleinen Formen und eine Beseelung dieser begrenzten Welt. Das weite Raumgefühl des Barocks, das in dem Garten Le Nôtres zum Ausdruck kommt, ist ihm fremd, ebenso die strenge nüchterne Regelmäßigkeit in der Aufteilung der Fläche. Deshalb erreichen die deutschen Nachahmungen des klassischen französischen Stils nie die majestätische Kraft und gewaltige Gliederung des Vorbildes; dafür entzücken sie durch feine Abweichungen vom Schema, durch eine frischere Naturempfindung. Auch in seinen Renaissance- und Barock-Formen behält der deutsche Garten stets etwas Mittelalterlich-Gotisches, etwas Krauses, Bizarres, Heimliches und Gemütvolles, und so hat er bezeichnenderweise sein Höchstes erst im Rokoko geschaffen, dessen Geist in seiner eigenwilligen Laune, in seiner organischen Üppigkeit an die Gotik anklingt. In solchem Zusammenhang ist dann der »Naturgarten«, der von England ausging, nur eine letzte Auflösung und Übersteigerung der Rokoko-Elemente, wie sich ja auch die »Rückkehr zur Natur« bei Rousseau, die Befreiung des deutschen »Sturms und Dranges« als der letzte entscheidende Schritt einer lange vorbereiteten Entwicklung darstellt. Es ist in der Geschichte der Gartenstile der Kampf zwischen Klassisch und Romantisch wirksam, wie er sich überhaupt innerhalb romanischer und germanischer Kunst vollzieht. Klassisch, romanisch, südlich ist die Stilisierung der Natur nach festen Gesetzen, die strenge Regelmäßigkeit und Ordnung, die die Natur in Fesseln zwängt und ganz einordnet in die »Gebilde von Menschenhand«. Romantisch, germanisch, nordisch ist die Ehrfurcht vor der Ursprünglichkeit und Urwüchsigkeit der Schöpfung, die liebevolle Versenkung in die Wunder des Alls, in die Sphärenklänge des Kosmos wie in die Schönheiten einer Blume, der Versuch, diese »leise waltende Spur« der Landschaft zu verfolgen und im Garten nachzubilden. Der Landschaftsgarten, in dem die romantische Richtung gipfelt, hat diesen Zug zum »Natürlichen und Großen«; er nimmt nicht umsonst von England seinen Ausgang, das im 18. Jahrhundert die Freiheit der Weltanschauung und Kunst heraufführte und unsrer deutschen Dichtung die Bahn brach.

So kann man im Garten dieselben nationalen Impulse entdecken, wie in der Dichtung und dem Naturgefühl, das in ihr ausgeprägt ist. Ja, man kann sogar die Menschen der verschiedenen Rassen und Zeiten in dem verschiedenartigen Formgefühl der Gartengestaltung gespiegelt finden. Wölfflin hat einmal die Frage aufgeworfen, ob nicht die einzelnen Stile der Kunst, die besonders in der Architektur und in der Tracht so entgegengesetzte formale Empfindungen voraussetzen, aus dem gegensätzlichen Körpergefühl der einzelnen Völker und Menschen zu erklären sind. Auch die Menschen, die den Garten mit ihrem Wesen erfüllen, können nur in einer ganz bestimmten äußeren Erscheinung in ihm heimisch werden; so hätte sich zum Beispiel eine Reifrockdame in den geschlängelten Waldwegen eines englischen Parks nicht fortbewegen können. Am charakteristischsten für diesen Zusammenhang zwischen Körper und Gartenform ist der japanische Garten. Die zierlichen Menschen mit ihrer überfeinerten Geschmackskultur verzierlichen und verniedlichen auch die Natur, schaffen eine bizarre Welt im Kleinen mit

Diefe Paeonie gehört zu den neuen P. Lemoinei-Formen, die von Lemoine gezüchtete Hybriden zwifchen P. suffruticosa (P. arborea) und P. lutea darftellen. Es ift die Sorte Mme. Louis Henry von Ruys in Dedemsvaart. Das verfteckte Nickende der lutea-Blumen ift noch zu erkennen.

Nichts ift vielleicht für die Farbenphotographie fchwerer als die fo reinen, fatten oder zarten Töne der orientalifchen Mohne, Papaver orientale, auf die Platte zu bannen. Hier war das eigenartige Kirfchrofa von Ethel Swete neben dem Lachsrofa von Mme. of Orange feftzuhalten. – Bilder C. S.

winzigen Wasserbecken, über die schmale Brückchen führen, mit sorgsam gewählten bunten Steinen und Zwergbäumen, deren verschnörkelte Formen etwas von der preziösen Grazie der Geishas haben.
Lassen sich so selbst Verbindungen zwischen Körpergefühl und Gartengestalt finden, so ist doch der seelische Zusammenhang natürlich viel enger. Man findet die Gartenleidenschaft erst auf einer bestimmten Höhe der Kultur ganz entwickelt, wenn das Naturgefühl eine gewisse Steigerung und Spannung erreicht hat. Solange der Mensch noch nicht in sich einen Gegensatz zur Natur empfindet, wird in ihm auch nicht der starke Wunsch wach, sich selbst ein Stück Landschaft zu schaffen und zu formen. Der primitive Mensch siedelt sich in der Schöpfung an, macht sich in ihr heimisch, aber er bildet sie nicht nach seiner Stimmung um; der naive »Vertraute der Schöpfung« lebt so innig in und mit allem Gewordenen, daß ihm der Gedanke an eine Verschönerung der Umwelt, Steigerung und Konzentrierung ihrer Reize garnicht kommt. Erst der sentimentale Kulturmensch, der in Städten wohnt, der in sich den Zwiespalt seines Wesens erkennt, fühlt sich auch der Natur entfremdet, sehnt sich nach ihr und sucht das verlorene Glück unbewußter Gemeinschaft durch ein schmerzliches Drängen nach Vereinigung und Hingabe zu ersetzen. Die Griechen der klassischen Blütezeit sind das beste Beispiel für eine Harmonie mit der Natur, die auf jede künstlerische Gestaltung verzichtet und mit der Schönheit ringsum organisch erwächst, sodaß Tempel und Häuser einfach in die reine Natur hineingestellt werden und in sie hineinpassen wie die Menschen. Erst als die Griechen aus diesem »paradiesischen« Zustand der Einheit mit der übrigen Schöpfung erwachten, als sie »wissend« wurden, als sie in großen Städten den Zusammenhang mit Hain und Feld, mit Baum und Blume verloren, als sie auch innerlich sich von dem Natürlichen entfernten, da suchten sie nach einem Ersatz in den künstlich aufgebauten und reich geschmückten gärtnerischen Anlagen, die der späte Hellenismus und die römische Kaiserzeit hervorbrachten. Ähnliche Stimmungen beginnen im absinkenden Mittelalter und in der Renaissance den Menschen zum Garten hinzudrängen, und diese Entwicklung gipfelt gegen Ende der Renaissance in der Schwärmerei eines Tasso, die die hohe Gartenkultur des Barock einleitet. Immer wenn eine große Sehnsucht nach dem Natürlichen die in die Fesseln der Kultur gezwängte Menschheit ergreift, dann ist es der Garten, in dem dies Gefühl Befriedigung sucht. So bringt Rousseau den Anstoß zu einer Neugestaltung des Gartens und zu einer Vertiefung der Gartenfreude. So ist auch in unsrer Epoche aus dem Überdruß an der Großstadt, aus der Liebe zu Freilicht und Freiluft, zu Sport und Leben im Freien die Gartenstadtbewegung entstanden, die ihre Parallele in der römischen Kaiserzeit und gegen Ende des Rokokos findet.
Dieses Gefühl der Sehnsucht nach der fremd gewordenen Natur, dieses flehentliche Ausstrecken der »Arme unsrer Seele« nach der »Geliebten« verleiht dem Naturempfinden etwas Gesteigertes, Überschwengliches, eine zitternde Spannung. Aber in dieser erregten Ekstase werden zugleich Blicke und Sinne für alle Wunder und Schönheiten geschärft. So ist die Entwicklung des modernen Naturgefühls eine stete Bereicherung, Verfeinerung, Differenzierung unsrer Eindrücke. Die Romantik entdeckt nicht nur das »Zwielicht« und die »Nachtseiten« der Landschaft, die unzähligen Schwebungen in der Beleuchtung und der Bewegung, sondern auch die unendliche Skala der Farben und Formen in Wolken und Schatten, in Pflanzen und Steinen. Was hier etwa Jean Paul und Tieck, die Maler Caspar David Friedrich und Gustav Carus, Annette von Droste und Adalbert Stifter, der Franzose Flaubert und der Däne Jacobsen erschaut und erlebt haben, das ist in unser Bewußtsein übergegangen. Dazu kam die Erschließung der exotischen Länder mit ihrem Pflanzenreichtum seit Alexander von Humboldt und den andern großen Reisenden des 19. Jahrhunderts. Der deutsche Garten fängt nun an, zum Weltgarten zu werden, und füllt sich mit Blumen und Sträuchern aus fernsten Gegenden. Diese Fülle neuer Möglichkeiten, dies Bewußtsein von der Unermeßlichkeit des Schönen auf der Erde, das sich erst heute in unserm Garten zu verwirklichen beginnt, prägt sich auch in den jüngsten Äußerungen des Naturgefühls aus, die vom Impressionismus die Feinheiten der Einzelbeobachtung gelernt haben, aber von einem tiefen kosmischen Erleben der Einheit aller Wesen und Dinge erfüllt sind.

CARL WAGNER / DAS RECHT IM GARTEN

AUF Grund des Bürgerlichen Gesetzbuches erstreckt sich das Eigentums- und Herrschaftsrecht der Grundstücksbesitzer auf den Raum über und unter der Erdbodenfläche. Diese Bestimmung ist wichtig für die Pflanzen, die sich nicht auf den Raum des Eigentümers beschränken, sondern sich ober- und unterhalb der Erde ausbreiten. Daß diese Beeinträchtigungen von beiden Seiten kommen können, ändert nichts an der Schärfe des Gesetzes. Nach § 910 des B. G. B. kann der Gartenbesitzer Wurzeln, die vom Nachbargrundstück in seinen Boden dringen, abschneiden, aber nur soweit sie sein Nutzungsrecht an seinen Garten beeinträchtigen, sie müssen also seinen eigenen Bäumen, Sträuchern, Pflanzen schaden, ihnen Nahrung und Feuchtigkeit entziehen. Nur dann hat er das Recht dazu, ein böswilliges Entfernen ist strafbar. Auch gegen das Überhängen der Zweige kann er angehen, soweit sie seinen Garten schädigen, ihm Luft und Licht entziehen. In diesem Falle muß er aber dem Besitzer eine angemessene Frist lassen, die Zweige selbst zu entfernen, damit das Abschneiden sachgemäß geschehen kann. Erst nach dieser nicht ausgenützten Frist erlischt das Selbstverfügungsrecht des rechtmäßigen Besitzers und der Nachbar kann die Zweige entfernen und das Holz behalten, ein Eingriff, der sonst zur Schadenersatzklage führt. Man kann aber nicht auf Entfernung der Zweige und Wurzeln klagen.
Während ein Gartenbesitzer die in seinem Garten eindringende schädigenden Wurzeln ohne weiteres entfernen kann, liegt der Fall bei den an den überhängenden Zweigen befindlichen Früchten anders. Solange sie festsitzen, gehören sie dem Besitzer des Baumes, der durchaus das Recht hat, sie von seinem Grund und Boden aus zu ernten. Er kann aber nicht von seinem Nachbarn verlangen, sie von dessen Besitztum aus zu pflücken, § 903. Fallen sie aber beim Pflücken, Schütteln, durch irgend eine sonstige Bewegung Sturm, Regen oder durch natürliche Reife auf das Nebengrundstück, so gehören sie dem Eigentümer oder dem Fruchtbezugsberechtigten dieses Bodens. Das Zurückholen der gefallenen Früchte seitens des Baumbesitzers vom nachbarlichen Grundstück wird als Diebstahl angesehen und verpflichtet zum Schadenersatz und Herausgeben der strittigen Früchte. Dies Gesetz gilt aber nur für Grund und Boden, der in Privatbesitz ist, vom Boden, der im öffentlichen Gebrauch ist, also einer Straße, einem Platz, können sie nach § 911 des B. G. B. vom Besitzer zurückgeholt werden.
Wichtig für die Nutznießung eines Grundstückes ist auch der Fragenkomplex, der sich um die Grenzregulierung zwischen zwei Besitztümern dreht. Grundsätzlich kann jeder Besitzer von seinem Nachbarn dessen Mitarbeit zur Festsetzung der Grenze durch ortsübliche Grenzzeichen verlangen, dafür steht auch der Klageweg offen. Falls die Grenze nicht erkennbar als alleiniges Eigentum eines der beiden Anlieger anzusprechen ist, werden die Kosten für die Abgrenzung Hecke, Mauer, Zaun gemeinsam getragen. Auch darf keiner der beiden Nachbarn etwas an der Grenze ohne die Genehmigung des andern Interessenten ändern § 921, 922. Diese Gemeinsamkeit bezieht sich auf einen Baum oder Strauch, der von der Grenze geschnitten wird, wobei er durchaus nicht symmetrisch geteilt zu werden braucht. Das Holz und die Frucht gehören beiden Teilen zusammen. Das Fällen kann von jedem der beiden Nachbarn auf gemeinsame Kosten verlangt werden, solange der Baum nicht als Grenzzeichen dient, das durch nichts anderes ersetzt werden kann. In diesem Falle muß die Zustimmung des andern Nachbarn vorhanden sein. Verzichtet einer der beiden Anlieger auf sein Recht an dem Baume, dann trägt der andere die Kosten des Fällens, erwirbt damit aber auch nach § 923 den Baum.
Steht der Baum nicht auf der Grenze, sondern wächst mit dem Stamme schief in das Nachbargrundstück hinein, dann kann der Besitzer nach § 1004 auf Entfernung des Baumes verklagt werden, eine Endscheidung, die wohl einleuchtet.
Wenig bekannt ist das Gesetz, daß die Nutznießung eines Grundstückes gewährleistet, das keine Verbindung mit einem öffentlichen Wege hat. Hier kann der Eigentümer des Landes verlangen, daß die Nachbarn ihn über ihr Grundstück fahren lassen gegen Entschädigung eines Geldwertes, ein Zustand, der gegebenenfalls für immer so bestehen bleiben kann, wenn eine Abhilfe nicht möglich ist. Dabei kann aber auch der Fall eintreten, daß zur Bewirtschaftung des Bodens Pferd und Wagen gebraucht, das Grundstück aber nur auf einem Fußweg erreicht werden kann. Hat der Besitzer aber seine Isolierung selbst verschuldet, etwa dadurch, daß er das Land, über das er eine Verbindung mit dem öffentlichen Weg hatte, verkaufte, besteht natürlich für den Nachbarn keine Veranlassung, die Benutzung seines Grundstückes zu erlauben. Auch die Tatsache, daß das betreffende Grundstück nur auf einem Umweg erreicht werden kann, gibt nicht die Forderung frei, das Gebiet des Nachbarn zu benutzen.

CAMILLO SCHNEIDER / WILDROSENSCHÖNHEIT

WENN der erſte Frühlingsblumenrauſch vorüber iſt, die Arabis, Aubrietien, frühen Ginſter, Forsythien und Magnolien verblüht haben, dann naht die Zeit der erſten Wildroſen. Mitte Mai beginnt ſchüchtern ihr Flor, um ſchnell zu vollen Akkorden anzuſchwellen, bis die erſten Sommertage ihn langſam verklingen laſſen. Es iſt eine flüchtige Schönheit, von zartem Duft umhaucht. Aber wer möchte ſie miſſen, der ſie kennt? Wenige freilich kennen ſie recht. Für die meiſten Roſenfreunde iſt Roſenſchönheit gleichbedeutend mit Edel- und Rankroſen. Sie kennen nicht, was vor dieſen kommt: den Auftakt der Wildroſenformen.

Rosa alpina rosea

Den Reigen eröffnen die Vertreter zweier Gruppen, der Bibernellroſen und Zimmtroſen. Unter den Bibernellroſen iſt die neue Schönheit aus Mittelchina, Roſa Hugonis, vielleicht die wichtigſte, über die E. H. Wilſon in Band VI, Seite 107, berichtet hat. Sie muß hinein in unſere Gärten und Parks. Wilſon gibt an dieſer Stelle auch ein Bild der Roſa spinosissima altaica, einer ſchönen Form, der auch bei uns heimiſchen Bibernellroſe, die unter dem Namen Roſa pimpinellifolia bekannter iſt. Sie ſpielt für Züchtungen nicht die Rolle, zu der R. Hugonis hoffentlich berufen iſt. R. spinosissima kommt auch in trockeneren Lagen fort. Sie bewohnt im ſüdlichen Mitteleuropa ſonnige Hänge, beſonders auf Kalk.

Unter den Zimmtroſen iſt wohl Roſa alpina oder pendulina nicht nur eine der hübſcheſten, ſondern auch der früheſten. Unter den von ihr ſtammenden Rankroſen iſt *R. alpina rosea* eine die wilde Stammart an Schönheit übertreffende, leicht gefüllte Form. Sie bildet einen recht aparten Typ in der ſo artenreichen Gruppe der Zimmtroſen, zu denen auch viele neue Arten aus China gehören. Von ihnen ſeien nur genannt R. bella, R. caudata, R. Davidii, R. Moyesii, R. saturata, R. setipoda und R. Willmottiae. Die erſte, die ihren Namen mit recht trägt, ſcheint in Mitteleuropa immer noch unbekannt zu ſein. Sie hat roſafarbene Blüten und ſteht R. Moyesii nahe, beſitzt aber, ſoweit ich mich vom Arnold Arboretum her erinnere, nicht deren ſo ſparrigen Wuchs, freilich auch nicht deren wunderbaren Blütenton. Über R. Moyesii hat Wilſon ebenfalls im letzten Jahre berichtet. Ihr Hauptwert dürfte in den von ihr ſtammenden Hybriden liegen, von denen eine der beſten mir bisher bekannten R. pruhoniciana iſt, die bereits im Aprilheft erwähnt wurde. Sie verbindet die Eigenart der R. Moyesii mit den Vorzügen der R. Willmottiae, auf die immer von neuem verwieſen werden muß. Eine weitere Chineſin, die nach Wilſon in Amerika bereits ſehr geſchätzt wird, bei uns aber noch unbekannt iſt, R. setipoda, lernte ich ebenfalls im Arnold Arboretum kennen und lieben. Alle dieſe chineſiſchen Wildarten werden ſehr bald noch eine Unmenge von Hybriden liefern, die vielfach noch ſchöner und für die Gärten und Parks wertvoller ſein dürften, als die Elternformen.

Zur Gruppe der Zimmtroſen gehört auch die mittelaſiatiſche *R. Beggeriana,* deren letzte Blüten und erſte Früchte das Bild zeigt. Die Blüten ſind weiß und bedecken in Fülle die dichten Sträucher mit ihrem zierlichen blaugrünen Blattwerk.

Rosa Beggeriana

Rosa lutea

Einer wichtigen Roſe müſſen wir nun gedenken. Der Kapuziner-Roſe *R. lutea* oder *foetida*, wie ſie jetzt genannt wird. Sie ſtammt aus Weſtaſien und iſt dort in verſchiedenen Formen eine alte Kulturroſe. Unter dieſen Formen iſt die Fuchsroſe, R. foetida var. bicolor (R. lutea var. punicea) mit ihren innen grell ziegelroten Blumen ſehr auffällig. Die Stammform zeigt unſer Bild. Ihre im Juni erſcheinenden Blüten ſind lebhaft gelb und duften ziemlich angenehm. In Perſien iſt nun ſeit alters eine leicht gefüllte Form in den Gärten, die jetzt var. persiana heißt, aber unter dem Namen Perſian Yellow ſehr verbreitet iſt. Sie iſt die Stammutter der Lutea-Hybriden oder Pernetroſen. Im Juni blüht auch die große Gruppe der Hundsroſen, Caninae. Sie ſind für uns die echten Wildroſentypen von hohem Reiz, aber allzu großer Vergänglichkeit. Das eigentliche Heideröslein findet man kaum im Garten und ſelten im Park. Mit ſeinen Verwandten, der Heckenroſe, R. dumetorum, der Apfelroſe, R. villosa (R. pomifera) und anderen hat es eine ſchier unerſchöpfliche Formenfülle ergeben. Welch blütenreiche Blendlinge und Formen bei den Caninae ſich da einſtellen können, lehrte im Botaniſchen Garten zu Nymphenburg beiſpielsweiſe die dort als *R. glauca × rubiginosa forma Dingleri* geführte, hier im Bilde gezeigte Form. Sie ſtammt aus dem Aſchaffenburger Forſtgarten, iſt ungemein ſtarkwüchſig mit elegant überhängenden Zweigen. An jüngeren Trieben erſcheinen die lebhaft roſaroten Blüten in noch überquellenderer Fülle als an den abgebildeten. Solche Formen muß man durch vegetative Vermehrung feſthalten, um unſere Parks damit zu bereichern. Für den Garten werden ſie oft etwas zu ungeordnet. Man darf nicht viel an ihnen herumſchneiden. Ab und zu iſt freilich ein ſtarkes Zurückſetzen notwendig. Vor allem darf man aber auch die Ernährung nicht vernachläſſigen. Wir wollen ja im Park und Garten noch kräftigere Wirkungen erzielen, als ſie in der Natur ſich zeigen, wollen den Eindruck ſteigern, Wildroſenſchönheit zum Überſchäumen bringen. Im allgemeinen verlangt ſie nicht viel Pflege, wenn der rechte Ort gegeben wird. Man muß immer danach trachten, daß ſich gute volle Einzelpflanzen ausbilden können. Sie brauchen Licht und Luft, können nicht als Unterholz dienen. Aber in Anlehnung an große Gehölzpartien, auf Lichtungen in ſolchen, laſſe man ſie ſich hinausfühlen in die weite Raſenfläche, die blumige Wieſe. Die in dem angeführten Artikel von Wilſon gegebenen Trachtbilder können in ihrer Art vorbildlich genannt werden. So müſſen Wildroſenpflanzen und Wildroſengruppen ausſehen. Den Kampf, den ſie in der Natur zumeiſt mit anderen Gehölzen kämpfen müſſen, ihnen im Garten und Park zu erſparen, iſt unſere Pflicht. Sie immer wieder anzuregen, zu neuem Leben und Blühen zu verjüngen, darin beſteht unſere Aufgabe. Bei ſolchen Wildroſenformen, deren Früchte ſehr zierend ſind, was zumeiſt für die neuen chineſiſchen Arten und auch für die noch zu erwähnenden Amerikaner gilt, iſt ein ſtarkes Ausſchneiden oder Zurückſetzen nach der Blüte nur dann zu empfehlen, wenn eben eine durchgreifende Verjüngung ſich notwendig erweiſt. Sonſt ſchneidet man dieſe Sorten nur im Frühjahr ſoweit aus, als es zur Erzielung hübſcher Büſche wünſchenswert erſcheint. Das Kahlwerden im unteren Teile iſt nicht immer leicht zu verhindern. Teilweiſe wird man durch Zwiſchenpflanzung von geeigneten Stauden verſuchen müſſen, dieſe alten kahlen Triebe etwas zu verkleiden. Arten, die ſo ſparrig wachſen,

Rosa Dingleri

Rosa virginiana

Rosa carolina

wie leider die schöne R. Moyesii, muß man durch Vorpflanzung niedriger bleibender Formen von dichterem Wuchs abdecken. Ihre Blüten leuchten von weitem hervor. Jede einzelne Art und Form will beobachtet sein und verhält sich ja auch nach Lage und Standort etwas verschieden.
Wir haben hisher nur Formen der Alten Welt erwähnt, aber auch die Neue Welt, Nordamerika, hat uns recht brauchbare Wildrosen geschenkt. Willson hat damals davon eine Varietät der R. setigera besprochen und abgebildet. Sie bildet eine Gruppe für sich, die der Prärierosen, die zu den spätestblühenden Wildrosen gehören. Sie sind alle echte Sommerblüher, in ihrer Art sehr schätzbar.
Die Formen, die wir heute noch im Bilde zeigen wollen, gehören ebenfalls einer der Neuen Welt eigentümlichen Gruppe an, den Carolinae. Sie vertreten in Nordamerika gewissermaßen unsere Hundsrosen, blühen aber im Durchschnitt etwas später als diese. Ein Bild zeigt die als Rosa lucida bekannte Art, die aber richtig den Namen *R. virginiana* trägt. Ihre lebhaft rosenroten Blüten heben sich sehr hübsch von dem dunkeln, glänzend grünem Laub ab. Ihr Holz ist braunrot und auch im Winter ziemlich auffällig. Dann findet man oft noch die drüsig-bestachelten schön geröteten Früchte an den Zweigen. Sie wird gut 1,5 Meter hoch und treibt im Gegensatz zur folgenden kaum Ausläufer. Diese Art kennen wir als R. humilis, und sie gilt oft nur als eine Form der vorhergehenden. Ihr richtiger Name ist *R. carolina*, denn so benannte sie Linné, doch wurde später in den Gärten statt dieser die R. palustris oder pennsylvanica verbreitet. R. humilis oder carolina wird kaum über einen Meter hoch und bleibt meist sogar niedriger. Sie hat fast gerade Stacheln und treibt zahlreiche Ausläufer. Ihr Laub ist ziemlich stumpf grün, ihre fast immer einzeln stehenden Blüten erscheinen vor denen der virginiana. Beide Amerikaner sind harte, reich und schön blühende Wildrosen, die keine besonderen Ansprüche stellen, aber frischen Boden lieben.
Die schon erwähnte R. palustris liebt in der Heimat sehr feuchte, ja sumpfige Orte. Man wird aber bei uns meist gut tun, sie nicht zu naß zu pflanzen.
Die Gruppe der Carolinae enthält noch eine sehr zierliche harte Art, die infolge ihres glänzenden Laubes R. nitida heißt. Sie wird etwa 40 Centimeter hoch und in Amerika gern für niedrige breite Hecken verwendet. Auch sie blüht bis in den Juli hinein. Ihre Triebe tragen eine feine dichte rote Bestachelung.
So ließen sich noch eine ganze Anzahl brauchbare Wildrosentypen und von ihnen stammende, ganz den Wildrosencharakter tragende Kulturformen nennen. Unter den europäischen Bastarden müßte für Kulturzwecke noch eine rechte Auswahl getroffen werden. Für uns kommt es nicht darauf an, die reinen Wildarten zu ziehen, sondern solche Formen auszuwählen, die den Wildtyp ausgeprägt zeigen, dabei aber schöne buschige, reichblühende und wo möglich auch reich fruchtende Sträucher geben. Es bieten sich hier noch ungezählte Kreuzungmöglichkeiten, die aber nicht wahllos vorgenommen werden dürfen.

PAUL KACHE / BLÜTENGEHÖLZE DES JUNI

BEHERRSCHEND durch die Fülle ihres überreichen Blütenflors tritt im Juni die Gattung Philadelphus auf den Plan. Keine andere vermag ihr den Rang abzulaufen. Es ist, als ob die Masse der Blüten, die zum Teil einen fast betäubenden Duft ausströmen, etwas entschädigen wollte für den Mangel jeglicher leuchtenden Farbe. Denn nur Weiß ist es, das die Blüten kleidet. Die ungemeine Veränderlichkeit der Gattung gibt uns eine große Anzahl natürlicher Arten, Formen und Bastarde und gleichfalls Gartenhybriden. Ihre Zahl ist so groß, daß die Wahl schwer wird. Auch die Erkennungsmerkmale sind hier schwach ausgebildet, sodaß das Kennenlernen der verschiedenen Vertreter nicht ganz einfach ist. Dem Äußeren nach wäre insofern eine gewisse Trennung erkennbar, als fast alle Wildarten einen ziemlich starken, ja hochgehenden Wuchs besitzen, während die Gartenzüchtungen eigentlich durchweg gedrungener, niedriger bleiben. An Reichblütigkeit und Schönheit der einzelnen Blüten haben sie aber fast noch gewonnen. Des sehr starken Wuchses wegen sind die natürlichen Arten und Bastarde für größere Gärten und Parks vorzuziehen. Ein charakteristischer Vertreter ist *Philadelphus latifolius*, ein annähernd 5 Meter hoher Strauch. Der Wuchs wird leicht allzu straff, wenn jahrelang der Auslichtungsschnitt fehlt. Wird dieser mehr betätigt, dann gibt es 1 bis 2 Meter lange Jahresschosse, die sich im nächsten Jahre unter der Last der Blütenmassen bogig überneigen. Dadurch erhalten selbst alte, hohe Sträucher ein leichtes, gefälliges Äußere. Das Bild bleibt dann im Gesamteindruck ziemlich gleich, auch wenn verschiedene Arten in Frage kommen. Das nähere Hinschauen zeigt schon eher den Unterschied. Recht ähnlich ist Ph. grandiflorus floribundus, der verhältnismäßig früh, oft schon Ende Mai erblüht. Der Wuchs ist mäßiger stark, doch ist die große Blütenmasse auffallend. Auch Ph. inodorus mit der var. grandiflorus sind reichstblütige Vertreter dieser Gruppe, doch schwächer im Wuchs. Recht starkwüchsig ist dagegen der schöne, meist etwas spät blühende Ph. insignis, mit langen Rispen recht großer, milchweißer Blüten. Ich schätze ihn sehr. Ein besonderes Bild bietet dann noch Ph. Falconeri, von mittelstarkem, etwas breitgehendem Wuchs. Die schlanken Triebe bringen einen reichen Flor auffallend geformter Blüten, deren Blütenblättchen zugespitzt sind. Die Blüte erhält dadurch eine gewisse Sternform. Die schneeweißen Blüten besitzen einen feinen Duft.
Aus der Reihe der Gartenzüchtungen ist die Sorte Voie lactée wohl die wichtigste der einfach blühenden. Sie ist starkwüchsig, doch gedrungen und nur allmählich mehr als zwei Meter Höhe erreichend. Die sehr stoffesten Blüten sind schalenförmig und sehr groß, fast sechs Centimeter breit, doch gibt es einzelne, die noch darüber hinausgehen.

Philadelphus latifolus

Der Strauch bringt die Blüten in langer Folge. Ein Gegenſtück hierzu mit gefüllten Blüten iſt Virginal. Der Strauch iſt wohl recht wüchſig, geht aber auch nur langſam an 2 Meter Höhe heran. Seine Blühwilligkeit iſt außerordentlich groß. Die ſehr große Einzelblüte iſt dicht gefüllt. Es iſt ein hervorragender Blütenſtrauch. Weitere mit gefüllten Blüten wären Mer de glace, Rosace und auch Bouquet blanc. Erſtere beide beſitzen ſehr große, locker gefüllte Blüten, letztere nur mittelgroße, ziemlich dicht gefüllte. Die letzte blüht faſt reicher als die beiden vorher genannten. Von den einfachblühenden Züchtungen ſeien vor allem noch die übervoll blühende Avalanche, dann auch Garbe de neige und Pavillon blanc erwähnt, die ſämtlich hervorragende Maſſenblüher ſind. Ihr Wuchs iſt mäßig ſtark. Nur ein dauerndes Auslichten zwecks Erzwingung eines regelmäßigen Jungtriebes vermag aus allen Philadelphus die höchſte Leiſtung herauszuholen.

Auch die dem Philadelphus naheſtehende Gattung Deutzia iſt als Juniblüher anzuſprechen, obwohl ihre früheſten Vertreter, wie die Gruppe um gracilis, ſchon von Mitte Mai an in Blüte kommen. Ebenfalls ſchon im Mai beginnt die Gruppe der D. discolor mit ihrem feinen, reichen, hellfarbigen Blütenflor. Beide Gruppen blühen aber weit in den Juni hinein. Dasſelbe iſt auch von D. Lemoinei mit ihrem Anhang zu ſagen. Es ſind alles Blütenſträucher kleineren Ausmaßes, erſtere beiden Gruppen etwa meterhoch, die letzte bis mannshoch werdend, alle aber von ſchier unbändiger Blühwilligkeit. Echte Juniblüher ſind dagegen alle Vertreter von Deutzia crenata, wie die reinweiße, dicht gefüllte Pride of Rochester, die ähnliche candidissima, die wie die vorige reinweiße, dicht gefüllte Blütenröschen in Unmengen bringt. In rötlichen Tönungen zeigt ſich purpurata, auch rosea plena. Alle dieſe crenata-Formen ſind recht ſtarkwüchſig, bilden Büſche von 2 Metern Höhe und auch mehr. Sie ſind völlig hart, ihres ſpäten Flores wegen werden auch die Blüten von Spätfröſten verſchont. Von anderen Arten ſei noch die D. Sieboldiana genannt. Es iſt ein langſam wüchſiger, etwa mannshoch werdender Strauch von großer Blühwilligkeit. Die weißen Blütchen bedecken förmlich den Strauch und ſind auch von guter Dauer. Recht intereſſant iſt ferner D. longifolia, die recht wüchſig und ſehr blütenreich iſt. Ihre Blütenfärbung iſt etwas variabel, da ſolche reinweißer und mehr oder weniger rötlicher Färbung auftreten. Sie iſt bis heute allerdings noch recht wenig bekannt. Einiges ſei noch zur Pflege der Deutzien geſagt. Obwohl ſie für unſere Gärten als völlig winterhart gelten müſſen, ſpielt uns der Spätfroſt doch manchmal einen Streich. Der junge Austrieb, auch die Knoſpen ſind recht weich, froſtempfindlich und werden von Spätfröſten oftmals zerſtört oder doch beſchädigt. Es iſt daher notwendig, den Sträuchern einen Standort zu geben, an dem ſie vor allen Dingen gegen ſcharfen Wind und Zug geſchützt ſind. Das gilt für die ziemlich früh erblühenden Gruppen ganz beſonders. Dann bedenke man, daß nur junges Holz imſtande iſt, den reichſten Blütenflor zu bringen. Es iſt dauernd die Wegnahme des mehr als zwei- bis dreijährigen Holzes erforderlich.

Einige baumartige Blüher treten im Juni gleichfalls auf. Sie ſind beſonders für größere Gärten von Wichtigkeit. Ein ganz ſelten zu findender, baumartiger Juniblüher iſt das Gelbholz, Cladrastis lutea. Es wird bei uns ſechs bis acht Meter hoch, wahrſcheinlich aber auch bedeutend höher und iſt ſchon durch das große Fiederblatt auffallend. Im Juni ſchmückt ſich der Baum mit zahlloſen, ſcharf hängenden, reinweißen Blütentrauben von 30 bis 40 Centimeter Länge. Er iſt dann eine wundervolle Erſcheinung. Warum man dieſes ſo dankbare und völlig harte Blütengehölz ſo ſehr ſelten nur ſieht, bleibt ein Rätſel. Es kommt noch hinzu, daß ſeine Belaubung eine blendendgelbe, weithin leuchtende Herbſtfärbung annimmt.

Auch aus der Reihe der Robinien gibt es einige ſehr gute Blüher. Eigentlich ſchon gut bekannt iſt Robinia hispida, die gewöhnlich als kleines Bäumchen auftritt und im Juni eine Fülle roſaroter Blütentrauben bringt. In dankbarer Tatkraft bringt ſie auch ſpäter noch eine recht gute Nachblüte. Ein vorzüglicher Blütenbaum iſt die im Bilde gezeigte R. Pseudacacia Rozynskyana, die ſchon durch die lange, hängende Belaubung hervortritt, im Schmucke der zahlloſen Blütentrauben aber erſt ihre wahre Schönheit zeigt. Auch R. Ps. semperflorens ſollte mehr in großen Gärten aufgenommen werden. Ihre reiche Juniblüte wird in geringerer Menge faſt während des ganzen Sommer fortgeſetzt. Noch ſei der R. luxurians,

Robinia pseudacacia Rozynskyana

bekannter als R. neomexicana gedacht, die gleichfalls im Juni einen Maſſenflor, aber von heller Roſafärbung bringt und im Verlauf des Sommers eine ſehr gute Nachblüte. Auch dieſe und noch manch andere Robinie ſollte als Blütengehölz mehr gewürdigt und in unſeren Gärten verwendet werden.

Einen baumartigen Charakter beſitzt ſchließlich noch Syringa japonica, die im Verlauf des Juni einen ſehr reichen Flor milchweißer Blüten bringt. Der Wuchs dieſer Art drängt mehr zum kleinen Baum, als zum Strauch, wenn auch nur allmählich die Baumform erreicht wird. Die große dunkelgrüne Belaubung gibt ihm ein ſchönes Kleid. Es iſt auffallend, daß die großen Blütenriſpen mehr breit als hoch gebaut ſind. In manchen Jahren bedecken ſie die Baumkrone völlig, ſo daß die Belaubung faſt verſchwindet. Ähnliches iſt von der gleichfalls hoch und ſtark wachſenden S. pekinensis zu ſagen, die gleichfalls ein überaus dankbarer Juniblüher iſt, aber noch viel ſeltener zu ſehen iſt als die vorgenannte. Sie bewahrt mehr den Charakter des baumartigen Strauches, hat etwas ſchmalere, lang zugeſpitzte Belaubung und faſt doldig breite, flach gelagerte Blütenriſpen von gelblich weißer Färbung. Sie iſt eines unſer wertvollſten Blütengehölze. Ebenſo wenig bekannt, weil aber erſt ſeit kurzer Zeit in Kultur, iſt Syringa reflexa, ein 3 Meter hoher und auch höherer Strauch. Er iſt recht raſch in Wuchs, beſitzt eine große, derbe Belaubung von länglicher Form. Die gegen Ende Mai erblühenden Blütenriſpen ſtellen unter den Syringa-Arten einen ganz abweichenden Typ dar. Sie ſind lang, recht ſchlank und bogig überhängend, ſodaß die blühende Pflanze zunächſt garnicht wie ein Flieder wirkt. Ihre Färbung iſt ein helles Karminrot, weißlich getuſcht. Mit dieſem weit in den Juni hinein blühenden Flieder ſollte man öfter einen Verſuch machen; er wird recht bald viele Freunde finden.

Hauptfront des Hauses

EIN KALIFORNISCHES GARTENPARADIES

Die Gartenanlagen von Henry E. Huntingdon in San Marino in Südkalifornien, die wir bereits beim Verpflanzen großer Kakteen erwähnten, wurden von einem Deutschen, William Hertrich, geschaffen, der so freundlich war, uns Bilder davon zur Verfügung zu stellen. Die Erläuterung zu diesen Bildern geben wir im wesentlichen nach einem Bericht von Henry O'Melveny. Das Ganze zeigt, was in diesem glücklichen Klima und mit den reichen zur Verfügung stehenden Mitteln mit Liebe und Sorgfalt geschaffen werden kann.

DIE Lage ist von Natur wundervoll. Als der Besitzer den Grund erwarb, fand er ein parkartiges Hinterland von Wäldern immergrüner Eichen vor, an seiner Ostgrenze eine sanfte Schlucht, ebenfalls mit jüngerem Eichenwuchs bestanden; im Süden das breite Tal von San Gabriel und im Norden und Osten das mächtige Gebirge, die Sierras, gleich drohenden Wächtern sein Paradies bewachend. Welche Vorbedingungen für einen Gartengestalter! Fast schien es nur nötig, die Gewalt der Natur ein wenig zu dämpfen, sie nicht durch neue Zutaten zu bereichern. Es war kein Wunder, daß Henry E. Huntingdon unter seinen vielen Besitzen, wo er sich ein Heim hätte schaffen können, gerade diese Gründe wählte, damit sein Haus hier stehen und seine reichen Sammlungen hier eine Stätte finden sollten.

Um diese Zeit gerade machte er die Bekanntschaft W. Hertrichs, und in diesem erfahrenen Fachmann und Künstler fand er den rechten Mann, der seine Absichten verwirklichen konnte. Vor beiden lag nun die Leinwand, auf die sie die Gartenbilder malen sollten. Wie ganz anders verhält es sich aber mit einem Maler, der mit Pinsel und Palette sein Bild schafft, als mit einem Gartengestalter, der das, was er schaffen soll, lebendig vor sich sehen muß. Er weiß, daß es zehn bis zwanzig Jahre dauern wird, ehe sein

Haupteingang mit Palmen und Eucalypten

Südfront mit einer Gruppe alter Cycas

Rosengarten

Bild fertig ist und daß im Anfang das ungeschulte Auge kaum etwas davon sehen wird, wie das Ganze später ausschauen soll.
Der Maler arbeitet mit toten Farben, der Gartengestalter mit den Elementen der Natur und mit dem lebenden, sich stets wandelnden Werkstoff.
An der Hand der Bilder wollen wir einen schnellen Gang durch die großzügigen Anlagen unternehmen. Die ersten Pflanzungen erfolgten im Jahre 1904, und dann wurden bis 1907 weitere ausgeführt, doch waren damals die Baupläne des Besitzers noch nicht ganz entschieden, sodaß in den ersten Jahren vor allem das Hintergrundpflanzen stattfand, der Rahmen für das Bild geschaffen wurde.
Wenn wir den *Haupteingang* mit seinem geschmackvollen Eisentor passiert haben, so führt uns ein aufs sauberste gehaltener Fahrweg in sanfter Steigung zum Schloß. Dieser Weg ist beiderseits von Palmenreihen, Cocos plumosa, begleitet, und stellenweise überschatten ihn mächtige Eucalypten. Am Hause kommen wir zunächst in einen Hof, den eine üppige, fast tropische Pflanzenpracht erfüllt und dessen Mittelpunkt ein alter italienischer Vogelbrunnen aus Marmor einnimmt. In diesem Hofe hat Hertrich durch ein von oben wirkendes Sprengsystem die Trockenheit der örtlichen Atmosphäre überwunden, und den verwendeten Pflanzen, unter denen sich Cycadeen und Palmen befinden, ihre natürlichen Bedingungen geschaffen. Es herrscht in diesem Patio Kühle und Schatten, sodaß er eine willkommene Zuflucht bildet in heißen sonnigen Sommertagen. Östlich schließt sich an den Hof ein Felsengarten an, wie er hier in Kalifornien so schwer zu schaffen ist. Ihn durchschreitend kommt man zur Terrasse, die der *Südfront* des Hauses vorgelagert ist. Hier setzt uns eine Gruppe alter Cycas in Erstaunen, die von einem alten buddhistischen Tempel in Japan stammen und über 500 Jahre alt sein sollen. In ihrer Nähe stehen einige Bronzewerke des großen französischen Bildhauers Houzeau aus dem Ende des 17. Jahrhunderts.
Das *Schloß* ist in klassischen Formen gehalten. Auch hier tritt uns ein ungewöhnlicher Werkstoff in den Pyramiden entgegen, die links auf dem Bilde sichtbar sind. Es sind geformte Eugenia australis oder myrtifolia, Myrtengewächse, die in Kalifornien gern als Heckenpflanzen verwendet werden. Südlich vom Haus liegt der Wassergarten, der durch eine natürliche Quelle gespeist wird, deren Wasser aus einem italienischen Marmorwandbrunnen springt, der buchstäblich aus dem Tiber gefischt wurde. Hier herrschen Lotosblumen und Seerosen aller Art, zwischen denen sich schwarze Schwäne und anderes seltnes Wassergeflügel tummeln. Westlich vom Wassergarten kommen wir zum *Rosengarten* mit seiner verschwenderischen Blütenfülle. Welch glückliche Zone, in der die Rosenschönheit der ganzen Welt sich vereinen läßt. Gartenflächen für Stauden und Einjahrsblumen schließen sich an, um den großen Blumenbedarf des Hauses zu decken.
Wenn wir jetzt zur Nordseite des Hauses kommen, so eröffnet sich eine großartige *Sicht*. Über eine schöne, hier schwer zu unterhaltende Rasenfläche schweift der Blick in die Ferne zu einer alten Fontäne aus dem 15. Jahrhundert. Den Rahmen für das Bild geben im Vordergrund alte Lebenseichen, Quercus agrifolia, und rechts und links erheben sich wieder hohe Cocos plumosa, hinter denen echte Akazien in großer Artenauswahl stehen. Zwischen die Palmen schalten sich unaufdringlich Marmorbüsten klassischer Heroen aus Griechenland und Rom ein. Was das Bild leider nicht zeigen kann, sind die Berge der Sierra im Hintergrunde, die die Krönung dieser herrlichen Aussicht bilden.
Doch damit sind die Hauptsehenswürdigkeiten dieser wechselreichen Anlagen noch nicht erschöpft. Von dem *Wüstengarten* war schon die Rede (Seite 51). Wie ganz anders wirken hier die Kakteen und Sukkulenten als in unseren Glashäusern. Sie treten uns in gleich stolzer Größe entgegen wie in ihrer Wüstenheimat, in Arizona und Mexiko, aus der sie Hertrich direkt herbeiholte. Die Säulen der Cereus-Arten, von denen einige Arten breite verzweigte Büsche bilden, wetteifern mit den massigen Kugeln verschiedener Echinocactus und Mamillaria. Dazwischen stehen Agaven und Aloë, Yucca, Dasylirion und Fourcroya, welch letzte zur Blütezeit ihre mächtigen und doch so eleganten Blütenstände hoch in die Luft schleudern. Hier ist es Hertrich gelungen, uns die wahre Schönheit dieser Wüstenpflanzen nachdrücklich vor Augen zu führen. Der Garten soll jetzt an die 14000 Kakteen und Sukkulenten umfassen.
Ein weiteres Hauptstück der Anlagen von San Marino bildet der sogenannte *Japanische Garten*. Er gilt als der größte und beste japanische Garten, den es in den Vereinigten Staaten gibt. Nicht mit Unrecht scheint mir, sagt H. O'Melveny in seiner kurzen Schilderung, daß der

Durchblick auf die Nordſeite des Hauſes

Schöpfer »has out-Japanesed the Japanese«. Soweit ſich ſolch Garten nach den vorliegenden Bildern beurteilen läßt, iſt er ebenſo, wie alle derartigen Anlagen, die von Europäern gemacht wurden, durch die Brille weſtlichen Empfindens geſehen. Auch hier hat ſich der Schöpfer an Äußerlichkeiten halten müſſen und den ſeeliſchen Gehalt des öſtlichen Gartens nicht wiedergeben können. Wir Europäer können einmal dieſe aſiatiſche Gartenkunſt nicht wirklich nachempfinden und mithin auch nicht richtig in unſeren Anlagen wiedergeben, genau ſo wenig wie ein europäiſcher Maler ein japaniſches Bild malen kann. Das hindert aber nicht, daß auch ſolche Verſuche im Garten ſehr reizvolle Einzelheiten bieten können. Vielleicht liegt aber der größte Reiz der Huntingdonſchen Anlagen in den Teilen, in denen der natürliche Landſchaftscharakter ſtark mitſpricht. Dieſer Charakter, der ſo eigenartig, ſo ganz anders iſt als das, was wir etwa in Mitteleuropa und den nördlichen Teilen der Vereinigten Staaten gewohnt ſind.

Der ſchon eingangs erwähnte natürliche Terraineinſchnitt oder Canyon, wie man ſolch Tal drüben nennt, iſt durch eine breite aufs beſte angelegte *Fahrſtraße* erſchloſſen, die uns beſonders im Frühling durch eine wundervoll lebendige Naturscenerie führt, deren ſtarkes Leben durch des Menſchen Hand noch bereichert worden iſt. Lianengleich ſchlingen ſich hier die japaniſchen Wiſtarien durch das Gehölz. Aſiatiſche Azaleen flammen auf in roten, lachsfarbenen und in orangenen Tönen. Camellien und Kirſchen tragen den Zauber oſtaſiatiſcher Gartenwelt hinein, der durch die japaniſchen Ahorne verſtärkt wird, deren reiche Farbenpracht den vollen Frühling kündet. All dies belebt die Landſchaft unter dem ſchweren Grün der immergrünen Eichen, zu denen ſich ſo viele andere in Kalifornien heimiſche Gewächſe geſellen, die wir höchſtens aus den Gärten der Riviera kennen. So bilden dieſe landſchaftlichen Szenerien, die hinüberleiten in unberührte Natur, einen ebenſo lebhaften wie wohltuenden Gegenſatz zu den formalen Anlagen ums Haus, die wir zuerſt kennen lernten. Beſitzer und Geſtalter haben ſich weiſe gehütet, das vorhandene Schöne

Wüſtengarten mit Kakteen und Sukkulenten

Fahrstraße durch den Canyon

zu beeinträchtigen oder gar zu zerstören. Nur soweit der Einfluß des Hauses reicht, haben sie das Menschenwerk auch im Garten deutlich hervortreten lassen. Im Park aber herrscht schon die Natur, wohl bereichert, aber nicht vergewaltigt, bis sie dann voll in ihre Rechte tritt und unmerklich die alleinige Herrscherin wird. In ihr selbst dominieren die gewaltigen Höhenzüge der Sierras. Sie schirmen das Paradies, das Menschenhand im innigen Anschluß an die Natur hier geschaffen hat und noch weiter auszubauen bestrebt ist. Die größten Schätze von Menschenhand birgt das Schloß. Hier hat der Besitzer hervorragende Gemälde zu einer einzigartigen Sammlung vereinigt. Berühmt ist außerdem die Bibliothek, die aus aller Herren Länder zusammengebracht wurde. Was man aber immer zum Preise der Gemälde oder zum Preise der Weisheit der Bücher sagen mag, ich glaube, so schließt H. O'Melveny seine Schilderung, daß es außerhalb des Hauses Bilder gibt, die schöner sind als die drinnen, und daß in der einfachsten Pflanze, die draußen wächst, so manches sich offenbart, was über all die Weisheit der Bücher in der Bibliothek hinausgeht. Keines Malers Pinsel hat je erreicht der Natur eigene Malerei oder die Röte der königlichen Rose, die Flamme der Azalee noch die Töne der Morgendämmerung oder des Sonnenuntergangs, noch den perlgrauen Seidenflor über den Bergen, noch kann eines Menschen Malerei die aus der Atmosphäre strömende Erheiterung vermitteln. Und kein Buch kann uns lehren, wie und warum es kommt, daß von zwei Mohnsamen vollkommener Gleichheit in der äußeren Erscheinung der eine reinweiße und der andere tiefrote Blüten bringen wird, noch weshalb und wie es zugeht, daß die Eichel, die wir in den feuchten Grund betten, unter der zeugenden Sonne ihre Schale sprengt und einen Trieb nach unten, den andern nach oben sendet, damit der eine der Wurzelanker werde und der andere der Stamm, der die Äste trägt, darin die Vögel Heim und Schutz finden. Welch andere Gartenwelt umschließen doch diese Gefilde! Was kann der Gartenkünstler hier noch alles leisten, namentlich wenn ihm solche Mittel zu Gebote stehen. Eine solche Schöpfung ist Ansporn dazu. *C. S.*

Garten im japanischen Stil

A. J. VAN LAREN / PFLANZEN UND GÄRTEN IN ALGERIEN II

WO die Kultur eindringt, da gibt es auch Pflanzenkultur, selbst in der Wüste! Die wichtigste Kulturpflanze der Sahara ist die Dattelpalme, die in Oasen von Heimischen und Europäern angepflanzt wird, sodaß sich eine Art von Gartenbau bildet. Denn die Dattelpalme ist absolut abhängig von der menschlichen Pflege; ohne diese würde die Pflanze sehr bald aus der Wüste verschwunden sein. Bei guter Wässerung aber wächst sie gesund und kräftig, und auch andere Pflanzen gedeihen unter ähnlichen günstigen Verhältnissen. Das überzeugendste Beispiel dafür ist der »Jardin Landon« in Biskra, ein üppiger Palmengarten, errichtet von Graf Landon de Longeville. Dieser Garten dient als Ort der Handlung in dem Buch von Robert Higgens »The Garden of Allah«. Wenn man ermüdet aus der Wüste zurückgekehrt ist und aus der heißen Sonne in den blattreichen Garten kommt, erscheint er einem mit seiner überraschenden Menge schönster Pflanzen ein Paradies. Es ist ein grüner, schattiger Garten, dicht gefüllt von schönbelaubten Ficus- und Palmenbäumen, Bambusen und dergleichen. Aber das Pflanzensortiment ist beschränkt. Stets sieht man die gleichen Pflanzenarten, immer üppig und in voller Blätterpracht. Blumen sind auffallend selten; nur die glühend purpurnen Rispen von Bougainvillea, die prächtigen, großen, roten, weit geöffneten Blumen des Hibiscus Rosa-sinensis und die gelben Blüten einer Anzahl von Mimosa- und Acacia-Arten brechen die grüne Einförmigkeit der tropischen Vegetation. Auch Adhatoda Vasica war in Blüte, ein Strauch mit festen grünen Blütenähren und weißen, lippenförmigen Blumen. Von den Palmen nenne ich, außer hohen Dattelpalmen, die Phoenix canariensis und P. tenuis mit plumpen Stämmen, die als mächtige Wächter entlang der Fußwege ausgepflanzt standen; auch hohe Fächerpalmen breiteten ihre gefalteten Blätter aus, wie Livistona chinensis. Die immergrünen Laubhölzer waren vertreten durch Ficus-Arten, wie Ficus religiosa, gekennzeichnet durch die langen Regenspitzen der Blätter, F. macrophylla mit hohen Bretterwurzeln am Boden, F. benjamina mit kleinen Blättern. Ferner hohe Casuarinen und breitkronige Johannisbrotbäume, während der Unterwuchs meistens aus jungen Livistona-Palmen bestand. Alles sieht gut gepflegt aus, die Pflanzen sind planmäßig angeordnet, so daß man sich in einem Gewächshaus wähnen konnte.

Neben dem »Jardin Landon«, gibt es andere Gärten, bei Landhäusern und Hotels, aber diese sind meist nicht von großer Bedeutung; immer wieder sind es die Phoenix-Palmen, die mit Citronen, Orangen und Bougainvilleen den wichtigsten Pflanzenschmuck darstellen. Möglich ist natürlich, daß hin und wieder Privatgärten vorkommen, in denen mehr Blumen kultiviert werden; aber ich habe solche Gärten nicht entdecken können. Wohl besuchte ich einen anscheinend öffentlichen Garten; er war nur klein und wenig charakteristisch. Es blühten einige Orangenbäume und Obstbäume, schlanke Dattelpalmen wuchsen empor, während die purpurnen Blüten der Bougainvillea auch hier den Hauptblumenschmuck bildeten. Es war ein kleiner Teich mit Springbrunnen da, in denen einige Richardien, unter dem Dach von Ficuskronen, einen schweren Kampf ums Dasein zu führen hatten. Die Anlage war sehr einfach aus rechteckigen Beeten hergestellt, auf denen Chrysanthemen, Rosensträucher und Tropaeolum majus standen, mehr in der Art eines vernachlässigten gärtnerischen Betriebes.

Wir haben gesehen, wie ausgiebig die ausländischen Gewächse in den Gärten und Parkanlagen Algeriens vertreten sind und wie wenig die einheimischen Arten darin verwendet werden. Und das ist in fast allen Anlagen der Fall. Dennoch besitzt die Flora Algeriens, des Küstenlandes und der Gebirge, viele Bäume, Sträucher und Kräuter, die mit Vorteil in Gärten Verwendung finden können. Wohl haben viele Arten harte, graugrüne und dunkelgrüne Blätter, wie die wilde Olive, Olea europaea var. Oleaster, die immergrüne Steineiche, Quercus Ilex, die Korkeiche, Q. Suber, und andere, die als Ziergehölze von nur geringem Wert sind; aber sehr alte Exemplare von Ölbäumen und Korkeichen mit ihren charakteristischen Stämmen und Ästen sind doch von großer, eindrucksvoller Wirkung in jeder Landschaft, und werden auch in den Gärten und Parks Schmuckwert besitzen. Der schönste, auch hier hochgeschätzte Baum, ist die grüne oder blaugrüne Atlas-Ceder, Cedrus atlantica, die so herrlich ihre breiten Äste wie schützend von sich streckt; klein oder groß, immer ist dieser Nadelbaum von schöner Wirkung. Auch der Johannisbrotbaum, Ceratonia Siliqua, dürfte als Schmuckbaum angeführt werden. In der Jugend gleicht er einigermaßen dem Mastixbaum, Pistacia Lentiscus, er kann aber zu einem schönen Baum mit breiter, dunkelgrüner Krone aufwachsen. Ernst wächst der Lorbeerbaum, Laurus nobilis, empor, bleibt aber von lebendigem und lockerem Wuchs; er kann mit anderen immergrünen Sträuchern vorteilhaft in schönen Holzpartien gruppiert werden.

Eine hervorragende Stelle nimmt auch der Oleander, Nerium Oleander, in der Flora Algeriens ein. Ihn soll man nicht verwechseln mit dem Oleander unserer Gewächshäuser, Nerium odorum, mit duftenden Blumen; der Oleander der Mittelmeerländer hat blaßrote, geruchlose Blumen. Man sieht diesen Strauch oder kleinen Baum mit seinem weidenartigem Habitus allerwegen längs der Flüsse und Bäche, in den Gebirgsschluchten, und in der Sahara in der Nähe von El Kantara und Biskra, an allen Orten, wo der Boden nur genügend Wasser enthält. Auf der Hochebene aber ist es zu trocken und der Winter zu kalt. Vor großer Wärme hat der Oleander keine Furcht, wenn nur Wasser da ist. Er ist in dürren Gegenden der getreue und zuverlässige Anzeiger von Wasser, nach ihm kann man den Lauf von Bächen und Flüssen feststellen, selbst dann, wenn das Flußbett trocken ist, die Oleander folgen als dichte, derbgrüne Sträucher von ein bis zwei Meter Höhe den Flußlauf, und ähneln auch darin den Weiden. Für den Schmuck von Teichen und Wasserpartien ist der Oleander von großem Wert und während der Blütezeit außerordentlich zierend.

Neben den erwähnten, immergrünen Bäumen gibt es eine große Menge von immergrünen kleinen Sträuchern, welche die Abhänge der Berge mit einem dunkelgrünen Kleide verzieren und für die Vegetation der Mittelmeerländer sehr charakteristisch sind. Man faßt diese Formationen unter dem Namen »Macchien« oder »Maquis« zusammen. Die meisten Arten zeichnen sich durch einen gewürzartigen Wohlgeruch aus, wie Rosmarinus officinalis mit kleinen, schmalen, harten Blättern und kleinen, blauen Blüten, die ich in Mengen als Unterholz in Kiefernwäldern sah; Lavandula Stoechas, L. multifida und L. dentata mit violetten Blütenährchen. Lavandula vera und L. Spica sind nicht einheimisch, aber in Gärten häufig vertreten; auch Salvia officinalis mit ihren schönen, blauen Blüten wird oft als Schmuckpflanze kultiviert. Erica arborea sah ich oft als Unterholz in Korkeichenwäldern, aber auch als Bestandteil der Maquis, zusammen mit Viburnum Tinus mit seinen weißen, doldigtraubigen Blüten, mehreren Cistus-Arten mit roten und weißen Blumen, Myrtus communis, Phillyreen, Mastixbäumen und Pistacia Lentiscus. Diese ist ein stark verzweigter Strauch oder dicht verästelter, kleiner Baum mit gefiederten, lederartigen Blättern, die an einer geflügelten Blattspindel befestigt sind. Es gibt noch einige verwandte Arten, wie P. atlantica und P. Terebinthus, mit im Winter abfallenden Blättern.

Also sieht eine große Menge von Ziergehölzen für Gärten zur Verfügung, doch scheint es, daß man für Schmuckzwecke die einheimischen Pflanzen, mit Ausnahme von Lavandula, Laurus oder Viburnum Tinus den ausländischen Pflanzen gegenüber zurücksetzt. Selbst die einzige einheimische Palme, Chamaerops humilis, die Zwergfächerpalme, die schnell in den Küstenländern und in den Bergen in einer Höhe von einem Fuß bis zu vier und sechs Metern wächst und sehr schmuckhaft sein kann, sieht man viel weniger verwendet als die ausländischen Palmenarten. Mehr geschätzt scheint der ebenfalls einheimische Judasbaum zu sein, Cercis Siliquastrum, der an winterkahlen Zweigen im Frühjahr seinen reizenden Blumenschmuck bringt, und eine freudige Farbe in das grüne Gehölz hineinträgt. Kleine freundliche Blütensträucher fand ich in Teucrium fruticans mit grauweißen Ästen, graugrünen Blättchen und schönen, blassblauen Blümchen, mit zierlich gebildeter und fein geäderter Lippe, und in Lithospermum fruticosum mit kriechenden, holzartigen, dünnen Ästen, und tiefdunkelblauen Blümchen; beide Pflanzen gehören zu den anziehendsten, kleinen Blütensträuchern auf den Felsen am Mittelmeer, das immergrüne Jasminum fruticans mit kleinen, gelben Blüten ist auch in unsern Gärten als Schmuckpflanze bekannt, und Lonicera implexa, eine Geisblattart mit lederartigen, verwachsenen Blättern und blaßgelben, duftenden Blumen, sowie Helianthemum-Arten schließen sich an.

Einen schönen Anblick bieten im Frühling auch die blühenden Acacia-Bäumchen am Wege und in den Gärten, aber diese sind meist australischer Herkunft. Sie besitzen große, grüne Pyllodien, und entwickeln gelbe Blüten in bürstenähnlichen Ährchen. Aber es gibt auch andere Arten, von denen die tropische Acacia horrida mit kugelförmigen Blütenköpfchen und großen, scharfen, weißen Dornen am gemeinsten ist. Die Blätter dieser Art sind gefiedert und fallen im Winter ab. Während unseres Besuches standen die Sträucher noch ganz blattlos da oder hatten kaum angefangen auszutreiben. Als Einfriedigungs- und Abwehrpflanzen wird diese Acacia in gleicher Weise wie Agaven und Opuntien benutzt. Von den Fruchtbäumen kommt der Feigenbaum

GARTENAUFGABEN / ALTE UND NEUE LÖSUNGEN

Von der Dresdener Jubiläums-Gartenbau-Ausstellung / Zwei Pläne von Gustav Allinger

Der kommende Garten

1. Sommerhaus
2. Wasserbecken
3. Brunnen mit Plastik
4. Laube
5. Alpinum
6. Schatten-Stauden
7. Niedrige und mittelhohe Blütenstauden
8. Moorbeet-Pflanzen
9. Heide
10. Plastik
11. Japanischer Ahorn
12. Kakteen und andere Sukkulenten
13. Sitzplatz mit Brunnen-Terrasse
14. Hohe Blütenstauden

IM Maiheft haben wir auf Seite 117 bereits zwei Bilder aus dem »Kommenden Garten« gezeigt. Der heute gegebene Plan wird diese so anregende Schöpfung Gustav Allingers noch besser verständlich machen. Er läßt die reiche, bei aller Unregelmäßigkeit doch harmonische Gliederung der Anlage erkennen. Es ist ein Garten voll Lebendigkeit und von einem überraschenden Reichtum an Motiven. Ihm haftet nichts an von der kalten Steifheit vieler strenggeformter Gärten unserer Zeit, in denen sich nur eine rein formale Begabung des Gestalters ausspricht. Allinger hat geschickt jede Langeweile vermieden und doch durch einige wirksame Linien die nötige Gliederung gegeben. — Anders wieder ist der »Garten der Rosenfreundin«, dessen Grundriß wir ebenfalls heute geben. Hier schließt sich dem regelmäßig aufgeteilten eigentlichen Rosengarten ein kleines Stück an, das an den eben gezeigten Garten gemahnt und ein erhöhter Sitz- und Spielplatz, der trefflich einkomponiert ist. Von ihm aus können wir das Leben im Garten in Muße belauschen. Einige Plastiken erhöhen die Stimmungsreize. *C. S.*

Der Garten der Rosenfreundin

A Buchsbaum-Einfassung
B Einjahrsblumen
C Fuchsien
D Ilex-Büsche
E Niedrige Rosen
F Polyantha-Rosen
G Hochstämmige Rosen
H Douglas-Tannen
J Taxus und Juniperus
K Rhododendron
L Erica carnea
M Oleander in Kübeln

wildwachsend vor und wird zusammen mit Granaten, Mandeln, Citronen und Orangen häufig kultiviert, auch in den Oasen in der Wüste. Den Feigenbaum sieht man überall, bis hoch in die Berge, wo er dann strauchartig bleibt.

Und wie steht es nun mit Kräutern, den einjährigen sowohl wie perennierenden? Wie bei uns werden viele ausländische Blumen in den Gärten gezogen, aber auch das Land selbst liefert viele anmutige Blütenpflanzen, wie Iris Sisyrinchium, mit kleinen, aber hübschen, klarblauen Blumen, die gern im Grasland wächst; Ringelblumen, Calendula, mit kleinen und größeren Blütenkörbchen, deren orange und gelbe Farben den Wiesen heiteren Glanz verleihen, wie beispielsweise C. arvensis. Auch Reseda alba mit ihren weißen Blumenähren ist eine anmutige Pflanze, ebenso Bellis sylvestris, ein großblumiges Gänseblümchen, Adonis microcarpa mit leuchtend roten Blümchen, und die schöne Cerinthe oranensis, eine einjährige Pflanze mit blassgelben Blumen, die zwischen violetten Vorblättchen hervorbrechen. Und an allen Orten, am Wege und im Felde, funkeln die große, gelben Blüten von Oxalis cernua, die blauen Blümchen von Borago officinalis und die blaßroten von Fedia Cornucopiae.

Zu den schönsten Blütenstauden müssen im Frühling die Affodille, Asphodelus microcarpus und andere, gerechnet werden mit ihren glänzendweißen Blumen und ihren schlanken, verzweigten Stengeln; ferner die herrliche Ferula communis, auf hohen, kräftigen verästelten Stengeln herrliche goldene Blütendolden tragend; in jedem Garten werden diese Pflanzen von großem Schmuckwert sein, während Centranthus ruber mit seinen roten oder weißen Blumenrispen zu den anmutigsten Stauden für Blumenrabatten gehört. Einen angenehmen Anblick bietet Lavatera maritima, die ich auf Felsen in reicher Blüte fand, eine strauchartige Staude mit filzigen Blättern, die stumpfeckig und gezähnt bis gekerbt sind. Die achselständigen Blüten sind groß und von blaßroter bis weißer Farbe und kommen einzeln zur Entwicklung. Auf schattigen Plätzen können Vinca major, die zwischen dem Gestrüpp der Bergabhängen wächst, in Gemeinschaft mit Hedera, Smilax, Viburnum Tinus und Farnen in Gärten verwendet werden.

Auf den Bergabhängen in der Nähe des Meeres fand ich viele hübsche Blütenpflanzen, Echiums mit tiefblauen, aber auch Arten mit roten Blümchen, Helichrysum rupestre mit glänzend goldgelben Immortellenblüten und Arisarum vulgare mit weißer orangegelb gestreifter Spatha, die oben einwärts eingebogen ist. Strahlend goldgelb sind die Blütenkörbchen von Asteriscus maritimus, einer niedrigen Pflanze, mit spatelförmigen, etwas sukkulentenartigen Blättern, und hübsch ist das weißblühende, niedrig über den Boden wachsende Alyssum maritimum, eine auch in unseren Gärten bekannte und beliebte einjährige Pflanze. War es in den Küstenländern Alyssum maritimum, das mit seinen weißen Blümchen ganze Strecken überdeckte, auf den Feldern der Hochebene waren es andere Cruciferen die, reichfarbige Blumenfluren bildeten, wie Arabis pubescens, weißblühend, Erysimum grandiflorum mit gelben und Matthiola-Arten mit violetten Blumen; auf verlassenen Äckern fand ich Noemeria hybrida, kleine Pflänzchen mit fiederteiligen Blättchen und dunkelvioletten Blümchen.

Eine der schönsten Blattpflanzen ist Acanthus mollis, die auf Felsabhängen wächst, und Anchusa italica ist hier in ihrer Heimat mit ihren leuchtenden blauen Blüten eine der herrlichsten Wildpflanzen.

Für trockene und humusarme Stellen im Garten würde vielleicht Solenanthus lanatus, eine weißgraublättrige Wüstenpflanze, die an steinigen Orten auf der Hochebene und in den Wüstendünen wächst, hübsch sein; ihre langen, seidenfilzigen, weißgrauen Blätter mit den dunkelpurpurnen, nickenden Blümchen zwischen den weißfilzigen Vorblättchen stehen in treffendem Zusammenklang mit der steinigen, dürftigen Landschaft. Auch viele Statice-Arten mit gelben, roten und blauen Blüten kommen auf solchem Boden vor. Sie halten es aus da, aber werden in gutem Gartenboden zu schönen Blütenpflanzen auswachsen.

Eine der auffallendsten Wüstenpflanzen ist Peganum Harmala, die freudiggrüne Blätter und weiße Blümchen trägt; zwischen den meist graugrünen, niedrigen und stark bewaffneten Pflanzen der Sandwüste fällt diese zarte Pflanze bald ins Auge. Obwohl ganz wehrlos, ist diese Pflanze gegen Tierfraß vollkommen geschützt durch ihren widerlichen Geruch und wird von weidenden Tieren, auch von den Dromedaren, gemieden, die lieber die schärfsten Stachelpflanzen wie Acanthyllis tragacanthoides fressen, als diese unschuldig aussehende Pflanze zu berühren. Aber, wie interessant in botanischer Hinsicht die Wüstenpflanzen auch sein mögen, als Schmuckpflanzen für Gärten kommen wenige Arten in Betracht. Für Dekorationszwecke muß man die Pflanzen und Blumen in Küstenländern und in den Bergen, auf Feldern und in Wäldern suchen, wo die Vegetation in meist verschiedenen Formen, reich und üppig sich uns aufdrängt und unser Interesse gefesselt hält.

Aus dem Blumengarten der Literatur

Aphorismen über Natur

Auch der Baum, auch die Blume warten nicht bloß auf unsere Erkenntnis. Sie werben mit ihrer Schönheit und Weisheit aller Enden um unser Verständnis.

*

Wie können Baumwipfel wie ein Mädchen aussehen, ja mehr noch: seinen ganzen Charakter zu enthalten scheinen? Und doch ist es manchmal so.

*

Warum erfüllen uns Gräser, eine Wiese, eine Tanne, mit so reiner Lust? Weil wir da Lebendiges vor uns sehen, das nur von außen her zerstört werden kann, nicht durch sich selbst. Der Baum wird nie an gebrochenem Herzen sterben und das Gras nie seinen Verstand verlieren. Von außen droht ihnen jede mögliche Gefahr, von innen her aber sind sie gefeit. Sie fallen sich nicht selbst in den Rücken, wie der Mensch mit seinem Geist, und ersparen uns damit das wiederholte Schauspiel unseres eigenen zweideutigen Lebens.

*

Worauf beruht z. B. der Zauber des Waldes, die tiefe Beruhigung, die er dem Menschen gibt? Darauf wohl zumeist, daß uns in ihm eine unübersehbare Anzahl pflanzlicher Individuen einer bestimmten Art entgegentritt, die Lebensfrieden und Lebensmacht zugleich mit äußerster Zweckmäßigkeit vereinen. Der Stamm einer Bergfichte ist das Urbild ruhiger, in sich gefestigter Kraft; ein gewaltiger Lebenswille, den sobald nichts zu stören oder gar zu brechen vermag, offenbart sich in ihm. Ihre Äste, Zweige und Nadeln aber strahlen mit solch äußerster Zweckmäßigkeit rings von ihm aus, stellen im Verein mit dem Stamm und den Wurzeln einen so weise der Außen- und Umwelt eingepaßten Körper dar, daß man begreift: hier liegt die Lösung eines Problems vor, an der vielleicht unermeßliche Zeiten gearbeitet haben.

*

Wie mag in einem rechten Sturm ein Baum zum Gefühl seiner selbst kommen! Wie wunderbar ist eine Birke im Sturm! Wie göttlich graziös! Wie unsagbar malerisch!

*

So ein Spinnentüchlein voll Regentropfen — wer macht das nach.

Aus: Christian Morgenstern „Stufen"
(R. Pieper & Co., München)

Gartenarbeit und Blumenpflege

ALEXANDER STEFFEN / DER SPATEN UND SEIN GEBRAUCH

DER Spaten dient im Gartenbau drei Zwecken: Erſtens dem *Graben,* alſo dem Umwenden des Bodens, um ihn zu lockern, wenn er durch Waſſer und Betreten feſt wurde. Die Bodenſchichten ſollen vermiſcht werden, die obere Krume mit den unteren Schichten und mit den aufgebrachten Dungſtoffen. Unkraut und Unkrautſamen wünſchen wir dabei in die Tiefe zu befördern. Den Wurzeln der zu ſetzenden oder ſchon ſtehenden Pflanzen wollen wir ein mürbes Bett bereiten, dem Boden Luft zuführen, übermäßiger Näſſe die Möglichkeit zur Verdunſtung geben, dem fallenden Waſſer Eintritts- und Verſinkungswege öffnen und was die phyſiologiſche Wiſſenſchaft und Praxis der Erde ſonſt an liebevoller Behandlung zugedacht hat.
Zweitens dem *Rigolen.* Wir beabſichtigen mit ihm die Vertiefung der Kulturſchicht, das Verſenken von Unland und das Heraufbringen wertvoller Untergrundſchichten, das Durchbrechen feſten Untergrunds, der den Waſſerabzug hindert.
Drittens dem *Herausnehmen von Bäumen und Sträuchern* (Baumſchulſpaten).
Für alle drei Zwecke ſtellen wir andere Anforderungen, daher muß es verſchiedene Spatenſorten geben. Der Rigolſpaten unterſcheidet ſich im weſentlichen nur durch geringere Stiellänge, was damit zuſammenhängt, daß der Standort des Rigolers meiſt tiefer iſt als die Erdhöhe und daß ein Teil der Erdmaſſen gehoben werden muß. Der Baumſchulſpaten dient weniger dem Umwenden des Bodens; man gräbt mit ihm meiſt einen mehr oder weniger tiefen Graben um die Pflanze, ſticht Wurzeln durch, die angetroffen werden, und dann geht das Hebeln und Wuchten an. Das ſtellt hohe Anforderungen an das Material: Die Stiele müſſen ſtark ſein, die Eiſenteile nicht weniger und ein beſonderer Ring wird unter Umſtänden noch um Stiel und Zunge gelegt, damit die Hauptbruchſtelle geſichert wird. Der Spaten muß zum wirkungsvollen Stoßen und Hebeln ſcharf und ſchwer ſein, 6 Kilogramm iſt ein hohes Gewicht, das ſtarke Arme fordert. Ganz allgemein ſollen Spaten für ſchwere Böden entſprechend ſtärker gebaut ſein als Sandbodenſpaten. Der kürzere Rigol- (Pionier-) Spaten eignet ſich natürlich auch als Rodeſpaten; zwar hebelt der Stiel nicht ſo gut wie ein langer, dafür bricht er aber auch nicht ſo leicht. Das beſte Holz für ſchwere Spaten gibt die Eſche, für leichtere die Weißbuche. Man ſoll durchs Holz den Spaten nicht zu ſchwer machen. Für Durchſchnittsgrabearbeit auf kultiviertem Boden und für Normalfiguren halte ich Spaten von 2500 Gramm ſchon für zu ſchwer und ſolche von 2000 Gramm für ausreichend. Sandböden kommen gut mit 1800 Gramm aus.
Der *Stiel* ſei glatt ohne Knorren, die Bruchſtellen geben, die Holzfaſer muß parallel zur Stielachſe und nicht quer zu ihr (Bild 13) laufen, ſonſt darf man den Spaten nur mit Glacéhandſchuhen anfaſſen, für die im Gartenbau bekanntlich noch kein Platz gefunden wurde und die der Gartenbürokratie vorbehalten ſind. Die Stielſtärke nimmt von oben nach unten von 3 auf 5 Centimeter zu. Die Geſamtlänge beträgt 108 bis 110 Centimeter, je nach der Körpergröße und Beſtimmung. Einen richtigen Spatenſtiel herzuſtellen macht mehr Schwierigkeiten als einen Hacken- oder Rechenſtiel. Kleinſtadt- und Dorfſchmiede bauen oft gute Schärfe haltende Spaten, weil ſie das Eiſen gründlicher in Weißglut durchſchmieden als es Fabriken tun. Aber ihre Schwäche ſind die Stiele. Sie bekommen keinen guten Griff zuſtande und machen den Stiel unhandlich dadurch, daß er unten zu dick und ſchwer und oben zu dünn ausfällt.
Der Griff ſoll feſt in der Hand liegen und ſich der Handfläche bequem anpaſſen. Knopfgriffe (Bild 1) erfüllen dieſe Anſprüche nicht. Sie laſſen ſich ſchlecht halten, weil das Umklammern mit den Fingern erſchwert iſt. Die Finger müſſen ſich zu ſtark, faſt tütenförmig, nach unten umbiegen; das gibt eine ähnliche krampfartige Stellung wie bei Hühnern, welche auf zu dünner Sitzſtange ſitzen. Daß der Knopfgriff kein Aufhängen an Nägel, Riegel geſtattet, rechne ich ihm ebenfalls als Mangel an. Der T-Griff (2) findet ſich viel verbreitet, er iſt bequem, ſicher, dauerhaft. Bei 13 Centimetern Länge und 6 Centimetern Stärke liegt er gut in der Hand und ſeine Befeſtigung reicht aus, da er wenig auszuhalten hat. Immerhin bleibt er dem Griff, der aus einem Stück mit dem Stiel beſteht, unterlegen, wegen der verringerten Schadengefahr. Der D-Griff (3) hat jenen Vorzug. Vor allem halte ich ihn deswegen dem T-Griff überlegen, weil bei ihm die Finger der Hand neben einander liegen können, während beim T-Griff der Stiel ſie zur Teilung in zwei Gruppen beiderſeits von ihm nötigt. Die Geſchloſſenlage gibt ſichereren Halt. Ein Mangel kann dem D-Griff nachgeſagt werden, daß das Holz vielleicht in der Längsrichtung leichter platzt. Da aber zwei Meſſingſchrauben durch ihn hindurchgezogen ſind, kann das Platzen nur bei mißbräuchlicher Benutzung eintreten.

Das Spatenblatt

DIE meiſten von uns erinnern ſich wohl noch der alten Holzſpaten mit Eiſenbeſchlägen; es fehlte ihnen an Schärfe, genügendem Gewicht, und dann ſetzte die Erde ſich ſo leicht an ihnen feſt. Die Stahlſpaten bedeuteten großen Fortſchritt, haben aber heute noch nicht alle Mängel überwunden. Jene Modelle, bei denen die Verbindung von Stiel und Blatt durch eine Tülle ſtattfand, durch die der Stiel auf die Blattrückſeite führte, gaben ewig Bruch der Tülle und die Erde ſetzte ſich hinten feſt. Die Vereinigung von Stiel und Blatt durch Aufnieten einer Platte (3) hat den gleichen Mangel. Die Plattenränder halten Erde feſt und hindern das ganz widerſtandsloſe Hinaufgleiten des Erdſtrichs über das Blatt. Da die Befeſtigung meiſt durch Eiſen-, ſtatt durch Meſſingnieten erfolgte, führte Roſten zum Wackeln von Nieten und Platte und zur Schwächung des Blattes überhaupt, ſo daß an dieſer Stelle durchbrochene Spaten zur Tagesordnung gehören.
Daher ſtellt der aus einem Stück gefertigte Spaten, deſſen Blatt in zwei Zungen zur Stielaufnahme ausläuft, einen großen Fortſchritt dar. Zwar verbleibt auch hier in der Blattmitte ein flach anſetzender, nach oben etwas anſchwellender Wulſt zur Stielaufnahme, aber er wird kaum vermeidlich ſein. Er begünſtigt das Feſtſetzen von Erde am Blatt nur noch wenig, namentlich dann nicht, wenn keine ſogenannte Auftritt-Umbiegung an der Oberkante vorgeſehen wurde. Eine ſolche Umbiegung von ein Centimeter Breite zum Aufſetzen des Fußes bei ſchwerem Boden, um dem Eindringen des Spatens nachzuhelfen, halte ich für fehlerhaft. Die Erde ſetzt ſich feſt in keilförmig auslaufendem Streifen, der ſich ſtändig vergrößert, den Spaten ſchwer macht und ſein Eindringen erſchwert. Der Spaten kann nicht blank

gearbeitet werden, immer muß man mit einem Hölzchen die angesetzte Erde abkratzen. Hält man etwas Stiefelschonung wirklich für nötig, so mag eine gleichmäßige Verdickung des Blattes nach oben dafür genügen. Wenn im übrigen der Boden so schwer ist, daß man den Spaten ohne Fußhilfe nicht hineinbringt, so müssen eben Dünger, Torfmull heran, damit der Boden mürbe gemacht, damit aus ihm Gartenboden wird.
Eine gute Blattlänge ist 28 Centimeter, Breite 18 bis 20 Centimeter. Für schweren Boden soll man, da das Graben ohnehin Kräfte kostet, nicht die äußersten Maße wählen, für leichtere Böden sind sie zur Förderung der Leistung anzuraten. Eine leichte Biegung des Blattes nach vorn, sowie eine ganz schwache löffelartige Wölbung haben den Vorteil, daß der Stich nicht so leicht abrutscht. Für Kantenstechen macht die Wölbung den Spaten unpraktisch.
Im allgemeinen herrscht eine Spatenblattform, welche nach unten nur wenig sich verschmälert. Sie übertrifft die spitz zulaufenden Formen, die sich zwar leichter in den Boden stoßen lassen, dafür aber auf der Grabsohle Erdkegel stehen lassen (Bild 6), also nicht so gut lockern wie das breite Blatt. Das ist keine Theorie. Jeder kann sich beim Graben davon überzeugen. Noch schlechtere Arbeit leisten abgearbeitete Spaten, deren Blattlänge oft nur 12 bis 15 Centimeter beträgt. Mit ihnen läßt es sich natürlich leicht graben, aber die Tiefenleistung bleibt gering, selbst wenn das Blatt über seine Länge in die Erde gestoßen wird, wie das beim guten Graben Regel ist. Es gibt aber Arbeitsgelegenheiten für solche Spateninvaliden, wo flach gegraben werden soll, etwa in Frühbeeten oder im Sommer bei Lockerungsarbeiten zwischen Kulturpflanzen oder auch beim Herrichten von gewissen Frühjahrsbeeten, wo nur die Krume flach gelockert, aber der Wassererhaltung halber der Boden nicht aus der Tiefe geholt werden soll. *(Ein zweiter Artikel folgt.)*

C. R. JELITTO / PRIMEL-ERFAHRUNGEN II

II. Arten für Steingarten und Alpinum

VON den im folgenden besprochenen sogenannten alpinen Primeln, also den Arten, die nicht wie die früheren als normale Stauden behandelt werden können, sind fast alle europäisch, bis auf P. farinosa, die wohl die verbreitetste der ganzen Gattung ist. Sie kommt im arktischen und subarktischen Gebiet der ganzen nördlichen gemäßigten Zone vor; dann noch in den Anden Südamerikas von Chile bis Feuerland. Wir wollen auch bei den Primeln fürs Alpinum und den Steingarten die Reihenfolge nach der Blütezeit wählen. Für den Praktiker ist das am klarsten und übersichtlichsten.
Anfang April, bei günstigem Wetter manchmal schon Ende März, erscheint immer als erste alpine Primel in den Felsspalten oder auch auf kleinen Bändern im Dahlemer Alpinum die P. marginata. Der Sektion Auricula angehörig, hat sie nicht nur den Typus dieser, sondern die Anzucht und Behandlung gleicht auch vollkommen der Aurikel, ist also einfach und jedem Liebhaber mit Erfolg möglich. P. marginata hat deutlich gezähnte, grau bemehlte Blätter und prächtig lavendelblaue, breitoffene Blüten in Büscheln von 2 bis 20 Stück und ist in voller Blüte stets ein Anziehungspunkt jedes kleinen Alpinums. Es wird bei ihr jedoch unausbleiblich sein, sie hin und wieder mal umzupflanzen. Im Laufe der Zeit bildet sich bei ihr der oberirdische Stengel zu einem Stämmchen aus, das bis zu zehn Centimeter und noch darüber lang wird und bei Regenwetter mit den schweren Blüten und dem Blattschopf leicht aus dem Standort fällt, besonders wenn der Boden locker geworden ist. Sind die Pflanzen etwas lang geworden, pflanzt man sie einfach bis an die Blätter tief um. Das vertragen sie sogar sehr gut und danken es damit, daß das Stämmchen ringsum neue Wurzeln treibt und die Pflanze um so freudiger gedeiht. Der Standort ist der gleiche wie bei P. Auricula, sonnig bis halbschattig. Samen setzt P. marginata willig und genügend an, und das Beste ist stets, man sät diesen sofort nach der Reife aus. Der Samen keimt leichter und man hat bis zum Herbst schon pikierte Pflanzen. Die Heimat dieser schönen Primel sind die See- und Cottischen Alpen, auf Felsen in 800 bis 2600 Meter, vornehmlich auf Kalk. Man gebe also dem Boden reichlichen Kalkzusatz. Es ist schade, daß diese Primel allzuwenig angetroffen wird, trotz ihrer leichten Behandlung und Verwendung.
Etwas später als P. marginata kommt *P. Auricula*. Sie ist wohl mehr als Gartenaurikel bekannt, die in einem fast unübersehbaren Farbenspiel häufig als Einfassungspflanze und sonst auch für Staudenbeete Verwendung findet, was ihrem Typus jedoch widerspricht. Die kultivierten Gartenaurikeln sind hybriden Ursprungs, haben immer größere Blüten, sind auch bedeutend mastiger in ihrem Aufbau als die reine Art. Das aber kommt daher, weil sie Generationen hindurch immer auf gut vorbereitetem, nahrhaftem Kulturboden gezogen werden und somit sich zu einem von der reinen Art vollständig abweichenden, regelrechten Kulturpflanzentyp entwickelt haben. (Man vergleiche das in Band II, Seite 75 gegebene Bild). Ähnliches gilt von unseren landwirtschaftlichen und anderen gärtnerischen Kulturpflanzen, wie etwa Kartoffeln oder Pelargonien. An und für sich sind gewöhnlich Zuchtformen immer wüchsiger als die Eltern. Die reine Art der P. Auricula ist viel edler und rassiger in ihrem Aussehen, die Blätter sind größtenteils ganzrandig und bereift, ebenso die Blütenstiele und der Kelch. Die Blüten sind hellgelb, duftend und erscheinen Ende März — April. Die ganze Pflanze erreicht eine Höhe von 15 Centimeter. Obwohl P. Auricula in unseren Steingärten häufig als Felsenpflanze behandelt wird, ist sie von Natur aus absolut keine solche. Sie kommt an ihren heimatlichen Standorten, die meist sanfte Abhänge und Matten sind, mit Aster alpinus, Gentiana acaulis, Primula minima, Globularia nudicaulis, Carex firma und ähnlichen Stauden gemeinschaftlich vor, ist also mehr eine alpine Mattenpflanze. Bei uns in den Gärten wird man der reinen Art einen frischen, ein wenig humosen, aber gut durchlässigen Boden mit Zusatz von altem Kalkbauschutt geben. Die Lage soll mehr sonnig bis halbschattig sein. Ihr Verbreitungsareal sind die nördlichen und südlichen Kalkalpen und die Westkarpathen.
Kommt P. Auricula auf Kalk vor, so treffen wir *P. hirsuta* ausschließlich auf Urgestein der Pyrenäen, Zentralalpen und der südtiroler Dolomitalpen an Felsen wie Felsbändern. Hier an den natürlichen Standorten entwickeln sich die Pflanzen in den Jahren zu gewaltigen Polstern, die in der Blütezeit weithin leuchten. Auf dem Weg nach dem Schwarzsee in den Walliser Alpen fand ich an einer Wand einen ungefähr 10 bis 15 Centimeter breiten Spalt ganz ausgefüllt mit dieser hirsuta, die sich oben auf dem Band noch in mächtigen Fladen fortsetzte. Die Selbstaussaat wird an günstigen Stellen für solch eine Entwicklung natürlich ungemein viel beitragen. P. hirsuta wird ungefähr zehn Centimeter hoch, hat drüsig behaarte, gezähnte Blätter und bringt alljährlich in reicher Fülle leuchtende, rosa bis lilarote Blütenbüsche. Man gebe dieser Art den gleichen Standort und gleichen Boden wie der Auricula, und als Bodenlockerung gebe man klein zerstampftes Urgestein.
Ähnlich der P. hirsuta ist *P. viscosa* mit ungefähr derselben Verbreitungszone und unter den gleichen Bedingungen. Die Blüten sind hier violett, der Schlund und die Innenfläche der Röhre dunkler. Der Blütenstand ist einseitswendig, nickend und die Blüten sind wohlriechend. P. hirsuta und P. viscosa sind beide gleich empfehlenswert, blühen jedes Jahr sehr dankbar und sind in der Behandlung äußerst genügsam. Die Vermehrung durch Samen ist leicht.
Wer im Alpinum Enzian, Kelchgras (Tofieldia), Ranunculus alpester und den Tarant (Sweertia) hat, der sollte zu dieser Gesellschaft auch *Primula farinosa* nehmen und möglichst alle zusammenpflanzen, da sie dieselben Bedürfnisse haben, feuchte, mehr torfige oder moorige, flache Plätze, in sonniger bis halbschattiger Lage. Diese bunte Gesellschaft wird sich miteinander sehr wohl fühlen, sich gut vertragen und einer nach den andern wird in der Blüte den Platz beherrschen. Zuerst Ranunculus alpester, dann unsere P. farinosa, hinterher das Kelchgras und im Sommer bis zum Herbst herrscht als letzter der ernste Tarant. Die kleine Primel aber wird auf diesem Platz in ihrer Gesellschaft das reizendste und lieblichste Geschöpf sein. Ihre fleischfarbigen, kleinen Blütchen werden von Mai bis in den Juni hinein leuchten, und hat eine Pflanze von ihr mal einen ganz besonders guten feuchten Standort, dann können die Blattrosetten zu starken Klumpen werden, die dann einen großen Strauß Blüten bringen. Überall im Garten, wo feuchte moorige Stellen sind, sollte man dieses kleine zierliche Primelchen hinpflanzen, etwa zwischen Rhododendron hirsutum, damit die Lieblichkeit und Anmut aus allen Ecken des Gartens hervorschaut. Doch achte man darauf, daß der Boden nicht etwa für längere Zeit zu trocken wird, denn dann brennen die armen Pflänzchen in wenigen Tagen aus, und nur schwierig ist solch trockener Torf- und Moorboden wieder feucht zu bekommen.
Etwas größer und robuster als P. farinosa ist *P. frondosa* aus dem Balkan, die dort an von Schneewasser feuchten, schattigen Orten vorkommt, während P. farinosa meist sonnig zu finden ist. In der Blütenfarbe sind sich beide gleich, ebenso haben beide Arten die Blätter unterseits weißmehlig bestäubt. P. frondosa jedoch ist im ganzen doppelt so groß und

ſtark, wie farinosa. Beide kommen meiſtens auf Kalkboden vor, den man ihnen ſelbſtverſtändlich auch in der Kultur geben muß. Ein Bild von P. frondosa erſchien in Band II, Seite 74.

In die Sektion Farinosae gehört auch *P. longiflora.* Wenn ſie auch nicht ſo leicht wie die vorhergehenden in der Kultur iſt, hat ſie für einen Steingartenliebhaber dennoch Wert. Schon aus dem Grunde, weil ſie geſchloſſene, geſchützte und kühle Standorte liebt. Solch ein Plätzchen hat ein Alpinum immer, oder man kann es leicht ſchaffen. P. longiflora hat kahle, längliche Blätter und ungefähr bis 20 Centimeter hohe Blütenſtiele, die im Juni bis Juli einen Büſchel fleiſchfarbener bis roter Blüten tragen. Die einzelnen Blüten haben eine beſonders lange Kronenröhre. Sie iſt wohl unter den Primeln auch die einzige gleichgrifflige Tagſchwärmerblume. Die Anzucht iſt genau wie bei P. farinosa und P. frondosa durch Samen. Jedoch ſorge man gerade bei P. longiflora für genügende Nachzucht, da ſie gegen zu ſtarke Winterfeuchte empfindlich iſt und dann leicht ausgeht. Man decke daher dieſe Art im Winter nur leicht und locker. Das Verbreitungsgebiet geht von den Süd-, Südoſtalpen und Karpathen bis Bosnien und Bulgarien, wo ſie meiſt alpin auftritt.

Verhältnismäßig leicht in der Kultur als alpine Primel iſt *P. spectabilis,* und doch wird ſie ganz ſelten angetroffen. Jedenfalls ſcheint ſie bedeutend beſſer zu gedeihen als die ihr naheſtehenden P. Clusiana, P. glaucescens und P. Wulfeniana. P. spectabilis unterſcheidet ſich leicht von den drei andern in den durchſichtigen Punkten der Blätter, die jene nicht beſitzen; in der Blüte ſind ſie ziemlich gleich, lila bis rot. P. spectabilis iſt die höchſte, bis 60 Centimeter.

P. Clusiana iſt ein ſteter Begleiter der Carex firma und Soldanellenfluren der nördlichen Kalkalpen, hat grasgrüne Blätter, die einen ſchmalen Knorpelrand beſitzen. Die Pflanze iſt auch bedeutend niedriger als P. spectabilis. Die ſeltenſte von den dreien, *P. Wulfeniana,* hat blaugrüne Blätter und blüht am reichſten, oft herrliche rote Teppiche bildend: Sie bewohnt in der alpinen Region der Südalpen ſteinige Stellen auf den Matten, ganz ſonnig, doch äußerſt ſelten. Dieſe letzten ſteif und ſpitzblättrigen Primelarten pflanze man nicht in Felsſpalten, ſondern auf flache, höchſtens geneigte Flächen mit recht durchläſſig-ſteinigem, jedoch humoſem und kalkdurchmiſchtem Boden. Bei guter Pflege werden ſie leicht gedeihen. Die Vermehrung kann durch Samen und Teilung vorgenommen werden.

Die kleinſte unter den felsbewohnenden Primeln iſt *P. minima,* das Hab-mich-lieb des Rieſengebirges. Sie tritt in den ganzen europäiſchen Gebirgen oft herdenweiſe, in dichten Polſtern auf, und geht bis zu den Schneetälchen hinauf. In der Kultur iſt ſie leider ſehr ſchwachwüchſig und nur für den erfahrenen Liebhaber zu empfehlen, der ſie ſchon hoch oben in den Bergen in voller Blüte bewundern konnte, der ſie dort liebgewonnen hat und dem der herrliche Anblick dieſer winzigen Zwergprimel unvergeßlich blieb. In der Kultur gebe man ihr möglichſt einen recht ſandigen Humusboden, vielleicht mit hochalpinen, nicht Ausläufer treibenden Gräſern zuſammen.

Alle alpinen Primeln decke man im Winter mit Fichten oder Kiefernreiſig; auch Kiefernadeln ſind als Winterdeckung gut geeignet.

Die alpinen Primeln gehören wohl zu den ſchönſten und edelſten Pflanzen unſerer Alpenflora, zu den Kronjuwelen unſerer königlichen Berge, und es wird für den Pflanzenfreund und nicht nur für dieſen allein ein herrlicher unvergeßlicher Anblick bleiben, ſie an ſonnigen Felſen, Bändern und Matten in voller Blüte geſchaut zu haben. Darum ſollten wir ſie hegen und pflegen, ſoviel wie wir nur können.

PAUL KACHE / ROSENPFLEGE IM SOMMER II

ZUR guten Pflege der Roſen gehört auch der *Sommerſchnitt.* Er iſt unbedingt erforderlich zur Erzielung eines guten dauernden Blütenflores. Schon in der halben Entwicklung des Frühjahrstriebes muß eingegriffen werden. Ein Roſenbeet, das in voller Entwicklung ſteht, geſund und mittleren Alters iſt, bringt im Frühjahr eine ſehr reiche Anzahl Jungtriebe. Oftmals ſtehen ſie dicht zuſammen. Hier ſollte inſofern regelnd eingegriffen werden, als durch einen gewiſſen teilweiſe durchgeführten Rückſchnitt nur ein beſtimmter Teil der vorhandenen Triebe zur Blüte kommt. Iſt der Frühjahrstrieb ſoweit vor, daß er an der Knoſpenbildung ſteht, dann iſt etwa jeder dritte Trieb oder unter fünf Trieben ſind ſtets zwei um ein Drittel der Länge zurückzuſchneiden. Unter Umſtänden genügt ſchon ein Ausbrechen der Triebſpitze, ſobald es frühzeitig gemacht wird. Doch ſollten ſtets nur die ſtärkſten Triebe zurückgeſchnitten werden. Vor allem aber ſolche, die aus dem alten Holze als Verjüngungstriebe kommen, als Langſchoſſe zu bezeichnen ſind. Dieſe bringen gewöhnlich ſowieſo keine ſehr gut geformte Blüte. Dies iſt bei manchen recht ſtarkwüchſigen Sorten zu finden, beſonders bei der recht gut bekannten Ulrich Brunner. Es iſt hier beſſer, die Langſchoſſe, die zur normalen Zeit der Knoſpenbildung noch unentwegt weiter wachſen, zu entſpitzen. Dieſe wie überhaupt alle entſpitzten Triebe bringen bald einige junge Durchwüchſe, die ſchnell ſtark heranwachſen und ſpäter kräftige Blütentriebe darſtellen. Infolge des ſpäteren Durchbruchs kommen ſie auch einige Wochen ſpäter zur Knoſpenbildung und zum Erblühen. Sie ſind dann eigentlich erſt am Beginn des Erblühens, wenn die erſte Blüte, der Hauptflor, zu Ende geht. Es iſt ganz logiſch, daß durch das erwähnte teilweiſe Entſpitzen der Frühjahrstriebe ganz von ſelbſt die eigentliche Blütezeit weſentlich verlängert wird. Das iſt in ganz natürlicher Weiſe vor allem dort der Fall, wo durch eine ſehr eingehende Pflege das ganze Wachstum der Roſen mit allen Mitteln gefördert wird. An ſich bleibt es ſich gleich, ob es ſich um Büſche oder Kronenbäumchen handelt. Auch die verſchiedenen Gruppen unſerer Edelroſen können ja mit gleich gutem Erfolge bearbeitet werden, nur nicht Rankroſen.

Sehr wichtig kann das Entſpitzen der jungen Triebe überhaupt dort ſein, wo es ſich um die Bearbeitung von jungen Pflanzungen handelt. Hier iſt der Durchtrieb gewöhnlich mäßig, auch ungleich. Es macht keinen guten Eindruck, wenn die wenigen, meiſt noch ſchwächlichen Triebe das Beet bedecken. Beſſer iſt es in dieſem Falle, ein regelrechtes Entſpitzen der Jungtriebe vorzunehmen, ſobald ſie etwa 15 bis 20 Centimeter lang ſind. Das Wachstum bleibt ſo etwas ſtehen, die reſtlichen Triebenden ſtärken ſich, die Pflanze macht weiterhin ein kräftiges Wurzelwerk, und nachdem die Augen der entſpitzten Triebe ſtark genug wurden, erfolgt dann ein kräftiger, reichlicher Neutrieb, ſehr häufig aus noch ruhengebliebenen Augen. Ein Beet zeigt dann ein ganz anderes Bild. Es gibt dann faſt einen Vollflor. Es können ebenſogut Fälle vorkommen, daß eine ſpätere Roſenblüte erwünſcht iſt. Da iſt das Entſpitzen der geſamten Triebe die einzige Möglichkeit, das Ziel zu erreichen.

Werden Roſenblumen in größerer Anzahl für Vaſen gewünſcht, dann wird ein Satz beſonderer Schnittroſen aufgepflanzt. Hier iſt das teilweiſe Entſpitzen unbedingt notwendig, um ſo eine andauernde Blütenfolge zu ſchaffen. Es muß fortlaufend Tag für Tag ein Erblühen von Roſen erzielt werden. Hier wird aber ebenſo auch auf die vollendetſte Ausbildung der Einzelblüte Wert gelegt. Nicht die Maſſe, ſondern die Güte iſt ausſchlaggebend. Es wird daher ein Ausbrechen aller Nebenknoſpen erforderlich. Nur die Spitzenknoſpe kommt zum Erblühen. Alles was ſich unter ihr bildet, wird dann ausgebrochen, ſobald es zu faſſen iſt. Nur ſo iſt eine erſtklaſſige Roſenblüte zu gewinnen. Es gibt auch ſchwächere Triebe, die, ohne eine Knoſpe zu bilden, mit der Entwicklung abſchließen, ſogenannte Blindtriebe. Dieſe ſollen geſchont werden, da ſie bei gutem Stand der Pflanzen nach kurzer Zeit wieder durchtreiben und dann meiſtens eine recht gute Blüte bringen.

Nach dem Verblühen der Roſen ſetzt ſofort wieder ein Rückſchnitt ein. Jede verblühte Einzelblüte iſt ſogleich auszubrechen. Iſt der geſamte Blütenſtand verblüht, erfolgt der richtige Rückſchnitt. Es iſt dann gewöhnlich auch ſo, daß eines oder einige der ſtarken oberſten Augen im Durchtreiben oder ſchon ſtarke Jungtriebe vorhanden ſind. Der Rückſchnitt des verblühten Blütenſtandes erfolgt dann bis oberhalb des erſten jungen Triebes. Iſt ein ſolcher noch nicht vorhanden, wird in ganz ähnlicher Weiſe bis auf das oberſte gut ausgebildete Auge zurückgeſchnitten, das bald zum Durchtrieb kommt.

Dieſe Art des Rückſchnitts muß ſo ausgeführt werden, daß ſie den diesjährigen Trieb ſo gut wie möglich ſchont. Er ſoll nur die oberſten Augen zum Durchtrieb bringen, die unteren aber ruhen laſſen, da ſie für das nächſte Jahr beſtimmt ſind. An ſich iſt es ſo ziemlich gleich, ob es ſich um Buſch- oder Hochſtammroſen handelt. Sie haben ja alle denſelben Entwicklungsgang. Wird nur die ganze Triebbildung der Roſen etwas überlegend verfolgt, dann kann es nicht ſchwer fallen, die richtige Art und Weiſe des Rückſchnitts zu erkennen und durchzuführen.

Eine gewiſſe Ausnahme machen allerdings die Rankroſen. Bei ihnen iſt zunächſt ein Entſpitzen der Knoſpentriebe untunlich, da der Durchtrieb nicht zur ſpäteren Blüte kommt, ſondern nur einen kürzeren Langtrieb bilden würde. Auch nach dem Verblühen iſt nur ein Wegſchneiden der reſtlichen Blütenſtände bis auf die Hälfte des Kurztriebes erforderlich. Ein Durchtrieb kommt hier nicht in Frage. Vielmehr wird es bisweilen

ratſam ſein, ſchon jetzt altes, verblühtes und wertloſes Holz vollkommen herauszuſchneiden. Es muß Raum geſchaffen werden für die diesjährigen Langſchoſſe, die alle ſorgfältig angeheftet werden müſſen. Doch ſieht man noch heute den kraſſen Unſinn, daß jeder Langtrieb fortgeſchnitten und das alte Holz geſchont wird. Bei hochſtämmigen Rankroſen iſt beſonders das baldige Wegſchneiden des älteren Holzes notwendig, während alle jungen Sproſſe in beſter Weiſe der Krone erhalten und geſchont werden müſſen.
Auch dort, wo Rankroſen oder ſonſtige ſtarkwüchſige und harte Edelroſen in natürlicher, freier Anpflanzung im Garten ſtehen, iſt im Sommer in ganz ähnlicher Weiſe die Pflege, alſo auch der Schnitt vorzunehmen. Vor allem iſt alles junge Holz zu ſchonen, vornehmlich wenn es aus dem unteren, alten Holz entſpringt. Es gibt doch eine vorzügliche Gelegenheit zur allmählichen Verjüngung der Pflanze.
Ähnlich wie es die Ulrich Brunner beſonders als Buſchroſe macht, alſo bis mannshohe, ſtarke, blütenloſe Langſchoſſe treibt, tun es auch viele unſerer meiſtens in Stammform gezogenen Teeroſen. Es ſeien nur die bekannteſten, die feine Maréchal Niel, auch die Gloire de Dijon, oder Mad. Bérard erwähnt. Nach einem etwas ſtärkeren Winterſchnitt entwickeln ſich bisweilen meterlange und längere Langtriebe, die aber mit keiner Knoſpe das Wachstum beſchließen, ſondern ſcheinbar unbegrenzt weiter wachſen. Dieſe Triebe dürfen nicht entſpitzt werden, ſondern ſollen in flachen Bogen abwärts gezogen werden. Am oberen Teil der möglichſt flach geſtreckten Biegungsſtelle werden ſich bald eine Reihe Augen zum Durchtrieb bequemen und einen Kurztrieb bilden, der mit einer ſchönen Blüte abſchließt. Ein ſolcher Langtrieb bringt dann bisweilen 6 bis 8 oder 10 Blüten und mehr auf einmal. Langtriebe, die noch nicht dieſen Durchtrieb bringen, belaſſe man der Pflanze bis zum nächſten Jahre. Dann bringt er die Blütenreihe ganz gewiß.
Auch gar manche Roſenfeinde machen uns im Sommer zu ſchaffen. Wir denken heute nur an zwei ſo verbreitete Pilzkrankheiten, wie den Mehltau und den Roſt. Der Mehltaupilz, Sphaerotheca pannosa, iſt ein Univerſalfeind der Roſen und fehlt nirgends. Er macht ſich beſonders bei wechſelndem Wetter bemerkbar. Seine grauen Überzüge, die das ſchöne glänzende Roſenlaub ſo unanſehnlich machen, müſſen in den allererſten Stadien ihres Erſcheinens bekämpft werden. Man verwendet zur Bekämpfung meiſt gemahlenen Schwefel, der zeitig am Morgen auf das befallene Laub gepudert wird. Dies muß öfter wiederholt werden und iſt leider nur bei warmem Wetter wirkungsvoll. Bei kalter Witterung nehme man einhalbprozentige Schwefelkalkbrühe oder die ſogenannte Schwefelleber. Der Roſt, eine Phragmidium-Art, verunſtaltet die Blätter durch ſeine rotbraunen Tupfen. Hier gilt es die befallenen Blätter zu verbrennen. Nicht etwa auf den Kompoſt bringen. Je beſſer in Kultur die Roſen ſtehen, deſto widerſtandsfähiger ſind ſie.

ERICH WIBIRAL / SCHUTTWURZLER

JEDER aufmerkſame Bergwanderer, er braucht gar nicht eigentlich botaniſch gebildet zu ſein, kennt verſchiedene Siedlungsweiſen der Gebirgspflanzen: auf Waldboden, auf der Matte, in Felsſpalten und *auf der Schutthalde*.
Bei der Schaffung der Gartenform, für welche die Bezeichnung Alpinum die gebräuchlichſte, wenn auch durchaus nicht die treffendſte iſt, wird zumeiſt die *Felsanlage* gewählt, aus begreiflichen Gründen, die ich hier nicht alle aufzählen will. In die Ritzen zwiſchen die je nach Geſchick des Erbauers mehr oder minder natürlich gefügten Blöcke kommen dann oft nicht nur die in der Natur derart Siedelnden, auch Humuspflanzen werden hineingeſetzt. Das gilt für gewöhnliche Anlagen, aber auch in beſonders durchdachten Schöpfungen iſt meiſt die Nachbildung der natürlichen Geröllhalde zu vermiſſen. Es iſt dies aus verſchiedenen Gründen bedauerlich. Die Schutthalde bietet die beſte und ſchönſte Möglichkeit einer natürlichen Gliederung der Felsgruppe, ſie ſchafft auch, in verſchiedenen Formen, den zwangloſen Übergang zu den Raſenflächen. Vor allem aber gibt ſie vielen Gebirgspflanzen beſſer als die Felsſpalte eine Angleichung an den natürlichen Standort und damit die Möglichkeit freudigſter Entwicklung.
In der Natur ſind hauptſächlich zwei Typen von Schutthalden zu finden. Der eine iſt die *wandernde* Halde; in unſeren Alpen findet man ſie häufig zwiſchen ſchroffen Felswänden und Zinnen, aber auch zwiſchen Wald und Wieſe zu Tal ſtreichend und ſo einen Landſchaftskomponenten von ſtarker Wirkung darſtellend. Wind und Waſſer, Froſt und Hitze haben an der Zerſtörung der Felſen gearbeitet; langſames Rieſeln der zerſetzten Maſſen und raſcher Steinſchlag ſchufen dann die Halde auf mehr minder geneigter Unterlage. Auffallend iſt die große Humusarmut dieſer Halden; ſie erklärt ſich aus ihrer Entſtehung ſowohl, als auch aus ihrer ſehr lockeren Beſiedelung mit Pflanzen. Dieſe wieder hängt zum großen Teil mit der zwar vorwiegend leiſen, aber ſtändig talwärts gerichteten Bewegung der Halde und der ſteten Verſchiebung ihrer Maſſe zuſammen. Vorhandene Pflanzen werden immer wieder wenigſtens teilweiſe von Sand und Schutt begraben, und dies bedingt im Verein mit der Humusarmut eine ſtrenge Ausleſe der hier fortkommenden Arten. In erſter Linie ſind es in Anpaſſung an die Bedingungen der gleitenden Halde *kriechende, ausläuferbildende* Arten, die gedeihen: Arabis caucasica, Hutchinsia, Linaria, einige Dianthus-Arten, D. fragrans und Lumnitzeri lieben beiſpielsweiſe ſolche Standorte, Campanula cochlearifolia breitet ſich weit aus, ebenſo Chrysanthemum Tchihatchewi, Aubrietia, Cerastium uniflorum, C. tomentosum, an halbſchattigen, nicht zu trockenen Stellen Steinbrecharten aus der Verwandtſchaft von Saxifraga decipiens und viele andere mehr. Solche Pflanzen verlangen es geradezu, immer wieder von Sand und Kies überrieſelt zu werden und dies haben wir auch in der Kultur zu beachten; dann werden wir auch von den als »kahlwerdend« verſchrienen Arten ſchöne, große und dichte Polſter gewinnen.
Wo das Schmelzwaſſer des Frühjahrs Furchen in die Halde geriſſen hat, können wir auch in ihre tieferen Schichten blicken: minder ſcharfkantig als die auf der Oberfläche liegenden ſind die in Kies, Sand und feinſtes Steinmehl eingebetteten alten Steinblöcke, in mäßiger Tiefe finden wir faſt ſtets Feuchtigkeit, mitunter ſtarke Näſſe, nicht ſelten treten ja am Fuße ſolcher Schutthalden Quellen zu Tage. Dem entſpricht es, wenn in der Kultur an ſehr ſonnigen und trockenen Standorten eine Unterlage von Sphagnum gegeben wird, ja auch ſchwache unterirdiſche Berieſelung (ja nicht ſtehende Näſſe) iſt zu empfehlen. Beſonders Pflanzen der Urgebirge ſind für ſolche Pflege dankbar. Man vergleiche hierzu die Darlegungen von Dr. Lemperg auf Seite 58 des letzten Oktoberheftes.
Neben dieſen »wandernden« Schutthalden, die bei nicht zu kleinen Anlagen recht wohl nachzubilden ſind, haben wir aber auch die »ruhenden« Schutthalden, die im Hochgebirge große Gebiete bedecken. Ihre Formen ſind meiſt milder als die der »gleitenden« Halde, aus der ſie entſtehen können. Oft ſind es auch Seiten- oder Stirn-Moränen zurückgewichener Gletſcher, doch ſind ſie dann meiſt an ihrer Geſtaltung und der weniger kantigen Form ihrer Felsblöcke und Steine leicht kenntlich. Anders und reicher iſt hier die Flora, Krummholz und Alpenroſe ſiedeln in geſchloſſenen Beſtänden, Ranunculus, Geum, Armeria, Phyteuma ſtellen ſich ein, Eiſenhut (Aconitum tauricum) umwuchert einzelne große Blöcke, im feineren Schutt ſtehen die zierlichen Polſter des ſchwer fortzubringenden Eritrichium nanum. Wo Schnee und Schmelzwaſſer durch Vertiefung oder Schatten ſich länger halten, dort wuchert das niedrige Gebüſch der Zwergweiden, ſtehen die violetten Glöckchen der Soldanellen. Auch viele der eigentlichen Felspflanzen ſiedeln hier wenigſtens zeitweiſe. Von dauerndem Beſtand iſt die ruhende Halde nur in beträchtlicher Höhe über der Baumgrenze; in tieferen Lagen geht ſie mit zunehmender Pflanzenbeſiedlung und Humusbildung in die Alpenmatte über, aus deren Vegetationsdecke nur vereinzelt große Felsblöcke hervorragen.
Nicht wenige der älteren »Felsanlagen« zeigen in ihrer abgerundeten Form eine freilich meiſt wenig glückliche Nachbildung der ruhenden Halde, ſofern der ſtolze Beſitzer nicht auf den Gedanken verfiel, Ortler oder Matterhorn nachformen zu wollen. Die heute oft angewendete Bildung von »Felsbänken« oder »Terraſſen« mit wagrechter Schichtung der Felsblöcke *kann* ſehr ſchöne Bilder ſchaffen und iſt beſonders in Verbindung mit Bauwerken zu empfehlen, doch ſollte man über dieſer *einen* Geſtaltungsmöglichkeit nicht die Schönheit und den Formenreichtum der natürlichen Felsgeſtaltung vernachläſſigen. Auch durch ein Zuviel an Pflanzen wird nicht ſelten ſowohl die Wirkung der ganzen Anlage als auch der einzelnen Pflanzenart beeinträchtigt.
Die Schönheit dieſer Seite der Gartengeſtaltung iſt mannigfach, abſolut und gibt ſich als Entgelt für das Naturgemäße der Schöpfung: Leuchtende Pflanzenfarben, Grün, rein und gebrochen, vornehme Töne des Geſteins in ſeinem Licht und Schatten, des Sandgerieſels ebenſo wie das eindrucksvolle Formenſpiel der Steinblöcke, zu dem die gegenſätzlich bewegten Pflanzenformen einen harmoniſchen, beruhigenden Einklang geben, ſchenken immer ſich erneuernde Freuden.

Die Pflanze in der Wohnung

Neue Blumenvasen

WOLLEN wir Blumenschönheit ins Zimmer bannen, so brauchen wir dazu nicht nur praktisch geeignete, sondern auch in Form und Farbe passende Behälter. Auch die Zimmerpflanzen sehen in ihren Kulturtöpfen meist nicht sehr reizvoll aus. Diese Töpfe sollen in ansprechende Gefäße gestellt oder durch solche ersetzt werden. Ferner brauchen wir im Garten mancherlei Kübel und Schalen für bestimmte Pflanzen, die wir an besonderen Orten oft nur zeitweise aufstellen wollen. Namentlich die heute so verbreitete Kakteenliebhaberei hat dazu geführt, für diese bizarren Wesen nach passenden Behältern zu suchen. Im allgemeinen kann man aber nicht sagen, daß diese Versuche, solche zu schaffen, glücklich ausgefallen sind. Das was man heute noch in Blumengeschäften und anderenorts an Vasen, Kübeln und Schalen zu kaufen bekommt, entspricht nur selten in Bezug auf Material, Form und Farbe höheren Ansprüchen.

Da ist es denn zu begrüßen, daß der als eigenartiger Künstler auch auf dem Gebiete der Gartengestaltung bekannte Architekt *Berthold Körting* für die von ihm geleiteten Oranienburger Werkstätten eine Anzahl Vasen, Kübel und dergleichen Gefäße geschaffen hat, die eine wesentliche und notwendige Bereicherung der Gartenkeramik bedeuten. Durch eine schlichte Formengebung und eine glückliche, unaufdringliche Färbung erweisen sich diese Gefäße fürs Zimmer und für den Garten sehr praktisch und schmuckvoll. Sie sind ausgezeichnet im Material. Wir bilden eine kleine Auswahl von Vasen ab, die sich für die verschiedenartigen Blumen gut eignen und auch für Pflanzen in Töpfen brauchbar sind. Für einige gibt es besondere Einsätze, in denen die Pflanzen stehen. Der abgebildete größere Kübel ist unglasiert und von leicht ziegelrotbrauner Färbung. Derartige Kübel sind sehr erwünscht vor dem Hause, auf Treppenwangen und an ähnlichen Plätzen, wo wir im Sommer gern Kübelpflanzen wie Agapanthus, große Hortensien, auch Fuchsien und dergleichen aufstellen wollen. Gerade dazu fehlten uns bisher geeignete Behälter, wenn wir nicht immer mit den jetzt so üblichen antiken oder barocken Nachahmungen uns behelfen wollen.

Die modernen Versuche, die alten Formen zu ersetzen, sind bisher nur selten glücklich gewesen, und so haben sich zahllose mehr oder minder banale Nachbildungen bei uns eingebürgert. Allmählich stellt sich aber doch auch der Gartengestalter auf eigene Füße und begrüßt dabei jeden Künstler, der ihm zeitgemäße Werke bietet. Dabei ist kein gewaltsames Suchen nach neuen Formen nötig, sondern nur ein Schaffen im gleichen Geiste, wie es die Meister im Orient, in der Renaissance und zu allen großen Zeiten künstlerischer Gestaltung taten. Dabei ergeben sich ganz von selbst Anklänge an alte chinesische und Formen anderer Perioden. Das ist ein ganz natürlicher Schaffensprozeß und hat nichts mit bewußter Nachahmung zu tun. Wir müssen uns vor allem den Zweck recht vor Augen halten, für den wir jeweils die Behälter haben wollen. Sie müssen außerdem solid und dauerhaft gefertigt sein. Aber nur wer Pflanzen kennt und liebt, kann Gefäße für sie schaffen, in denen sie ihre Eigenart wahren und in dieser gesteigert uns entgegentreten können. *C. S.*

JOHANNES KÖSTER / BLÜTENNOTIZEN

Einige Früh- und Maiblüher

AUS dem Reichtum der in den Gärten dienstbar gemachten Früh- und Maiblüher konnte nur eine kleine Reihe beobachtet werden, der große Teil auch nur in einem Jahre. Wichtige Arten und Züchtungen sind dabei, aber das meiste fehlt. Ich rufe bei dieser Gelegenheit noch einmal zu einer fleißigen Mitarbeit an der Registrierung der Blütezeiten auf. Es ist notwendig, solche Beobachtungen in jedem Jahre zu wiederholen; das drängt sich jedem auf, der die Listen liest und die verschiedenen Jahre miteinander vergleicht.

Die Temperatur- und Niederschlagsbilder der jährlichen Winter und der Frühzeiten sind schon an einem Ort von einer unendlichen Buntheit. Ebenso wechselvoll sind die dadurch vollkommen beherrschten Blütezeiten unserer Frühlingskinder. Milde Witterung lockt sie hervor, kalte

Zeiten lassen sie lange andauern, Frost hält sie lange zurück oder zerstört wohl gar ihre Pracht.
Viel können wir ihnen helfen, die Unbilden zu überstehen. Wir siedeln sie dort an, wo sie Schutz haben. Den Waldpflanzen können wir kaum Waldklima gewähren, aber eine Waldbodendecke können wir ihnen geben, eine gute Laubdecke, die den Boden warm und feucht hält.

Sei nun der Beobachtungsort noch so verschieden von anderen Plätzen, die Bekanntgabe der Registrierungen wird immer wichtig und willkommen sein, denn die Reihenfolge im Tanz der Blütenkinder ist annähernd gleich, und es sind auch dieselben, die sich dabei die Hand reichen. Gerade dies, die Feststellung der Gleichzeitigkeit, ist das Fruchtbarste an der ganzen Arbeit und ist leicht nutzbar zu machen.

	1922				1923				1924				1925			
	Erblüht	Vollblüte	Noch ansehnlich bis	Verblüht	Erblüht	Vollblüte	Noch ansehnlich bis	Verblüht	Erblüht	Vollblüte	Noch ansehnlich bis	Verblüht	Erblüht	Vollblüte	Noch ansehnlich bis	Verblüht
Alyssum saxatile comp. 1. Blüte	10.5.	15.5.-25.5.	29.5.	30.5.	28.4.	5.5.-19.5.	23.5.	4.6.	14.5.	18.5.-28.5.	4.6.	7.6.	4.5.	9.5.-18.5.	20.5.	23.6.
2. Blüte					11.8.	11.8.-25.8.	29.8.	8.9.		—						
Alyssum saxatile fl. pl. 1. Blüte					9.4.	30.4.-11.5.	26.5.	15.6.	9.5.	12.5.-28.5.	7.6.	14.6.	18.4.	29.4.-16.5.	20.5.	25.5.
2. Blüte					8.7.	5.8.-20.8.	25.8.	1.9.		——				——		
Anchusa myosotidiflora . . .					11.4.	25.4.-11.5.	26.5.	9.6.	21.4.	5.5.-14.5.	27.5.	4.6.	11.4.	22.4.- 9.5.	18.5.	27.5.
Aquilegia vulgaris	31.5.	3.6.- 1.7.	—	—	23.5.	28.5.-11.6.	15.6.	4.7.	26.5.	31.5.-11.6.	14.6.	18.6.	18.5.	28.5.- 5.6.	8.6.	13.6.
Arabis albida fl. pl. 1. Blüte					9.4.	30.4.-11.5.	26.5.	15.6.	9.5.	12.5.-28.5.	7.6.	14.6.	18.4.	29.4.-16.5.	20.5.	25.5.
2. Blüte					8.7.	5.8.-20.8.	25.8.	1.9.		——				——		
Aubrietia Dr. Mules					18.4.	28.4.-17.5.	25.5.	5.6.	29.4.	7.5.- 4.6.	14.6.	21.6.	18.5.	20.5.- 2.6.	13.6.	22.6.
Aubrietia tauricola	—	10.5.-21.5.	31.5.	31.5.	11.4.	25.4.- 5.5.	17.5.	28.5.	3.5.	12.5.-28.5.	31.5.	11.6.	22.4.	2.5.-25.5.	8.6.	15.6.
Caltha palustris fl. pl.	25.4.	10.5.-24.5.	13.6.	16.6.	11.4.	25.4.-15.5.	23.5.	28.5.	28.4.	5.5.-19.5.	24.5.	28.5.	11.4.	18.4.- 9.5.	13.5.	16.5.
C. palustris monstrosa . .		—				—			14.6.	19.5.-28.5.	31.5.	7.6.	11.5.	13.5.-25.5.	6.6.	10.6.
Centaurea montana	3.5.	10.5.-13.6.	16.6.	20.6.					28.5.	3.6.-12.6.	16.6.	21.6.	14.5.	18.5.-30.5.	2.6.	10.6.
C. montana rosea									31.5.	7.6.-18.6.	21.6.	28.6.	18.5.	25.5.-10.6.	29.6.	8.7.
Dicentra eximia	1.5.	21.5.- 1.8.	23.8.	—	11.5.	2.6.-28.7.	13.11.	13.11.	12.5.	16.5.-23.7.	28.7.	4.8.	22.4.	11.5.-27.7.	29.7.	5.8.
D. formosa	11.5.	14.5.-30.7.	16.8.	23.8.	4.5.	28.5.-23.7.	13.11.	13.11.	9.5.	14.5.-26.7.	30.7.	6.8.	25.4.	16.5.-23.7.	27.7.	29.7.
D. spectabilis									6.5.	14.5.-28.5.	4.6.	14.6.	6.5.	11.5.-28.5.	2.6.	6.6.
Erica carnea atropurpurea . .	—	1.5.-19.5.	31.5.	3.6.	18.2.	22.3.-16.4.	25.4.	30.4.	25.3.	8.4.- 9.5.	12.5.	16.5.	15.2.	18.2.-20.4.	25.4.	7.5.
E. carnea rosea	15.11.	10.5.-22.5.	3.6.	9.6.	15.11.	15.3.-28.4.	26.5.	3.6.	22.3.	5.4.-16.5.	26.5.	2.6.	16.11.	11.4.- 9.5.	15.5.	20.5.
Euphorbia polychroma . . .					23.4.	11.5.-25.5.	28.5.	1.6.	9.5.	14.5.-31.5.	7.6.	27.6.	27.4.	4.5.-23.5.	30.5.	2.6.
Iberis Schneeflocke	15.5.	21.5.	—	—	2.5.	9.5.-30.5.	9.6.	16.6.	16.5.	21.5.- 4.6.	7.6.	14.6.	29.4.	9.5.-23.5.	25.5.	27.5.
I. sempervirens	11.5.	20.5.- 6.6.	13.6.	13.6.	31.4.	5.5.-23.5.			14.5.	19.5.-21.5.	4.6.	11.6.	25.4.	6.5.-18.5.	25.5.	27.5.
I. »Weißer Zwerg«	15.5.	17.5.- 3.6.	9.6.	13.6.	5.5.	9.5.- 2.6.	6.6.	11.6.	16.5.	19.5.- 4.6.	7.6.	12.6.	2.5.	11.5.-25.5.	27.5.	30.5.
Iris pumila caerulea	4.5.	15.5.-19.5.	21.5.	21.5.	25.4.	7.5.-16.5.	19.5.	28.5.	16.5.	19.5.-22.5.	24.5.	26.5.	27.4.	29.4.-13.5.	—	16.5.
I. pumila cyanea	16.5.	20.5.-25.5.	31.5.	3.6.	5.5.	11.5.-23.5.	26.5.	2.6.	21.5.	23.5.-28.5.	31.5.	4.6.	6.5.	9.5.-18.5.	—	26.5.
I. pumila excelsa	19.5.	20.5.-25.5.	31.5.	3.6.	7.5.	15.5.-23.5.	26.5.	2.6.	24.5.	25.5.-31.5.	2.6.	4.6.	11.5.	13.5.-18.5.	—	20.5.
I. pumila formosa	11.5.	19.5.-25.5.	31.5.	6.6.	9.5.	17.5.-23.5.	28.5.	2.6.	19.5.	21.5.-26.5.	28.5.	31.5.	29.4.	6.5.-13.5.	—	16.5.
Megasea (Bergenia) hybrida					18.4.	28.4.-11.5.	17.5.	26.5.	30.4.	9.5.-21.5.	24.5.	26.5.	15.4.	20.4.-13.5.	16.5.	20.5.
Phlox amoena . . . 1. Blüte	5.5.	15.5.-25.5.	3.6.	6.6.	24.4.	5.2.-17.5.	26.5.	16.6.	16.5.	21.5.- 7.6.	14.6.	21.6.	9.5.	15.5.-25.5.	30.5.	2.6.
2. Blüte					1.8.	11.8.-23.9.	1.10.	10.10.		—				——		
P. divaricata canadensis . . .	17.5.	22.5.- 6.6.	9.6.	16.6.	25.4.	7.5.-17.5.	28.5.	16.6.	11.5.	26.5.-11.6.	14.6.	18.6.	6.5.	12.5.-18.5.	20.5.	2.6.
P. hybrida lilacina						——			21.5.	26.5.-14.6.	18.6.	21.6.	4.5.	15.5.-27.5.	2.6.	8.6.
P. subulata	11.5.	14.5.- 3.6.	4.6.	16.6.	25.4.	9.5.-19.5.	28.5.	16.6.	14.5.	21.5.- 7.6.	14.6.	20.6.	6.5.	13.5.-27.5.	30.5.	2.6.
P. subulata atropurpurea . .		—				—			14.5.	21.5.- 4.6.	7.6.	14.6.	6.5.	11.5.-18.5.	25.5.	30.5.
P. subulata »Brightness« . .						——			16.6.	18.6.-28.6.	30.6.	4.7.	8.15.	13.5.-27.5.	30.5.	2.6.
P. subulata nivalis	8.5.	15.5.- 3.6.	6.6.	13.6.	28.4.	9.5.-17.5.	26.5.	20.6.	12.5.	16.5.- 4.6.	11.6.	21.6.	29.4.	11.5.-25.5.	30.5.	2.6.
Primula elatior					11.4.	18.4.-15.5.	22.5.	28.5.	12.4.	23.4.- 5.7.	9.7.	16.7.	16.2.	15.4.-10.5.	16.5.	20.5.
Saxifraga hybr. Blütenteppich					6.5.	11.5.-19.5.	28.5.	—	12.5.	16.5.- 2.6.	7.6.	11.6.	15.4.	20.4.-16.5.	20.5.	23.5.
S. hybrida Purpurmantel . . .					2.5.	9.5.-26.5.	30.5.	—		——			25.4.	6.5.-20.5.	23.5.	25.5.
S. hypnoides magnifica . . .					9.5.	11.5.-28.5.	2.6.	—	9.5.	12.5.-28.5.	2.6.	7.6.	22.4.	29.4.-18.5.	23.5.	23.5.
Trollius europaeus . 1. Blüte	16.5.	19.5.-23.5.	31.5.	6.6.	5.5.	11.5.-19.5.	23.5.	4.6.	19.5.	20.5.- 2.6.	4.6.	11.6.	14.5.	16.5.-27.5.	30.5.	6.6.
2. Blüte					4.8.	13.8.-25.8.	10.9.	—		——				——		
T. japonicus Excelsior	19.5	—	—	—	11.5.	15.5.-23.5.	30.5.	11.6.	19.5.	21.5.-28.5.	31.5.	4.6.	15.5.	18.5.-28.5.	2.6.	8.6.
T. hybridus Orange Globe . .	16.5.	19.5.-25.5.	3.6.	6.6.	15.5.	19.5.-30.5.	9.6.	23.6.	19.5.	21.5.-31.5.	7.6.	14.6.	12.5.	16.5.-25.5.	2.6.	10.6.
Veronica gentianoides	8.5.	16.5.-20.5.	23.5.	29.5.	2.5.	7.5.-15.5.	19.5.	26.5	16.5.	21.5.-26.5.	29.5.	31.5.	4.5.	9.5.-16.5.	—	18.5.
Vinca minor	11.5.	16.5.-20.6.	29.6.	19.7.	3.5.	9.5.-28.5.	4.6.	16.6.		——			9.4.	18.4.-16.5.	20.5.	30.5.
Viola cornuta Blütenfülle 1. Bl.	7.5.	16.5.-19.7.	—	—	11.5.	17.5.- 1.8.	27.8.	29.8.	21.5.	28.5.-28.6.	23.10	—	11.5.	18.5.- 2.6.	29.6.	8.7.
2. Blüte					17.10.	26.10.-27.10.	31.10.	—		——				——		
V. cornuta Gustav Wermig . .						——			29.5.	4.6. bis Ende Nov.			6.5.	16.5.-10.6.	24.6.	1.7.
V. cornuta Maggi Mott 1. Blüte	1.5.	19.5.-19.7.	—	—	30.4.	11.5.-25.7.	20.8.	29.8.	14.5.	19.5.-21.5.	11.7.	26.7.	25.4.	27.4.- 6.6.	13.7.	22.8.
2. Blüte					12.9.	19.9.-20.10.	27.10.	31.10.	16.8.	—	—	3.10.		——		
V. cornuta Papilio						——			9.5.	12.5.-23.7.	30.7.	6.8.	6.4.	18.4.-15.8.	21.10.	—
V. odorata Königin Charlotte						—			30.4.	9.5.-14.5.	—	21.5.	9.4.	15.4.-22.4.	—	27.4.
V. cucullata		——				——			12.5.	19.5.-26.5.	14.6.	14.6.	6.5.	11.5.-16.5.	—	23.5.
Pulmonaria angustifolia azurea		——			1.4.	11.4.- 7.5.	11.5.	17.5.	7.4.	28.4.-17.5.	24.5.	28.5.	23.3.	8.4.-29.4.	11.5.	18.5.
P. officinalis		——			28.3.	14.4.-28.4.	9.5.	15.5.	12.4.	30.4.-16.5.	19.5.	21.5.	4.4.	18.4.-27.4.	4.5.	11.5.
P. rubra		——			28.3.	14.4.-28.4.	7.5.	11.5.	16.4.	5.5.-19.5.	21.5.	27.5.	6.4.	18.4.- 1.5.	6.5.	13.5.
P. sacharata maculata . . .		——			9.4.	18.4.-15.5.	28.5.	9.6.	19.4.	12.5.-26.5.	31.5.	4.6.	8.4.	20.4.-16.5.	18.5.	23.5.
Doronicum caucasicum . . .		—			11.4.	18.4.-28.4.	7.5.	11.5.	5.5.	9.5.-17.5.	24.5.	31.5.	11.4.	18.4.-24.4.	25.4.	29.4.
D. Columnae		——				——			8.5.	12.5.-21.5.	26.5.	2.6.	18.4.	25.4.-11.5.	16.5.	23.6.
D. plantagineum excelsum 1. Bl.	15.5.	17.5.	—	29.5.	25.4.	5.5.-11.5.	17.5.	26.5.	16.5.	21.5.-28.5.	2.6.	10.7.	22.4.	4.5.-16.5.	18.5.	23.5.
2. Blüte		——			25.7.	—	13.11.	—	11.8.	—	23.10.	—		——		
Geum Heldreichii	15.5.	25.5.- 9.6.	13.6.	16.6.	7.5.	15.5.-23.5.	2.6.	15.6.	21.5.	24.5.-30.5.	4.6.	9.6.	29.4.	9.5.-23.5.	27.5.	2.6.

Gartenrundschau

NEUES AUS ALLER WELT

Studienfahrt nach Köln

SEIT 1913 war ich nicht nach Köln gekommen. Als ich damals mit Gartendirektor *Encke* die öffentlichen Anlagen durchwanderte, bekam ich bereits überaus reiche Eindrücke von dem Schaffen dieses ausgezeichneten Fachmannes, den das Geschick in Köln so recht an den ihm gebührenden Platz gestellt hat. In dem letzten Jahrzehnt hat aber sein Wirkungskreis eine ganz wesentliche Erweiterung erfahren infolge der Schleifung der Befestigungen. Encke selbst hatte schon vor Jahren einen großzügigen Plan für die Grünanlagen bei einer umfangreichen Erweiterung des Bebauungsgebietes ausgearbeitet. Als dann durch Professor Schuhmacher ein gewaltiger Plan für den Ausbau einer Millionenstadt am Rhein aufgestellt wurde, fanden die Enckeschen Vorschläge die gebührende Berücksichtigung. So ergab sich gerade in den Nachkriegsjahren für Köln die Möglichkeit, öffentliche Garten- und Sportanlagen in einem Ausmaße zu schaffen, wie es wohl nirgendwoanders der Fall gewesen ist. Die ehemaligen Forts wurden in geradezu vorbildlicher Weise diesen gärtnerischen Plänen dienstbar gemacht.

Köln hatte das große Glück, in Encke einen Gartendirektor zu bekommen, der in jeder Weise für seine Aufgaben vorbereitet war und es verstand, sich in die gegebenen Verhältnisse einzuleben und sie soweit es nur ging sich dienstbar zu machen. Und ihm wiederum bot sich in Köln ein Arbeitsfeld, wie in keiner anderen Stadt Europas. Somit bringt auch schon ein schneller Überblick über Enckes ältere und neuere Schöpfungen in Köln eine Fülle angenehmer Überraschungen mit sich. Anlagen, wie der Klettenberg und auch der Blücherpark, die ich 1913 in erster Jugendblüte oder noch ganz in ihren Anfängen erleben durfte, zeigen jetzt schon ein starkes Reifestadium und lassen erkennen, ob das, was dem Schöpfer vorschwebte, auch Wirklichkeit wurde oder zu werden verspricht. Sie sind auch dort lehrreich, wo das Gewollte nicht so recht in Erscheinung tritt, denn überall spürt man ein zielbewußtes, von tiefem künstlerischem Empfinden getragenes Wollen. Der Unterschied zwischen der alten Zeit vor Encke, für die beispielsweise der Volksgarten typisch ist, und dem, was seit über 20 Jahren geschaffen wurde, ist sehr auffällig und bezeichnend.

Unter den letzten Schöpfungen machten besonders die Anlagen um die ehemaligen Forts I und X tiefen Eindruck. Hier hatten sich Gestaltungsmöglichkeiten ergeben, die eigenartige Lösungen mit sich brachten. Oft nur kleine, aber mit großem Geschick ausgenutzte Räume. Ganz frei wiederum konnte Encke schalten beim Vorgebirgspark und bei der Erweiterung des Stadtwaldes. Im ersten Falle ergaben sich räumlich recht gut gefaßte architektonische Lösungen. Im letzten konnte der Versuch großzügiger, aber einfacher Landschaftsgestaltung unternommen werden. Alles steht immer im Dienste der Volkswohlfahrt. Große Spielwiesenflächen, die in Köln geradezu vorbildlich sind und überall eingeführt werden müssen, schließen sich an lauschig waldige Teile und verbinden sich mit echten Gärten. In der Schaffung solcher Gärten, die so völlig den Bedingungen öffentlicher Anlagen angepaßt sind und dabei doch auf den Besucher wie Privatgärten wirken, in denen er sich wie zuhause fühlen kann, ist Encke Meister. Hier bietet fast jede Anlage neue Überraschungen. Rosengärten, Staudengärten mit Rabatten und Trockenmauern, Laubengänge, Wasserbecken, Kinderspielplätze und vor allem ungemein intime Sitzplätze treten uns immer wieder in den verschiedensten Formen entgegen. Der Pflanzenreichtum solcher Gärten ist ungemein. Man findet stellenweise Material, das man sonst nur in Sondergärten eifriger Liebhaber zu sehen gewohnt ist. Vieles wird mit Glück versucht, das man in anderen öffentlichen Anlagen nicht kennt.

Auf Einzelheiten wird an der Hand von Bildern und Plänen noch einzugehen sein. Für heute sei nur zusammenfassend gesagt, daß die Kölner öffentlichen Anlagen in ihrer räumlichen wie pflanzlichen Ausgestaltung Studienobjekte ersten Ranges darstellen für jeden, der sie mit offenen Augen durchwandert. Die Gartenkunstjünger unserer Lehranstalten müßten Jahr für Jahr sie besuchen und in sie eingeführt werden. Kein leitender städtischer Gartenbeamter dürfte an ihnen vorübergehen. Aber jedem Gartengestalter, jedem Gartenfreunde bietet sich hier reichste Gelegenheit, Motive aller Art zu studieren und daraus Nutzen zu ziehen für die Lösung eigener Aufgaben. Wie wenig das selbst solche Gestalter tun, die ganz nahebei hausen, zeigen beispielsweise die umfangreichen Anlagen bei den Farbwerken in Leverkusen. Auch hier haben sich Möglichkeiten in Hülle und Fülle geboten, aber wie sind sie ausgenutzt? Da hätte Köln vorbildlich sein können, und es sollte es für jeden sein, der sehen kann und lernen will.

Jeder Schöpfer öffentlicher Anlagen ist an bestimmte Bedingungen gebunden und muß ihnen gerecht werden. Aber gerade darin, wie er sich damit abfindet und wie er das Unpersönliche ins Persönliche umformt, ohne seiner Aufgabe untreu zu werden, darin offenbaren sich sein Gestaltungstalent und sein Verständnis für das soziale Moment dieser Anlagen. Köln und sein Gartendirektor sind beide zu beglückwünschen. Die Stadt wird ihn schweren Herzens bald scheiden sehen. Er aber kann mit dem Bewußtsein scheiden, daß es ihm vergönnt war, ein großes Werk erfolgreich seinem Ende nahe zu führen und der Bevölkerung einer künftigen Weltstadt unentbehrliche Stätten für die Volksgesundheit und die unsern Städtern so nötige Liebe zum Garten und Park, zur Pflanze und Blume geschaffen zu haben.

Gärtnerische Versuchsstation in Friesdorf

DIE Landwirtschaftskammer zu Bonn hat seit einigen Jahren unter der Leitung von Garteninspektor *Max Löbner* eine gärtnerische Versuchsstation eingerichtet, die nun ihre endgültige Stätte in Friesdorf gefunden hat. Löbner hat es hier verstanden, mit wenigen Mitteln einen kleinen, aber mustergültigen Betrieb aufzubauen, in dem zielbewußte Kultur- und Züchtungsversuche durchgeführt werden. Friesdorf ist so recht ein Schulbeispiel dafür, was erreicht werden kann, wenn ein energischer Mensch die Sache richtig anzupacken weiß und durch weitblickende sachverständige Kollegen, wie hier in erster Linie wohl durch Georg Arends, willig unterstützt wird. Ein Gang durch die Station lehrt dies sofort.

Die Glashäuser sind vor allem für gewinnbringende Kulturen, wie beispielsweise frühe Gurken, ausgenutzt. Eine Kultur folgt dabei immer auf die andere. Mitte Mai standen auch Tomaten darin, die kurz vor dem Aussetzen waren und deren Kultur, wenn man so sagen darf, das finanzielle Rückgrat der Versuchsstation bildet. Löbners Neuzüchtungen von Tomaten und Gurken sind bekannt genug. Sonst findet sich eine große Zahl von Versuchskulturen, seien es nun Neuzüchtungen oder Düngungsversuche und ähnliches. Viele Neuheiten, die von auswärts kommen, werden hier geprüft. Erfreulicherweise finden sich immer mehr Firmen, die ihr neues Material der Station zur Prüfung überlassen. Beiden Teilen ist damit gedient. Die sorgfältige Kleinarbeit, die Löbner dabei zu leisten hat, kann nicht hoch genug bewertet werden. Er selbst ist dauernd bemüht, bestimmte Zuchtziele zu verfolgen, und bringt fast Jahr für Jahr wertvolle Neuheiten heraus, die dann zumeist von bestimmten Firmen aufgekauft und vertrieben werden. Im Freien sind es besonders die Rosenunterlagen, denen er jetzt sein Augenmerk zuwendet. Ebenso Unterlagen für bestimmte Fliedersorten zum Treiben und vieles andere mehr. Bei den Rosen handelt es sich vor allem darum, bei der Anzucht für Hochstämme ein Jahr zu ersparen und doch gute Stämme zu erhalten. Nebenbei fallen sozusagen immer wieder Kleinigkeiten ab. Bald sind es neue Clivien, bald Gehölze, wie etwa eine Kreuzung zwischen Magnolia stellata und Kobus, die den Namen Loebneri trägt und für geeignete klimatische Lagen eine prächtige Gartenpflanze zu werden verspricht. So findet man hier auf kleinem Raume eine Fülle von Anregungen und scheidet mit dem Bewußtsein, daß die Versuchsstation geschickt und erfolgreich geleitet wird.

Deutsche Dendrologische Gesellschaft

DER Präsident dieser Gesellschaft, *Dr. Fritz Graf von Schwerin*, feierte im Mai in vollster Rüstigkeit und Schaffensfreude seinen 70. Geburtstag. Nach dem am 21. Oktober 1902 erfolgten Hinscheiden des ersten Präsidenten der D. D. G., Ulrich Le Tanneux von Saint-Paul Illaire, übernahm Graf Schwerin die Leitung und hat es verstanden, die von Anfang an rührige Gesellschaft zu einer über ganz Deutschland, ja Mitteleuropa verbreiteten Vereinigung zu entwickeln, die heute rund 7000 Mitglieder zählt. Die alljährlich in Form eines Jahrbuches erscheinenden Mitteilungen der D. D. G., die im Jahre 1902 ein Heft von 138 Seiten umfaßten und heute einen Band von 440 Seiten bilden, sind der beste Beweis für das, was die D. D. G. in diesen Jahren geleistet

hat. Das Hauptverdienſt hierbei iſt unſtreitig in erſter Linie dem ebenſo eifrigen wie geſchickten Präſidenten zuzuſprechen. Wer dieſe Jahrbücher aufmerkſam geleſen und an den Jahresverſammlungen der D. D. G. des öfteren teilgenommen hat, wird wiſſen, welch rege Teilnahme bei den Mitgliedern herrſcht und wie vorzüglich es Graf Schwerin verſteht, dies Intereſſe immer wach zu halten und die Geſellſchaft in zwar autokratiſcher, aber liebenswürdiger und erfolgreicher Weiſe zu leiten. Die Hauptbedeutung der D. D. G. liegt meines Erachtens darin, daß ſich in ihr Vertreter und Freunde des Forſtbaues, der Gehölzkunde, der Gartengeſtaltung und verwandter Gebiete aus allen Kreiſen der Geſellſchaft zuſammenfinden und verbunden mit einem regen Meinungsaustauſch gärtneriſche und forſtliche Anlagen von dendrologiſchem Intereſſe ſtudieren. Auch auf dem Gebiete der wiſſenſchaftlichen Dendrologie hat ſich Graf Schwerin durch zahlreiche Arbeiten, insbeſondere über die Gattung Acer, große Verdienſte erworben.
Wir beglückwünſchen den Jubilar auf das Herzlichſte und hoffen, daß es ihm noch durch manche Jahre vergönnt ſein möge, die D. D. G. in der bisherigen Friſche mit gleichem Erfolge zu leiten. Ohne ihn iſt ſie nicht denkbar.

Zwei Iris-Schriften

SEITENS des Ackerbauminiſteriums der Vereinigten Staaten (U. S. Department of Agriculture, Washington) werden billige Schriften für Landwirte, Förſter und Gärtner herausgegeben. Unter dieſen verdient des Farmers' Bulletin no. 1406 erwähnt zu werden. Es trägt den Titel *„Garden Irises"* und iſt ganz vortrefflich von *B. Y. Morriſon* bearbeitet. Die kleine Schrift umfaßt 46 Seiten in Oktav mit 53 Bildern, die zumeiſt ſehr inſtruktiv ſind. Das Motto der Schrift iſt gewiſſermaßen in den einleitenden Worten enthalten, daß in den Garten geſchäftiger Leute keine Pflanzen gehören, die übermäßige Pflege und Wartung verlangen. Zu ſolchen Leuten gehören die Landwirte, an die ſich die Schrift verwendet. Sie behandelt in ſehr hübſcher klarer Weiſe alles, was ein Liebhaber von Iris wiſſen muß. Jeder Irisfreund wird ſie mit Nutzen leſen, ſofern er Engliſch kann. Die Zeichnungen, die verſchiedene Iris-Typen darſtellen, können für dieſe Zwecke vorbildlich genannt werden. — Die zweite amerikaniſche Iris-Schrift, auf die wir heute hinweiſen wollen, iſt von der Ackerbauabteilung (N. Y. State College of Agriculture) der Cornell Univerſität des Staates New York, in Ithaca, N. Y., herausgegeben. Sie trägt den Titel *„Bearded Iris, a perennial suited to all gardens"* und behandelt in recht guter Weiſe die Untergattung Pogoniris, die unſere wichtigſten Kultur-Iris umfaßt. Ihr Verfaſſer iſt *Auſtin W. W. Sand*, der auf 92 Oktavſeiten mit 47 Bildern einen trefflichen Überblick über dieſe Gruppe mit ihren Arten und in Amerika wichtigen Kulturformen gibt. Die Darſtellung der Klaſſifizierung iſt wertvoll und zeigt, wie die amerikaniſche Iris-Geſellſchaft es verſtanden hat, hohe Zuchtziele zu ſtecken. Jeder, der ſich mit dieſen Iris beſchäftigt, ſollte dieſe Schrift zu Rate ziehen. Im Deutſchen fehlt uns vor der Hand noch ein Iris-Buch und eine Iris-Geſellſchaft. *C. S.*

Neue Bücher

ARISTOKRATEN DES GARTENS. Ein neues Buch von *Erneſt H. Wilſon*, dem bekannten Forſchungsreiſenden und ſtellvertretenden Direktor des Arnold Arboretum ſtellt immer ein Ereignis für die Gartenbauliteratur dar. Seine »Ariſtocrats of the Garden«, die kürzlich bei The Stratford Company in Boſton, Maſs., erſchienen, legen wieder Zeugnis ab für die große Pflanzenkenntnis des weitgereiſten Verfaſſers und für ſein Talent, ſein Wiſſen dem Gartenfreunde zu vermitteln. Die vornehmſten der Arikokraten ſind die Roſen, ihnen gilt das erſte Kapitel. Dann folgen Lilien. Weitere Abſchnitte ſind unter anderen ſommerblühende Bäume und Sträucher, harte Schlinger, Gehölze mit zierenden Früchten, Herbſtzauber, harte Nadelhölzer, immergrüne Laubgehölze für den Garten des Nordens, Flieder, Rhododendron, die Geſchichte der Davidia. Schon dieſe Hinweiſe zeigen, was das Buch bietet. Eine ganze Anzahl Tafeln nach Aufnahmen des Verfaſſers begleiten den Text. Sie ſind zumeiſt recht hübſch ausgefallen. Ein Index der lateiniſchen und engliſchen Namen beſchließt den ſchmukken Band, den kein Gehölzfreund, ja kein Gartenliebhaber und Fachmann unbefriedigt aus der Hand legen wird, wenn er des Engliſchen mächtig iſt. *C. S.*

DER DEUTSCHE PARK. In der Sammlung Blaue Bücher: Baukunſt und Plaſtik bei Karl Robert Langewieſche, Königſtein im Taunus, iſt ein Band *„Der Deutſche Park, vornehmlich des 18. Jahrhunderts"* erſchienen, zu dem Profeſſor Wilhelm Pinder ein kurzes Vorwort geſchrieben hat. Dieſes ſchmucke Heft enthält 125 zumeiſt ganzſeitige Bilder nach zum großen Teil ſehr hübſchen Photographien. Es bildet ſomit ein Parkbilderbuch, wie wir es bisher nicht beſitzen und führt uns durch die bekannten Anlagen Deutſchlands und Öſterreichs: wie Bayreuth, Brühl, Dresden, Eisgrub, Groß-Sedlitz, Herrenhauſen, Kaſſel, München, Oliva, Pillnitz, Potsdam, Rheinsberg, Schwetzingen, Veitshöchheim, Weimar, Wien, Wörlitz, Würzburg. Aber auch Unbekannteres iſt gut vertreten, wie Fulda, Wilhelmsthal, Weikersheim, Krumau. Meiſt ſind es architektoniſche oder plaſtiſche Ausſchnitte. Immer wird der Wunſch nach einem Mehr wach, wenn nur vereinzelte Szenerien aus ſolchen Anlagen geboten werden. *C. S.*

Zeitſchriften

BELGIEN

Im Aprilheft von *„Le Jardin d'Agrément"* wird Gladiolus primulinus nebſt ſeinen Abkömmlingen beſprochen. Die Beſchreibung der Flora des Thals von Chamonix wird fortgeſetzt. Im Aprilheft gibt H. Gilſon eine Auswahl von 25 Kletterſträuchern. — *„La Tribune Horticole"* von Ende April bis Ende Mai (no. 496) enthält viele wirtſchaftliche und kulturelle Notizen. No. 494 bringt einen Beitrag über die Einführung der Tulpen.

DÄNEMARK

Die *„Havekunſt"* bringt in no. 4 Bilder und Betrachtungen über Profeſſor Carl Milles Garten.

FRANKREICH

Die Farbentafel im Aprilheft der *„Revue Horticole"* zeigt Mammut-Levkojen mit Text von F. Blot. J. Gerôme beſpricht Kakteen. — Im Maiheft von *„Jardinage"* wird der Artikel über das Château d'Ecouen fortgeſetzt.

ENGLAND

Im Maiheft von *„The Orchid Review"* beſpricht Broadway weitere Orchideen aus Trinidad, L. Sander die Orchideenkultur in Italien. Eine ſchöne Pflanze von Cymbidium Sybil wird abgebildet. Notizen über weitere Orchideen beſchließen das Heft. — In no. 2841 von *„The Garden"* behandelt N. Lambert neue wertvolle Dahlien. W. J. Bean ſetzt ſeine Artikelreihe über Gehölze für Mauern fort. Er zeigt eine prächtige Prunus triloba fl. pl. als Wandſtrauch. Die ideale Geſtalt moderner Gladiolen wird in Bildern dargeſtellt. In no. 2842 zeigt R. L. Praeger heimiſche Wildpflanzen im Garten. Bean führt in ſeinen Betrachtungen Schizophragma hydrangeoides vor. R. Scharfetter ſpricht über die Flora der öſtlichen Alpen. Die Ausſtellung der Rhododendron-Geſellſchaft in London am 27. April ſcheint nach der Schilderung ſehr ſchön geweſen zu ſein. — *„The Gardener's Chronicle"* bringt in no. 2053 eine Tafel von Rhododendron Dorothea. Coelogyne Lawrenceana var. superba iſt nach einem Bilde zu urteilen eine wundervolle Form. Ebenſo iſt Berberis kansuensis zur Blütezeit ſehr ſchön. No. 2054 enthält weitere Rhododendron-Bilder: R. croceum, R. campylocarpum und R. adenogynum, ferner R. Gladys (R. campylocarpum × R. Fortunei). Ward's Artikel über Meconopsis wird fortgeſetzt und M. Baileyi abgebildet. No. 2055 bringt Pflanzenbilder aus den Anlagen von Brocket Hall.

HOLLAND

In no. 43 von *„Onze Tuinen"* ſetzt Hanſen ſeine Betrachtungen über den Gehölzſchnitt fort. Ebenſo werden die Mitteilungen über Eigenſchaften von Sukkulenten weitergeführt. Im folgenden Hefte bringt Bleeker eine Notiz über Juglans-Arten mit Bildern von Blättern, Zweigen und Früchten. Van Laren ſpricht in no. 45 über frühblühende Rhododendren, und im nächſten Hefte über die wenig bekannte Ampelpflanze Erodium hymenodes aus Nordafrika. — Die *„Floralia"* hat in no. 16 eine Sondernummer über Chryſanthemum mit einer Farbentafel. Bleeker ſetzt ſeine Artikelreihe über das Schneiden von Gehölzen in no. 18 fort.

NORDAMERIKA

Im Aprilheft von *„Horticulture"* werden neue wertvolle Roſen beſprochen. Eine bei uns kaum bekannte Iridacee: Acidanthera bicolor wird abgebildet. Im Maiheft werden verſchiedene Einjahrsblumen behandelt. — In *„The Gardener's Chronicle of America"* vom April finden wir eine gute Notiz von J. Fisher über Grasſamen-Miſchungen. — Das Aprilheft der *„Landscape Architecture"* enthält einen illuſtrierten Artikel von W. H. Sears über Gartenhöfe in Cordova. Dann ſpricht K. B. Lohmann über die Gartengeſtaltung im Mittelweſten von Nordamerika. Er zeigt unter anderem ein Bild aus den Garten von Jens Jensen in Ravinia. Eine Zuſammenſtellung von Florida-Pflanzen folgt. Querſchnitte für Straßen-Anlagen mit Pflanzung von J. H. Bell ſind ſehr inſtruktiv. Taylor ſetzt ſeine gartentechniſchen Notizen fort und behandelt den Gehölzſchnitt.

ÖSTERREICH

Im Maiheft der *Gartenzeitung* wird über die Dresdener Ausſtellung und über Dahlien berichtet. *C. S.*

VERLAG DER GARTENSCHÖNHEIT G. m. b. H. in Berlin-Weſtend / Verantwortlich für die Schriftleitung OSKAR KÜHL in Berlin-Weſtend, für den Anzeigenteil DOROTHEA KLETT, Berlin-Lichterfelde / Druck von W. SOMMER, Buch- und Kunſtdruckerei in Berlin-Schöneberg.

Wilhelm Pfitzer
G. m. b. H.
gegr. 1844
Stuttgart 44

Spezialitäten:
Gladiolen
Dahlien, sämtliche Blumenzwiebeln und Knollengewächse; Rosen, Blütenstauden, Schlinggewächse sämtliche Gemüse- und Blumensamen.

Bei Bezugnahme auf die Gartenschönheit Kataloge (224 Seiten, 300 Abbildungen) umsonst und portofrei

KARL FOERSTER-Bornim-Potsdam

Aster Sam Banham

Für Spätpflanzung
bis in den Sommer, in kräftigen, abgehärteten Topfpflanzen, in diesem Jahr schon reich blühend:
Chrysanthemum indicum in 40 bewährten win-
Staudenastern [terharten Gartensorten
Anemone japonica
Dahlien in 120 erlesenen Sorten.

Mein neuer STAUDENKATALOG, zugleich ein Wegweiser durch das Staudenreich, mit ca. 100 neuen schwarzen und farbigen Bildern wird gegen Voreinzahlung von 2 M. (Postscheckk. Berlin 30893) oder Nachnahme zugesandt. / Ausführliche Preisliste ohne Bilder kostenfrei.

Das
Doerfel-Gewächshaus
Das Ideal der Gärtner

Ausführung in Eisen und Pitchpine, Ia Glas. Gebaut nach Entwürfen hervorragender Fachleute. Hochleistungsfähig im Betrieb und unverwüstlich, billig in der Anschaffung.
VERLANGEN SIE ANGEBOTE!

Richard Doerfel, Kirchberg i./Sa.
Sonderwerk für Gewächshausbau
Heizanlagen und Frühbeetfenster
Gründungsjahr 1863

Wer die landschaftlichen
Schönheiten des Harzgebirges
als Ziel der diesjährigen Sommerreise festgesetzt hat, versäume nicht, dabei das
tausendjährige Quedlinburg
und unsere
unvergleichlich schönen Blumenfelder zu besuchen.

Unsere ausgedehnten Kulturen
Sommerblumen / Stauden / Gladiolen / Begonien / Dahlien usw. während der Blütezeit zu besichtigen, ist gern gestattet und für Fachmann und Liebhaber gleich lohnend.
Alle Leser der Gartenschönheit, deren Besuch uns jederzeit willkommen ist, sind herzlich eingeladen.
Wenn aber besondere Umstände ein anderes Reiseziel bedingen, das den Besuch Quedlinburgs nicht ermöglicht, dann verlange man unsere reichbebilderten und vornehm ausgestatteten Preisverzeichnisse und Sonder-Angebote, die in hochgezüchteten Gemüse- und Blumensamen, Blumenzwiebeln und Knollen nur das allerbeste enthalten. — Die Zusendung erfolgt kostenlos.

Samenhaus **Pape & Bergmann**, Quedlinburg 5

Sammelmappe

MENSCH UND PFLANZE

EIN schier unerschöpfliches Gebiet auch dann noch, wenn man von den rein praktischen Beziehungen absieht! Uns Kultur- und Ueberkulturmenschen freilich wird es schwer uns in all die Zusammenhänge hineinzufinden, die den Menschen im Urzustande mit der Pflanzenwelt seiner Umgebung verbinden. Das Gefühl einer wirklichen Lebensgemeinschaft mit der Pflanze ist uns verloren gegangen Nur im Unterbewußtsein schlummert es bisweilen, besonders im Landvolk, das als Träger alter Ueberlieferung noch so manches bewahrt hat, was dem Städter schon längst entschwunden ist. Auch unsere deutsche Muttersprache hält noch an manchem bildlichen Ausdruck fest (etwa wie »blühendes« Leben), der an diese alten Zeiten einer innigen Naturgemeinschaft gemahnt. Am deutlichsten schimmert die alte Naturverehrung wohl im Baumkult durch. Der Baum, der dem Menschen Schutz und Obdach bot, der ihn mit seinen Früchten ernährte und aus dessen Holz das heilige Feuer loderte, mußte Gegenstand einer besonderen Verehrung werden. So gering ist der Wesensunterschied zwischen Mensch und Baum, daß ein Eddamythus (Wöluspa) die ersten Menschen aus Bäumen, Ask (Esche) und Embla (Ulme?), entstehen läßt.

HINWEIS
Diesem Heft liegt ein Prospekt der Fa. Paul Teicher, Striegau (Erstes deutsches Spezialhaus für Levkojen) bei, den die Leser gefl. besonders beachten wollen.

Gingen da dreie aus der
Versammlung
Mächtige milde Asen zumal,
Fanden am Ufer unmächtig
Ask und Embla und ohne
Bestimmung,
Besaßen nicht Seele, und Sinn
noch nicht,
Nicht Blut noch Bewegung,
noch blühende Farbe.
Solche gab Odhin, Hoeni gab Sinn,
Blut gab Lodhur und blühende
Farbe.

Aehnliche Anschauungen treffen wir auch bei anderen Völkern an, so lassen die Sagen verschiedener Indianerstämme (Sioux, Kariben) die ersten Menschen ebenfalls aus Bäumen entstehen. Auch sonst weisen in Sagen die Bäume nicht selten menschliche Züge auf: der mit der Axt verletzte Baum blutet, heißt es in einer schwedischen Sage, und Mannhardt erinnert hier an die Stelle aus Schillers »Tell«, wo der kleine Walter seinen Vater fragt:

Vater, ist's wahr, daß auf dem
Berge dort
Die Bäume bluten, wenn man
einen Streich
Drauf führe mit der Axt?

Auf derartige Vorstellungen über die Stellung der Bäume zum Menschengeschlecht gehen wohl auch die geradezu barbarischen Strafen zurück, welche in mittelalterlichen Landrechten dem Baumfrevler drohen.

Bis in die jüngste Zeit hat sich, wenn auch schon in etwas verblaßter Form, der Glaube an Bäume erhalten, deren Schicksal mit dem des Menschen eng verknüpft ist.

In der Altausseer Gegend (Steiermark) schüttet man das erste Badwasser von einem Knaben unter einen Apfelbaum, von einem Mädchen unter einen Birnbaum. Der betreffende Baum trägt dann den Namen des Kindes; verdorrt der Baum, so wird auch das Kind nicht mehr lang leben. Die schöne Sitte, bei der Geburt des Kindes einen solchen »Lebensbaum« zu setzen, kommt leider auf dem Lande immer mehr ab. Die Uebertragung menschlicher Krankheiten auf Bäume, der Schlag mit dem Fruchtbarkeit spendenden Zweige (Lebensrute), die Verehrung gewisser Bäume als Schutz- und Familienbäume, lauter Bräuche und Meinungen, von denen wir bei der Be-

sprechung der einzelnen Baumarten Ausführlicheres hören werden, haben ihre Grundlage in einer »Vermenschlichung« der Pflanze.

Daß bei einer solchen Verehrung der Bäume der Wald oder doch gewisse Waldbezirke als »heilige« Stätten gelten mußten, liegt nahe. Berichtet doch schon Tacitus, daß die Germanen ihre Götter in heiligen Hainen verehrten. Wenn einzelne Bäume gewissen Gottheiten, so dem Donar »geweiht« waren, so müssen wir das wohl so auffassen, daß die Verehrung des Baumes das Ursprüngliche war und die Beziehung zu dem Gott erst später erfolgte.

Nach dem Gesagten mag es vielleicht etwas befremden, wenn manche Bäume als dem Menschen feindlich gesinnt gelten oder es zum mindesten heißt, daß es in ihrer Nähe nicht recht geheuer sei, ebenso wie auch der Wald in der Sage nicht selten als ein Ort des Grauens erscheint. Einesteils mögen solche Vorstellungen auf die Bemühungen der ersten christlichen Glaubensboten zurückgehen, die heidnischen Kultstätten als etwas Böses, Teuflisches umzuprägen, andernteils spielt aber sicher der Glaube mit herein, daß der Wald oder gewisse Bäume der Aufenthaltsort der Toten bzw. der abgeschiedenen Seelen sei. Für den primitiven Menschen aber ist der Tote etwas Feindliches, dessen Wiederkehr ins Reich der Lebenden er auf alle mögliche Weise zu verhindern sucht und dessen Rachsucht er fürchtet. Der Tote ist nicht wirklich tot, er hat nur seinen Aufenthaltsort gewechselt. Die geheimnisvollen Stimmen des Waldes, das nächtliche Aechzen der Bäume, das Rauschen ihrer Wipfel, groteske Baumformen, die dem Wanderer in der Dämmerung allerlei Spukgestalten vortäuschen, all das mag zusammengewirkt haben, um den Wald und Baum als den Aufenthaltsort von Geistern erscheinen zu lassen.

Der Baumkult und alles, was damit zusammenhängt, stellt nur einen Teil der gemütvollen Beziehungen des Menschen zur Pflanzenwelt dar. Das niedere Volk der Kräuter wird nicht übersehen. Allerdings läßt sich hier eine gewisse Auswahl beobachten. Wenn wir die große Fülle der heimischen Kräuter betrachten, so finden wir verhältnismäßig recht wenige, die im Volksbrauch und Volksglauben eine bedeutendere Rolle spielen. Welche Gesichtspunkte sind aber für diese Auswahl maßgebend? Da sind es zunächst Kräuter, die durch ihre äußere Erscheinung auch die Aufmerksamkeit des Nichtbotanikers auf sich lenken. Auffällige Blüten, sei es nun in Form oder Farbe, haben selbstverständlich mehr Aussicht beachtet zu werden als unscheinbare. Bei der Suche nach pflanzlicher Nahrung wurde der Urmensch auch mit den unterirdischen Pflanzenteilen bekannt, so daß Gewächse mit abweichenden Wurzelstockbildungen (etwa wie das Salomonssiegel [Polygonatum officinale], der Teufelsabbiß [Succisa pratensis] mit seinem wie abgebissen erscheinenden Wurzelstock) oder mit Knollen (Orchideen!) nicht unbekannt bleiben konnten. Stark aromatisch riechende Pflanzen (wie verschiedene Doldengewächse, Kümmel, Dill) gelten seit Urzeiten als geisterverscheuchend. Werden ja noch jetzt von abergläubischen Landleuten die »bösen Geister« in Haus und Stall durch Räucherungen vertrieben. Da der Urmensch bei seiner Suche nach Nahrung oder nach Heilmitteln alles Pflanzliche in den Mund brachte, wurde er auch mit der Wirkung der Gewächse auf die Lebensvorgänge im menschlichen Körper bekannt. Narkotisch wirkende und giftige Kräuter (wie das Bilsenkraut) erscheinen ihm als Sitz geheimnisvoller oder böser Mächte. Selbstverständlich ist ferner, daß alte Nutz- und Kulturpflanzen (Feldfrüchte), von deren Gedeihen so viel für den Menschen abhängt, im volkstümlichen Glauben und Brauch hervortreten müssen. Schließlich darf nicht vergessen werden, daß nicht nur die Eigenschaften der Pflanzen an sich, sondern auch ihr Standort (etwa in der Nähe der menschlichen Siedelung) oder ihre außergewöhnliche Blütezeit (die ersten Frühlingsblumen genießen eine besondere Verehrung), die Gründe für eine besondere Wertschätzung werden können.

Wem die Blumen nichts anderes sind als »Naturgegenstände«, jeder säuberlich mit einem lateinischen Namen versehen und an einem bestimmten Platz des Systems eingereiht, ein solcher wird freilich die »Volksbotanik« als etwas recht Ueberflüssiges und Müßiges betrachten. Aber wer einmal die Lebenseinheit von Mensch und Pflanze in der Einsamkeit des Waldes oder inmitten einer blumigen Flur gefühlt hat, für den ist all der »unwissenschaftliche« Glaube, mit dem das Volk die heimischen Pflanzengestalten umgibt, kein ungeordnetes Haufenwerk von sonderbaren oder törichten Meinungen. »Aber es ist doch ein Unsinn zu glauben, daß man menschliche Krankheiten auf Bäume übertragen könne, ein Unsinn zu meinen, daß der Rauch des Wacholders die bösen Geister verjage«, meint mit überlegenem Lächeln der »Aufgeklärte«. Aber »Unsinn« kann doch wohl nur die willkürliche Erfindung eines Einzelnen sein. Was von so vielen Menschen der verschiedensten Länder und Zeiten geglaubt wurde, muß im Wesen des Menschengeistes begründet sein und ist daher der Erforschung wohl wert. Die Zusammenhänge, die der primitive Mensch zwischen den Pflanzen einerseits, den Naturerscheinungen oder dem menschlichen Leben andrerseits knüpft, sind recht oft nicht »logisch« im Sinne eines wissenschaftlichen Denkens. Sie sind aber nicht »unsinnig«, sondern liegen nur in einer anderen »Denkebene«, in der des assoziativen Denkens, das von dem Glauben einer

Einheit der ganzen Natur, der toten wie lebendigen ausgeht. Anderes volksbotanisches Gut legt wieder Zeugnis ab von der nimmermüden und schöpferischen Phantasie des Volkes; hierher gehören vor allem viele Pflanzensagen, Volksrätsel über Pflanzen u. a. Was aber viele Bauernregeln oder die Anwendung von Pflanzen in der Volksheilkunde betrifft, so steckt gewiß in manchen dieser Dinge ein Stück Wahrheit, auch wenn die heutige Wissenschaft keine Erklärung geben kann.

Heinrich Marzell
in »Die Pflanze im deutschen Volksleben«
(Bei Eugen Diederichs, Jena)

UNSERE NEUERSCHEINUNGEN

Der Weltgarten

ZWEITER BAND: Fritz von Oheimb

Gartenglück von heute

Mit 16 Bildern

In diesem kleinen Buch steckt ein großer und neuer Vorgang. Ein eben aus der Tiefe der Natur und der Kulturentwicklung aufgetauchtes Glücksgebiet, das Gartenerlebnis unserer Tage, ward hier schon deutsche Literatur. Ganz neuartige Gefühlsbrücken zum Gartenwesen und zur Pflanzenherrlichkeit aller Fernen und Nähen der Welt werden geschlagen.

AUS DEM INHALT: Gedankenreisen / Austrieb / Rhododendron / Päonien / Blütenknospen / Sommernacht / Steine / Seerosenteich / Japanische Schwertlilien / Ganz dahinten im alten Park / Herbstfärbungen / Oktobergang / Schmucknadelhölzer.

DRITTER BAND: Paul Landau

Gartenglück von einst

Mit 16 Bildern und Zeichnungen

Keine Geschichte der Gartenkunst! Vielmehr eine Schilderung der ewig jungen, ewig neuen Naturerlebnisse der Menschheit, gespiegelt in der wechselnden Stellung, die große Zeiten und große Persönlichkeiten durch die Jahrhunderte zum Garten eingenommen haben.

AUS DEM INHALT: Die Entdeckung der Blume / Antike Gartenfreuden / Unser Garten vor tausend Jahren / Vom Gartenglück der Renaissance / Die Wiederentdeckung der Blumenwelt / Im deutschen Renaissance-Garten / Das Heim im Grünen / Gartenhausleben von einst / Friedrich und sein Garten / Veitshöchheim / Goethe als Gartenfreund / Klassische Gartenidylle / Fürst Pückler / Brunnen im Garten / Der Kranz.

Preis jedes Bandes: In Pappband 3.– M, in Ganzleinen 4.– M.

NEUE POSTKARTEN-SERIEN

Vierfarbige Bildpostkarten

DRITTE SERIE:

Teppichphlox Phlox setacea Vivid / Clematis Jackmanni / Himalaja-Primel, Primula denticulata / Japanische Schwertlilie, Iris Kaempferi Pieter de Hooge / Nepal-Fingerkraut, Potentilla nepalensis Miß Willmott / Coreopsis grandiflora

VIERTE SERIE:

Magnolia Soulangeana / Flieder Edouard André / Japanische Scheinquitte, Chaenomeles japonica / Eberesche, Sorbus splendida / Chinesische Wildrose, Rosa Wilmottiae / Zierapfel Malus pumila × baccata

FÜNFTE SERIE:

Edelpelargonie / Alpenveilchen Rokoko-Cyclamen / Rittersiern, Amaryllis / Sterncinerarie / Rehmannia elata / Blattbegonie Olga Teupel

PREIS JEDER SERIE VON 6 POSTKARTEN 1 M. POSTFREI

Einfarbige Bildpostkarten

ERSTE SERIE:

Steingarten: Umbilicus spinulosus / Alpenwaldrebe, Clematis alpina / Zwergelfenbeinginster, Cytisus kewensis / Junibluher am Wasserloch / Schildsteinbrech, Saxifraga peltata / Treppe mit Astern

ZWEITE SERIE:

Gartenbilder: Gartenterrasse / Gartenterrasse mit Ginster / Aus Kloster Eberbach / Chinesischer Garten / Aus Fürstenstein / Brunnen im Generalife (Granada)

DRITTE SERIE:

Japanische Blumenkunst: Wistaria japonica / Aspidistra / Cytisus scoparius und Aster / Celastrus articulatus und Chrysanthemum / Wacholder mit Calendula / Wistaria und Ringelblume

PREIS JEDER SERIE VON 6 POSTKARTEN 50 Pfg. POSTFREI

POSTSCHECKKONTO BERLIN 76 290

Beim Besuch der Dresdner Jubiläums-Gartenbau-Ausstellung bitten wir unseren Raum (Halle 18) zu beachten.

VERLAG DER GARTENSCHÖNHEIT, BERLIN-WESTEND

Gartenschönheit

eine Zeitschrift mit Bildern

für Garten- und Blumenfreund · für Liebhaber und Fachmann

Juli 1926

in Gemeinschaft mit Karl Foerster und Camillo Schneider
herausgegeben von · Oskar Kühl
Verlag der Gartenschönheit G.m.b.H. Berlin-Westend

GARTENSCHÖNHEIT

EINE ZEITSCHRIFT MIT BILDERN

FÜR GARTEN- UND BLUMENFREUND / FÜR LIEBHABER UND FACHMANN
IN GEMEINSCHAFT MIT KARL FOERSTER UND CAMILLO SCHNEIDER
HERAUSGEGEBEN VON OSKAR KÜHL

Erklärte dauernde Mitarbeiter:

Gartenarchitekt GUSTAV ALLINGER, Dresden / GEORG ARENDS, Ronsdorf / Professor PETER BEHRENS / Garteninspektor BONSTEDT, Göttingen / FRANZISKA BRUCK, Berlin / Gartendirektor FRITZ ENCKE, Köln / Obergärtner M. GEIER, Homburg, Saar / Professor HECK, Direktor des Zoologischen Gartens Berlin / CLARA HELLER, Miltenberg / ERNST LUDWIG VON HESSEN / Gartenarchitekt REINHOLD HOEMANN, Düsseldorf / Oberinspektor HOLFELDER, Nymphenburg-München / PAUL KACHE, Dahlem / WILHELM KESSELRING, Nymphenburg-München / Gartenarchitekt HERMANN KÖNIG, Hamburg / Dr. ing. HUGO KOCH, Nerchau / BERTHOLD KÖRTING, Neubabelsberg / Oberhofgärtner KUNERT, Sanssouci / Dr. PAUL LANDAU, Berlin / Gartendirektor LUDWIG LESSER / EMIL LUDWIG, Heidelberg / HARRY MAASZ, Lübeck / WILHELM MÜTZE, Oranienburg-Schmachtenhagen / Garteninspektor E. NUSSBAUMER, Bremen / VON OHEIMB, Woislowitz / Gartenarchitekt KURT POETHIG, Charlottenburg / RUDOLF RÖBER, Wutha / Professor PAUL SCHULTZE-NAUMBURG / ALEXANDER STEFFEN, Pillnitz / MARGARETE STEUDEL, Stegliz / Gartenarchitekt H. FR. WIEPKING-JÜRGENSMANN, Berlin. *Österreich:* Gartenarchitekt FRANZ LEBISCH, Wien / Hofrat HANS MOLISCH, Wien / HERBERT Graf SCHAFFGOTSCH, Purgstall. *Tschechoslowakei:* Dr. FRANZ FRIMMEL, Eisgrub / Dr. WILHELM KRIECHBAUM, Pruhonitz / Gartenverwalter J. MIŠÁK, Malonya / ERNST Graf SILVA TAROUCA, Pruhonitz. / F. ZEMAN, Pruhonitz. *Ungarn:* ISTVAN Graf AMBROZY-MIGAZZI, Tana. *Rumänien:* ARPAD MÜHLE, Temesvár. *Schweiz:* Gartenarchitekt AMMAN, Zürich / HENRI CORREVON, Genf / Gartenarchitekt HEROLD, Zürich. *Holland:* J. F. CH. DIX, Assen / E. H. KRELAGE, Haarlem. *Dänemark:* Garteninspektor AXEL LANGE, Kopenhagen. *Schweden:* Dr. HENRY B. GOODWIN, Stockholm. *England:* GEORGE FORREST, Lasswade-Schottland / GUERNEY WILSON, Haywards Heath. *Nordamerika:* ALWIN BERGER, Geneva, N. Y. / JENS JENSEN, Chicago / ALFRED REHDER, Arnold Arboretum, Jamaica Plain, Mass. / RICHARD ROTHE, Glenside, Pa. / HEINRICH TEUSCHER, Morton Arboretum, Lisle, Illinois. *Südamerika:* SIEGFRIED DECKER, Sao Paulo, Brasilien.

7. JAHR / HEFT 7 JULI 1926

GARTENSCHÖNHEIT

eine Zeitschrift mit Bildern
für Garten- und Blumenfreund
für Liebhaber und Fachmann
in Gemeinschaft mit Karl Foerster
und Camillo Schneider
herausgegeben von Oskar Kühl

Inhalt des Juliheftes:

Seite

Das Blumentheater in Wörlitz / Bild . . . 169
Kurt Pöthig / Ein Einjahrsblumengarten / Mit 4 Bildern . . . 169
F. von Oheimb / Schlinger / Mit 2 Bildern 172
Sommerblüher / 6 Bilder . . . 174
Karl Foerster / Veronika im Garten / Mit 3 Bildern . . . 176
I. A. Purpus / Crassulaceen aus Mexiko / Mit 2 Bildern . . . 178
Norwegische Gärten / Mit 3 Bildern . . . 179
J. H. Mc. Farland / Neue Klasse amerikanischer Rosen / Mit 3 Bildern . . . 180
Camillo Schneider / Ein Heckengarten / Mit 3 Bildern und Zeichnung . . . 181
Hugo Koch / Ein alter Schloßgarten / Mit 4 Zeichnungen . . . 183
Karl Foerster / Gartengang Mitte Juni . . 186

Gartenaufgaben
Von der Dresdener Jubiläums-Gartenbau-Ausstellung / Zwei Pläne von Gustav Allinger . . . 187

Aus dem Blumengarten der Literatur
Sommernacht / Von Theodor Storm . . . 188

GARTENARBEIT UND BLUMENPFLEGE
Alexander Steffen / Der Spaten und sein Gebrauch II . . . 189
Fritz Lemperg / Temperaturbeobachtungen im Garten / Mit Zeichnung . . . 190
J. Köster / Blütennotizen . . . 194

Bepflanzungspläne
Kurt Pöthig / Einjahrsblumengarten / Mit Zeichnung . . . 191

Auf dem Balkon
Grete Höcker / Erfahrungen in der Balkonpflanzung / Mit Bild . . . 192

Die Blume im Gefäß
Pfingstrosen / Mit Bild . . . 193

Am Wege
Wilhelm Kriechbaum / Sortenwirrnis in Staudenkatalogen . . . 193

GARTENRUNDSCHAU
Neues aus aller Welt
Päonienausstellung in Boskoop / Luther Burbank / Die besten Steinbrech-Formen . 195
Neue Bücher
Blumengarten / Grabmäler / Praktische Düngerlehre / Obstbaumschnitt . . . 196
Chronik . . . 169
Zeitschriften . . . 196

BILDBEILAGE
Clematis Lasurstern

FARBIGE BILDBEILAGEN
Einjahrsblumengarten
Rittersporn und Gladiolen

Monatlich ein Heft

Bezugspreis für das Vierteljahr
in *Deutschland* 4 G.-M. und 0.75 G.-M. Versandkosten (Postscheckkonto Berlin 76290),

im *Ausland* einschließlich Versandkosten: 5.25 Goldmark = 1,25 U. S. A.-$ oder entsprechend in der Landeswährung.

Preis des Einzelheftes
1.50 Goldmark zuzüglich Versandkosten

Verlag der Gartenschönheit G.m.b.H.
Berlin-Westend / Akazien-Allee 14.

Tagetes, Ageratum und Petunien wetteifern im Blühen in dieſem Teile des kleinen Einjahrsblumengartens bei F. C. Heinemann, über den an anderer Stelle des Heftes geſprochen wird. Zu ihren einheitlichen Farben ſteht in hübſchem Gegenſatz das frohe Bunt der Löwenmaulſorten auf dem Randbeete im Hintergrund. Der Laubengang iſt überzogen von verſchiedenen einjährigen Schlingern, deren Feinheiten hier nicht hervortreten.

Das Gold der Tagetes und das tiefe Violettblau der Verbena venosa brandet gegen die roten Farbendämme der Salvien und Canna. Wenn man nur dieſes Salvien-Rot in einer Farbenaufnahme feſthalten könnte! Es iſt von einer fabelhaften Leuchtkraft, daß es in der Sonne das Auge blendet. Das Grün der hohen Canna bildet einen guten Hintergrund dazu. Sie ſelbſt prangen in einer neuen Schattierung darüber. – Bilder Biſſinger.

Das Blumentheater in Wörlitz. – Bild C. S.

Im Juli

KURT PÖTHIG / EIN EINJAHRSBLUMENGARTEN

WELCHER Garten- und Blumenfreund träumt nicht ſeinen Garten gern in den bunteſten Farben. An allen Ecken und zu allen Jahreszeiten ſoll es blühen in rot und gelb und blau und weiß, in buntem wildem Durcheinander oder in Beeten ſauber nach Farben zuſammengeſtellt. Doch für viele bleibt dies immer nur ein Traum, weil ſie glauben, daß dazu bedeutende Geldausgaben notwendig ſind. Wenn beim Gartenplanen der Beſitzer die Schönheit der grünen Raſenfläche gegenüber dem beratenden Gartenfachmann preiſt und »recht viel Raſen« wünſcht, ſo iſt es in den meiſten Fällen die Sorge um den Geldbeutel, aus der heraus er ſich dieſe »Schönheit« einredete. Es ſoll nichts gegen die Schönheit einer Raſenfläche eingewendet werden, aber unſere Hausgärten ſind doch deswegen zu oft ſo öde und langweilig, weil ſie eigentlich nur Raſenflächen aufweiſen, auf denen neben der dürftigen Grenzpflanzung ein paar Sträucher gewöhnlichſter Art ein trauriges Daſein friſten. In unſere Hausgärten gehören Blumen hinein! Und zwar neben Blütengehölzen, Roſen und Stauden auch Einjahrsblumen. Sie verurſachen im Vergleich zu den anderen die geringſten Ausgaben. Für wenige Mark bekommt man ſo viele Blumenſämereien, daß man große Flächen damit beſtellen kann, und für ebenſowenig Geld kann man beim Gärtner eine große Anzahl Einjahrsblumenpflanzen kaufen, die bei richtiger Wahl den ganzen Sommer hindurch das Auge mit ihren Blüten erfreuen.

Die Stauden haben ſich aus den Motiven des Bauerngartens heraus einen feſten Platz im modernen Garten erobert, aber die Einjahrsblumen, denen doch dort in dem bunten Farbenſpiel eine nicht minder große Rolle zugedacht iſt, ſind dem Hausgarten der Städter noch ziemlich fremd geblieben. Hier werden ſie allenfalls als Lückenbüßer zur Zwiſchenpflanzung in den Staudenrabatten verwendet, auf anderen Blumenbeeten findet man jedoch nur die üblichen Pelargonien, Begonien und andere Dinge, an denen man ſich doch eigentlich ſatt geſehen haben müßte. Es will ſcheinen, als wenn gerade die abgezirkelten Blumenbeete die Menſchen dem Garten ſo entfremdet hätten, die Bepflanzung wird beim Gärtner beſtellt, der ſchlägt jahraus jahrein die üblichen Handelspflanzen vor, die er als guter Geſchäftsmann führt, und der Beſitzer weiß im voraus ganz genau, wie ſeine Blumenbeete ausſehen werden. Da gibt es keine Erwartungen und keine Überraſchungen in der Wirkung, allerdings – auch keine Fehlſchläge. Aber gerade in dem Ringen mit dem Werkſtoff des Gartens um ſeine Formen- und Farbenwirkung liegt doch ein weſentlicher Reiz für die Betätigung im Garten. Statt der Blumenbeete ſollte man Blütenbeete und -flächen ſchaffen, Flächen, die in ihrem Rahmen und in der großen Form wohl feſtliegen, deren Unterteilung aber jederzeit gewechſelt werden kann. Hier kann ſich nun der Gartenfreund ganz nach ſeinem Geſchmack und nach ſeiner Laune betätigen. In einem Jahre wird er vielleicht mit den maſſigen Farbenwirkungen arbeiten, die mit den Einjahrsblumen viel leichter und billiger zu erzielen ſind als mit den Stauden. Er wird dabei vor allem die niedrig bleibenden Sorten verwenden und außerdem ſolche, die ohne Vorkultur gleich an Ort und Stelle geſät werden können: Alyssum Benthamii, Calendula, Clarkia, Convolvulus, Matricaria, Tagetes und andere. Dabei wird jeder Blumenfreund mit Erſtaunen feſtſtellen, welche Farbenſtimmungen den Einjahrsblumen innewohnen. Man findet Arten, deren Farben an die Biedermeierzeit erinnern wie etwa Dianthus barbatus oder Phlox Drummondii, und wieder andere, die mit den Phantaſieſorten der modiſchſten Damenſtoffe wetteifern können, wie viele Delphinium, Tropaeolum und ähnliche. Im nächſten Jahre wird ſeine Blütenfläche auf intereſſante Blütenformen abgeſtimmt ſein. Es gibt unter den Einjahrsblumen eine große Menge Gattungen mit bizarren, aſymetriſchen Blütenformen, die im Staudenreich nicht ihresgleichen haben. Es ſei nur an die Gattungen Mimulus, Salpiglossis, Schizanthus, Nemesia oder Clarkia erinnert. Ein andermal wird er vielleicht aus ſeiner Blütenfläche einen kleinen Bauerngarten hervorzaubern und Freude an dem wilden Durcheinanderwachſen und -blühen erleben. Dabei laſſen ſich derartig bunt durcheinandergepflanzte Flächen durch unregelmäßig verſtreute Trupps von Sonnenblumen, Malven und ähnlichen auffallenden Erſcheinungen zu einer einheitlichen Wirkung zuſammenziehen. So gibt es eine Anzahl Möglichkeiten, Blütenbeete und -flächen zu ſchaffen, deren Entwickelung der Beſitzer nicht gleichgültig, ſondern mit täglich ſich ſteigernden Erwartungen entgegenſieht, weil er immer wieder Überraſchungen im ſtändigen Wechſel der Entwickelung, des Erblühens und Vergehens der mannigfaltigen Formen und Arten erlebt.

Aber auch der Gärtner muß von ſich aus daran arbeiten, den Blumen-

freund und Gartenbeſitzer mit den Einjahrsblumen mehr bekannt zu machen als bisher. Die Pflanzenzüchter haben auf dieſem Gebiete eine Arbeit geleiſtet, die dem großen Publikum faſt völlig unbekannt iſt. Aus ihren Katalogen iſt dieſe Arbeit ſicher nicht zu erſehen; ſie ſind mit ihrer Unzahl ſpezialfachmänniſcher Namen und Bezeichnungen alles andere als eine Werbeſchrift für die Einjahrsblumen. Ganz beſonders ſchlimm ſcheint es mir in dieſer Beziehung bei den ſogenannten Sortimentsblumen zu ſein. Da gibt es beiſpielsweiſe bei den Aſtern: Kometen, Amerikaniſche Buſch, Viktoria, Pariſer Markt, Hohenzollern, Rekord, Päonien, Straußenfeder und Chryſanthemumaſtern. In jeder Gruppe kommen dazu noch die Farbenſorten und die Wuchsformen. Bei den drei zuletzt genannten Sorten kann der Laie vielleicht aus dem Namen auf die Blütenform ſchließen. Was ſoll er aber mit den anderen Bezeichnungen anfangen? Oder welcher Unterſchied beſteht für den Nichtfachkundigen zwiſchen Erfurter und Dresdener Sommerlevkojen, zwiſchen Land- und Gartennelken? Das ſind Bezeichnungen für Zuchtraſſen, die nicht einmal dem Gartenfachmann geläufig ſind, wenn er nicht Spezialiſt auf dieſem Gebiete iſt. Solange es nicht gelingt, für alle dieſe Dinge einheitliche, gut charakteriſierende Bezeichnungen zu finden, wird der Samenzüchter gut tun, ſeinem Betriebe einen Garten anzugliedern, in dem er die Einjahrsblumen als Anſchauungsmaterial vorführen kann. Aus dieſer Erkenntnis heraus hat die Erfurter Samenzuchtfirma F. C. Heinemann auf unſere Anregung in ihrem Betriebe einen Einjahrsblumengarten geſchaffen, der einmal dem Publikum das Einjahrsblumenmaterial vorſtellen, zum anderen aber auch dem Fachmann Gelegenheit geben ſoll, Farbenzuſammenſtellungen und andere Verwendungsmöglichkeiten als die bisher üblichen, auszuprobieren. Der rund 500 Quadratmeter große Garten liegt an der Weſtſeite des Wohnhauſes zwiſchen dieſem und der Gärtnerei. Im Süden wird er von einem etwa vier Meter hohen Schuppen begrenzt; den Abſchluß nach Weſten und Norden bildeten ehemals Spaliere aus Fichtenſtangen. Außerdem waren vorhanden und mußten erhalten bleiben: die Hainbuchenlaube vor dem weſtlichen Spaliere, die Bäume und die Pergola vor dem Wohnhauſe. Hinter dem Spaliere an der Nordſeite befand ſich ein toter Winkel, der zum Abſtellen von Geräten benutzt wurde. Im übrigen beſtand der Garten nur aus einer großen Raſenfläche mit einem Verbindungsweg vom Hauseingang nach der Hainbuchenlaube. Es galt nun, einen Garten zu ſchaffen, der den oben angedeuteten Zwecken dienen ſollte, der aber auch als Hausgarten für den Beſitzer eine gewiſſe Wohnlichkeit nicht vermiſſen laſſen durfte. Ferner mußte darauf geſehen werden, daß einzelne Teile für Anſchauungsmaterial herausphotographiert gute Bilder ergaben. Wie die Löſung dieſer Aufgaben verſucht wurde, iſt aus dem Grundplan (Seite 191) erſichtlich. Der ehemalige Sitzplatz an der Pergola wurde als Kinderſpielplatz umgewandelt und unter den großen Birnbaum verlegt.

Der Kinderſpielplatz iſt mit immergrünen Gehölzen umpflanzt. Die Schuppenwand iſt an der Gartenſeite mit Epheu überſponnen; davor liegt eine ſchmale, mit wintergrünen Farnen bepflanzte Rabatte. Das Spalier an der Weſtſeite bildet den Abſchluß gegen die Gärtnerei und bleibt, ebenſo wie die davorliegende Hainbuchenlaube, in ſeiner bisherigen Form erhalten. Das Spalier an der Nordſeite erhält außer fenſterartigen Öffnungen drei Eingänge und wird nach dem toten Winkel zu als Laubengang in einfachſter Konſtruktion aus Kiefernſtangen ausgebaut. Von hier bietet ſich aus dem dunklen Schatten heraus ein ſchöner Blick in den ſonnigen und farbendurchglühten Garten. Das weſtliche Spalier und der Laubengang werden von einjährigen Schlinggewächſen berankt wie: Cobaea scandens, Eccremocarpus scaber, Humulus japonicus, Mina lobata und ähnlichen. Als Gegenſtück zum achteckigen Sitzplatz unter dem Birnbaum wird ein kleiner Brunnenhof von der gleichen Form vorgeſehen, der mit Kalkſteinplatten ausgelegt iſt. Der Brunnen ſelbſt iſt aus Klinkern erbaut; das Waſſer ſpringt in einem glockenförmigen Springſtrahl. Die Flächen zwiſchen dem inneren und äußeren Umgangsweg ſind als Blumenrabatten ausgebildet. Hier ſollen die höherwachſenden Einjahrsblumen wie Antirrhinum, Delphinium, Papaver, Delphinium, Godetien und andere in bunter Farbenmiſchung Platz finden. Dagegen ſollen auf dem Mittelſtück die niedrigbleibenden Arten nach Farben geordnet angepflanzt werden. Es iſt in Bänder und Flächen aufgeteilt, die durch Raſen- oder Kiesſtreifen voneinander getrennt ſind, um vielſeitige Bepflanzungsmöglichkeiten zu erhalten. Durch eine flache Raſenböſchung (4) zwiſchen dem Blumenband (5) und dem Kiesſtreifen (3) iſt die mittlere Beetfläche um 30 Centimeter vertieft gelegt. Der dadurch gewonnene Boden wurde zum Auffüllen der Laubengangfläche benötigt.

Im Bepflanzungsplan waren eine Frühjahrs- und eine Sommerbepflanzung vorgeſehen. Von der Frühjahrsbepflanzung mußten vorkultiviert und darnach an den richtigen Platz geſetzt werden: Viola, Myosotis, Silene pendula und Bellis perennis, während Saponaria multiflora, Hyazinthen-Ritterſporn, Papaver und Erysimum Perofskianum zum Teil ſchon im Herbſt gleich an Ort und Stelle geſät wurden. Die Sommerbepflanzung wurde ausnahmslos im Saatbeet vorkultiviert und erſt dann an den vorgeſehenen Platz geſetzt. Aber auch hier hätte ſich bei entſprechender Einteilung eine gute Farbenwirkung durch Ausſaat geeigneter Arten an Ort und Stelle erzielen laſſen.

So iſt in dieſer Anlage der Verſuch gemacht, einen kleinen Hausgarten als bunten Einjahrsblumengarten zu geſtalten. Wenn es hier durch Verſuche gelingt, für die Einjahrsblumen neuartige praktiſche Verwendungsmöglichkeiten und Zuſammenſtellungen zu finden und ſie dem Gartenfreund bekannt zu machen, damit ſie in ſo großer Zahl in unſere Gärten Eingang finden, wie ſie es verdienen, dann hat die Anlage die ihr zugedachte Aufgabe erfüllt.

F. VON OHEIMB / SCHLINGER

HIERHIN und dahin, herauf und herunter ſchaukelts und ſchwingts vor meinem Fenſter, dort rankt am Balkongitter eine Wiſtaria ſinenſis, Glycine, wie man ſie bisher zu nennen pflegte, ein ſchönſtes Sonnenkind, im Frühjahr mit ſeinen langen, wundervollen Blütentrauben, von blauviolett über roſa bis zu weiß. Damals, als ſie uns durch ihre Blüten den rechten Lenzesgruß brachte, dachte ſie noch garnicht an ihre jetzige Tätigkeit. Jetzt ſtreckt ſie überallhin zuerſt ihre kurzen, nun aber länger und länger werdenden Ranken. Wie die Traube in ſchönſter Regelmäßigkeit ſich verjüngt in ihren Farben, ſo verjüngt ſich nun der Blätterſchmuck dieſer Ranke von braunen bis in lichtgelbe ſeidne Blättchen, von großen bis in winzig kleine Fiederchen, bis ſie zuletzt ganz nackt, ſcheinbar planlos weit in die Luft hinaus wankt. Wie ſich doch dieſe kahlen, faſt durchſichtigen Ranken hierhin und dahin drehen und biegen, in ſchwingenden Bewegungen oft zueinander finden. um ſich dann nie wieder loszulaſſen!

Die eine Ranke am Eiſengitter beobachtete ich täglich mit Freude. Sie hat erſt keck hinaus und nach oben geſtrebt, allerlei Verkrümmungen und Zirkel gebogen und dann weit draußen wieder Umkehr gehalten, ſich pfropfenzieherartig an ſich ſelbſt zurückgeleitet und endlich das feſte Gitter erreicht. Schon zwei Tage ſpäter wickelte ſich die Ranke feſt um einzelne Stäbe des Gitters, und nun dient ihre ſchwebende Schlinge da draußen ſchon wieder ihren Kameradinnen zur Stütze. Wieder iſt ein gutes Stück am Balkon gewonnen und von ihrem jetzt geſicherten Halt aus greift ſie einer dünnen Schlange gleich weiter und weiter. Ich ſehe ſie faſt lebendig vor mir.

Hydrangea petiolaris im Arnold Arboretum. – Bild C. S.

Die Ranke ſieht nichts, hört nichts, riecht nichts, und doch hat ſie einen feinen Sinn für die von dem Eiſen oder einem Holzpfahl zurückgeſtrahlte Hitze, und dieſer Hitzwelle geht ſie lebhaft nach. So lange ſie nackt und durchſichtig ausgeſtreckt war, hatte ſie weit draußen das Empfinden von kühlerer Luft und unangenehmen Winden, da war es doch an ihrer Urſprungsſtelle am ſonnigen Eiſengitter ſehr viel ſchöner und wohliger, da beſchließt ſie eben Umkehr und läuft an ſich ſelbſt mühelos zurück.

So lieblich ſie faſt den ganzen Sommer hindurch ausſieht, ſo bedrückend und beklemmend ſind mir immer ihre Umſchlingungen, es iſt ein unbarmherziges Würgen und Erwürgen, ein erſtickendes Umſtricken des einen Triebes um den Leib des anderen, mit dem ſie zufällig draußen zuſammenkommt, der die arme Antilope darſtellt, die von einer Rieſenſchlange umwunden, erdrückt und erſtickt und ſo lange gepreßt wird, bis ſie in den Rachen des Würgers hineinpaßt.

Die Wiſtarie kann armſtarke Seile treiben, viele viele Meter hoch, immer wird ſie ſich dabei elegant und zierlich zeigen. Ihr ähnlich treiben es gar viele Pflanzen in feuchtwarmer Urwaldheimat, aber viele auch bei uns in kühleren Zonen. Da iſt an Blütenfülle und lieblichem Duft jener faſt ebenbürtig, aber weit kleinlicher und unanſehnlicher, das alte gute Jelängerjelieber, das Gaisblatt, Caprifolium, das man ſich ohne Voſſens Luiſe, ohne den ſilberhaarig guten alten lächelnden Paſtor mit Käppchen und Schlafrock und der ein bis eineinhalb Meter langen Studentenpfeife, *ſeinem* Jelängerjelieber, garnicht vorſtellen kann. Es iſt ſo recht die Verkleidung der Laube aus der Biedermeierzeit, in der die Mutter mit weißer faltiger Haube und der Kaffeekanne, *ihrem* Jelängerjelieber, waltet. In der Jetztzeit iſt das wirkliche Jelängerjelieber ſeltener geworden, in die Vorſtadt in die Schrebergärten gezogen. Die Wiſtarie, die tiefdunkle Actinidia polygama, der Strahlengriffel, mit ihrem glänzenden Lederblatt und roten Kirſchenfrüchten, die Actinidia chinenſis wundervoll in ihrem rotſeidenhaarigen Stielen und Blättern und hübſchen hellen Blüten, die tollrankende Akebia quinata haben das arme Jelängerjelieber verdrängt. Nicht zuletzt die prächtig farbenglühenden Rankroſen.

Ich muß ſagen, daß ich dieſes Verdrängtwerden billige, denn das gute Jelängerjelieber iſt eine Herberge für unzählige Spinnen und Raupen. Seine Blätter müſſen auch für dieſe ſehr guten Salat geben; ganz beſonders aber iſt es von Blattläuſen in jeder Altersſtufe befallen. Da ſeine Blätter matt und rauh gegenüber denen anderer Schlinger ſind, nehmen ſie auch viel Straßenſtaub auf und wirken bleichſüchtig und ſtaubig. Neuerdings wird auch die eigentlich ſo vornehm ſich gebende Ariſtolochia Sipho in der Stadt oder an der Straße, auch aus gleichem Grunde wie der zuletzt angegebene durch die Wiſtarien und andere Schlinger verdrängt. Ihre oft rieſigen und ſchön geformten Blätter ſind zu rauh und runzlig und nehmen des Straßenſtaubes zu viel auf. An Landhäuſern mit großen Formen und deren wuchtig einfachen Vorbauten paſſen dieſe wirklich vornehmen, bis in die höchſten Stockwerke ſteigenden chineſiſchen Lianen ganz wundervoll hin. Freilich müſſen ſie Spaliere, geſpannte Drähte oder eingeſchlagene Haken finden, wie alle genannten Schlinger.

Ein im glänzenden Blatt der Wiſtarie ähnliche ſchlingende Schmuckpflanze beſitzen wir in der Tecoma (Campſis) radicans mit ihren ſchönen, großen, orangegelben, dem Fingerhut oder der Gloxinie ähnlichen Tubenblüten, in die das Auge wie in einen roten Schlund hineinſehen kann. Ich liebe ſie ſehr, und intereſſant iſt der edle Wettſtreit ihres kräftigen Wuchſes mit der Glycine. Dieſe Bignonia iſt wohl ein Schlinger, aber kein Würger, ſie ſchlingt wohl an anderen Lianen, Gittern, Zäunen, aber ihre Ranken würgen ſich und anderes nicht ſo. Dagegen kann dieſe wie die Wiſtarie und Ariſtolochia darin ſchädlich werden, daß ſie ſich hinter und zwiſchen Dachrinnen und Wand und Dach hindurchquetſcht und ſie verbiegt oder abſprengt, weil die erſt dünnen Ranken mannsſtark werden können.

Clematis Lasurstern

Wenn dieſe Schlinger alle nur einigen Halt durch Drähte oder ähnliche Vorrichtungen finden, klettern ſie bis zu den höchſten Stockwerken und gucken neugierig in jedes Fenſter. Aber auch in manch Vogelfamilienleben ſehen ſie da oben unter Dachrinne oder Grünem. Hier iſt der Ort, wo Sperling und Amſel ſicher vor aller ſtädtiſchen Polizei und ländlichen Katzenfeinden in Menge hauſen und brüten, wo Tauſende von jungen Sprößlingen auskommen und heimiſch ſind, denn dort obenhin wagt ſich auch kein noch ſo frecher Straßenjunge. Darum nehmen auch die Amſeln mehr und mehr Beſitz von Städten und Gärten, die bis vor vierzig Jahren nur den Wald- und Buſchrand kannten, wo ſie früher als Krammetsvögel in Dohnen gefangen wurden. Ganz neuerdings kehren ſogar Sing- und Weindroſſeln in Gärten und ſtädtiſchen Anlagen ein und dürften den Beeren und Nachtigallen ebenſo ſchädlich werden wie ihre ſchwarzen Geſchwiſter. Seit dem Dohnenfangverbot mehren ſich auch die Strichvögel augenſcheinlich.

Weiter ſind unter die Lianen der gemäßigten Zone zu rechnen die bereits erwähnten Strahlengriffel, Actinidia chinensis, Kolomikta und polygama. Man könnte die drei wirklich nicht als Geſchwiſter anreden, aber alle ſind arge, rückſichtsloſe Schlinger und Würger. Es iſt eigenartig, wie ſich ihre vielen, ſchön verjüngten und ſchließlich ganz blattloſen Ranken ſuchend nach einem Halt hin und her biegen und ſich bei gegenſeitigem Begegnen feſt ineinander verknoten, um wahre Luftſchaukeln und Hängematten zu bilden. Ähnlich treibt es die Akebia quinata aus Oſtaſien, die aber feiner, weicher ſchlingt und nicht würgt. Auch ſie ſieht bei ihrem mächtigen Klettern neugierig vielen Menſchen in die Fenſter. Hier iſt ſie an einem die Hauswände umkleidenden Veitch's Wein, Parthenocissus tricuspidata, hinaufgeklettert und unterbricht anmutig deſſen ſonſt etwas langweilige Glätte. Ihre braunbläulichen Blütentrauben bringen einen eigenartig wechſelnden Ton in ihr nettes Grün; aber ſie wird leicht etwas wirr.

Noch wirrer und dabei leider viele trockene Blätter und Ranken bildend, iſt das jetzt viel angepflanzte Polygonum baldschuanicum, nur zierend durch ſeine lockeren weißen Blütentrauben. Dieſes wieder kann einer der fürchterlichſten Würger werden und eine Baumkrone förmlich verfilzen. Weit ſchöner in ſonniger Lage wird ein mehr ſtaudiger Verwandter, Polygonum cilionode, ein überaus zierliches Sonnenkind mit gelbrot metalliſchen Stengeln, die ſich ganz wundervoll genau verjüngen bis ins allerkleinſte Knötchen, das einmal ein Blättchen werden will. Die Blätter ſind dreikantig, fein zugeſpitzt, pfeilförmig, und die Blütenträubchen auch allerliebſt. Schade, daß man es ſo ſelten ſieht, dies hoch hinauf kletternde und in regelmäßigen Abſtänden ſeine Arme wagrecht ausſtreckende Geſpinſt.

Das Bild einer Urwaldliane zeigt uns dagegen die Hydrangea petiolaris oder scandens, die an glätteren Stämmen aufklimmt und ihren Stamm mit großen, flach anliegenden, glänzenden Blättern ſchildartig verdeckt. Unſer Bild zeigt ſie an einer Hauswand.

Der Baumwürger, Celastrus, hat wieder die beſtialiſch grauſame Luſt am Würgen, wenn er ſonnig wuchern kann; er umſtrickt und umſchnürt jeden erreichbaren Aſt, und wäre es ſein eigener und ruht wohl nicht, bis er ihn abgewürgt hat.

Unter den großen Schlingern würde ich nur noch die ſüddeutſche Waldrebe, Clematis Vitalba, anführen, wenn ſie auch mehr Spinne genannt werden ſollte. Zu gelenkſtarken Stämmen kann ſie es auch wohl bringen, und dieſe können ihnen Begegnendes auch feſt umſpannen, kaum aber würgen. Dagegen tötet ſie leicht ganze Büſche und Sträucher durch völliges Überziehen, Überſpinnen. Sie iſt ſo recht ein Kind ſonniger warmer Lehnen und Halden, hält aber auch noch in ſtarkem Halbſchatten bei genügender Bodenwärme aus und duftet aus ihren Millionen von elfenbeinfarbigen Blütchen, die nachher in metalliſchglänzende Samenkopfbüſchel ausreifen. Was ſie überzieht, das deckt ſie ſo kräftig ein, daß die Oberfläche einer brokatgewirkten Silberdecke gleicht, die Wochen hindurch von wunderbarer Schönheit iſt. Sie pflanzt ſich durch ihre weithin fliegenden Samen ſo ſchnell fort, daß ſie leicht zum größten Unkraut wird. Ähnlich die gelbblühende Clematis graveolens. Weit edler und ſchöner ſind drei Geſchwiſter von ihr: Clematis montana mit herrlich duftenden, unzählbaren roſa und weißen Blüten und C. (Atragena) alpina, in lichten hellblauen, langzipfligen Einzelblüten, die weit ſeltener im zeitigen Frühjahr blühen, auch weniger ranken. Beide Ranker, ſowie die noch reizvollere Glöckchentrauben auf langen Stielen bringende Clematis nutans, ſind wunderhübſche Wildſchlinger. Zumal C. alpina wird manchem Alpenwanderer liebe Erinnerung wecken; ich fand ſie auch in Ungarn, ganze Hecken in der Sonne bildend, während ſie hier eher ſchwach treibt. Etwas höher werden in günſtiger Lage vielleicht noch die italieniſchen Verwandten, die Clematis Viticella und deren Kulturformen wie La Pourpre oder M. Koſter. Ihre vierblätterigen, geſpreizt offenen Blüten an wagerechten Stielen bilden hängende Glöckchen in verſchiedenen Farben. Auch ſie können bei üppigem Wucher Sträucher überziehen und töten.

Tecoma radicans. – Bild Biſſinger

Alle dieſe Schlinger haben aber eben auch die große Schönheit miteinander gemein, dort wo ſie ſich ſo recht entwickeln können, und der Schönheit verzeiht man ja alles. In Schönheit wandeln ſie auch alle oft unſchönen Stellen, ſchaffen hängende Flächen, ganze Segel und Vorhänge mit fein darüber ausgeſtreuten Blütenmaſſen und herrlichen Farben oder metalliſchglitzernden Samenköpfchen.

Und nun noch ein großer Nutzen all dieſer kleineren Schlinger im Garten. Faſt alle heißen Tauſende von kleinen Singvögeln willkommen und bieten ſich ihnen als Hütten wie Paläſte an. Längſt iſt man darüber unterrichtet, daß die Weibchen all dieſer niedlichen nützlichen Sänger die Nähe ihrer Geburtsſtätten zum Neſtbau wieder aufſuchen. Die viel freizügigeren Männchen aber kommen ſchon rechtzeitig von weit her zu ihren ſpäteren Bräuten und Frauen, ſo daß immer wieder neue Blutauffriſchung entſteht. Staunenswert iſt die Sicherheit, mit der der heimkehrende ſchwirrende Zaunkönig, das Schwarzblättchen, die Grasmücke, der Gartenlaubvogel, wie ein abgeſchoſſener Pfeil das winzige Eingangsloch in die Schlingerdecke findet, und drinnen muß doch immer noch die Schwungkraft wirken, damit der Vogel ohne Flügelſchlag zum Neſt gelangen kann. Ja, die Heimreiſe kann garnicht ſchnell genug ſein, um die vier bis fünf gelbgeſäumten Schnäbelchen ſtill und ſatt zu bekommen.

Darum baut Siedlungen für unſere luſtigen, immer hungrigen Muſikanten des Gartens und der Wieſen, indem ihr an geeigneten Sonnenplätzen recht viele Schlinger an wertloſe Sträucher pflanzt. Auge und Ohr gewinnen und die Inſektenlarven verlieren dadurch; ſolche Hecken werden die Vogelfreunde nur gutheißen. Auch auf von Berlepſch's Vogelſchutz-Büchlein ſei bei dieſer Gelegenheit immer wieder hingewieſen. Jeder Gartenfreund braucht es.

Diese Riesen-Senecio aus China, die zur Gruppe Ligularia gehören, haben sich im Laufe der letzten Jahrzehnte schon einen Platz in unseren Gartenanlagen zu erobern gewußt. Der abgebildete S. Veitchianus und der ihm in der Tracht so ähnliche S. Wilsonianus gehören zu den stärksten harten Schmuckstauden.

Unter den Königskerzen gibt es jetzt Bastarde verschiedenen Ursprungs. Mit ihren teils lachsfarbenen, teils eigenartig isabellfarbenen, bräunlichen oder gelblichen Blütenkerzen, wie bei dieser densiflorum-Form, erfreuen sie uns gerade im Sommer durch lange Wochen in überraschender Weise. – Bilder C. S.

Der Turkestan-Lauch, Allium karatawiense, gehört unter den ornamentalen Lauchformen, die im Sommer blühen, zu den eigenartigsten. Aus den großen Zwiebeln kommen breite, metallischgrüne Blätter empor und die Blütenstandkugeln wirken auch noch während der Reifezeit der Früchte zierend. – Bild A. Seeger

Die hier dargestellten Nelken gehören zu einer Gruppe der von Dianthus Caryophyllus abstammenden Formen, die man in England als „Border-Carnations", Rabatten-Nelken, bezeichnet. Das linke Bild zeigt die beste weiße Form Snowline, eine sehr blütenreiche Sorte. Rechts ist die ebenfalls sehr geschätzte gelbe Viceroy dargestellt. Der Züchter ist James Douglas. Wer diese Nelkengruppe einmal versucht hat und ihnen die richtigen Bedingungen zum Gedeihen gibt, wird sie sehr schätzen lernen. – Bilder R. A. Malby.

Unter den bei uns noch kaum bekannten spätblühenden Enzianen, die der Gentiana septemfida nahestehen, ist die im Bilde aus den Ruys'schen Kulturen in Dedemsvaart gezeigte G. lagodechiana von besonderem Reize in ihrer reinen himmelblauen Färbung, die dann besonders entzückt. – Bild C. S.

Veronica repens. – Bild Zörnitz

Veronica spicata. – Bild Stoff

KARL FOERSTER / VERONIKA IM GARTEN

DIE Gattung Veronika bedeutet für den Garten, ſoweit es ſich um Stauden-Veronika handelt, Entfaltung reiner blauer Farben auch an trockenen Stellen, und zwar vom Frühling bis zum Spätſommer. Der Name Veronika und auch der deutſche Name Ehrenpreis oder Männertreu klingt ſo volkstümlich, und doch trifft man die vielen edlen Vertreter dieſer Gattung trotz ihrer völligen Anſpruchsloſigkeit außerordentlich ſelten im Garten.

Der ſchöne Klang jener Namen nimmt gewiſſermaßen die Volkstümlichkeit, Verbreitung und Hochſchätzung künftiger Gartenepochen ſchon vorweg und wirkt ſo doch ſchließlich als Schrittmacher für ihr künftiges Gartenleben.

Die zehn Kennworte für die Erſchließung dieſer Gartenſchätze ſind bisher nur in fremder Sprache feſtgelegt. Die deutſche Taufe iſt nicht leicht. Aber wenn man noch ein paar Jahrzehnte damit wartet, wird ſie auch nicht leichter. Statt des Wortes Ehrenpreis könnte man ſchon lieber Veronika ſagen. Alſo:

Veronica filiformis – Vorfrühlingsveronika
V. saxatilis – Felſenveronika
V. armena – Armeniſche Veronika
V. rupestris – Enzian-Veronika
V. Shirley blue – Shirleyveronika
V. candida – Silberblattveronika
V. Hendersoni – Spätſommerveronika
V. repens – Moosveronika.

Blütezeiten:
Veronica filiformis, Ende März bis Ende Mai
Veronica armena und Veronica saxatilis, Mitte April bis Mitte Mai
V. repens, bis Ende April
V. prostrata pallida, bis Ende April
V. p. coerulea, bis Ende April
V. p. coelestina, Mitte April bis Mitte Mai
V. rupestris Ende Mai bis Juni
V. latifolia Shirley's blue, Anfang Juni bis nach Mitte Juni
V. candida, Mitte Juni bis Juli
V. spicata, Ende Juni bis Ende Juli
V. Hendersoni, Ende Juli bis Ende Auguſt.

Reine ſtarke Blaus haben armena und saxatilis, prostrata coerulea, rupestris, latifolia, Shirley's blue. Die andern gehen nach lila oder blaßblau hinüber.

Wer dieſe Pflanzen in ſeinem Steingarten oder Frühlingsgarten, oder an ſeinen Beeten als Einfaſſung, oder im Schnittblumengarten einige Jahre beſitzt, verwächſt ſo mit ihnen, daß er ſie für ſein Gartenleben durchaus braucht und das Fehlen eines von ihnen nicht nur als Gartenlücke, ſondern auch als kleine Lebenslücke empfindet.

Statt der wirklich edlen Veronika-Arten ſind bisher meiſtens langweilige oder unordentliche in den Gärten verbreitet.

Die Veronica latifolia-Gruppe liegt als altes Gewächs meiſt halb am Boden. Auch ſind ihre Riſpen und Einzelblüten mit der ge-

Veronica rupestris. Bild K. F.

Ritterſporne und Gladiolen, vom weichen Lichte des ſcheidenden Tages umwoben, gegen grün überſponnene Wand. Vollſter Ausdruck des ſommerlichen Blumenlebens. Friſche heitere Bläue vermählt ſich mit Alabaſterweiße. Jede Blume ein Höhepunkt ihrer Raſſe in Farbe und Form. Sie ergänzen einander und bilden doch nur einen Ausſchnitt aus dem reichen Gartengemälde des Sommers. – Bild Stiller.

drungenen, tief dunkelblauen Shirley blue garnicht zu vergleichen. Von Veronica rupestris ſind ſchlechte lila Formen im Handel. Weit verbreitet iſt Veronica gentianoides, obwohl gar kein Grund dafür beſteht. Sie iſt eine ganz unangenehme, langweilige Perſon, in der Disproportioniertheit ihres 20 Centimeter hohen Blütenſtieles und in ihrem vorzeitigen unteren Verblühen an Hirtentäſchelkraut erinnernd, das ſchon verblüht ausſieht, ehe es recht blüht. Auch durch die weißgerandete Form iſt das nicht wieder gutzumachen. Ich glaube, ich habe ſie früher empfohlen, als die Anſprüche noch geringe waren. Bitte alſo tauſendmal um Entſchuldigung.
Die hohe Veronica virginica iſt eine ganz tolle Giraffe, für deren weiße Form ich wegen einiger intereſſanter Linien und Architekturen früher eine gewiſſe wohlwollende Duldung hatte, doch iſt ſie nun hier als zu unweſentlich ausgemerzt worden.
Aus der spicata-Gruppe gab es bis jetzt nur umfallende, halb am Boden kauernde Arten. Dasſelbe galt meiſtens von ihren roſa Formen. Beide ſind nun in ſtraff gebauten Raſſen vorhanden.
Man kann manchen etwas beſcheideneren Gewächſen durchaus keine Elemente von Unordnung zubilligen und zu Gute halten. Ihr eigentlicher Gartenſinn, die ganze Munterkeit ihres Weſens geht durch ſolche erdenſchweren Fehler verloren.
Die Veronika aus der latifolia- und amethystina-Gruppe waren als alte Pflanzen durchaus nicht für ſtramme Haltung zu haben, ſondern lagerten und fielen auseinander. Die Veronica latifolia Shirley blue mit ihrem etwas niedrigen, nur 20 Centimeter hohen Wuchs und ihrer feſtgeordneten Geſamtgeſtalt bei außerordentlich geſteigerter Blütenſchönheit wirkt wie eine Erlöſung. Es iſt, als ob man ſich ſelber einen Fehler abgewöhnt. Alle dieſe Natur- und Züchtungsvorgänge und Fortſchritte wirken tiefe Kräfte aus und helfen uns vorwärts.
All dieſe Veronika ſind ſo unglaublich verſchieden voneinander, abgeſehen von der zeitlichen Verſchiedenheit ihres Flors, daß gar keine Rede davon ſein kann, irgendwelche von ihnen entbehren zu können.
Nun zu näherer Beſchreibung der einzelnen Arten:
Veronica filiformis, Vorfrühlingsveronika. Wenn man davon eine nicht ſehr große Pflanze ſetzt, ſo erfreut uns ſchon nach zwei Jahren Ende März ein noch nicht fünf Centimeter hohes, Halbquadratmeter großes Blütenpolſter in leuchtend blau-weißen Tönen. Dieſe Polſter ſind immergrün. Die Pflanze kriecht weiter, bewurzelt ſich ſofort und iſt maſſenhaft zu vermehren. Läſtig wird ſie nie. Sie gehört in den Vorfrühlingsgarten, in den Steingarten, auch in Naturgartenpartien und ſieht überhaupt unglaublich deutſch und treuherzig aus. »Da biſt du ja, ich wußte es doch, daß es dich geben müßte«. Reizende Nachbarn finden ſich in Maſſen für dieſen vermittelnden Farbenton. Ich ſuche in meinem Garten immer nach neuen Vorwänden, irgendwo ein Exemplar dieſer Pflanze zu ſetzen, um zu ſehen, wie ſie ſich an jedem Platz benimmt und was wohl das Licht und die Fernwirkung an jeder Gartenecke Neues und Beſonderes aus ihr herausholt. Man kann auch brennende Farben früher Tulpen und anderer zäher und ſtarkwüchſiger Knollengewächſe in ihre Polſter hineinſtecken, denn ſie wurzeln nur flach und die Knollen dürfen ja 12 bis 20 Centimeter tief gelegt werden.
Veronica armena, die armeniſche Veronika, iſt ein ſehr ſeltener blauer Edelſtein von 20 Centimeter Höhe und etwa vierwöchentlicher Blütezeit ab Mitte April. Sie gilt als Form von austriaca, doch ſind die Meinungen verſchieden. Die allerſtärkſten Meinungsverſchiedenheiten ſchlichten ſich oft verblüffend dadurch, daß mit der ſtrittigen Pflanze eine ganz andere gemeint iſt. Am meiſten feſten Grund und Boden bezüglich der Gattung Veronika fühlt man noch in dem großen amerikaniſchen Lexikon unter den Füßen. Streit tobt um V. satureioides und satureidefolia. Ich habe eine kleine beſcheidene Pflanze, welche den Namen satureioides trägt und der zweitfrüheſte Blüher gleich nach V. filiformis iſt. Was ſie aber mit Satureja zu ſchaffen haben ſoll, kann ich nicht erkennen. Im erſten Jahr ſchien ſie ſchwachſüchtig, jetzt kräftigte ſie ſich enorm und kommt vielleicht noch einmal auf die Liſte idealer Veronika.
Veronica saxatilis, die Felsveronika, blüht in einem glühenden Blau von Mitte April bis Mitte Mai in acht Centimeter Höhe. Die Pflanze verträgt in den erſten Jahren enorm viel Dürre und blüht doch gut. Als alte Pflanze jedoch muß ſie in friſchbleibendem Boden ſtehen, um reich weiter zu blühen, andernfalls müßte die Pflanze nach ein paar Jahren aufgeteilt werden.
Nach ihr blüht noch im April die Moos-Veronika, Veronica repens, mit blaßblauen Blütchen, auf ganz niedrigem Teppich. Nach mehreren Jahren bekommt die Pflanze, die aus Korſika ſtammt, in der Mitte des Polſters eine Tonſur, aber die Ränder kriechen grün weiter und ſind überall bis zur Spitze bewurzelt. Man kann nun entſprechend andere Stauden in die Tonſur ſetzen, zum Beiſpiel auch die folgende Sorte. Bei gartenkünſtleriſcher Verwendung der Moos-Veronika in breiter Fläche iſt dieſe Gefahr zu bedenken. Sie ſcheint alſo ihren Boden ſehr einſeitig zu verbrauchen.
Veronica prostrata. Aus dieſer kleinen frühen einheimiſchen Form, die etwas jenſeits von Gut und Böſe war, ſind drei ganz ausgeſprochen ſchöne Schmuckgeſtalten erzüchtet worden, mit denen man ſehr weſentliche Wirkungen im Steingarten, Frühlingsgarten und Naturgarten zu einer Zeit erzielt, in der ſonſt gar nicht ähnliches zur Hand iſt. Die weiße Form hat enorm lange und ſchön beſetzte Riſpen bekommen und die blauen und dunkelblauen Töne der anderen zwei bis drei Wochen vor rupestris ſind ſo willkommen, daß man dieſem feinen Trockenheitsgeſchmeide ſehr gute Plätze ausſucht. In ihrem letzten Verblühen tritt die Enzian-Veronika in Flor, auch wie jene, zehn Centimeter hoch, aber wohl im ſchönſten Blau aller Veronika, doch dieſes Blau iſt jedoch nur von morgens früh bis mittags ſo ſchön und rein, um dann leider für die zweite Hälfte warmer Tage ganz verwandelt und erloſchen zu ſein. Mitten in ihren blauen Polſtern wirken Pflanzen der Siebenhügel-Varietät des ausdauernden Leins, Linum narbonense herrlich, wohl eine der ſchönſten fernleuchtenden blauen Stauden. Daneben pflanze ſehr hohe weiße Steinbrech und knallrote Sonnenröschen.
Wenn die Veronica rupestris ganz dicht blühen ſoll, muß ſie etwas nahrhaften und tiefen Boden haben. Sie hält zwar mit ihrem Flor auch noch an ziemlich ſchwierigen Stellen aus, blüht dann aber entſprechend etwas magerer.
Eine weiße var. alba hat es aus unerklärlichem Grund nicht zur Winterhärte gebracht.
Um ſo erfreulicher iſt die prachtvolle weiße prostrata pallida.
Die Shirley-Veronika, Anfang Juni bis nach Mitte Juni 20 Centimeter hoch blühend, iſt über alle Begriffe ſchön und merkwürdig in ihrem dunklen Blau und ſämtlichen verwandten Sorten der amethystina- und latifolia-Gruppe durch vollendete Schönheit entrückt. Sie paßt prachtvoll zwiſchen weiße und farbige Wildnelken, verträgt noch mehr Dürre als rupestris, bildet als alte Pflanze 60 Centimeter breite üppige Büſche. Auch mit der Heuchera und der weißen Texas-Nachtkerze hat ſie einen Schönheitsbund geſchloſſen.
Die blauen Stauden kann man nicht genug im Garten verwenden. Überall wirken ſie farbenvermittelnd und buntheitsveredelnd.
Dieſe Gartenſchätze ſind ja noch ſo neu, daß wir uns ihre volle Tragweite und gartenverwandelnde Kraft noch garnicht klar machen können, aber man wittert ſchon dunkle Entwicklungen zu einer Volkstümlichkeit ohne gleichen und freut ſich ihres prachtvollen, grundſätzlichen Gegenſatzes zu den meiſt ſo langweiligen Gärten von heute.
Im ganzen Reich der Veronika iſt die Silberveronika, V. candida oder incana wieder eine reizende Naturmarotte für ſich. Dieſe kleine Edelgeſtalt von 25 Centimeter Höhe und tiefdunkelblauen Riſpen auf ſilbergrauem Blattwerk iſt dabei außerordentlich dienſtbereit und unverwüſtlich. Ich ſah ſie als acht Jahre alte ungepflegte Einfaſſung in voller lückenloſer Schönheit. Sie kommt ſchon mit ihrem Flor in die Blütezeit vieler Sedum hinein, zu denen ſie auch gut paßt.
Die Hochſommer-Veronika, V. spicata, iſt mit ihren 70 Centimeter hohen Riſpen in dunkellila und roſa eine ſchlichte, aber liebenswürdige Hochſommerſtaude für dürre Plätze, Steingärten und Naturgärten und auch für den Schnittblumengarten. Abgeſchnitten hält ſie ſich außerordentlich lange. Sie ſoll etwas hungrig plaziert werden, damit ſie nicht doch bei zu großer Entwicklung das Überkippen bekommt. Die roſa Formen, wie V. s. Erika und ähnliche ſind niedriger und ſehr brauchbar.
Sehr ſchön ſind Gruppen aus gelber niedriger Missouri-Nachtkerze, orangeroter Potentilla (P. versicolor plena) und weißbunter Zwergſpindel mit einigen Hochſommer- und Spätſommerveronika.
Die Königin der großen Veronika iſt die Ende Juli bis September blühende Japan-Veronika, V. subsessilis Hendersoni. Ob ſie eine wilde japaniſche Art oder ſchon eine Hybride iſt, darüber ſcheint man noch nicht endgültig klar, jedenfalls iſt die Staude mit ihren großen, dunkelblauen Kandelabern auf Rabatten, im Steingarten, unter Umſtänden auch im Naturgarten und im Schnittblumengarten durch nichts zu erſetzen. In den feuchten deutſchen Klimaten dauert ihr Flor außerordentlich lange, bis in den Herbſt hinein, ſie wird dann faſt 90 Centimeter hoch. Die Winterhärte iſt vollkommen.
Spätſommerglockenblumen, wie Wahlenbergien und Adenophoras, leiſten dieſer ſtillen Schönheit unaufdringliche Geſellſchaft. Man kann ihr auch etwas Halbſchatten zumuten. Die Pflanzen müſſen ein paar Jahre alt ſein, um zu ihrer vollen wuchtigen Wirkung ausgebaut zu ſein.

I. A. PURPUS / CRASSULACEEN AUS MEXIKO

MAN müßte annehmen, daß die Craſſulaceen in den Xerophiten-Gebieten des mexikaniſchen Hochlandes eine große Rolle ſpielen: Das iſt jedoch nicht der Fall. Wohl ſind einige hundert Arten bekannt, ſie treten aber nicht beſonders hervor.

Den Kakteen gegenüber, die durch den impoſanten Wuchs gewiſſer Arten und teilweiſe durch ihr Maſſenvorkommen das Gebiet beherrſchen und ihm ein beſonders charakteriſtiſches Gepräge verleihen, verſchwinden ſie völlig. Wegen ihrer Kleinheit und meiſt lokalen Verbreitung entgehen ſie leichter dem Auge des Sammlers und ſind größtenteils nur Zufallsentdeckungen.

Erſt in den letzten Jahrzehnten, nachdem das Land eingehender von Botanikern durchforſcht wurde, ſind eine größere Zahl von Arten aufgefunden und beſchrieben worden, die zum Teil den Weg zu uns gefunden haben und unſeren Sukkulentenſammlungen zur beſonderen Zierde gereichen. Die von mir neubeſchriebene Echeveria leucotricha wurde im Jahre 1908 von meinem Bruder, C. A. Purpus, in der Umgebung des Dorfes San Luis Tultitlanapa, in der Sierra des Mixteca, Staat Puebla, entdeckt. Sie wächſt vereinzelt an ſonnigen Felſen und iſt nicht häufig. Verwandtſchaftlich ſteht ſie der Echeveria pulvinata nahe, der ſie ähnelt, von der ſie aber doch weſentlich verſchieden iſt. Die prächtige Pflanze bildet im älteren Stadium kurzſtämmige Büſche und iſt in allen Teilen dicht ſamtig weiß behaart, nur die Stämme und Zweige ſind mit rotbraunem Filz bekleidet; auch die fleiſchigen langen Blätter ſind oben rotbraun geſäumt. Im Februar bis April entfalten ſich bei uns die prächtigen zinnoberroten Blüten, die in einfacher Traube am Ende der achſelſtändigen, beblätterten Infloreszenz ſtehen und auffallend mit den weißhaarigen Hoch- und Kelchblättern kontraſtieren. Als ausgeſprochene Sonnenpflanze und Bewohnerin ſonniger Felſen trockner Gebiete beanſprucht ſie eine dementſprechende Behandlung in der Kultur, gedeiht dann leicht und iſt durchaus nicht heikel. Auch als Zimmerpflanze iſt ſie gut geeignet, verliert aber ihren Charakter und ihre Schönheit, wenn ſie zu dunkel und warm im Winter gehalten wird. Den Sommer über kann man ſie vor das ſonnige Fenſter oder ganz ins Freie ſtellen. Als Erdmiſchung iſt jede gute, nicht zu magere Kakteenerde geeignet. Mit dem Begießen muß man, namentlich im Winter, ſehr vorſichtig ſein.

Pachyphytum oviferum

Echeveria leucotricha

Eine zweite Art iſt das gleichfalls von mir neuaufgeſtellte *Pachyphytum oviferum*. Es wurde im Jahre 1911 ebenfalls von C. A. Purpus im Staate San Luis Potosi entdeckt und eingeführt. Es gibt wohl keine zweite Pflanze, deren Blätter ſo täuſchend Vogeleiern ähnlich ſehen, wie die dieſes Pachyphytum. Bricht man ſie ab und legt ſie in ein Vogelneſt, ſo iſt die Täuſchung vollkommen. Die reizende, höchſt eigenartige Sukkulente bildet kurzſtämmige, durch kurze, ſeitliche Verzweigung mäßig große Klumpen, die mit dicken, verkehrteiförmigen, fleiſchigen Blättern bekleidet ſind, welche von einem dichten, weißen Reif überzogen werden, der leicht abwiſchbar iſt. Sehr merkwürdig iſt die Infloreszenz: Die purpurkarminroten Blüten verſchwinden gänzlich zwiſchen der bleichen, weißbereiften Hülle, welche die Blumenkrone weit überraget. Man bekommt ſie nur zu ſehen, wenn man den abwärts gekrümmten Blütenſtand aufrichtet. Die Behandlung iſt die gleiche wie bei Echeveria leucotricha. Im Freien muß die Art gegen Regen geſchützt werden, da ſonſt der Reif leicht von den Blättern geſpült wird; aus dieſem Grunde darf ſie auch nicht mit den Fingern berührt werden. Wird die Pflanze zu hoch und unten kahl, was in der Kultur leicht vorkommt, ſo ſchneidet man die Köpfe ab und läßt ſie bewurzeln. Die unteren Stammteile bilden dann reichlich Sproſſe, die zur Vermehrung dienen können. Beide Craſſulaceen laſſen ſich wie alle Echeverien auch durch Blätter vermehren, ſie bewurzeln ſich aber nicht ſo leicht oder ſie bilden nicht ſo gerne Adventivknoſpen an der Blattbaſis wie andere Arten. Die Blätter des Pachyphytum oviferum faulen ſehr leicht. An den Blütenſtengeln der Echeveria leucotricha bilden ſich in den Blattachſeln Adventivſproſſe, die ein gutes Vermehrungsmaterial geben. Samen bringen die Pflanzen nur dann, wenn ſie künſtlich oder durch Inſekten befruchtet werden.

Während man von Pachyphytum nur wenige Arten in unſeren Gärten, und dann auch faſt nur in den botaniſchen, findet, iſt die Zahl der in der Kultur verbreiteten Echeverien eine ziemlich große. Sie gehen vielfach unter dem Gattungsnamen Cotyledon. Wir nennen Echeveria retusa, E. gibbiflora und agavoides.

NORWEGISCHE GÄRTEN

VON norwegischen Gärten, von den Gärten, die auf den Höhen liegen mit dem Blick über die klaren Weiten des Fjords, von den Gärten auf Felsen gebaut zwischen Kiefern und Tannen, einsam und herrlich, will ich hier sprechen. Wald sind die Hänge der Gärten, Urwald, mit Birken und Tannen, Kiefern und Fichten, mit Rosen, Brombeeren, Farnen und Moosen bewachsen und einem Teppich von Anemonen, blau wie das Wasser in Norwegens Fjorden.
Die Gärten sind Felsgärten, aus Felsen gehauen, in Felsen gesprengt, in Terrassen gegliedert durch mächtige Mauern und Böschungen. Am höchsten Punkt steht das Haus, das schlichte norwegische Holzhaus, frei, nur einige einzelne Kiefern sind Zeugen des einstigen Waldes. Und Blumen stehen am Haus, farbige, viele, denn der Norweger liebt seine Blumen und liebt die leuchtenden Farben. Und wie sie leuchten! Ja, nicht die Glut der südlichen Sonne weiß reichere Töne zu malen als das unendliche Licht des nie sich erschöpfenden Tages. Stärker und heiter sind hier alle Farben der Pflanzen: gelb ist so golden und rot so glühend, blau ist so strahlend und weiß so blendend. Die Blumen glänzen im Licht, die Bäume, die Blüten, alles ist farbig, ist schimmernd. Denn rein ist die Luft dieses Landes, durchsichtig klar. So scheint die Ferne nahegerückt, die Berge, die Wälder, die Wasser, alles fast greifbar und wundervoll in der Beleuchtung.
Blau ist die Farbe Norwegens. Blau sind die Berge hinter den Bergen, wo die Weite beginnt, blau ist der Himmel, blau ist das Wasser und blau ist die Luft. Blau ist die Farbe des Tages. Erst in der Dämmerung, in der sommerlichen Mitternacht, erwachen Töne zartester Schöne, hellsmaragdenes Grün, violette und rötliche Streifen stehen am fahlhellen Himmel zur Seite des blaßweißen Mondes. Doch nur kurz ist die Stunde der Nacht, und von neuem ergießt sich eine Fülle von Licht auf das erwachende Land. Dabei wachsen und blühen die Pflanzen so wundervoll üppig. In diesem nie verliegenden Licht leben sie ein Leben so intensiv und reich, ein atemloses Leben ohne Pause, und dank dieser Sonne sind die Farben der Blumen tiefer und stärker als sonst und machen den norwegischen Garten zum farbenfreudigsten Bild. Denn Platz für Blumen ist in dem Felsengarten, zwischen den Steinen, den Mauern, den Treppen, an den Böschungen, überall quillt es von Stauden und Rosen, von Einjahrsblumen, von Rankgewächsen und Moosen. Eine Blütenfülle, die fast alle Steine verdeckt. Lebende Mauern aus duftigstem Stoff.
Der Garten schmiegt sich dem Berge an, und Treppen zwischen den Mauern führen von einer Terrasse zur andern. Nicht immer ist es möglich, ihn architektonisch zu gliedern, zu groß sind die Felsen, die man umgehen muß, Kiefern und ehrwürdige Fichten zwischen den Steinen hat man das Herz nicht zu fällen. Drum macht solch ein Garten fast immer den Eindruck ursprünglicher Wildheit, die verstreuten Felsblöcke, die mächtigen Mauern, die Böschung aus Steinen, die Treppen und Winkel, alles dies gibt ihm ein romantisches Gepräge.
Natürlich haben nicht alle Gärten hier diesen Charakter, oft sind die einzelnen Stufen und Absätze von größerem Ausmaß, dort gibt es dann Rasenpartien und richtige Blumenrabatten. Sondergärten liegen gar lieblich auf solcher Terrasse. Und man hat auch unsere Gärten mehr ähnliche auf flachem Gelände, in denen viel Obst wächst.
Die Arbeit im norwegischen Garten ist mühsam, der Boden durchsetzt mit Gestein, die Erde ist schwer und vor allem selten. Von weither muß sie herbeigeschafft werden. Und es drängt sich die Arbeit zusammen, denn lang ist der Winter. Im April liegt noch Schnee. Der Frühling kommt plötzlich, er überstürzt sich. Von einem Tag zum andern wird es warm, sommerwarm. Und dann beginnt es in märchenhafter Schnelle zu grünen, die Kastanien in der Stadt brechen auf über Nacht, die Obstbäume blühen und der Flieder, alle Wiesen sind bunt, es wächst uns fast sichtbar, von Stunde zu Stunde, eine unendliche Masse von Blumen drängt zusammen, Rosen und Lilien, Tulpen und Primeln, Goldregen und Erdbeeren zur selben Zeit. Sie hat großen Reiz, diese unsagbare Fülle, doch den eigentlichen Frühling kennt man dort nicht. Der Sommer ist heiß, oft sehr trokken, früh verfärben sich die Blätter, der Herbst erglüht in den leuchtendsten Tönen, dann folgen Nebel und Regen, Frost und Schnee.

Dr. E. H. Mills

Heart of Gold

J. H. Mc FARLAND / NEUE KLASSE AMERIKANISCHER ROSEN

Der Verfaſſer iſt der Herausgeber des Jahrbuchs der amerikaniſchen Roſengeſellſchaft (American Rose Annual) und zählt zu den beſten Kennern der Roſe in den Vereinigten Staaten. Er wird von Zeit zu Zeit über auch für uns intereſſante Roſenthemen berichten. Beginnt doch Nordamerika, ſich auf dem Gebiete der Roſenzucht eine führende Stellung zu erobern. C. S.

DER verſtorbene Dr. W. Van Fleet war vielleicht der bedeutendſte Pflanzenzüchter, den die Vereinigten Staaten beſeſſen haben, beſonders auf dem Gebiete der Roſe. Er iſt verantwortlich für eine ſchöne Gruppe harter Rankroſen, die ſolche Sorten wie American Pillar, Dr. W. Van Fleet, Mary Lovett, Bess Lovett, Alida Lovett, Silver Moon und viele andere üppige und ſchöne Schöpfungen einſchließt. In ſeinen ſpäteren Lebensjahren, als er für das »Bureau of Plant Induſtry in the Federal Departement of Agriculture«, die Pflanzen-Einführungsſtelle des Ackerbauminiſteriums, arbeitete, ſtrebte er danach, das, was er »Hoftor«-Roſen nannte, zu erzielen, Sorten von allgemeiner Brauchbarkeit, Wuchskraft und Härte. In Bell Station, dem Verſuchsgarten zwiſchen Baltimore und Washington, wo er tätig war, hatte er eine ſehr große Sammlung von Roſen-Arten zuſammengebracht, und dort blieben noch viele Sämlinge als Ergebniſſe ſeiner Kreuzungen zurück, die weitere Beachtung verdienen. Aus dieſen Sämlingen werden unſtreitig noch ſehr wertvolle Varietäten hervorgehen.

Bei ſeiner Zuſammenarbeit mit der Amerikaniſchen Roſengeſellſchaft hat das Ackerbauminiſterium dieſe bereits ermächtigt, unter einer ſehr günſtigen Vereinbarung fünf dieſer Van Fleet'ſchen Sorten in den Handel zu bringen. Es ſei hier bemerkt, daß die Vereinbarung vorſieht, daß immer die Beſchreibung der Roſe gebraucht wird, wie ſie das Ackerbauminiſterium gibt, daß der Name geführt wird, den es ihr verleiht, und daß jede Angabe und Abbildung vermieden wird, die mißdeutig ſein könnte. Außerdem darf der Preis nicht höher ſein als der doppelte Durchſchnittspreis für ein Dutzend ähnlicher Roſen auf dem offenen Markte. Die amerikaniſche Roſengeſellſchaft gibt allen ihren Handelsmitgliedern Gelegenheit, dieſe neuen Roſen zu dieſen Bedingungen zu kaufen, ſodaß ihnen eine weite und günſtige Einführung ohne Mißdeutung möglich iſt.

Die erſte Roſe, die auf dieſe Weiſe vor zwei Jahren in den Handel gebracht wurde, war *Mary Wallace*, die ſich als ausgezeichneter Erfolg erwies. Es iſt eine harte Rankroſe, die ſich auch für Hecken ſehr eignet, ebenſo als große Buſchform; ſie bedeckt ſich im Juni mit ihren rieſigen Blüten von eigenartig glühendem Roſa, die ſich lange gut halten. Die Varietät hat eine leichte Neigung, ſpäter nochmals zu blühen.

Die nächſte Einführung war *Heart of Gold*, eine Hybride zwiſchen R. Wichuraiana und R. Moyesii. Dieſer Name wurde ihr gegeben wegen ihrer Büſchel goldener Staubfäden, die von einer deutlichen weißen Zone umgeben ſind, die ſich ſcharf von dem tiefen reichen Scharlach-Karmeſinrot abhebt; die einzelnen Blumen werden etwa fünf Centimeter breit und bedecken die üppigen ſchönen Pflanzen.

Im Herbſt 1926 kommt *Sarah Van Fleet* in den Handel. Es iſt eine Rugosa-Hybride von reichem ſattem Roſa und bildet ſehr ſtarke Pflanzen, die ganz hart ſind. Die Blüte iſt duftend, anziehend, wenn auch etwas unregelmäßig, und die Pflanze neigt zum Remontieren.

Ganz verſchiedener Abkunft iſt die Roſe, die nach dem früheren Präſidenten der Amerikaniſchen Roſengeſellſchaft, *Dr. E. M. Mills*, benannt iſt. Sie iſt eine Hybride zwiſchen R. Hugonis mit R. spinosissima oder R. rugosa oder beiden, wobei die Vermutung beſteht, daß die bekannte Theehybride Radiance bei einer der Kreuzungen beteiligt war. Sie bildet ſehr ſchmuckhafte Sträucher mit langen Ruten halbgefüllter Blumen

Breeze Hill

von etwa fünf Centimeter Breite. Ihr Farbenton iſt eine lebhafte Miſchung von Primelgelb und hellem Roſa, im Verblühen in faſt reines Weiß übergehend. Keine andere exiſtierende Roſe ähnelt ihr in ihrer ſo abweichenden Schönheit oder in ihrem beſonderen Wert als Strauch. Die letzte dieſer Roſen, die bis heute benannt wurden, iſt eine Wichuraiana-Hybride mit Beauté de Lyon, wodurch Pernetiana-Blut in das der Rankroſen eindringt. Dieſe Roſe, die nach des Verfaſſers Garten *Breeze Hill*, wo ſie zu großer Vollkommenheit erzogen wurde, benannt wurde, kann man am beſten als eine verherrlichte harte Gloire de Dijon beſchreiben. Sie ähnelt dieſer in der Farbe, doch ſind die Blumen mehr als zweimal ſo groß, und nicht ſelten ſtehen ſechs bis acht Blumen in großen Büſcheln zuſammen. Sie gilt als die größte harte Rankroſe, die man bis jetzt ſowohl in Amerika wie in Europa kennt. Trotz ihres ſtarken und üppigen Wuchſes iſt ſie nicht leicht wurzelecht zu vermehren. Wer ſo glücklich iſt, ſie zu erhalten, möge bedenken, daß ſie ihre volle Schönheit erſt im zweiten oder dritten Jahre nach ihrer Anpflanzung erreicht.

Die Vereinigten Staaten erzeugen auch viele andere Roſenſorten, ſowohl von Theehybriden, wie von harten Rankroſen, über die ich Gelegenheit zu finden hoffe, unſere deutſchen Freunde zu unterrichten. Nordamerika bietet auch in der Roſenzucht von Jahr zu Jahr immer Wertvolleres, das gut geſichtet wird. Heute zeige ich mit Vergnügen dieſe neue Klaſſe Van Fleet'ſcher »Hofthor-Roſen« an, als einen Beweis, wie die amerikaniſche Roſengeſellſchaft Hand in Hand mit dem Ackerbauminiſterium arbeitet in ihren Bemühungen, die Roſe Allgemeingut in Amerika werden zu laſſen. *(Überſetzt C. S.)*

CAMILLO SCHNEIDER / EIN HECKENGARTEN

DAS Heckenmotiv ſpielt auch im Garten von heute eine große Rolle. Beherrſcht es den Garten auch nicht mehr wie zur Zeit, da der franzöſiſche Gartenſtil herrſchte, ſo iſt es doch immer mehr zu neuer Geltung gekommen, je mehr die landſchaftliche Periode im Garten abflaute. Die Hecke in ihren verſchiedenen Abwandlungen gehört zum Garten im engeren Sinne. Mit ihr ſchaffen wir räumliche Wirkungen, die ſich auf andere Weiſe nicht erzielen laſſen. Die ſteinerne Mauer iſt in ihrer Verwendung begrenzt und oft unerſetzbar. Die grüne Mauer jedoch iſt weſensverſchieden von ihr und in ihren Möglichkeiten, in ihrer durch die verſchiedenen Pflanzen bedingten Formenſprache noch längſt nicht erſchöpft. Als ſie im franzöſiſchen Garten zur Gewaltherrſcherin wurde, trat ſie in viel zu einſeitiger Weiſe in Erſcheinung, war viel zu ſehr Mauererſatz. Dieſe Anlagen ſind uns heute ganz weſensfremd. Sie dienten einer vergangenen Weltanſchauung, waren Ergebniſſe höfiſcher Prunkſucht und ohne das geſpreizte Hofleben der damaligen Zeit nicht denkbar. Heute ſind es für uns Muſeen. Ihre Erhaltung im hiſtoriſchen Sinne, wie man es etwa in Schönbrunn verſucht, iſt ſtreng genommen unmöglich. Sie haben ſich im wahren Sinne des Wortes überlebt. Die grüne Mauer iſt auf die Dauer unzähmbar. Sie muß ſich zur Freiheit durchringen oder ſterben. Ein Jahrhundert hat ſchon an ſolchen Anlagen herumgeflickt, aber es war eben immer Flickwerk.

Indeſſen wird das Heckenmotiv aus den angedeuteten Gründen nie aus dem Garten verſchwinden können und auch in ſtärker betonter Form als Heckengarten in großen Anlagen immer wieder mit Erfolg angewendet werden. Nur als Alleinherrſcherin im großen Garten iſt die grüne Mauer verſchwunden. Sie ordnet ſich jetzt einem anderen Organismus ein, verleiht ihm gar reizvolle Einzelzüge und bringt beſondere Zwecke und Ziele zu ſtarker Geltung. Darin liegt ihre hohe Bedeutung für den Garten von heute, der ja Raumſchaffung bedingt. Ein Beiſpiel dafür bieten wir heute in den *Bildern aus dem Hamburger Stadtpark*. In dieſer großen, an gehaltvollen Einzelheiten ſo reichen Schöpfung iſt auch ein Heckengarten enthalten, deſſen Grundlinien der Plan zeigt. Ihn mit reichem Pflanzenleben zu erfüllen, hat Gartendirektor *Linné*, dem in Garteninſpektor *J. Köſter* ein ſo ausgezeichneter Helfer zur Seite ſteht, in hohem Maße verſtanden. Ich erinnere mich gut der Zeit, als im letzten Jahre die Aſtilben in vollſtem Flor ſtanden und ihre Farbenwogen gegen die grünen Mauern brandeten. Solch geſteigertes Pflanzenleben gehört in den Heckengarten wie das bunte Leben und Treiben des Hofes in den franzöſiſchen Park.

ausgezeichneter Wirkung. Je nach dem Gehölz, das wir verwenden, ist ihre feine Struktur recht verschiedenartig. In dieser Hinsicht wiederholen wir uns viel zu sehr. Immer wieder herrschen Hainbuche und Linde, am ehesten kommt noch Rotbuche hinzu, deren Bedeutung für kräftige Hecken man immer mehr erkennen lernt. Doch es gibt sehr viel mehr Material, wie Paul Kache kürzlich an dieser Stelle näher ausführte (Band VI, Gartenarbeit und Blumenpflege, Seite 57), er regt da zu vielseitigen Versuchen an. Die neuen Schönheitswerte, die sich für Heckengärten daraus ergeben können, sollten erprobt werden. Es sei nur nochmals auf die Kornelkirsche, auf den Hainbuchenahorn, Acer carpinifolium, auf Blutbuchen und vor allem die wintergrünen Eichen hingewiesen, soweit es sich um hohe Hecken handelt. Wenn man von den letzten einmal genügend Vorrat hätte, so würde ein neuer Typ des wintergrünen Heckengartens entstehen.

Gesellen sich nun in unseren öffentlichen Anlagen noch frohe, Erholung suchende Volksscharen den Blumen, so wird der Heckengarten seinen Zweck ganz erfüllen und Rast und freudige Anregung denen spenden, die in ihm weilen.

Die farbige Blumenwelt kann sich in mannigfacher Weise eingliedern lassen. Als breite Parterreflächen, als vor die Hecken gelagerte einfarbige oder bunte Rabatten, als feine Säume frohgrüner Rasenflächen. Hecken können sich mit Pergolamotiven vereinen, an denen sich die Welt der Kletterrosen und vielfachen Schlinggehölze entfaltet. Im Frühjahr beginnen Clematis montana und die Wistarien, denen die Rosen folgen, bis der hohe Sommer die Bignonien und späten Clematis sowie Polygonum Auberti bringt, die in Blüte und Frucht bis in den Winter die Laubengänge beleben. Die Hecken selbst sind auch nach dem Blattfall und vielleicht gerade dann von

Den immergrünen Typ darf man auch nicht vernachlässigen. Hier kommt in erster Linie der Stechhülsen, Ilex Aquifolium, in Betracht. Wo dieser sich gut entwickelt, gibt er ganz wunderbare Hecken. Daß diese auch schnell gedeihen, wenn man sie richtig pflanzt, beweist das Beispiel auf dem Ehrenfriedhof in Lübeck. Selbst Rhododendren kann man in Nordwestdeutschland für Heckengänge verwenden, wie ein Versuch im Parke zu Rastede zeigt. Solche Versuche werden allerdings immer vereinzelt bleiben. Von Nadelhölzern kommen die Eiben an erster Stelle. Thuja-Hecken sind meist besonderen Bedingungen angepaßt. Da muß man in der Formenwahl vorsichtig sein. Für kleinere Hecken aller Art, wie sie im größeren Heckengarten gebraucht werden, kommen vielmehr Gehölze in Betracht. Hecken, die nur mannshoch werden, sollten bei Sitzplätzen in öffentlichen Anlagen eine große Rolle spielen.

Bilder Joh. Köster

HUGO KOCH / EIN ALTER SCHLOSSGARTEN

Seerhauſen

DIESEN Schloßgarten zu Seerhauſen, 10,8 Kilometer oſt-ſüdöſtlich von Oſchatz gelegen, hat der Geheime Rat Chriſtoph Dietrich v. Boſe zu Ende des 17. Jahrhunderts angelegt und zwar nach handſchriftlichem Zuſatz im Jahre 1695.« So berichtet die »hiſtoriſche Beſchreibung der Stadt, des Amtes und der Diöces Oſchatz in älteren und neueren Zeiten« von Carl Samuel Hoffmann (Oſchatz 1873 II. Teil). Über dieſe Planung unterrichtet uns ein Grundriß im Hauptſtaatsarchiv in Dresden mit der Aufſchrift: Ausmeſſung und Grundlegung zugleich Ausrechnung des Schloßgebäudes Seerhauſen, ſamt den umliegenden Gebäuden ... und Gärten ... dem Hochwohlgeborenen Chriſtoph Dietrich Boſen, dem jüngeren Herren, aus Seerhauſen. — ... Monat Oktober 1696 durch Hans Auguſt Nienburg.«

Das Schloß in urſprünglicher Geſtalt

Nach einer anderen handſchriftlichen Bemerkung auf einem Plan von 1856 iſt der Garten bereits in den Jahren 1672 bis 1682 angelegt worden, was etwa mit der weiteren handſchriftlichen Aufzeichnung im Schloßarchiv übereinſtimmt, wonach Fräulein von Schleinitz, die Beſitzerin von Seerhauſen, Herrn Dietrich von Boſe heiratete, welcher 1678 bis 81 den Garten mit Alleen neu anlegte.

Es iſt eine typiſche Planung für dieſe Zeit und dieſe Gegend. In meiner »Sächſiſchen Gartenkunſt« habe ich ja eine ganze Reihe ähnlicher Schloßgärten aus dieſer Zeit behandelt. Sie zeigen alle eine charakteriſtiſche Verwendung des Waſſers. Die waſſerreiche Gegend dieſes ſächſiſchen Flachlandes zwiſchen Leipzig und Rieſa gab den Anſporn. Dazu kamen lebhafte Handelsbeziehungen der Leipziger Kaufherren nach Holland, wo ſchon früh die Gartenkunſt zu großer Blüte kam und wo die waſſerreiche, tafelebene Landſchaft zu charakteriſtiſchen Löſungen führte, ſodaß wir in der Kunſtgeſchichte von einem holländiſchen Gartenſtil ſprechen können. Der lebhafte Handel führte die Holländer in viele fremde Gegenden, von wo ſie die ſeltenſten Gewächſe zur Kultivierung in ihre Heimat einführten, womit ſie den Ruf Hollands im Gartenbau begründeten. Sie lernten auch früh Italiens Gartenkunſt kennen, die freilich in der tafelebenen Landſchaft ihrer Heimat keine unmittelbare Anwendung finden konnte. Die Anlage von Terraſſen und Treppen, das Charakteriſtiſche des italieniſchen Gartens, mußte unterbleiben. Konnten demnach Anlagen, die auf großen architektoniſchen Aufbau zugeſchnitten waren, nicht aufkommen, ſo wendete ſich das Gartenſchaffen vor allem auf die Pflege der Blumen. Der Waſſerreichtum des flachen Landes führte dazu, daß man es in Gräben durch den Garten zog. So wurden die Blumenparterres und die ſtillen ſtehenden Gewäſſer, die den Garten in Kanälen rechtwinklig durchſchnitten, ein charakteriſtiſches Moment des holländiſchen Gartens. Das ganze Innere der Gärten war regelmäßig gebildet, wie die zuweilen vorkommenden Durchſichten. Eine deutliche Vorſtellung jener Gärten geben uns die Stiche von Vredemanno Vrisio aus dem Jahre 1583. Peinliche Sorgfalt und Ordnung beherrſchen dieſe Gärten, deren Grundform ſchachbrettartige Aufteilung zeigt. Die einzelnen Teile begrenzen ſorgfältig beſchnittene Hecken, und auch die Alleen werden unter der Scheere gehalten.

Die gleichen Grundzüge zeigt der Plan vom Schloßgarten zu Seerhauſen von 1696. Das Waſſer iſt ganz im Sinne holländiſcher Plangeſtaltung verwendet. Das Schloß umzieht im Sinne der Waſſerburgen jener Zeit rings ein Graben, ſodaß das Schloß abgeſchloſſen auf einer Inſel liegt. Weiter iſt das Waſſer in verſchiedenen tunlichſt gerade geführten Kanälen durch den Garten gezogen. Der etwas abſeits liegende große Teich wird in möglichſt regelmäßige Formen gebracht, an den Eckpunkten mit Rundplätzen geſchmückt und wohl mit Pavillons oder Ruheſitzen ausgeſtattet. Die zwiſchen den Kanälen liegenden Gartenſtücke ſind ſtets recht regelmäßig aufgeteilt und mit Küchen- oder ſeltenen Ziergewächſen bepflanzt. Erhöhte Gänge gewähren einen ſchönen Blick auf den tiefer liegenden Waſſerſpiegel, andere, wohl durch Laubengänge begleitet, geben ſchattige Kühlung. Der erhöhte Gang (f), begleitet zu beiden Seiten mit ſchmalen Kanälen, ſowie die Alleen rechts vom Schloſſe, führen die Hauptachſen der Gartenplanung in die Ferne. So wird ſchon von weitem im Sinne der beginnenden Barockzeit der Sitz der Herrſchaft angedeutet, das Schloß zum beherrſchenden Mittelpunkt der umgebenden Landſchaft erhoben.

Der Garten zeichnete ſich nach den Berichten der Zeit durch eine ſchöne Orangerie, durch viele Arten von dem ſchönſten Franzobſt, durch ſeltene Tulipanen und andere Blumen aus, die man aus Holland und aus Amerika kommen ließ. Im Jahre 1726 ward er durch eine blühende Aloë ſo berühmt, daß er ſogar von dem bekannten Wittenberger Dichter Dr. Triller weitläufig beſungen wurde.

Inzwiſchen war die Gartenkunſt unter der Förderung Ludwigs XIV. von Frankreich und ſeines genialen Gartenſchöpfers Lenôtre zu großer Höhe geführt worden. Es gehörte einfach zum guten Ton, ſeinen Schloß- oder Landſitz im Geſchmack der Zeit mit künſtleriſch geſtalteten Gartenanlagen zu umgeben, wobei in ſtetig ſteigendem Maße der Kunſt höhere Bedeu-

Plan der erſten Anlage von Schloß und Garten (1696)

A Schloß
B Innerer Hof
C Gang um das Schloß
E Schloßgraben
O Torhaus
T Großer Teich mit Brücke (S)
X Großer Kanal
a Küchenbeete
b Wieſe
c Viereck von Raſenſtufen
d, f Erhöhte Dämme
g Kegelplatz

tung eingeräumt wurde, das Nützliche mehr in den Hintergrund trat, der Garten zum Schauplatz der Geſellſchaft wurde. Schloß und Garten wurden zur Einheit verſchmolzen — zu einem einzigen Kunſtwerk feſt zuſammengeſchweißt, wie dies der Plan gut verdeutlicht. Sachſen unter ſeinem lebensfrohen kunſtliebenden Fürſten Auguſt dem Starken hat ja in dieſer Zeit eine Fülle herrlicher Gartenſchöpfungen hervorgebracht. Auch der Garten von Seerhauſen wurde im Geiſte der Zeit umgeſtaltet. Darüber berichtet ein Plan im Schloßarchiv mit der Aufſchrift »Grundriß von dem Garten zu Seerhauſen, gemeſſen und gezeichnet von Johann Friedrich Rudolf Möſtel, J. Capit. M. Jung 1774.« Das Schloß wird gegen früher noch klarer als Mittelpunkt der Geſamtplanung herausgearbeitet. Die Inſelanlage wird beibehalten, nur erhält der umfließende Graben ſtrengere, künſtleriſch fein abgewogene Grenzlinien. Der zweite, äußere, früher das Schloß nur zweiſeitig umfaſſende Kanal wird nunmehr auch auf der dritten Seite ſymmetriſch nur mit geringer Breite weitergeführt und zur Betonung der Hauptachſe des Schloſſes auf der Vorderſeite im Halbkreis ausgebogen. Der dritte äußere Graben wird hierzu parallel geführt, ſodaß die Geſamtanlage als ein in ſich geſchloſſenes Ganze erſcheint. Der erhöhte Gang wird zu einer Allee ausgebildet, die in der Achſe des Schloſſes ſich weit in die Landſchaft fortſetzt. Daß auch die Einzelausgeſtaltung künſtleriſch fein durchgebildet wurde, lehren heute noch die erhaltenen Hermen und dekorativ geſchmückten Vaſen, die aus dieſer Zeit ſtammen dürften. Nach dem Plan von 1774 waren wohl die Vaſen zu beiden Seiten der im Halbkreis geführten, den Kanal begleitenden Allee aufgeſtellt, während die ſechs Hermen vielleicht zu beiden Seiten des Mittelparterres an der Rückfro it des Schloſſes ſtanden. Außerdem birgt der Garten noch heute eine köſtliche, reich bewegte Statue des Saturn, von dem berühmten Bildhauer Balthaſar Permoſer, die in den Revolutionstagen nach dem Weltkrieg leider ſtark beſchädigt wurde. Auch ſonſt war der Garten, wie der Plan von 1774 lehrt, mit dekorativ geſtalteten Brücken und Torbauten geſchmückt. So war mit einfachen Mitteln bei Benutzung gegebener Verhältniſſe eine Anlage geſchaffen, die ganz dem künſtleriſchen Empfinden der Zeit entſprach. Im Schatten der beſchnittenen Baumalleen entlang der Ufer promenierte die Geſellſchaft. Auf den Kanälen und Teichen aber entwickelte ſich zu den Gartenfeſten mit Fiſcherſtechen und dergleichen Beluſtigungen ein feſtliches Treiben. Feſt und Spiel ſind es, die dem Garten dieſer Zeit den Stempel aufdrücken. Voran ging der Dresdner Hof. »Hier gibt es immer«, beſchreibt M. von Loen, der berühmte Sittenſchilderer jener Tage, »Maskeraden, Helden- und Liebesgeſchichten, verirrte Ritter, Abenteuer, Wirtſchaften, Jagden, Schützen und Schäferſpiele, Kriegs- und Friedensaufzüge, Zeremonien, Grimaſſen, ſchöne Raritäten; kurz alles ſpielt, man ſieht zu, man ſpielt mit, man wird ſelbſt geſpielt.« Der Entfaltung ſolch reichen geſellſchaftlichen Lebens verdankt der Garten der Barockzeit ſeine großzügige Form und den Charakter des Repräſentativen. Daneben bot er in ſeinen Pavillon-, Lauben und Gitter-Bauten, die wir ſicher auch in der Seerhauſener Planung annehmen dürfen, abgeſchiedene Plätze. Sie betonen die Wegekreuzungen, bilden den Zielpunkt der Alleen oder den Mittelpunkt abgeſchiedener Gartenteile. So war nach dem Plan von 1774 als Zielpunkt der Allee auf der Südſeite des Gartens ein kleiner Pavillon gebildet, in welchem vielleicht die Statue von Permoſer ſtand, und auf dem früheren Kegelplatz (z auf dem Plan von 1696) iſt ein Gartenhaus errichtet, mit einem etwa quadratiſch geſtalteten Vorplatz und Ausblick nach Süden auf den Jahnebach. Eine noch

Plan 1774

Ausgeführter Plan von 1856

heute erhaltene Allee führt in die freie Landschaft. Neben diesem abgeschiedenen Gartenraum liegt ein zweiter, ein kleines dekorativ gestaltetes Ziergärtchen, von einem Laubengang begrenzt, das heute nicht mehr erhalten ist.
Diese abgeschiedenen Gartenteile gewinnen mit dem heraufziehenden Zeitalter des Rokoko eine immer größere Bedeutung. Das Leben im Garten, den Beginn der Rührseligkeit, die zunächst noch die Liebe beherrscht, schildert anmutig folgendes Gedicht:
»Es glänzt der Tulpenflor, durchschnitten von Alleen, / Wo zwischen Taxus still die weißen Statuen stehen, / Mit goldnen Kugeln spielt die Wasserkunst im Becken, / Im Laube lauert Sphinx, anmutig zu erschrecken.
Die schöne Chloe hat spazieret in dem Garten, / Zur Seit ein Kavalier, ihr höflich aufzuwarten, / Und hinter ihnen leis Kupido kommt gezogen, / Bald duckend sich im Grün, bald zielend mit dem Bogen.
Es neigt der Kavalier sich in galantem Kosen. / Mit ihrem Fächer schlägt sie manchmal nach dem Losen. / Es rauscht der taftne Rock, es blitzen seine Schnallen, / Dazwischen hört man oft ein artges Lachen schallen.
Jetzt aber hebt vom Schloß, da sichs im West will röten, / Die Turmuhr schmachtend an ein Menuett zu flöten, / Die Laube ist so still, er wirft sein Tuch zur Erde / Und stürzet auf ein Knie mit zärtlicher Geberde.
»Wie wird mir, ach, es fängt schon an zu dunkeln« — / So angenehmer nur sehr' ich zwei Sterne funkeln — / »Verwegner Kavalier!« — Ha, Chloe, darf ich hoffen? — / Da schießt Kupido los und hat sie gut getroffen.«
Im Zeitalter des Rokoko machte sich immer mehr ein Mißbehagen über die bestehende Gesellschaftsform fühlbar. Man war überdrüssig geworden des höfischen Prunkes, der Repräsentation, zog sich von der breiten Geselligkeit zurück. Die Einsiedelei findet Eingang in den Garten. Zunächst nur langsam, aber stetig drang die Erkenntnis durch, daß die Kultur auf dem Wege geirrt hatte, was treffend für den Garten das folgende Gedicht von Weiße charakterisiert:
»Der Garten ist sehr schön geschmückt, / Hier Statuen und dort Kaskaden, / Die ganze Götterzunft, / Hier Faunen dort Najaden, / Und schöne Nymphen, die sich baden, / Und Gold vom Ganges hergeschickt, / Und Muschelwerk und güldene Vasen. / Und Porzellan auf ausgeschnittnem Rasen. / Und buntes Gitterwerk und — eines such ich nur, / Ists möglich, das was fehlt? / Nichts weiter — als Natur!«
Je mehr sich die Kultur von der Natur entfernte, umso schmerzhafter war das Gefühl der Entbehrung, je größer und heftiger wurde die Sehnsucht nach der Natur. Rückkehr zur Natur, wurde das Schlagwort. Das Material, mit dem die Gartenkunst arbeitete, war aber Natur. Als man sich dessen bewußt geworden war, schlug der Geschmack mit einem Schlage in das Gegenteil um. Nunmehr sollte der Garten nicht mehr einen Gegensatz zur Natur bilden, sondern Natur selbst sein, aber nicht eine sich ergebende, den jeweiligen Bedingungen entsprechende, sondern eine ganz bestimmte, idealisierte Natur. Das Ideal freilich schwankte.

Nicht ausgeführter Plan von 1856

Die Bewegung war von England ausgegangen. Schon früh empfand der Engländer das Gezwungene der Gesellschaftsform, die den französischen Garten entwickelt hatte. Pope, der Dichter, Addison, der Philosoph, wirkten aufklärend durch Schriften. Die Theorien setzte in die Tat um William Kant (1748), Landschaftsmaler, Baumeister und Gartenkünstler zugleich. Er wollte die Natur natürlich, doch nicht als Einzelerscheinung, sondern als verdichtetes Gesamtbild der englischen Landschaft wiedergeben. Er zog bereits das weidende Vieh mit in den Garten, brachte Tempel und Einsiedeleien zur Verstärkung der Stimmung in seine Schöpfungen. William Chambers war es vorbehalten, dem Garten eine neue Richtung zu geben, indem er auf die Stimmungsszenerien des chinesischen Gartens hinwies. Er erzielte damit weniger in England als im übrigen Europa und vor allem in Deutschland eine überraschende Wirkung. Hier hatte man von jeher der chinesischen Kunst, vor allem dem Porzellan eine große Vorliebe entgegengebracht. Nun sieht man das Ziel im Garten darin, möglichst viele und verschiedenartige Naturbilder aneinander zu reihen. Sentimentalität und Romantik finden Eingang in den Garten. Die Bewegung tritt mit solcher Gewalt auf, daß sie kaum eine Schöpfung der Barockzeit ganz unberührt läßt und viele der schönsten Gärten völlig vernichtet.
Auch der Garten von Seerhausen bleibt nicht verschont. Die nur mit großen Mitteln zu beseitigende strenge Kanalführung mit ihren begleitenden Alleen bleibt wohl aus diesem Grunde erhalten. Aber die dazwischen und angrenzend liegenden Gartenteile werden im Geiste der Zeit umgestaltet. Ein vorhandener Plan aus dem Jahre 1856 gibt darüber Aufklärung. Die beiden rechts und links vom Schloß liegenden Gartenteile werden nach englischer Art umgestaltet, das heißt mit möglichst geschlängelten Wegen durchzogen, ohne irgendwelche Beziehungen zum Schloßbau in kleinliche Einzelbildchen aufgeteilt. Die jahrhundertelang gepflegten Beziehungen von Architektur und Garten sind mit einem Schlage vergessen, werden mit Absicht vermieden, um die »Natürlichkeit« zu haben. Besonders charakteristisch ist die Ausgestaltung des südlichen Gartendreiecks mit seinen Schnörkelwegen und einem Gartenhaus, vielleicht als Einsiedelei, als bescheiden gezimmerte Hütte mit Strohdach unter

dem dunklen Grün der Bäume geplant. Die einstigen in ihren Abmessungen wohl abgewogenen Gartenräume sind verschwunden. Die reale Vorstellung des Begriffes Garten geht unter in dem Phantasiegebilde »künstliche Natur«. Nur die Orangerie auf der Rückseite des Schlosses erinnert noch an die vergangene Zeit und ihre Ideale.
Auch sie ist verschwunden auf einem weiteren im Schloß vorgefundenen Plan vom Jahre 1856, unterzeichnet von Petzold, dem Obergärtner von Muskau. Diese Umgestaltung, die für die Anlagen um das Schloß nicht zur Durchführung kam, ist wiederum charakteristisch für die weitere Entwicklung in der Kunst der Gartengestaltung. Sie zeigt den Geist Pückler-Muskau's, des großen deutschen Reformators in der landschaftlichen Gartenperiode. Besonders typisch ist hierfür der neu geschaffene große parkartige Teil zu beiden Seiten der großen Allee nach Westen. Er zeigt den auf große Landschaftsbilder gerichteten Sinn, klare, nicht verschwommene Blickgrenzen und erstrebte Durchblicke und Ausblicke vom Schloß. Wenig klar und verständlich erscheint die geplante, aber nicht ausgeführte Abänderung der Anlagen um das Schloß. Die charakteristische Gliederung durch die die Kanäle begleitenden Alleen ist aufgehoben und dafür eine gewisse, in Wirklichkeit garnicht zur Geltung zu bringende Symmetrie der landschaftlichen Anlage erstrebt. Die Kanäle sind zum großen Teil zugeschüttet gedacht.
Diese geplante Umänderung am Schloß kam erfreulicherweise nicht zur vollen Durchführung. Freilich wurde ein Teil des südlichen Kanalteiles zugeschüttet, auch der Kanal um das Schloß und das Schloß selbst, dessen frühere Gestalt aus dem Bilde ersichtlich ist, wurde nach 1870 wenig glücklich im Geschmack der Zeit umgebaut. Im Garten ist aber durch die erhaltene klare Wegführung der Alleen und des nördlichen und westlichen Kanalteiles der große Zug der alten Anlage noch zu erkennen. Es wäre nur zu wünschen, daß es dem jetzigen kunstverständigen Besitzer, dem ehemaligen Oberhofmarschall Exellenz Hugo von Fritzsch, gelingt, mit der Zeit das Typische der alten Anlage noch klarer herauszuschälen und so wieder das zu gewinnen, was wir in heutiger Zeit in unserem Garten- und Parkschaffen wieder erstreben, Einheit von Architektur und Garten.

KARL FOERTSER / GARTENGANG MITTE JUNI

DIESE Zeit der verblühenden Schwertlilien und der blühenden Päonien, des eben erblühenden Rittersporns und erlöschenden Feuermohns, zwischen Sommer und Frühjahr, ist eine reich verworrene, zeitlose Zwischenepoche des Jahres. Aller Vogelgesang ist noch im vollen Gange, und die Welt ist schon voll sommerlichwürziger oder feuchtschwerer Düfte, von denen man viele halb vergessen hatte mit ihrer Zugehörigkeit zum Reichtum wechselnden Wetters.
An feuchten Abenden, nach warmem Wetter und Regentagen ist abends schon eine kleine fruchthafte Herbstreife in der Luft, obgleich der längste Tag noch vor uns liegt. Sterne sind nur in ihren glänzendsten Vertretern am Himmel. Ihre feierlichen Feuer brennen regungslos über dunklen regungslosen Bäumen. Das schwebt und schwimmt so sommerstill über dem dämmernden Garten, in dem noch so viel zu sehen ist, daß man vergißt, schon Sterne über sich zu haben. Große Feuermohnblumen öffnen nachts auf den Beeten sammetschwarze Schlünde.
Hohe knospende Rittersporntürme scheinen wie tauverhangene silberne Gitter. Alle Blaus der erblühten antworten verschieden und überraschend auf die späte Lichtstunde.
In tiefem Farbenschlafe liegt nun der leuchtend bunte Mittagsgarten ganz still und dunkel. Die Maler, die vor den Blumen malten, sind so verschwunden wie die Schmetterlinge und Insekten. Weiß Gott, in was für Schlupfwinkel sie alle hingesunken sind, um dann wieder in den hellen Tag vorzubrechen.
Solche Nächte sind nicht blos zum Schlafen da, wir sollen uns oft von dieser Schlafsklaverei befreien und in die kühlen besternten Wurzeltiefen der heißen Sommertagblume sehen.
Man trinkt die fruchtbare Nachtfeuchte, die unverbrüchliche regungslose Stille wie einen Krafttrank und sieht Garten und Landschaft fremdartig von wandernder Helle aus Norden her angeleuchtet.
Das große feuchte Bild liegt wie ein Bild der Welt so zauberstarr und geisterstill. Die Sterne ruhen vom Flimmern aus. Die Blumen haben in taugebadetem Halbschlummer die feierlichen Abgründe allnächtlich über sich und saugen sie in ihre Schönheit auf, um sie in den Menschentag wieder hineinzustrahlen.

•

Die Farbenpracht, die eine Fülle von fünf bis sechs Jahre alten Exemplaren der edelsten Schwertlilien in einen Garten tragen können, würde deswegen noch selten in ihrer vollen Schönheit erlebt, weil die Pflanzenden sich nicht auf die Siegersorten beschränkten, die nach vier bis sechs Jahren noch eine Wolke von Blüten tragen, an jeder Pflanze dreißig bis fünfzig Blütenstiele hervorbringen. Durch die Beschränkung auf diese nachhaltigen Reichblüher kann man auch in kleinen Gartenräumen die dreifach größere Fülle entfalten, als mit Irissorten, die jenen Filter der Dauerbeobachtung noch nicht passiert haben.
Wie alles nach- und nebeneinander im Garten erblüht und verblüht, können wir nie recht im Kopf behalten. In jedem neuen Jahr ist da immer Neues, was gegen die Verabredung zu verstoßen scheint, und zwar meist durch bestimmte Vorläufer und Nachzügler.
Plötzlich steht da eine Reihe hellblauer Ritterspone über einem weißen Irissaum. Es blühen noch bunte Primeln, P. Bullesiana, in unseren Vasen vor uns, während wir schon bei Erdbeeren mit Schlagsahne sitzen.
Immer erlesenere Blumen in immer größerer Fülle umstehen uns regungslos im Garten in üppigster Entwicklung und treten zu Gesamtwirkungen zusammen, deren Stimmungskraft nicht von uns erwartet werden konnte. Die Wirkung der Einzelheiten scheint sich zu vervielfachen, und das Ganze wird etwas anderes als die Summe der Teile.
Pflanze edle Blütengewächse in rechter Weise, und es werden unbekannte Singvögel, unerwartete Schönheitsstimmen aus ihnen singen.
Überall blüht im Garten die Rose Parkfeuer in Riesensträuchern und streut Rosenteppiche über Felstreppen und Steinflanken und blaues Staudengeraniumgetümmel und überdunkelt mit mächtigen Zweiglasten den purpurblattüberschütteten Boden. Hier sang auch der unbekannte Vogel.
Und wieder anderes war unerwartet in den goldfischdurchschwommenen Spiegelbildern blauer Iris sibirica: Fisch und Spiegelblume halten Wechselrede mit altem Geheimnis aus Andersens Märchen. Dieser Iris sibirica schien es märchenhaft gleichgültig, aus fußtiefem Wasser oder zwei Schritt daneben aus tiefer Dürre herauszublühen.
Märchenverwandteste aller Iris sibirica ist die neue hellblaue, Perry's Blue genannt. Hier hat wieder einmal eine Veredlung Wesen der Urerscheinung einer Pflanze tiefer fühlbar gemacht. Das helle warme Blau dieser bald meterhohen Iris mit ihren leichten, kühnen Blumen ist in manchen Mittagsstunden des ersten Vollflors hinreißend schön. Trägt man zum ersten Mal einen Strauß einer so traumhaft veredelten Blume in Händen zum Hause, so hat sie die Kraft, uns das Leben in einer Uranfänglichkeit und Neugeschenktheit fühlen zu lassen, als trennten uns kaum ein paar Stunden von den besten Stunden der Jugend.
Namenlose Düfte und Würze schweben Tag und Nacht durch den Garten hin und wechseln in allen Räumen. Bekannte Düfte scheinen immer schön und verwandlungsreicher, und durch diese Düfte wandeln wir noch mit kleinen Sträußen voll lauter Duftüberraschungen, auf welche die Menschen mit unbeschreiblichem Gesichtsausdruck antworten, die den Duft zum ersten Mal atmen.
Iris humilis, tausendmal edler als Iris graminea, birgt schönste Pfirsichdüfte in ihren seltsamen Blumen, welche die Arme über der Brust kreuzen wie Mohamedaner.
Aus den blaßgelben Hängelocken der Primula sikkimensis strömt eine Mischung indischen Parfüms mit feinstem Pariser Duft. Kaukasischer Diptam, 1,60 Meter hoch, also doppelt so mächtig wie der deutsche, haucht bei Berührung herrlichen Würzgeruch.
Duft jeder Taglilienart meint etwas anderes. Manche Päonie maskiert sich mit himmlischem Rosenduft, kaum einer Rose erreichbar. Charles Levêque heißt solch Duftwunder.
Jetzt blüht auch das Blumenrätsel mit dem verzwickten Namen Codonopsis ovata, aus Himalayafernen gebürtig, und strömt aus der edelgeschnittenen, blaßblauen Glockenblume mit dem rhythmisch bunt gebatikten Blumeninnern unbezeichenbar fremdartigen, Wildtiergeruch aus.
Im Vorübergehen pflückt man einen fliederduftenden Strauß des Phlox Arendsi, der fast noch schöner als Flieder riecht, tut in sein helles Lila Feuerlilien und schwarzblaue Rittersporn kolben, hört dabei das Geruf der Amsel von weit entfernten Waldrändern wirr durcheinanderhallen mit dem Gesang einer nahen Amsel aus grell beleuchteten, blühenden Akazienzweigen vor schwarzem Gewittergewölk.
Diese eine Akazie blüht immer etwas später und dreimal so reich wie alle Akazien der Nachbarschaft, und jene eine Amsel meines Gartens hat sich etwas ganz besonders Schönes ausgedacht und singt ihren Sang

GARTENAUFGABEN / ALTE UND NEUE LÖSUNGEN

Von der Dresdener Jubiläums-Gartenbau-Ausstellung / Zwei Pläne von Gustav Allinger

AUF Seite 115 zeigten wir schon Bilder, aus denen die Lage der *Leuchtfontäne* hervorgeht. Der Plan läßt die Eingliederung noch deutlicher erkennen. Die Fontäne verstärkt bei der nächtlichen Beleuchtung des riesengroßen Rosengartens, der sich von hier bis zum grünen Dom hinzieht, die Wirkung ganz außerordentlich.

Das *Gartentheater* zählt zu den Hauptanziehungspunkten der Ausstellung. Es ist mit großem Geschick in den vorhandenen alten Eichenbestand eingegliedert, wie schon das Bild auf Seite 116 erkennen ließ. Wir geben oben den Grundplan der Gesamtanlage, um diese dadurch noch schärfer zu kennzeichnen.

ganz nach eigener Melodie, die sie mit ein paar neuen, merkwürdig gefallsüchtigen Trillern und Kadenzen versieht.
Wir werden immer aufmerksamer auf besondere Begabungen des Individuums und suchen jene Kräfte der Gattung und der Allgemeinheit nutzbar zu machen. Wir werden auch noch die Verschönerung des Vogelgesanges und die Schönheit der größten Garten- und Waldbäume in die Hände bekommen.
Die Ungleichheit der Begabung ist es, mit der wir dereinst den größten Weltreichtum und Schicksalsausgleich aufbauen werden.
Das moderne Gartengefühl ist hundertmal so breit gelagert wie das unserer Voreltern. Es schwingt zwischen der lauten Prachtblume und dem stillen Felsenblüher, zwischen festlich stilisiertem Wald im Garten und den farbigen Prachtsälen des neuen architektonischen Gartens mit seinen überspannenen Mauern durch alle zwölf Monate des Jahres hin, durchwirkt von einem Wechselspiel von Erfüllung, Spannung und Erwartung, das sich in jedem Jahr bereichert. Daß irgend welche neue Pflanzenarten oder Züchtungen gerade in Knospe stehen, scheint uns allmählich ganz untrennbar vom innersten Wesen des Gartengefühls. Der Steingarten ermöglicht das ja auch für die kleinsten Gartenräume.
Diese Spannungen setzen sich auch bei der einzelnen neuen Pflanze durch Jahre hindurch fort. Zuerst hat man nur eine kleine Pflanze, die noch nicht einmal recht eingewurzelt ist und steht überrascht vor einer einzigartigen roten Blütenfarbe, wie etwa bei der Potentilla Gibson's Scarlet, wohl der wichtigsten roten Steingartenstaude für die zweite Hälfte des Jahres. Im nächsten Jahre ist die Pflanze sehr stark geworden, und ihre spannende Kraft ist noch viel größer als im ersten Jahr. Denn solch Rot und soviel Tugend war überhaupt nicht vorstellbar. Das Jahr drauf trägt wieder die andere Erwartung in sich, wie sich nun ein ganzer Trupp dieser Pflanze tief eingewurzelt am wirksamen Steingartenplatz, durchpflanzt mit schneeweißen, niedrigen Glockenblumen, entfalten wird.
Jeder Quadratmeter unseres ganzen Gartens steckt beständig voller Vorfreuden und Erwartungen. Auch Pflanzen, die uns längst bekannt sind, halten uns immer wieder in neuer Spannung durch eine unerwartete Entwicklung an einem neuen Gartenplatze.
Die Dinge der Welt haben tausend Wege, dem Herzen des Älterwerdenden immer näher zu rücken: »Alles wird mir immer neuer«, heißt es in einem Goethebrief, »und das Vergängliche zieht das Kleid der Unvergänglichkeit an.«

Aus dem Blumengarten der Literatur

Sommernacht

Ich sah wieder über den Rasen weg jenseits des Boskett̄s die ferne Buchenwand des Lusthains in dem bläulichen Duft der Mondscheinbeleuchtung. Durch Zufall war ich immer noch nicht hineingekommen; jetzt aber lockten mich noch mehr als gestern die tiefen Schatten, durch welche sich die Eingänge kenntlich machten. Mir war, als müsse in jenem Labyrinth von Laub und Schatten das süßeste Geheimnis der Sommernacht verborgen sein. Ich sah in den Saal zurück, ob mich jemand bemerkte; dann stieg ich leise von der Terrasse in den Garten hinab. Der Mond war eben hinter den Kronen der Eichen und Kastanien heraufgestiegen, welche denselben nach Osten hin begrenzten. Ich ging an dieser Seite, die noch ganz im Schatten lag, um den Rasen; eine Rose, die ich im Vorübergehen brach, war schon feucht von Tau. Dem Hause gegenüber gelangte ich in das Boskett. Breite Steige schlangen sich scheinbar regellos zwischen Gebüschen und kleineren Rasenpartien; hier und dort leuchtete noch ein Jasmin mit seinen weißen Blüten aus dem Dunkel. Nach einer Weile trat ich auf einen sehr breiten, quer vor mir liegenden Weg hinaus, jenseits dessen sich majestätisch und hell vom Mond beleuchtet die Laubwände der alten Gartenkunst erhoben. Ich stand einen Augenblick und sah daran empor; ich konnte jedes Blatt erkennen; mitunter schwirrte über mir ein großer Käfer oder ein Schmetterling aus dem Laubgewirr in die lichte Nacht hinaus. Mir gegenüber führte ein Gang in das Innere.
Auf diesen Steigen, die ich nun betrat, war eine Einsamkeit, die mich auf Augenblicke mit einer traumhaften Angst erfüllte, als würde ich den Rückweg nicht zu finden wissen. Die Laubwände an beiden Seiten standen so dicht und waren so hoch, daß ich nur wie abgeschnitten ein Stückchen Himmel über mir erblickte. Wenn ich, wo sich zwei Gänge kreuzten, auf einen etwas freieren Platz gelangte, so war mir immer, als müsse aus dem Schatten des gegenüber liegenden Ganges eine gepuderte Schöne in Reifrock und Kontusche am Arm eines Stutzers von anno 1750 in den Mondschein heraustreten. Aber es blieb alles still; nur mitunter hauchte die Nachtluft wie ein Atemzug durch die Blätter.
Nach einigen Kreuz- und Quergängen befand ich mich an dem Rande eines Wassers, das von meinem Standort aus etwa hundert Schritte lang und vielleicht halb so breit sein mochte, und von den es an allen Seiten umgebenden Laubwänden nur durch einen breiten Steig und einzelne am Ufer stehende Bäume getrennt war. Weiße Teichrosen schimmerten überall auf der schwarzen Tiefe; zwischen ihnen aber in der Mitte des Bassins auf einem Postamente, das sich nur eben über dem Wasser erhob, stand einsam und schweigend das Marmorbild der Venus. Eine lautlose Stille war an diesem Platze. Ich ging an den Ufern entlang, bis ich dem Kunstwerke so nahe als möglich gegenüber stand. Es war offenbar eine der schönsten Statuen aus der Zeit Louis Quinze. Den einen der nackten Füße hatte sie ausgestreckt, so daß er wie zum Hinabtauchen in die Flut nur eben über dem Wasser schwebte; die eine Hand stützte sich auf ein Felsstück, während die andere das schon gelöste Gewand über der Brust zusammenhielt. Das Antlitz vermochte ich von hier aus nicht zu sehen; denn sie hatte den Kopf zurückgewandt, als wolle sie sich vor unberufenen Lauschern sichern, ehe sie den enthüllten Leib den Wellen anvertraue.
Der Ausdruck der Bewegung war von so täuschendem Leben, und dabei, während sich der untere Teil der Gestalt im Schatten befand, spielte das Mondlicht so weich und leuchtend um die marmorne Schulter, daß mir in der Tat war, als hätte ich mich in das Innerste eines verbotenen Heiligtums eingeschlichen. Hinter mir an der Laubwand stand eine Holzbank. Von hier aus betrachtete ich noch lange das schöne Bild.
Endlich stand ich auf und irrte wiederum aufs Geratewohl eine Zeitlang in den dunklen Gängen umher. Unweit des Teiches, den ich eben verlassen, fand ich an einem mit niedrigem Gebüsch bewachsenen Platze auf marmornem Sockel noch den Überrest einer zweiten Statue. Es war ein muskulöser Männerfuß, der sehr wohl einem Polyphem gehört haben konnte; und so hatte Vetter Philologe vielleicht nicht unrecht, der jenes Marmorbild für eine Galathea erklärt haben sollte, die vor der Eifersucht des ungeschlachten Göttersohns ins Meer entflieht . . .

Aus: Theodor Storm
„Von Jenseits des Meeres".

Gartenarbeit und Blumenpflege

ALEXANDER STEFFEN / DER SPATEN UND SEIN GEBRAUCH II

Die Handhabung des Spatens

WER nicht linkshändig ist, hält den Spaten an der rechten Körperseite. Die rechte Hand am Griff, die linke am Stiel oberhalb der Blatt-Tülle. Der Spaten wird schräg vorwärts in die Erde gestoßen, Stich neben Stich gesetzt und so energisch, daß der Spaten bis über den Blattrand in die Erde fährt. Das entspricht unserm Streben, tief zu graben, also die Kulturschicht allmählich zu vertiefen. In leichtem Gartenboden begegnen dem tiefen Eindringen keine Schwierigkeiten und dem Hochheben und Vorwärtsentladen auch nicht. Im schweren Boden kostet es nicht nur mehr Kräfte, sondern das Tiefeinstoßen gelingt mit den Armen allein nicht, der auf die Kante gestellte Fuß muß nachhelfen. In solchem Fall haben wir noch keinen Gartenboden vor uns. Es fehlt Humus, Bodenlockerung: also Mist, Gründüngung, Torfmull hinein. Ein weiteres Hindernis bereitet der Mensch selbst dem Tiefgraben. Er wirft keinen genügend breiten Graben auf, in ganz schlimmen Fällen kippt er die abgestochene Erde fast auf den gleichen Platz, wo sie stand. In beiden Fällen legt sich die gelockerte Erde gegen die Grabenwand mehr oder weniger hoch an, wenn ich den Spaten mit dem nächsten Stich hoch heben will, muß ich den Widerstand des vorigen Stiches zum Teil mit überwinden, tue ich es nicht, dann fällt der Stich eben flach aus. In Skizze 7, Seite 161, suchte ich zu verdeutlichen, was ich meine. Dort wird auch der zu steile Einstich gezeigt, der ermüdende Folgen hat, denn nun muß der Spatengriff erst nach hinten heruntergedrückt werden, sonst kann ich den belasteten Spaten nicht hoch heben. Zu schräger Einstich (8) bedeutet flaches Graben. Während das zu steile Graben Anfänger-Ungeschicklichkeit darstellt, ist das zu schräge die Methode der Geriebenen, es geht nämlich schnell und strengt wenig an. Wir sagten früher »lang-englisch«. Wenn man sich manchmal als fleißiger und reeller Graber wundert, wie ein Mitarbeiter scheinbar spielend mitkommt, dann achte man genau auf das Wie, er gräbt eben »lang-englisch« — also flach und kippt mit einem Stich an Erdoberfläche fast soviel um, wie dreiviertel der Blattfläche ausmacht. So lenkt der Mensch selbst bei einer so wundervollen und gesunden Tätigkeit wie dem Graben, das uns in nahe feierliche Berührung mit der Erde bringt, seine Routine nicht nur der angesichts der Ehrwürdigkeit des Objekts einzig sittlichen Bestleistung zu, sondern kann es sich nicht versagen, ins Schwindelhafte abzuschwenken. Ideale verfliegen leicht im Alltag. Die richtige Art zeigt Skizze 10.

Das Graben benutzt man, um die Flächenunebenheiten auszugleichen. Ein geübtes Auge sieht die Löcher und Berge. Aus gleichem Grund muß man überlegen, wo man anfängt. Bei abfallenden Stücken beginnt man an der tiefsten Stelle und arbeitet unter Umständen über Eck. Wenn etwa bei einer Fläche wie Skizze 12 die Ecke A am tiefsten läge, würde man bei ihr mit Graben anzufangen haben. Berghänge gräbt man in der Regel gleichlaufend zur Höhenlinie. Den Aushub des Anfangsgraben werfen wir bei größeren Arbeiten einfach hinten aus. Bei kleinen Flächen richtet man es so ein, daß er zur Füllung des letzten Grabens Verwendung findet. Angenommen, es wäre eine Fläche wie in Skizze 11 zu graben, uns ständen nur drei Arbeitskräfte zur Verfügung, so würde ich bei B beginnen lassen, die Erde teils werfend, teils mit Schubkarre zum Endgraben bei A schaffen, in der Richtung B — D graben und bei D — C mit dem Radius wenden.

Soll man immer *tief* graben? Als Regel muß die Frage bejaht werden. Aber es kann Ausnahmen geben. Wir können vielleicht bei Land, das noch nicht lange in Kultur steht, auf harte zähe Lehmschichten stoßen. Davon dürfen wir nur allmählich etwas an die Oberfläche bringen, und auch nur im Herbst, wo der Frost die harten Klöße noch zerkleinern kann. Im Frühjahr wird sich tiefes Graben oft verbieten, namentlich in leichtem Boden, der viel Wasser verlieren müßte. Dann auch bei Kulturpflanzen, die eine gewisse Bodenfestigkeit fordern wie Möhren, Zwiebeln und bei anderen, wie Mohn, Rittersporn, die das Austrocknen des Saatbeetes so übel nehmen. Flach werden wir etwa im Frühjahr trotz Herbstgrabens nochmals lockern müssen in folgendem Fall: Wir haben einen bindigen Lehmboden, der durch Schnee und Winternässe ganz festgeschwemmt ist. Mit dem Lockern und Graben solcher Böden im Frühjahr muß man vorsichtig sein, es gibt nur wenig Tage, wo sie sich bearbeiten lassen, zu naß entstehen unter Sonneneinfluß harte Klumpen. Sticht man die Erde bei genügender Abtrocknung um, so soll sofort der Rechen folgen. Für solchen zur Verkrustung neigenden Boden muß immer wieder empfohlen werden, im Herbst auf das grob gegrabene Land Torfmull oder Kompost dünn überzustreuen, damit sie sich zwischen die Erdteilchen legen und das Verschlemmen mindern.

Bei sehr bindigem Boden, der gleichzeitig naß ist, soll man dem Gebrauch und den Erfahrungen solcher Gegenden folgen und das Land in lange Hügel von etwa 60 Centimeter oder mehr Breite aufwerfen. Das Verfahren geht so: In der Längsrichtung des Landes wird ein gerader Strich — bei früheren Beeten in der Beetmitte — von zwei bis drei Spatenbreiten umgestochen, auf diesen gegrabenen Streifen wirft man dann von rechts nach links die Hügel (Skizze 10). Nun kann das Land gründlich durchlüften, durchfrieren und verwittern.

Das Graben dient nicht allein der Bodenlockerung, sondern dem Unterbringen von Unkraut. Wenn Kulturen so verunkrauten, daß Hacke und Radhacke versagen, dann müssen wir zum Spaten greifen. Mit ihm läßt sich noch ziemlich hohes Unkraut beseitigen, aber schließlich gibt es auch da Grenzen. Wer in solche bedauernswerte Lage sich gestellt sieht, muß überlegen, ob nicht besser die Sense oder der Pflug in Tätigkeit treten. Scheint Spatenarbeit noch aussichtsreich, so ist erst recht auf breite und tiefe Gräben zu halten, damit das Unkraut wirklich gut abgedeckt werden kann.

Beim Graben lesen wir grobe Unkräuter aus, von denen wir wissen, daß das Bedecken mit Erde sie nicht zum Ersticken bringt. Die gefährlichsten sind: Distel, Ackerwinde, Quecke. Weniger gefährlich: Schachtelhalm, Melde, Franzosenkraut, Saudistel. Bei fleißiger und guter Bodenpflege können sie nicht mächtig werden. Selbst Distel weicht verhältnismäßig schnell bei regelmäßigem Abhacken. Ackerwinde ist sehr zähe. Immer wieder zeitig hacken und bodenbeschattende Kulturen bringen. Quecken lassen sich auch in Schach halten. Am üppigsten wuchern sie auf leichtem Boden. Beim Graben müssen sie immer wieder ausgeschüttelt und ausgelesen werden, im Frühjahr, wenn sie grün spitzen, muß man unter Umständen Leute übers Land schicken, um die Nester auszuheben, im Sommer immer wieder hacken, bis die Kulturpflanze schließt. In schwerem Boden macht das Auslesen von Quecken viel Schwierigkeiten, weil die Enden leicht abreißen. Um ein Feld rein zu bekommen, müßte großer Zeitaufwand getrieben werden. Aber die Quecke hats in solchem Boden auch nicht leicht. Gräbt oder pflügt man tief, so wird ihr das Durchstoßen nach oben sauer. Werden die ersten Neusprosse bekämpft, so bekommen wir das Land erstaunlich schnell rein. Für die Quecke gibt es auch Widerstandsgrenzen und Zeiten der Empfindlichkeit, namentlich im Frühjahr, während sie ausgereift viel aushält.

Die Leistung beim Graben hängt von vielen Umständen ab: 1. von der Schwere des Bodens, je leichter und humoser er ist, um so höher die Leistung, 2. vom Feuchtigkeitszustand, 3. vom Bestand an Unkraut, Wurzeln, Steinen und vom Einbringen oder Nichteinbringen von Dünger, 4. vom Kulturzustand, 5. vom Wetter, Regen, Kälte, Wind, drücken auf die Arbeitsstimmung, 6. von der Güte des Geräts, 7. vom Geschick des Arbeitenden, seiner Körperkraft, seinem Arbeitswillen, 8. von der Arbeitsdauer. Wer nur zwei Stunden zu seiner Erholung gräbt, wird höhere Flächenleistung je Stunde erzielen als jemand, der im Tagelohn neun Stunden graben muß, 9. Stücklohn (Akkord) hebt die Leistung. Die Angaben, welche oft in Veröffentlichungen erscheinen, haben also nur dann Wert, wenn die wichtigsten Begleitumstände genannt werden. In schwerem, nassem Boden haben fünf Frauen und zwei Männer 1924 bei uns eine Stundenleistung von 12 Geviertmetern erreicht, womit ich im Hinblick auf die Schwierigkeit der Arbeit zufrieden war. Bei anderer Gelegenheit war ich aber unter günstigeren Bedingungen von 20 qm nicht befriedigt. Bei tiefem, ordentlichem Graben leichten Bodens, ohne Düngereinbringen, ohne viel Quecken, Wurzeln, Steine-Auslesen bei freiem Gelände können 30 qm gut erwartet werden.

Spatenarbeit und Graben wird als Handarbeit immer teuer sein, sodaß ein guter Betriebsleiter suchen muß, von ihr möglichst loszukommen und sie durch Pflug- und Pferdearbeit oder Fraise zu ersetzen. Für beide sind bestimmte Betriebsgrößen Voraussetzung. Pflugarbeit ist der Spatenarbeit zwar an Schnelligkeit der Leistung weit überlegen, aber nicht an Güte. Mit Spaten wird eine bessere und tiefere Lockerung erzielt.

Die Fraiſe aber liefert beſſere Arbeit, billigere und ſchnellere. Es gibt alſo Grenzen der Spatenarbeit.

Spaten und Graben ſcheinen ſo einfache Dinge und, doch bleibt viel noch über ſie zu ſagen und an ihnen zu lernen. Wenn man mit unſeren Weiſen in der Anſicht übereinſtimmt, daß es Unwichtiges in der Welt nicht gibt, dann dürfte es auch erlaubt ſein, dieſen Geräten und ihrer Anwendung eine eingehende Betrachtung zu widmen. Millionen von Händen kommen als Nutznießer in Betracht. Eine Spaten-Monographie wäre eigentlich fällig. Sie müßte nicht nur die techniſche Seite des Gerätes, ſondern auch die geſundheitliche herausarbeiten: Heilbringer für die Dicken und Muskelſchwachen, Helfer zum tiefen Einatmen geſunder Luft, Frühjahrskur beſſer als Kräutertee und Aderlaß.

FRITZ LEMPERG / TEMPERATURBEOBACHTUNGEN IM GARTEN

ICH halte es ſo wie Mr. Cox, der Herausgeber der bekannten engliſchen Zeitſchrift »The Garden«, einmal im Leitartikel einer Nummer hingeworfen hat, für ausgemacht, daß in ſo ziemlich jedem echten Gartenfreunde auch ein Stückchen Experimentator ſteckt, oder wie Cox ſich ausdrückt, daß jeder Gartenfreund gerade eben jene Gewächſe am liebſten kultivieren möchte, für die das Klima ſeines Gartens nicht mehr geeignet iſt. Das durch dieſe Experimentierfreude neben zahlloſen Mißerfolgen auch tatſächlich außerordentlich wertvolle Entdeckungen gemacht worden ſind, iſt ſicher; denn ſie brachte es mit ſich, daß Pflanzen heute eingebürgert ſind und ſich als hart erweiſen wie: vom Kapland die Kniphofia-(Tritoma-)Arten, viele aus dem Mittelmeergebiete ſtammende Arten, Iris aus perſiſchen und turkeſtaniſchen Wüſten, Berberis aus dem Feuerlande, die Passiflora coerulea aus braſilianiſchen Urwäldern und das Delphinium macrocentron aus dem Kenya-Gebiet in Zentral-Afrika. Wenn alſo das Experimentieren auf dieſem Gebiete ein zwar meiſt recht koſtſpieliges, aber doch immerhin in manchen Fällen auch erfolgreiches Vergnügen iſt, ſo war die Frageſtellung, die ich mir vorlegte, eine berechtigte: »Wie groß ſind die feſtſtellbaren Temperaturunterſchiede innerhalb *desſelben* Gartens, gegeben durch offene rauhe Lage, Schutz einer Hauswand, Sonnen- und Schattenſeite und Winterſchutz?« Ich wollte alſo wiſſen, wie für meine Experimente die günſtigſten Verhältniſſe erzielbar ſeien.

Ich benutzte den letzten, wohl genugſam rauhen Winter, um mit genau aufeinander abgeſtimmten Maximum-Minimum-Thermometern dieſer Sache auf den Leib zu rücken, die bisher eine mehr gefühlsmäßige Löſung gefunden hatte. Ich möchte ausdrücklich aber bemerken, daß mir durchaus klar iſt, daß die Temperatur nur eine *Teilerſcheinung* jener Vielheit darſtellt, die wir als Klima bezeichnen. Erlebniſſe aber, wie im letzten Winter, daß auf derſelben Felſengruppe, kaum zehn Meter Luftlinie voneinander entfernt, die eine Gruppe Neuſeeländiſcher (und nahe verwandter) Veronica-Arten mit dem gleichen Schutz von einigen Reiſigzweigen bis zum Grunde erfriert und die andere nicht ein Blättchen gebräunt erhält, beweiſen genugſam, daß jener oft gehörte Ausruf »Warum gedeiht dieſes oder jenes im Nachbargarten und nicht bei mir!« nicht immer mit einem reſignierten Achſelzucken erledigt werden ſollte, ſondern daß durch genaues Studium der Temperaturverhältniſſe — denn um dieſe Teilerſcheinung des Klimas handelt es ſich im vorliegenden Falle — auf *engem* Raume doch gewiſſe, allerdings in beſcheidenen Grenzen liegende Erfolge erreicht werden können, wenn man geneigt iſt, daraus ſeine Lehre zu ziehen.

Die Verſuchsanordnung mit den verglichenen Thermometern war in meinem Garten in Hatzendorf in Steiermark zunächſt folgende:

1. Es wurden die Inſtrumente an der *Nord*ſeite des Hauſes und an der *Nord*ſeite einer vollſtändig ungeſchützt liegenden, weit entfernten Felſengruppe angebracht. Es zeigte ſich in der Beobachtungsperiode zwiſchen 7. und 12. Dezember, daß das Nachtminimum an der entfernten Felſengruppe durchſchnittlich ein bis zwei Grad niedriger lag als in der ſchützenden Nähe des Hauſes; das Tagesmaximum ſchwankte nach beiden Seiten, was wohl dahin zu erklären iſt, daß bei dem kompakteren Schatten des Hauſes die Erwärmung bei ſonnigem Wetter eine weniger günſtige iſt als am Alpinum. Die Maximalſchwankung betrug nie mehr als zwei Grad (Tabelle I). Es ergibt ſich daraus, daß bei einer Kälte von zehn bis vierzehn Grad ſich durch die ſchützende Nähe des Hauſes ein Vorteil von immerhin ein bis zwei Grad gegen eine ganz analoge ungeſchützte Lage erzielen läßt.

2. Die zweite Verſuchsanordnung bezieht ſich auf Sonnen- und Schattenſeite des Hauſes. Gebraucht wurde an der Sonnenſeite kein Schwarzkugel-Thermometer, wie es zu exakteren meteorologiſchen Verſuchen Verwendung zu finden pflegt, ſondern Maximum-Minimum-Thermometer gleicher Type. Trotz der dadurch ungünſtigen Verhältniſſe ergaben ſich ganz außerordentliche tägliche Temperaturſchwankungen an der Sonnenſeite während einer längeren Beobachtungsperiode. Es zeigte ſich, daß zwar das Nachtminimum der Sonnenſeite durch Wärmeſpeicherung in der Mauer durchſchnittlich ein bis zwei Grad, in einem Falle (17. XII.) allerdings um ſechs Grad höher lag als auf der Schattenſeite. Das Bild, das an ſich deshalb einen günſtigen Eindruck zu machen ſchien, wird aber vollkommen dadurch verwiſcht, daß an ſonnigen Tagen die tägliche Wärmeſchwankung nach oben an der Sonnenſeite, ſelbſt ohne Schwarzkugelthermometer, eine ſo außerordentliche iſt, daß der günſtige Einfluß der Sonnenſeite auf das Nachtminimum dadurch vollkommen verwiſcht wird. So war an einem Tage, 17. Dezember, eine Wärmeſchwankung von 38 (— 14 bis + 24) Grad und am 12. Januar eine von 39 (— 11 bis + 28) Grad zu beobachten (Tabelle II und IV). In der Verſuchszeit vom 1. bis 9. und 19. bis 24. Januar betrug die Wärmeſchwankung täglich durchſchnittlich 30 Grad. In der gleichen Beobachtungszeit betrug die tägliche mittlere Wärmeſchwankung auf der Schattenſeite nur etwa 10 bis 12 Grad und erreichte als Maximum 18 Grad. Wenn man nun bedenkt, daß die dunkle Rinde von Gehölzen, die dunkle Farbe der Blätter immergrüner Gehölze und bei ſchneefreiem Wetter die dunkle Farbe des Erdbodens eine viel ſtärkere Wärmeabſorption bedingt, als die blanke Queckſilberſäule, ſo ergibt ſich daraus, daß die Wärmeſchwankungsinſulte, die die lebende Pflanze erleidet, ſicher höher zu bewerten iſt, als die angeführten Zahlen andeuten. Kein Wunder, wenn in ſolchen ungünſtigen Lagen die Zellwände dem Spiel vom Auftauen und Wiedererfrieren erliegen. So ſind mir in ſolchen ungünſtigen Lagen im letzten Winter die anerkannt winterharten Clematis paniculata und montana erfroren, während ſich, wie oben erwähnt, in günſtiger Lage die bekannt ſchwierigen holzigen Veronica-Arten gehalten haben.

3. Die dritte Verſuchsreihe war der Frage gewidmet, welchen Einfluß Winterſchutz auf die Temperaturverhältniſſe auszuüben geeignet iſt. Der Winterſchutz beſtand in einer mehrſchichtigen, frei angebrachten Reiſigdecke an der Südſeite des Hauſes. Das eine Thermometer befand ſich innerhalb der niedrigen Gehölze, das andere an der Sonnenſeite des

DEZEMBER 1925. JANUAR 1926.

MAXIMUM / MINIMUM

I TIEFER SCHATTEN. AM HAUS: ——— UNGESCHÜTZT: ·······
II AM HAUS. 1. STOCK. NORDSEITE: — — — SÜDSEITE: ———
III SÜDSEITE, BODENNÄHE. UNTER WINTERSCHUTZ: ——— OHNE WINTERSCHUTZ: —·—
IV TAGESSCHWANKUNG 6 m ÜBER DEM BODEN: NORDSEITE: —·—·— SÜDSEITE: ××××××
V TAGESSCHWANKUNG, BODENNÄHE, SÜDSEITE. MIT WINTERSCHUTZ: +—+—+ OHNE WINTERSCHUTZ: ++++

Winterſchutzes außen. Zunächſt zeigte ſich, daß das Tagesmaximum *und* Minimum in der Sonne an der *Außenſeite* des Winterſchutzes in der Nähe des Erdbodens durchwegs niedriger war, als die in der Höhe des erſten Stockes, etwa ſechs Meter über dem Erdboden, gefundenen Zahlen, und zwar durchſchnittlich etwa das Maximum um zwei bis vier, das Minimum um ein bis drei Grad. Praktiſch ergibt ſich daraus, daß die Kronen hoher Bäume eher des Vorteiles des Berghangklimas teilhaftig werden, als die in der ſtagnierenden kalten Bodenluft ſich befindenden kleinen Gehölze, die einer niedrigeren Nacht- und Tagestemperatur ausgeſetzt ſind, ferner, daß man, wenn man die Möglichkeit hat zu wählen, mit den empfindlichen Gehölzen an den höchſten Punkt der Anlage gehen ſoll.

Es iſt ja eine bekannte Erſcheinung, daß Reif am Boden bei einer Temperatur über null Grad in der Luft (einige Meter höher) auftritt, ſowie, daß Täler oftmals vom Reif heimgeſucht werden, wo Hügelhöhen ſchon um 100 bis 200 Meter darüber verſchont bleiben.

Betrachtet man die Verhältniſſe, wie ſie *unter* dem Schutz von Reiſigzweigen herrſchen, ſo ergibt ſich die immerhin überraſchende Tatſache, daß ſowohl das Tagesmaximum (!) um zwei bis drei Grad niedriger iſt als auf der Nordſeite des Hauſes, als auch, daß das Minimum höher liegt als an der *Südſeite* außerhalb des Winterſchutzes und zwar um ganz beträchtliche Werte von 4 bis 6 Grad, ſodaß die tiefſt gemeſſene Temperatur von fünfzehn Grad auf der Außenſeite des Winterſchutzes einer ſolchen nur von ſieben Grad unter demſelben entſprach (22. I.) Die tägliche Wärmeſchwankung iſt ſomit die niederſte erzielbare und bewegte ſich zwiſchen ſechs und acht Grad (Tabellen III und V).

Aus dieſen Unterſuchungen zuſammen ergibt ſich, daß es durch entſprechende Wahl der Beſonnungsverhältniſſe im Winter möglich iſt, die Unbilden des mitteleuropäiſchen Winters durch die ſehr kraſſen Temperaturſchwankungen zwiſchen Tag und Nacht bis zu einem beträchtlichen Grade zu mildern und zweifellos manche Gewächſe, die an einer ungünſtig gelegenen Stelle des Gartens dieſen zerſtörenden Einfluß beſonders an ſehr ſonnigen Tagen ausgeſetzt wären und ihm erliegen würden, an entſprechend gewählten anderen Stellen, unter Zuhilfenahme von Winterſchutz am Leben zu erhalten.

Es geht aus den gefundenen Zahlen einwandfrei hervor, daß es an einer günſtigen Stelle gelingt, das Nachtminimum bis um ſechs bis acht Grad zu mildern und die Wirkungen der ſengenden Winterſonne um 20 bis 25 Grad herabzuſetzen. Dabei dürfte ſich ergeben, daß die Südſeite unter dem Wärmeſpeicher einer größeren Hausmauer (oder auch größere Steinmaſſen eines Alpinums) ſich als ſpeziell günſtig zur Kultur heiklerer Stauden und Zwiebelgewächſe erweiſt, dort haben Scilla peruviana, Amaryllis Belladonna, Statice coccinea den gewiß ſehr harten Winter überſtanden. Die Südweſt- und Weſtſeite aber dürfte ſich zur Kultur von immergrünen Gewächſen am geeignetſten erweiſen. Falls man ſich außerdem noch den tieferen Stand der Winterſonne an der Südſeite eines an einem Hang gelegenen Gebäudes von dunkler Mauerfarbe dadurch nutzbar machen kann, daß man immergrüne Gehölze ſo im winterlichen Schlagſchatten einer Coniferenhecke anbringt, daß ihr Holz von den ſteil auffallenden Strahlen der *Sommer*ſonne doch noch getroffen und gut zur Ausreifung gebracht werden kann, ſo dürften die in unſerem Klima günſtigſten Bedingungen geſchaffen ſein, die überhaupt erreichbar ſind.

Zweck dieſer Zeilen iſt, Liebhaber anzuregen, das »Klima« ihres eigenen Gartens in ſeinen verſchiedenen Örtlichkeiten ſelbſt näher zu ſtudieren, weil dadurch ſicher mancher Mißerfolg vermieden werden kann. Ich möchte aber zum Schluſſe, um jeglichem Mißverſtändniſſe vorzubeugen, nochmals ausdrücklich darauf hinweiſen, daß Winterkälte nur eine relativ geringfügige Teilerſcheinung des Klimas einer Landſchaft darſtellt, daß Luftfeuchtigkeit, Niederſchlagsmengen, Radioaktivität des Bodens beziehungsweiſe Ioniſation der Luft, Zahl der ſonnigen Tage und Verteilung aller dieſer Elemente auf die verſchiedenen Jahreszeiten eine gewiß ebenſo bedeutende Rolle ſpielen. Alle dieſe Bedingungen ſollte man beſſer kennen, um ihnen Rechnung zu tragen.

Bepflanzungspläne

Einjahrsblumengarten

DER Grundplan zeigt den auf Seite 169 geſchilderten Heinemannſchen Einjahrsblumengarten in Erfurt. In dem Plan ſoll nur der äußere Rahmen und die Grundeinteilung feſtgelegt ſein. Es ſoll kein Farbengarten ſein und kein Garten, der durch feſtliegende Beetformen mit den Jahren ermüden und langweilig werden muß, ſondern ein Garten, der alljährlich ſein Geſicht wechſelt und das Intereſſe des Beſitzers immer wach erhält. Dieſes Ziel ſoll erreicht werden durch: Wechſelnde Unterteilung der Beetflächen, bunte oder einfarbige Bepflanzung, regelmäßiges oder regelloſes Einſtreuen von farbigen Tuffs, Verwendung von Blattpflanzen (Ricinus, Zea, Atriplex), regelmäßige Anordnung von Annuellen mit ſtreng ſymmetriſchem Bau (Kochia, Artemisia), Unterteilung durch Sommerhecken (Cosmos, Perilla, Cannabis), Berankung mit zierfrüchtigen, einjährigen Schlingern und andere Möglichkeiten, die ſich durch die jahrelange Beſchäftigung mit dieſer Materie und durch Verſuche noch ergeben werden. Zunächſt war folgende Bepflanzung vorgeſchlagen:

Frühjahrsbepflanzung

1. Viola tricolor maxima orchideaeflora. 2. Viola tricolor maxima Goldelſe. 3. Grauer Kiesſtreifen. 4. Flache Raſenböſchung. 5. Myosotis dissitiflora perfecta. 6. Raſeneinfaſſungen. 7. Silene pendula compacta Karminrot. 7a. Saponaria multiflora compacta Scharlachkönigin. 8. Hyacinthen-Ritterſporn, gemiſcht. 8a. Papaver somniferum, glühendrot. 9. Bellis perennis Schneeball. 10. Erysimum Perofskianum (Cheiranthus Allionii). 11. Stauden. 12. Tulpen oder Hyacinthen. 13. Immergrünes Strauchwerk: Rhododendren, Kirſchlorbeer oder Phillyrea Vilmoriniana. 14. Wintergrüne Farne vor Efeuwand. 15. Annuelle Schlinggewächſe verſchiedener Art.

Sommerbepflanzung

1. Tagetes nana, dunkelgelb. 2. Ageratum, gute blaue Sorte, niedrig. 5. Senecio elegans purpurea. 7 und 7a. Hohe Antirrhinum majus, ge-

miſcht. 8 und 8a. Gemiſchte hohe Aſtern in zwei Klaſſen nach Abblühen der Delphinien und Papaver. 9. Phlox Drummondii, niedrig, gemiſcht. 10. Petunia Norma, blau und weiß, einfach. 12. Cosmos hybridus, roſa oder weiß, hoch.

Infolge ſtarker Inanſpruchnahme der Arbeitskräfte im Gärtnereibetriebe während des Verſandes war jedoch die rechtzeitige Fertigſtellung des Gartens nicht möglich, und die Bilder zeigen daher folgende Bepflanzung:

1. Tagetes patula nana Ehrenkreuz. 2. Ageratum mexicanum nanum Blauſternchen. 5. Petunia nana compacta Purpurviolett. 7 und 7a. Antirrhinum majus nanum. 8 und 8a. Fuchſien, Prachtmiſchung. 9. Cäcilienphlox, Prachtmiſchung. 10. Petunia hybrida Norma. Der Laubengang und die Spaliere waren mit: Cobaea scandens, Ipomaea purpurea und Tropaeolum peregrinum berankt, die Fenſterkäſten am Schuppen waren mit Lobelia hybrida pendula Saphir bepflanzt. *K. Pöthig.*

Auf dem Balkon

Erfahrungen in der Balkonpflanzung

SEIT ſechzehn Jahren bin ich bemüht, die Bepflanzung des Balkons und der Veranda in unſerem Landhaus in harmoniſche Übereinſtimmung mit dem Geſicht des Gebäudes und dem Rahmen des Gartens zu bringen. Es hat viel Lehrgeld gekoſtet und mancherlei Enttäuſchung gegeben. An dieſer Stelle will ich aber mehr von meinen guten als von meinen ſchlechten Ergebniſſen berichten.

Als Laie fing ich an. Ich brachte außer großer Liebe zu den Blumen und einem gewiſſen maleriſchen Gefühl keine ſelbſtändigen Erfahrungen mit. So muß ich mit Beſchämung eingeſtehen, daß ich zuerſt etwas gedankenlos die damalige große Berliner Mode mitmachte, roſa Peltaten mit Meteorpelargonien zuſammen zu pflanzen.

Heute kann ich an dieſe Farbenverbindung nur mit Schauder zurückdenken. Gewiß, die Blumenkäſten ſtanden bald in üppigſter Blütenfülle, aber die beiden Farbentöne klangen mir immer als unerhörte Diſſonanzen.

Die Meteorpelargonie mit ihrem jauchzenden Mohnrot iſt ja überhaupt in einem Roſengarten oder in Verbindung mit Roſen unmöglich, während ſie auf großen grünen Plätzen ſehr ſtarke Wirkungen auslöſen kann. Alſo das war nichts.

Nun verſuchte ichs mit Zuſammenpflanzen von lauter bunten Blumen, Margueriten, Petunien, Nelken, Lobelien, Frauenſchuh und Hängepelargonien. Das ergab an ſich eine ganz reizende Wirkung, die etwas ſommerlich Fröhliches, etwas ländlich Buntes beſaß. Doch lag die Schwierigkeit, den Käſten dauernd ein harmoniſches Bild zu geben, in der verſchiedenen Blühzeit und dem ungleichmäßigen Wachstum der Pflanzen. Der Plan mußte ſchon vor der Pflanzarbeit genau durchdacht ſein, damit keine Lücken und kahlen Stellen im Laufe des Sommers entſtanden; dieſe Zuſammenſtellung hatte auch den Nachteil, daß ſie ziemlich koſtſpielig war. Ich verſuchte es dann auch einen Sommer lang mit bunten Petunien, war aber davon garnicht befriedigt. Nun tauchte die Karlsruher Rathauspetunie auf. Die Üppigkeit und Fülle der blauvioletten Blüten, ganz beſonders der ſtarke und dabei liebliche Duft taten mir es an. Ich fand dann aber doch, daß das tiefe Violett einen zu ſchwachen Gegenſatz zum braunen Holz des Balkons und zum ockergelben Bewurf des Hauſes bot.

Im nächſten Jahr pflanzte ich alſo weiße Petunien. Damit hatte ich meinen erſten großen »Schlager«. Jahrelang wurden die Balkon-, Veranda und Gartenmauerkäſten mit weißen Petunien bepflanzt; bei guter Erde und öfterem Nachdüngen gediehen ſie herrlich; es ſah ſich an, als ſeien dicke weiße Teppiche über alle Brüſtungen und Fenſterbretter gebreitet. Eine Enthuſiaſtin tat einmal den Ausruf: »Bei Ihnen kocht ja die Milch über.« Da man ſich aber auch an das Schöne allzuſehr gewöhnt und ſchließlich nach Abwechſlung verlangt, ſo habe ich mir in dieſem Frühjahr eine neue Bepflanzung ausgedacht, die im beiſtehendem Bilde wiedergegeben iſt. Es iſt eine dicke Reihe der roſaroten Petunie Pfingſtröschen mit einer Vorpflanzung von weißbunter Glechoma, einer Gundermannart, die außerordentlich ſchnell wächſt und einen dichten Silberſchleier ausbreitet.

Die feinen Farbengegenſätze ſind auf dem ſchwarzen Bilde natürlich nicht erſichtlich, aber ſie wirken überraſchend ſchön und warm. Zudem hat dieſe Petunie eine roſa Färbung, die ſich mit allen roten und roſa Farben ausgezeichnet verträgt. Rechts im Bilde ranken Schlingroſen in die Höhe, Tauſendſchön, Eiſenach und Dorothy Perkins, die mit dem Petunienband zu einer leuchtenden Flamme zuſammenſchlagen. Daß der Rieſenritterſporn am Fuße der Veranda die Farbenwirkung nicht beeinträchtigt, ſondern erhöht, kann ich verſichern.

Den Blumenkübel mit Tropaeolum, der daneben ſteht, werde ich wohl entfernen müſſen, wenn er blüht, denn roſenrot und gelborange gehen nicht gut zuſammen. *Grete Höcker*

Die Blume im Gefäß

PFINGSTROSEN ſind der Ausdruck überquellender Lebensfreude im Garten. Sie vereinen breite lebendige Behäbigkeit mit einer Fülle ſchier unerſchöpfbarer Feinheiten im Antlitz der Blumen. So wirken ſie ſowohl als maſſige Fülle in weit geformter Vaſe verbunden wie als Einzelblume. Im erſten Falle glüht ein Farbenrauſch im Zimmer auf oder blendet uns ein weißer Widerſchein, während die Einzelblume, zumal die ſich eben öffnende, uns lockt, ſie liebend aus größter Nähe zu beſchauen. Gefüllte wie einfach blühende Formen haben ihre eigenen Reize. *C. S.*

Am Wege

Sortenwirrnis in Staudenkatalogen

SEIT langem iſt es eine dringende Notwendigkeit, daß einmal die arten- und ſortenreichen Gattungen wie beiſpielsweiſe Aſter, Anemone, Chryſanthemum, Dahlia, Delphinium, Gladiolus, Iris, Paeonia, Pyrethrum, Phlox, Trollius und ähnliche monographiſch bearbeitet werden. Zur Kennzeichnung der ſo überaus zahlreichen Gartenformen ſtehen faſt nur die Kataloge der erſten Firmen aus Deutſchland, England, Frankreich, Holland oder Nordamerika zur Verfügung. Es herrſcht aber in dieſen Katalogen eine arge Sortenwirrnis und große Unklarheit in der Benennung und Beſchreibung der Gartenformen. Namenverdrehungen, falſche oder mindeſtens unklare Farbenbezeichnungen ſind an der Tagesordnung. Es liegt nun im allgemeinen Intereſſe der Züchter wie der Käufer, daß dieſem Mangel abgeholfen wird. Ein Anſatz dazu iſt in dem amerikaniſchen Werke Standardized Plant Names zu finden, worin jedoch nur die lateiniſchen Benennungen und teilweiſe auch die Sortennamen bei Gattungen wie Roſa, Gladiolus, Paeonia oder Iris mit Angabe der Züchter verzeichnet ſind. Es fehlen jegliche Angaben über Farben und eventuell auch Höhe und Blütezeit.
Ich möchte nun heute auf einige der größten Mängel in den Angaben der Kataloge hinweiſen und dieſe an beſtimmten Beiſpielen erläutern. Man kann dabei zwei Fehlergruppen unterſcheiden: unbeabſichtigte, wie Sortenunklarheit, ungenaue Farbenbezeichnurg, Namenverdrehung und ähnliches, ferner abſichtliche, die vor allem durch mangelhafte Überſetzung fremdſprachlicher Benennungen entſtehen.
Als Beiſpiel für Sortenwirrnis diene die Anemonenſorte Lady und Lord Ardilaun. Es handelt ſich dabei um zwei weiß blühende Sorten, deren eine gefüllt, die andere einfach iſt. Welche aber iſt die einfache und welche die gefüllte? Da es ſich um eine engliſche Züchtung handelt, zieht man die engliſchen Kataloge zu Rate. Ich nehme nun zwei ſolche erſter engliſcher Staudenfirmen zur Hand und finde in dem einen: »Lord Ardilaun, large white flowers, double row of petals«, im anderen »Lord Ardilaun, pure white, double row of petals« und »Lady Ardilaun, pure white ſingle«. Die deutſchen Kataloge weiſen bald die eine, bald die andere Bezeichnung auf. So heißt es hier »Lord Ardilaun, große, einfache, weiße Blume, außen ſchwachroſa Schimmer« und bei Lady Ardilaun »weiß mit rötlichem Schimmer, halbgefüllt«, ein anderer Katalog gibt an, daß Lady Ardilaun eine vergrößerte Honorine Jobert ſei, alſo einfach. Wem ſoll man da glauben?
Irreführend und botaniſch wie gärtneriſch falſch ſind auch ſolche Bezeichnungen wie »Aſter Boltonia latiſquama«. Boltonia iſt eine von Aſter botaniſch verſchiedene Gattung, man kann alſo, wenn man ſie unter Aſter einreiht, nur ſchreiben Aſter (Boltonia) latiſquama, doch iſt eine A. latiſquama botaniſch bisher nicht aufgeſtellt worden.
Ein ſehr wunder Punkt in Katalogbeſchreibungen iſt die *Farbenbezeichnung*. Man verſuche es einmal, nach den Farbenangaben in Katalogen dunkelrote Phloxe zu beſtimmen. Vor all den ſcharlachorange, purpurviolettroſa, purpurroſa, ſcharlachkarminzinnober und ähnlichen ſinnloſen Angaben wird einem blau oder rot vor den Augen. Die Zuſammenkoppelung ſich ganz widerſprechender Bezeichnungen iſt an der Tagesordnung. Orange wird beſonders gern mit zinnober verwechſelt, obwohl doch die Farbe der Orange jedem Gärtner bekannt ſein ſollte. Die engliſchen Farbenangaben ſind im Durchſchnitt viel verläßlicher als die deutſchen. Mit ihrem pink, crimſon, mauve, ſalmon, lilac und je nach Abſtufung dem Zuſatze soft, deep, rich, bright vermögen die Engländer eine viel klarere Farbenſkala aufzuſtellen. Vielleicht wäre überhaupt die Farbenangabe auch für deutſche Kataloge viel eindeutiger, wenn man die Farbentöne allbekannter Blumen und Früchte zum Vergleich heranziehen würde, wie enzianblau, ageratumblau, citronengelb, kaſtanienbraun, amarantrot, mohnrot. Weniger entſchuldbar aber ſind die falſchen Angaben, wenn etwa ein dunkelroter Phlox als roſa, eine rein blaue Aſter als violett bezeichnet wird. Oder wenn man, wie dies ſeitens einer großen Gärtnerei geſchieht, eine Aſter Novae Angliae, halbhoch, »weiß« anbietet, während doch bisher weiße Novae Angliae-Aſtern noch ganz unbekannt ſind.
Mit dem Lateiniſchen ſtehen die Gärtner auch nicht ſelten ſehr auf dem Kriegsfuße. So bietet eine bekannte ungariſche Gärtnerei eine »Aſter perenne cordifolia elegans« an. Dabei muß man unwillkürlich an die Geſchichte von dem Ungarn denken, der die deutſche Sprache für ſo ſchwer erklärte, weil man darin in einem Satze die Artikel aller drei Geſchlechter hintereinander finden könnte. Auf das ungläubige Geſicht des andern erwiderte der Ungar: »No ja, wenn's heißt, Daß di der Teufel hol!« Bei der Aſter iſt es in der Tat ähnlich. Aſter iſt männlich (wenigſtens im Lateiniſchen), perenne fächlich und cordifolia weiblich.

Unrichtige Schreibart iſt nur zu häufig in vielen Katalogen auch ſonſt recht guter Firmen. Selbſt in engliſchen heißt es beiſpielsweiſe bald Aſter Novae Angliae Mrs. »Raynor«, bald Mrs. »Rayner«. Neben dem richtigen »Top« Sawyer findet man »Tom« Sawyer, neben »Lil Fardell« das unzutreffende »Lill Fardel«, oder auch Beauty of »Colwall« neben Beauty of »Colwell«. Iſt es dann zu verwundern, daß in deutſchen Katalogen bald dieſe, bald jene Schreibart auftaucht? Deutſche Namen werden in engliſchen Katalogen ſehr oft entſtellt; ſo fand ich bei Phlox-Sorten ein Freifraulein von Lassburg, ein G. A. Strohlein, General von Hentz, Hannz Pfleiderer und Wolfgang von Goeth. Bei einiger Achtſamkeit laſſen ſich doch ſolche Fehler ſehr leicht vermeiden. Vor allem in Katalogen. Schwieriger iſt es auf den Etiketten der Beete, die von Gehilfen geſchrieben werden. In Pruhonitz gab es beiſpielsweiſe Lohengrün, Brumhilde, Schneewitzchen, Max Niobe (Chryſanthemum maximum Niobe) oder gar Wolf. Ganc. v. Goeth (Wolfgang von Goethe).

Schlimm ſteht es mit der Überſetzung fremdſprachlicher Namen in die Sprache des Kataloges des betreffenden Landes. Oft wirkt es wie kindiſcher Chauvinismus, oft iſt es nur das Beſtreben, den Kunden verſtändliche Namen vorzuführen. Dies letzte hat ſelbſt große Firmen veranlaßt, die verſchiedenen fremdſprachigen Bezeichnungen in die Sprache des Kataloges zu überſetzen. So verdeutſchen deutſche Kataloge die engliſchen und franzöſiſchen Namen, und umgekehrt tun es Engländer und Franzoſen. Holländiſche Kataloge führen ſogar für die deutſchen Originalnamen engliſche Bezeichnungen ein. Da findet man beiſpielsweiſe unter den Iris »Snowcup« (Schneekuppe), »The Bride« (Die Braut), »Giant of Connern« (Rieſe von Connern), »Flamming Sword« (Flammenſchwert) oder »Peacock Eye« (Pfauenauge). Bei Phlox iſt aus Nordlicht ein »Northern Light« und aus Gruppenkönigin eine »Queen of Groups« geworden. Ein beſonderes Sprachmonſtrum iſt aus Phlox Alpenglühen geworden durch »Alpenglow«, eine deutſch-engliſche Hybride.

Die japaniſche Anemone Königin Charlotte heißt in Holland und England Queen Charlotte, in Frankreich Reine Charlotte. Der Pruhonitzer Katalog müßte ſie dann als Kralovna Charlotte führen, und ſo würde man ſie manchem deutſchen Gärtner als Neuzüchtung verkaufen können. Auch in der Tſchechoſlovakei gibt es ja Gärtnereien, die dieſem Überſetzungsunſinn huldigen und neben einer Roſe »Pani Karel Druſchki« einen Phlox »Létvodén« (Sommerkleid) und ein Chryſanthemum indicum »Videnska perla« (Wiener Perle) führen. Noch häufiger iſt die Roſe »Pozdrav z Teplicum« anzutreffen, wobei die Überſetzung auch noch falſch iſt, denn die Roſe heißt Gruß an Teplitz und nicht Gruß aus Teplitz. Solche Überſetzungen fallen ſehr häufig falſch aus. So wurde aus der oben erwähnten Iris pumila Schneekuppe im engliſchen Snowcup (Schneebecher) oder auch Snowcap (Schneemütze), ſtatt Snowtop. Die Sorte wird vielfach fälſchlich Schneekoppe benannt.

Auch in den Katalogen großer deutſcher Firmen ſind ſolche Überſetzungen nicht ſelten. Eine Aſter ericoides »Entzücken« war mir lange Zeit unbekannt, bis ich daraufkam, daß es ſich um die engliſche Züchtung »Delight« handelte. Oder wer würde hinter Aſter Novae Angliae »Kleinod« ſofort die engliſche Züchtung »Treaſure« vermuten? Wie würde ſich ein franzöſiſcher Gärtner freuen, wenn er ſich als ihm unbekannte deutſche Neuheit die Aſter »Allerheiligen« beſtellen und dann die franzöſiſche Züchtung »De la Touſſaint« erhielte! Die Anemone »Weiße Rieſin« entpuppt ſich als die »Géante des Blanches«. Die Aſter Schöne von Colwall (Beauty of Colwall) geht noch an; ihr engliſches Gegenſtück iſt die Beauty of Ronsdorf (Schöne von Ronsdorf). Gefährlicher iſt ſchon Perry's Liebling (Perry's Favourite).

Schlimm ſteht es mit der Aſter König der Zwerge, die nichts zu tun hat mit König Laurin, dem ſagenhaften Beſitzer des Bozener Roſengartens, ſondern aus Frankreich ſtammt und Roi des Naines heißt, was doch bedeutet, daß es ſich um eine niedrige Aſter handelt und nicht um einen Zwerg. Wenn ein anderer Katalog die Sorte als König der Niederen bezeichnet, ſo iſt das eine recht ſchwache Überſetzung. Die Heuchera Feuerregen (Pluie de Feu), die Iberis Kleiner Edelſtein (Little Gem) und der orientaliſche Mohn Lachskönigin (Salmon Queen) gehören in dieſes Kapitel.

Auf jeden Fall iſt es ganz unzuläſſig, Sortennamen durch Überſetzung zu ändern. Man darf höchſtens hinter den Originalnamen der Sorte die richtige Überſetzung in die Sprache des Kataloges in Klammer ſetzen, um Sprachunkundigen ein ſchnelles Verſtehen des ihnen fremden Namens zu vermitteln. Wünſchenswert wäre es, daß man in allen europäiſchen Ländern ſich zu einer ähnlichen Feſtlegung beſtimmter Namen entſchlöſſe, wie es die Amerikaner in dem oben zitierten Werke angebahnt haben.

Wilhelm Kriechbaum

J. KÖSTER / BLÜTENNOTIZEN

	1924				1925			
	Erblüht	Vollblüte	Noch anſehnlich bis	Verblüht	Erblüht	Vollblüte	Noch anſehnlich bis	Verblüht
Adonis vernalis	30.4.	—	—	14.5.	18.4.	25.4.-11.5.	16.5.	20.5.
Anemone nemorosa	15.4.	19.4.-28.4.	5.5.	17.5.	1.4.	11.4.- 9.5.	11.5.	16.5.
Arnebia echioides					22.4.	27.4.-13.5.	16.5.	20.5.
Aubrietia hybrida Lavender .					4.5.	12.5.-27.5.	8.6.	27.6.
A. hybr. Mrs. Marshall . . .	9.5.	16.5.- 9.6.	12.6.	18.6.	25.4.	23.5.- 6.6.	10.6.	17.6.
A. hybr. Moerheimii	6.5.	13.5.-25.5.	27.5.	13.6.				
A. hybr. Purpurteppich . . .					25.4.	6.5.-27.5.	2.6.	24.6.
Bulbocodium vernum . . .					23.2.	4.3.-25.3.	—	30.3.
Chionodoxa Luciliae					24.3.	1.4.-13.4.	15.4.	18.4.
Corydalis lutea					13.5.	20.5.-29.7.	5.8.	10.8.
Crocus, großbl. gelbe . . .					16.2.	21.2.- 1.4.	4.4.	8.4.
C. King of the Whites . . .					24.2.	9.3.-30.3.	1.4.	6.4.
C. Margot					2.3.	14.3.- 4.4.	6.4.	8.4.
C. purpurea grandifl. . . .					18.3.	30.3.- 4.4.	8.4.	11.4.
Epimedium coccineum . . .					18.5.	27.4.	—	13.5.
E. Muschianum					20.4.	25.4.-18.5.	—	2.6.
E. sulphureum					18.4.	29.4.-20.5.	—	6.6.
E. macranthum					20.4.	25.4.-18.5.	—	2.6.
Erica carnea Vivellii					28.2.	6.4.-25.4.	9.5.	13.5.
E. carnea alba					13.11. Blühte den ganzen Winter			12.3.
Fritillaria imperialis					22.4.	25.4.- 6.5.	—	13.5.
Galanthus nivalis	20.3.	—	—	16.4.	18.2.	23.2.- 9.3.	—	28.3.
Gentiana acaulis					11.5.	—	—	20.5.
Helleborus niger					1924	7.1.-24.1.	—	5.2.
Hepatica triloba					30.3.	5.4.-22.4.	—	27.4.
Leucojum vernum					9.2.	14.2.- 7.3. (Frost)		10.3.
Narcissus poeticus	19.5.	24.5.-31.5.	—	2.6.	12.5.	14.5.-20.5.	—	23.5.
N. poeticus fl. pl.	28.5.	31.5.- 9.6.	—	14.6.	18.5.	20.5.-27.5.	—	30.5.
N. poeticus ornatus					22.4.	25.4.- 6.5.	—	13.5.
N. Barri conspicuus					20.4.	12.4.- 4.5.	—	9.8.
N. bicolor Emperor					18.4.	18.4.-29.4.	—	2.5.
N. bicolor Emperor					11.4.	13.4.-18.4.	—	22.4.
N. pseudonarzis. Golden spur					4.4.	6.4.-15.4.	—	18.4.
N. pseudonarcissus Trompete					13.4.	15.4.	—	—
N. pseudonarc. Van Sion . .					6.4.	8.4.-15.4.	—	18.4.
N. pseudonarc. Princeps . .					6.4.	15.4.-18.4.	—	20.4.
N. pseudonarc. Sir Whatkin .					8.4.	11.4.-18.4.	—	20.4.
Phlox-Hybride Müngsten . .					13.5.	25.5.- 2.6.	6.6.	20.6.
Phlox-Hybride Schloß Burg .					13.5.	25.5.- 2.6.	6.6.	20.6.
Phlox-Hybride Kuppelstein .					16.5.	27.5.- 2.6.	6.6.	20.6.
Primula acaulis, Typ					14.2.	23.2.- 9.5.	11.5.	13.5.
P. Auricula					20.4.	29.4.-16.5.	20.5.	27.5.
P. cashmeriana					8.4.	18.4.- 9.5.	13.5.	18.5.
P. japonica					12.5.	16.5.- 2.6.	8.6.	13.6.
P. rosea grandiflora	31.4.	26.4.	—	19.5.	8.4.	12.4.-27.4.	2.5.	6.5.
Saxifraga umbrosa					13.5.	18.5.- 6.6.	8.6.	13.6.
Scilla sibirica					25.3.	4.4.-27.4.	—	29.4.

Gartenrundschau

NEUES AUS ALLER WELT

Päonienausstellung in Boskoop

MITTE Juni war in Boskoop eine sehr aufregende Päonienausstellung. Solche Zusammenfassung der Gipfel dieses Blumenreiches hat es wohl auf dem Kontinent selten gegeben, nur fehlten leider mancherlei schöne deutsche Züchtungen dazwischen, die Goos und Koenemann verdankt werden, von denen nur die Sorte Wiesbaden vertreten war. Die Ausstellung konnte frühblühende und spätblühende Sorten dadurch vereinigen, daß die frühblühenden vierzehn Tage lang auf Eis aufbewahrt gewesen waren. Diese Eiserfahrungen mit Schnittblumen lieferten so erstaunliche Ergebnisse, daß sie für die Beschickung transozeanischer Ausstellungen immer häufiger benutzt werden dürften. Zu den Überraschungen der Ausstellung gehörte der Andrang eines sehr vielartigen Publikums an einer doch so abgelegenen Stelle, ferner die kaum überbotene Schönheit vieler uralter Sorten, die schon vor 70 bis 100 Jahren gezüchtet wurden, Menschen gewidmet in ihrer Namenstaufe, die nun schon längst Urgroßväter und Urgroßmütter oder halb vergessen sind, Blumen, die zur Krinolinenzeit entstanden und noch in allbeherrschender Schönheit weiterblühen werden, wenn die Bubikopfzeit schon der Sage angehören wird. Viele der edelsten alten Päonienzüchtungen scheinen in ihrer Wesensart dem Geschmack von heute und morgen zu entstammen. Schließlich überraschte in der Ausstellung auch der Wegfall all des Halbguten und sämtlicher Gartengreuel dieses Gebietes, Papiergekräusel auf Papptellern, das man uns als schön hat einreden wollen.

Die geringe Verbreitung wirklicher Qualitäten dieser ältest werdenden Staude hat vier Hauptgründe: Sie läßt sich nicht so leicht vermehren wie Dahlie, Gladiole und Rose, wo die Päonie als schlechte Sorte in einem Garten wächst, hat sie sich für immer festgesetzt und ernüchtert dauernd alle Päonienbegriffe. Dann bieten die Päonienblüten bei langen Transporten für Ausstellungen doch gewisse Transportschwierigkeiten. Es muß also in Zukunft an der Verbreitung der Edelpäonie noch mehr mit guten Bildern und Extraktlisten gearbeitet werden, in diesen Extraktlisten muß auch die verhältnismäßig große Empfindlichkeit dieser Blume gegen Sonnenbrand und Regen dadurch berücksichtigt werden, daß man frühe, mittelspäte und späte Sorten unterscheidet, um eine Rückversicherung gegen Wetterzufälle zu haben.

Einer ganz enormen Verbreitung irgendwelcher besonderer schönen Dinge auf der ganzen Welt geht ja oft ein halbes oder ganzes Jahrhundert merkwürdigen Zögerns voraus, unterbrochen von einigen sprunghaften Ansätzen zu größerer Verbreitung, man denke an viele Werke der Musik und Malerei.

Erst die alleredelsten, einfachen und gefüllten europäischen Päonienzüchtungen geben uns einen Begriff der Rolle dieser Blume in Ostasien, doch konnte ostasiatische Malerei einem Hauptreiz dieser Blume nicht gerecht werden, der gerade aus Beleuchtung und Durchleuchtung der Blume in Wohnräumen entsteht; denn die ostasiatische Kunst steht Licht und Schatten so fern, wie wir der Linie, halbgeöffnete Blüten mancher Päonien können in solchen Durchleuchtungen völlig unerwartete Phasen einer Reiz- und Formenentfaltung von unglaublicher Zartheit und Feierlichkeit durchlaufen; das Licht findet in diesen Schönheitslabyrinthen Entfaltungsmöglichkeiten wie kaum in einer anderen Blume.

Die Päonie entwickelt sich immer mehr ins Grandiose, und hierin gerade ist die Züchtung Miss Alexander Duff kein bloßer Fortschritt, sondern ein wahrer Vorstoß, Knospen, Aufblühen und Abblühen solcher reich und lässig modellierten Riesenblumen hat fast etwas Dramatisches und Schicksalhaftes, bei jeder einzelnen Blume verschiedenartig verlaufend. Hier sind völlig neuartige Blumengebärden von eigentümlich imponierender Großartigkeit.

Bald siebzigjährig sind nun Sorten wie Reine Hortense; sieht man Sträuße dieser großen, warmlichtrosa Blume, so gibts an jeder einzelnen Blume etwas Besonderes zu sehen, ganz abgesehen von der Verschiedenartigkeit des Lichtes, es hat aber nicht viel Zweck, dies alles zu beschreiben, noch weniger Zweck, es blos zu notieren; man notiere wenn möglich am besten die Pflanzen in seinen Garten selber hinein, wo sie sich jahrzehntelang uns wieder ins Gedächtnis bringen.

Manche Sorten kosten 100 Gulden pro Pflanze. Lächerliche Ahnungslosigkeit findet diesen Preis zu teuer, während für ein kleines Aquarell der gleiche Preis gezahlt wird, das oft nur einen Bruchteil der geistigen Voraussetzung jener Blume darstellt. Wenn man jene Blume auf solchen Preis hin ansah, hatte man vor ihrer Schönheit das Gefühl entsprechender Kostbarkeit. Aber soviele der ebenso kostbar-schönen Sorten etwas älteren Ursprungs kosten alle pro Pflanze nur so viel wie eine ganze oder halbe Flasche billigen Weines.

Den einfach blühenden Päonien gehört europäische Gartenzukunft genau so wie den gefüllt blühenden. Die Züchter und Experten berichten, daß unter allen einfachen Sorten die Züchtungen japanischen Ursprungs fast alle viel widerstandsfähiger gegen Witterungseinflüsse sind als die europäischen. Die von mir nach langem Durchmustern und eingehender Rücksprache mit den Züchtern aufgeführten einfachen Sorten sind auch alle voll größter Verschiedenheit von einander und voller Farben- und Formenüberraschung. Die goldenen Sonnen der Staubgefäße greifen oft teilweise Blumenblattfarben auf, ihre Preise sind auch alle erschwinglich. Nur eine jener Sorten wie Pink delight in ganz zartem lichtem Lachsrosa, bisher nie im Päonienreich gesehen, kostet 40 Gulden. Ein großer Strauß dieser neuen Blume war unauffällig aufgestellt, aber trotzdem immerfort Mittelpunkt eines dichten Kreises ernst auf ihn einredender Beschauer.

Leider konnte hier von mir in der Liste der einfachblühenden noch keine Gliederung nach drei Zeitgruppen vorgenommen werden. Statt vieler Einzelbeschreibungen, die den Kern doch nie treffen können, weil er unbeschreiblich ist, gebe ich die Extraktlisten. Die Liste der gefüllten hat Herr den Ouden, Vater der Ausstellung, aus 25jährigen Erfahrungen mir nach besonderen Wünschen und Gesichtspunkten zusammengestellt, diese seine Erfahrungen verarbeiteten auch immer die Hauptergebnisse der großen amerikanischen Päoniengesellschaft, die seit etwa fünfzehn Jahren systematisch am Werke ist. Ich habe dann einzelnen Gruppen dieser Extraktliste noch einige weniger außerordentliche Sorten ausländischen und einige deutschen Ursprungs beigefügt, wobei mir jedoch genaue Blütezeiterinnerungen nicht zur Hand waren.

Gefüllte:

Früh: Weiß: Festiva maxima, Duchesse de Nemours, James Kelway. — Lichtrosa: Madame Calot, Eugen Verdier, Noemie Demay. — Dunkelrosa: Edulis superba, Mons. Jules Elie. — Rot: Adolf Rousseau, Martin Cahusack.

Mittelspät: Weiß: Albatre, Baronesse Schröder. — Lichtrosa: Asa Gray, Germaine Bigot, Königin Wilhelmine, Leonie Calot (bekannt unter Charles Levêque), Reine Hortense, Lady Alex. Duff. — Dunkelrosa: Marie Crousse. — Dunkelrot: Atrosanguinea, Felix Crousse, Curt Rosenfield, Dr. v. d. Take.

Spät: Weiß: Marie Lemoine. — Lichtrosa: Alb. Crousse, Mme. Lemoine, Marguerite Gerhard. — Dunkelrosa: Claire Dubois, Sarah Bernhard. — Dunkelrot: Louis von Houtte, Victor Hugo.

Einfache:

Eva, lachsrot, Emma, dunkelrot, Vesuv, schwarzrot, Kamilla, tiefrot, Pink delight, zartlachsrosa, Akalu, brillant karmin, Eglantine, weiß, Nymphe, rosa, Dürer, weiß, Holbein, rosa, Schwindt, rot, Jeso, weiß, Seruga, kirschrot, Henry Botin, Wiesbaden, halbgefüllt, rosaweiß.

Luther Burbank.

IM letzten Jahre starb in Santa Rosa in Californien ein Mann, von dessen Wesen und Wirken als Pflanzenzüchter wir uns hier schwer eine genaue Vorstellung machen können. Infolge einer echt amerikanischen Reklame, die seitens der Gesellschaft gemacht wurde, die seine Züchtungen vertrieb, wurde er uns als der große Pflanzenzauberer, der Erzeuger unmöglichster Kulturformen angepriesen. Als ich nun im April 1915 von China nach Californien kam, führte mich in San Francisco der Zufall mit einem Herrn zusammen, der zu Burbank Beziehungen hatte und mir auch Einsicht in das große Prachtwerk verschaffte, worin man die Züchtungen Burbanks beschrieben und abgebildet hatte. Als ich die drei Bände davon durchgesehen, mußte ich mich fragen, was denn nun eigentlich so Wunderbares an dieser ganzen Sache sei? Das allermeiste war uns in Europa seit Jahrzehnten geläufig. Die trivialsten Sachen waren als eine Art Wunder verzeichnet. Ich habe leider meine damaligen Notizen nicht mehr. Aber die Eindrücke, die ich in Californien und bei einem kurzen Besuch an Burbanks Wirkungsstätte bekam, sind mir noch gewärtig.

Im Juni-Heft der Österreichischen Gartenzeitung berichtet nun Professor

Erich Tſchermak-Seyſenegg über Burbank, den er 1909 beſucht hatte. Er ſtellt feſt, daß Burbanks hervorragendſte Leiſtungen auf dem Gebiete der Obſtzüchtungen liegen, beſonders von Pflaumen und Kirſchen. Allerdings ſind ſolche Produkte wie die ſteinloſe Pflaume nicht derart geweſen, wie ſie die ſkrupelloſe Reklame ausgab. Ich erinnere mich, daß ſie in Böhmen an verſchiedenen Stellen probiert und als unbrauchbar befunden wurde. Ähnlich ging es mit der berühmten ſtachelloſen Opuntie, die alle Wüſtenländereien in fruchtbare Landſtriche verwandeln ſollte. Burbank ſelbſt war eine beſcheidene, liebenswürdige Natur, jedenfalls ein bedeutender Gärtner der alten Schule. Er ſelbſt ſtand der Reklame fern, die man mit ihm und ſeinen Arbeiten machte. Er hat manches Gute erreicht, aber in keiner Weiſe mehr als bedeutende Züchter ſeiner Art bei uns vor ihm. *K. F.*

Die beſten Steinbrech-Formen

IN no. 2835 von *The Garden* verſucht R. Lloyd Praeger die fünfzig beſten Formen der Gattung Saxifraga zuſammenzuſtellen. Aus der Silbergruppe, wie er ſie nennt, der Untergattung Euaizoonia, iſt S. Cotyledon der nobelſte, insbeſondere in den Varietäten caterhamensis und pyramidalis. Der ſchönen S. longifolia gebührt ein Platz, trotzdem ſie nicht ausdauert. Von den Hostii-Formen iſt altissima die beſte. S. cartilaginea var. Kolenatiana iſt als roſafarbene wichtig, und von S. lingulata ſtehen an erſter Stelle wohl var. Alberti und var. lantoscana. Nicht ausgelaſſen dürfen werden S. cochlearis var. major und S. valdensis, wofür nicht cochlearis var. minor genommen werden darf. Von S. Aizoon werden gewählt die Varietäten balcana, lutea und rosea. Schließlich ſind von dieſer Gruppe noch die zwei ausgezeichneten Hybriden S. splendens (longifolia mit Cotyledon) und S. paradoxa (crustata mit Hostii) zu nennen. — Aus der Kabschia-Gruppe ſtehen für den Liebhaber im Vordergrund S. apiculata und var. alba, S. Elisabethae und S. sancta. Von weiteren gelben S. Ferdinandi-Coburgi, S. Falconside, S. Borisii, S. Haagii, S. Paulinae. Von den weißen S. Burseriana major, S. caesia, S. marginata var. Rocheliana, S. Petraschii, S. scardica, ſowie S. squarrosa und S. tombeanensis. Von roten S. Griesebachii und S. Stribnyi, ſowie die lilafarbenen S. Irvingii und S. lilacina. — Von den Moschatae werden genannt S. moschata atropurpurea und Stormonth's Variety, S. decipiens Red Hussar und var. sanguinea superba, S. Camposii, S. trifurcata und var. ceratophylla, ſowie S. tenella. — Dann wählt Praeger aus verſchiedenen Gruppen noch folgende: von Robertsonia S. umbrosa var. Colvillei und var. primuloides, ſowie die Hybride S. Andrewsii; von Xanthozoon, welche Gruppe nur aus S. aizoides beſteht, deren Form atrorubens; von Porphyrion S. oppositifolia und S. retusa; von Diptera S. Fortunei und ſchließlich noch von Trachyphyllum S. Brunoniana. *C. S.*

Neue Bücher

BLUMENGARTEN. Unter dem Titel »fran Blomſtergarden« hat der Verein »Freunde der Blumenzucht in Finnland«, Helſingfors, im Verlage von Söderſtröm & Co. im vergangenen Jahre ein erſtes Heft einer ſehr intereſſanten kleinen Publikation herausgegeben. Die Redaktion beſteht aus den drei Ausſchußmitgliedern, die auch die intereſſanteſten Beiträge geliefert haben. Der Univerſitätsbibliothekar Ragnar Dahlberg beſchreibt zartfühlend die Kulturanſprüche zweier im Norden gut gedeihender Windröschen, Anemone sylvestris und pennsylvanica. Der Gartenarchitekt Bengt M. Schalin ſteuert eine kritiſche Überſicht über die für unſere Breiten geeignetſten Lilien bei, unter denen er mit Recht Lilium regale beſonders empfiehlt. Ein anderer Fachmann, Harald Waſaſtjerna, behandelt die Gattung Hydrangea, inſoweit ſie ſich für nördliches Freiland eignet. Der allerwertvollſte Beitrag ſteht ohne Verfaſſernamen, es iſt ein kleines Verzeichnis von Stauden und Laubgehölzen, die ſich in Finnland entweder als nicht winterhart oder als kurzlebig erwieſen haben. Die Schrift iſt ſchon deswegen wertvoll, aber auch ſonſt eine gediegene und nützliche Publikation, die man herzlich willkommen heißen kann. *H. E. Goodwin*

GRABMÄLER. Seit Jahren iſt man beſtrebt, die Grabmäler unſerer Friedhöfe wieder auf ein höheres künſtleriſches Niveau zu bringen. Hat doch die Grabdenkmalskunſt in den letzten Jahrzehnten ſtark verſagt. Seit Anfang dieſes Jahres erſcheint in Nürnberg die Monatszeitſchrift *Das Deutſche Grabmal*, zu deren ſtändigen Mitarbeitern eine Anzahl bekannter Architekten, Bildhauer und Gartengeſtalter zählen. Jedes der Hefte bietet intereſſante Vorſchläge für die Geſtaltung von Grabmälern und behandelt alle Themen, die mit der Friedhofsanlage in Verbindung ſtehen. So wird beiſpielsweiſe im Aprilheft der Dortmunder Hauptfriedhof beſprochen. Für alle Intereſſenten iſt die Rubrik Baunachrichten wichtig. Dem weiteren Ausbau dieſer Blätter kann man mit Intereſſe entgegenſehen.

PRAKTISCHE DÜNGERLEHRE. Unter den mancherlei Schriften, die dies Thema für den Gartenfreund behandeln, iſt Nr. 16 der Gartenführer-Bibliothek, Erfurt, von *Paul Schmidt, Wann und womit dünge ich im Obſt-, Gemüſe-, und Blumengarten?* als eine recht nützliche wohlfeile Broſchüre denen zu empfehlen, die ſich über dieſe wichtigen Fragen unterrichten wollen.

OBSTBAUMSCHNITT. In der bei Paul Terey, Berlin, erſcheinenden Sammlung gärtneriſcher Lehrhefte iſt in no. 17 dem *Obſtbaumſchnitt nach natürlichen Entwicklungsgeſetzen* gewidmet und von Walter Poenicke bearbeitet. Verfaſſer will die Entwicklungserſcheinungen verſtändlich darſtellen und dadurch einen naturgemäßen Obſtbau fördern. Jeder Obſtbauer wird das Büchlein mit großem Intereſſe leſen. *C. S.*

Chronik

WIE wir berichten mußten, ſtarb der bekannte Sekretär der Royal Horticultural Society, dieſer bedeutendſten Gartenbau-Geſellſchaft der Welt, W. R. Dykes, infolge eines Automobilunfalles. Die Geſellſchaft hat jetzt zu ſeinem Nachfolger Lt.-Col. *F. R. Durham* ernannt. Dieſer war zuletzt als »Director of Works of the Imperial War Graves Commiſſion« tätig und hat ſich bei dieſer Fürſorge für die Kriegergräber ſehr ausgezeichnet. Auf dem Gebiete des Gartenbaues iſt er bisher noch wenig hervorgetreten. *C. S.*

Zeitſchriften

BELGIEN

Die Juninummern von *La Tribune Horticole* beſchäftigen ſich wieder in erſter Linie mit ernſten wirtſchaftlichen Problemen, worunter der immer ſtärkere Abſchluß des nordamerikaniſchen Marktes gegen die Pflanzeneinfuhr das bedeutſamſte iſt.

FRANKREICH

Das Juniheft von *La Revue Horticole* zeigt als Farbentafel ein eigenartiges neues Croton Président Doumerge eine hybride Varietät aus dem Formenkreiſe des Codiaeum pictum. Ferner wird die Gattung Funkia beſprochen. — *Le Jardinage* vom Juni bringt Betrachtungen über gegen Regen widerſtandsfähige Roſen und ſetzt ſeinen Bericht über das Arboretum Allard fort.

ENGLAND

In no. 2846 von *The Garden* wird das Thema eines roſafarbigen und grauen Gartens behandelt. Wertvoll iſt ein hier beginnender Artikel über Narziſſen, der im nächſten Hefte zu Ende geht. Hier und in no. 2848 wird auch eine Aufſatzreihe über den Wert ſchön belaubter Gehölze fortgeſetzt. In dieſem Hefte ſchildert E. H. Wilſon die dornige Ulme, Hemiptelea Davidii, einen ſehr intereſſanten Baumtyp aus Nordoſt-China, der Mandſchurei und Korea. Die Tracht alter Bäume iſt ſehr maleriſch. — In no. 2060 von *The Gardener's Chronicle* ſpricht A. Grove über Iris W. R. Dykes, eine prächtige gelbe Form, ſie bildet mächtige ſchön geformte Blüten. J. K. Ward ſetzt ſeine Betrachtungen über die Gattung Meconopsis fort, die im folgenden Hefte, dem letzten des 79. Bandes der dritten Reihe des 1841 gegründeten Weltblattes für den Gartenbau zu Ende gehen.

HOLLAND

In no. 51 von *Onze Tuinen* wird die Frage des Balkonſchmuckes angeſchnitten. Das folgende Heft bringt eine Plauderei über Kiefern, Tannen und Fichten. Ein Farbendruck von Cineraria multiflora nana liegt no. 25 der *Floralia* bei, die als Zimmerpflanzen-Sonderheft gedacht iſt. Bleekers Serie über den Gehölzſchnitt iſt auch in no. 26 noch nicht beendet.

NORDAMERIKA

Vom *Bulletin of Popular Information* des Morton Arboretum, wie des Arnold Arboretum liegen wieder Nummern vor. Vom *Morton Arboretum* no. 7 und 8. H. Teuſcher berichtet über Winterſchäden und neue Pflanzungen, ſowie über Fliederſorten. Das *Arnold Arboretum* gibt viele Einzelheiten, ſo über amerikaniſche Magnolien, Zieräpfel und Crataegus. — Das Juniheft von *The Gardener's Chronicle of America* bringt unter anderen Notizen über Einjahrsblumenkultur und eine Steingartenpflanzen-Auswahl. — Im gleichen Hefte von *Horticulture* finden wir unter den vielen Einzelheiten Muſter für Ziegelwege, Notizen über Delphinien, Iris und Gladiolen.

RUMÄNIEN

In der *Bursa Horticola Romana* ſpricht Arpad Mühle über den Botaniſchen Garten in Nymphenburg und über Stockroſen.

VERLAG DER GARTENSCHÖNHEIT G. m. b. H. in Berlin-Weſtend / Verantwortlich für die Schriftleitung OSKAR KÜHL in Berlin-Weſtend, für den Anzeigenteil DOROTHEA KLETT, Berlin-Lichterfelde / Druck von W. SOMMER, Buch- und Kunſtdruckerei in Berlin - Schöneberg.

Sammelmappe

SPITZBERGENS FLORA

Die Berge dieser Insel im hohen Norden, die durch den auch im arktischen Sommer, im Juli, in ihren Schrunden und Mulden lagernden Schnee oft wie gestreift aussehen, stoßen unmittelbar ans Meer, ohne den lieblichen Uebergang ins Flachland, den in den Alpen das Knieholz, grünende Matten und freundliche Täler bilden. Nur ein schmaler Streifen des Vorlandes bildet eine Art von Strand. Wenn der kurze Polarsommer ihn vom Eise frei gibt, erstrahlt in frischen, bunten Farben eine niedrige, aber entzückende Blumenwelt und bildet den reizvollen, lieblichen Saum der starren Gletscherwelt dort im hohen Norden. Die goldene Mitternachtssonne konnte diese Blumenpracht in kurzer Zeit ins Leben rufen! Hat erst der Fuß des Frühlingsgottes der eisigen Erde die Fesseln gelöst, ihre kristallenen Bande gesprengt, so schmilzt bald die Schneedecke und wie ein ausgedörrter Schwamm saugt der Pflanzenteppich das langentbehrte Labsal ein. Die Temperatur auf Spitzbergen erreicht im Sommer mit + 12 Grad C. ihren Höhepunkt, im Winter sinkt sie bis auf — 38 Grad C. herab. Dann soll der Boden in einer Tiefe von 80 Centimeter eine Temperatur von — 24 Grad C. aufweisen. Doch ist die Aufsaugung der Wärmestrahlen durch den Boden, die Insolation desselben, eine sehr

intensive. Zu bewundern ist die Anpassungsfähigkeit der Pflanzen an so niedrige Temperaturen! Ist es doch kaum zu begreifen, wie zarte, pflanzliche Organe eine derartig zähe Lebenskraft entfalten, daß ihr Mark Kältegrade aushalten kann, welche die Menschen kaum ertragen können!

Besondere Schutzmittel, etwa dichtere Behaarung, sehen wir an ihnen nicht einmal, nur in der Art ihres Zusammenstehens, in der »Rasen«- und »Polster«bildung, im dichten Aneinanderlegen von Blättchen und Stengeln zum fast undurchdringlichen Gewirr gibt sich eine Schutzmaßregel und eine Anpassung an das hochnordische Klima kund. Prof. v. Wettstein sagt darüber: »Es gehört zu den überraschendsten Ergebnissen einer Betrachtung nordischer Pflanzen, daß spezifische Einrichtungen gegen die Kälte ganz fehlen oder in nicht höherem Maße als bei unseren Pflanzen entwickelt sind. Diese, im ersten Moment sehr überraschende Tatsache wird bei näherer Betrachtung verständlich: die Temperaturextreme sind im arktischen Gebiete so groß, daß auch die zweckmäßigsten Ausbildungen ihnen gegenüber wirkungslos bleiben müßten. Wenn in einem Gebiete die Abkühlung eine so bedeutende ist, daß der Boden in einer Tiefe von 80 Centimeter eine Temperatur von — 24 Grad C. aufweist, dann kann keine noch so dichte Hülle, kein noch so fester Abschluß nach außen die Pflanzen vor dem Erfrieren schützen. Wir müssen vielmehr annehmen, daß der feinere Bau einer hochnordischen Pflanze ein derartiger ist, daß entweder ein Gefrieren des Protoplasmas als des Trägers des Lebens nicht eintritt, oder daß es imstande ist, selbst nach weitgehender Abkühlung wieder zum Leben zu erwachen. Daß es Pflanzen gibt, bei welchen das Protoplasma diese Fähigkeit hat, ist längst bekannt, wissen wir doch z. B., daß die Spaltpilze, insbesondere deren Fortpflanzungsorgane, die sogenannten Sporen, ohne irgend ein mechanisches Schutzmittel abnorm hohe und abnorm niedrige Temperaturen zu ertragen vermögen.« An der überaus schnellen Entwicklung der arktischen Pflanzen hat außer der zunehmenden Wärme auch das stete, intensive Licht, die strahlende Helligkeit der Mitternachtssonne, großen Anteil. Wochenlang bescheint es die Pflänzchen ununterbrochen, ohne je ihren Lichthunger stillen zu können. Jeder Blumenliebhaber weiß, wie seine grünenden und blühende Lieblinge auf Fensterbrett und Blumentisch sich nach dem lebenspendenden Lichte wenden und ohne dasselbe verkümmern und verblassen. Diese flutende Lichtfülle ist neben der immerhin geringen Wärme und der Durchsaugung der oberen Bodenschichten mit dem Schmelzwasser der Gletscher das treibende Moment in den zarten Pflanzengebilden. Daneben hat die überraschend schnelle Ausbildung derselben aber noch einen anderen Grund. Die Pflanzen selbst bereiten sich in ganz besonderer Weise für den nächsten Sommer vor. Sie legen im arktischen Herbst, der schon im August be-

ginnt, Winterknospen an, wie es auch unsere Pflanzen z. T. in kleinerem Maßstabe tun. Diese Winterknospen überdauern in lebensfähigem Zustande die ganze, furchtbare Kälte des Polarwinters. Und dann genügt eine kurze, warme Frühlings- und Sommerszeit, zusammengedrängt in die Monate Juni und Juli, um die so vorgebildeten Blüten zur vollen Entfaltung zu bringen. Gehindert wird diese oft genug durch eisige Schneestürme, die auch den Sommer nicht verschonen und plötzlich eintretenden Temperatursturz verursachen. Im Bellsund und in der Adventbay war es mir möglich, in kurzer Zeit 30 verschiedene Pflanzenararten zu finden. So eine ganz nie-

drige Cherleria mit dichtrasigen Stengeln, eine Silene, weißlich mit rotviolettem Kelch, tief im Blumenpolster versteckt, eine andere rosenrot blühend, dann die Silberwurz, Dryas octopetala, eine eiszeitliche Pflanze, — ferner mehrere Arten von Hungerblümchen, den peitschenartigen Steinbrech, Saxifraga flagellaris, der kandelaberartige Ausläufer mit neuen Pflänzchen daran treibt dann den gelben Bocksteinbrech und einige andere Steinbrecharten mit entzückenden, teils roten, teils gelben und weißen Blütchen. Der Polygonum viviparum, der Knöllchen, sog. Brutknospen trägt, fehlte nicht, und auch nicht das Löffelkraut, Cochlearia, ein wichtiges Skorbutmittel, früher sehr wichtig, als die Polarfahrer noch auf gänzlich vitaminlose Kost angewiesen waren. Kaum einige Millimeter »ragt« der »Baum« auf der Insel hervor aus dem Pflanzenpolster, die Polarweide, Salix polaris. Es fällt schwer, in dem winzigen, kriechenden Gewächs den Abkömmling eines »Strauches« oder »Baumes« wieder zu erkennen! Zwei kleine grüne, rundliche Blättchen mit je einem Blütenkätzchen lugen aus dem Wirrwarr von Pflanzenteilen hervor. Dunkelrotviolette Blüten treibt die Bartsia alpina. Die auffallendste aber unter den Blumen ist der arktische Mohn, Papaver nudicaule, der auf schwankendem Stengel seine 2—3 Centimeter im Durchschnitt betragenden, gelblichweißen, zarten Blüten im Polarwinde wiegt — ein unvergeßlicher Anblick! Ihm gilt vor allem die Aufmerksamkeit und die Bewunderung jedes Nordlandfahrers, wie auch dem »Wilden Rosmarin« oder »Grönländischem Maiglöckchen«, Andromeda (Cassiope) tetragona. Seine Blüten ähneln unserer Maiblume, Convallaria, auffallend, aber den Duft derselben besitzen sie nicht. In der Adventbay blühte, gleich rechts von der Landungsbrücke, zwischen dem flachen Geröll die beinahe himmelblaue, an Vergißmeinnicht erinnernde Mertensia tenella, die außerdem nur noch auf Nowaja Senelja vorkommen soll. Ihre fast schiefergrauen Blätter legen sich flach auf die gleichfarbigen, flach abgerollten Steinscheiben des Strandes, wie in einer Art merkwürdiger Anpassung. Die weißen Büschel des Wollgrases, Eriophorum Scheuchzeri zittern bei jedem Hauche der klaren, sonderbar durchsichtigen, weil gänzlich staubfreien Polarluft! Läusekräuter, ihren häßlichen Namen Lügen strafend mit helmartigen, gelblichen, rosa und hellroten Blüten, tragen mit zur Belebung des eigenartigen, floristischen Bildes am Rande des ewigen Eises bei. In den Seitentälern der Adventbay soll noch eine andere Weidenart und auch die Polarbirke gefunden worden sein.

Pflanzliche Gebilde sind auch die winzigen Algen, die auf Spitzbergen sowie in den Alpen auf den Gefilden der Gletscher den sog. »roten« und »grünen Schnee« bilden. Es ist die Sphaerella nivalis und eine andere ihres Geschlechts, welche diese frappierende Erscheinung auch auf den ewigen Schneefeldern im höchsten Norden verursachen. Prof. Nordenskiöld meint, diese winzigen, pflanzlichen Organismen könnten wohl Einfluß haben auf das raschere Schmelzen des Schnees, weil die durch die Algen dunkler gefärbten Stellen mehr Wärmestrahlen absorbieren.

Vor undenkbar langen Zeiträumen, etwa im Zeitalter des Tertiärs, scheint durch Polverschiebung eine ganz andere Vegetation auf Spitzbergen geherrscht zu haben, beeinflußt durch ein Klima, das dem unserer Breiten ähnlich war. Das zeigen die vielen Funde, Pflanzenabdrücke, die man in den dortigen Kohlenbergwerken gemacht hat. Ahorn und Eiche, Farrenkraut und andere unserer jetzigen Bäume und Gewächse sind damals Spitzbergen nicht fremd gewesen. Diese Abdrücke reden eine deutliche Sprache von den großen Veränderungen und Umwälzungen, denen unsere Erde im Laufe der Jahrmillionen unterworfen war. *E. Seeger*

BLUMENFREUDE

Lord Lambourne, Präsident der Royal Horticultural Society, schreibt im Londoner Daily Express:

»Blumen sind meine höchste Freude. Eine schöne Blume ist für mich viel leichter zu behandeln als eine schöne Frau. Ich pflanze und pflege die Blumen, und ich verfolge ihr allmähliches Erblühen. Dann kann ich sie, wenn ich gerade will, abschneiden und in eine Vase stellen, kann sie behandeln, wie es mir paßt indessen die Frauen meiner Bekanntschaft, die auch nur einigermaßen darauf Anspruch machen können, daß man sie gern anschaut, nicht ganz von diesem Bewußtsein durchdrungen sind.

Meine Vorstellung von Gartenglück liegt nicht in der Anlage eines mühseligen Farbenmusters oder einer geometrischen Zeichnung. Mein Ehrgeiz ist nicht auf die Schaustellung einer langen Linie von Pantoffelblumen gerichtet, die vor einer Reihe Dahlien stehen, hinter denen sich schlanke Stockrosen erheben, alles mit unbedingter Genauigkeit und geziemender Rücksichtnahme auf die Farbe einer jeden Pflanze angelegt. Aber ich bin tief durchdrungen von dem Entzücken, das die Förderung des Wachstums seltener Pflanzen, Blumen und Sträucher bietet, die in England noch wenig heimisch sind; von der Befriedigung, in einem ausgedehnten Garten einen Platz ausfindig gemacht zu haben, der sie vor Wind, Sonne oder Frost beschützt und, wenn möglich, vor der Verheerung durch Insekten bewahrt.

Es ist eine ganz besondere Kunst, diese Aufzucht seltener Pflanzen. Sie erfordert unge-

wöhnliche Sorgfalt und Aufmerksamkeit, ein ängstliches Ausspähen des geeigneten Platzes in dem Garten. Wohl werdet ihr viele Fehlschläge hinnehmen müssen; aber das Entzücken, endlich den für eure Pflanze geeigneten Platz und Boden zu finden, ist Lohn genug.

Es ist nötig, den Heimatsboden der Pflanzen, die ihr züchten wollt, genau zu studieren. So dürft ihr niemals ein Rhododendron in einen Boden pflanzen, der auch nur eine Spur Kalk aufweist; aber ihr könnt ihn in jedes kalkfreie Erdreich, wie Lehm oder Kies, setzen. Der Gärtner, von dem ihr die Pflanze kauft, kann euch viele wertvolle Winke geben; falls es sich um die Gewinnung aus Samen handelt, wird der Samenimporteur euch den Ort schildern können, wo dieser gesammelt worden ist. Es ist eine seltsame Tatsache, daß viele aus Samen, der an den höchsten Punkten der Anden gesammelt worden ist, gewonnene Pflanzen mit bestem Erfolg in den Gärten von Devonshire heimisch gemacht worden sind; gerade so wie die asiatischen Pelikane sich in St. James' Park wohl fühlen, unseren Winternebeln und Schnee zum Trotz.

Als ich vor vierzig oder fünfzig Jahren in meinem ersten Garten nach meiner Hochzeit es unternahm, Steckrüben zu säen, kam nichts hervor als eine reiche Ueberfülle von Unkraut. Die Folge davon war ein Brief, den ich an den Lieferanten des Samens, einen angesehenen Landmann, richtete und in dem ich ihn jeder unter der

Sonne möglichen Betrügerei beschuldigte. Später erst entdeckte ich, daß die Steckrüben hervorgekommen waren, aber daß das Unkraut ihre Anstrengungen vernichtet hatte.
Ein jeder Gartenfreund wendet bald sein Interesse einer besonderen Blumenart, der Rose, der Dahlie, der Nelke, zu. Heute ist er ganz von den neuen Rhododendron in Anspruch genommen und von den Entdeckungen, die in den Bergen Tibets gemacht worden sind.«

Gartenschönheit

eine Zeitschrift mit Bildern

für Garten- und Blumenfreund - für Liebhaber und Fachmann

August 1926

in Gemeinschaft mit Karl Foerster und Camillo Schneider
herausgegeben von · Oskar Kühl
Verlag der Gartenschönheit G.m.b.H. Berlin-Westend

7. JAHR / HEFT 8 AUGUST 1926

GARTENSCHÖNHEIT

eine Zeitschrift mit Bildern für Garten- und Blumenfreund für Liebhaber und Fachmann in Gemeinschaft mit Karl Foerster und Camillo Schneider herausgegeben von Oskar Kühl

Inhalt des Augustheftes:

Seite

Waldhaus / Bild 197
Berthold Körting / Zwei Gärten / Mit 8 Bildern und Zeichnung 197
Camillo Schneider / Einjahrsblumen / Mit 6 Bildern 202
Karl Foerster / Dauerbeobachtung 204
Paul Kache / Catalpen / Mit Bild 205
Heinrich Teuscher / Aus dem Morton Arboretum / Mit 3 Bildern 206
Karl Foerster / Hochsommerflor im Steingarten / Mit 6 Bildern 208
W. Schacht / Im Burggarten zu Rothenburg / Mit 4 Bildern 212
Siegfried Decker / Dahlien in Brasilien I . . 214

Gartenaufgaben
Camillo Schneider / Laubengänge / Mit 2 Bildern 215

Aus dem Blumengarten der Literatur
In Chinas Zaubergärten von Richard Wilhelm 216

GARTENARBEIT UND BLUMENPFLEGE
Kurt Poethig / Steine im Garten I / Mit 3 Bildern und Zeichnung 217

Bepflanzungspläne
Eine große englische Staudenrabatte / Mit Zeichnung 219

Die Pflanze in der Wohnung
B. Goodwin / Eine neue Ampelpflanze / Mit Bild 220

Vom Werkstoff des Gartens
C. R. Jelitto / Für Unterpflanzung von Gehölzen / Mit Bild 220

Aus der Werkstatt der Pflanzenzüchter
In Ronsdorf 221
W. Kriechbaum / Anbau von Primelsamen / Die Rankrose Marietta Silva Tarouca . . 221
J. Köster / Blütennotizen 222

GARTENRUNDSCHAU
Neues aus aller Welt
Dresden im Zeichen der Rose / Rosa Hardii / Schneckenbekämpfung 223

Neue Bücher
Illustriertes Gartenbau-Lexikon / Gärtnerische Lehrhefte 223
Zeitschriften 224

BILDBEILAGE
Sommer im Naturgarten
FARBIGE BILDBEILAGEN
Agapanthus umbellatus / Canna
Staudenphlox

Monatlich ein Heft

Bezugspreis für das Vierteljahr
in *Deutschland* 4 G.-M. und 0.75 G.-M. Versandkosten (Postscheckkonto Berlin 76290),
im *Ausland* einschließlich Versandkosten: 5.25 Goldmark = 1,25 U.S. A.-$ oder entsprechend in der Landeswährung.

Preis des Einzelheftes
1.50 Goldmark zuzüglich Versandkosten

Verlag der Gartenschönheit G.m.b.H.
Berlin-Westend / Akazien-Allee 14.

Unter den Kübelgewächsen, die im Hochsommer Gartenterrassen zieren, ist kaum eine, die sich mit der Schmucklilie vom Kap, Agapanthus umbellatus, messen kann, wenn diese in guter Kultur steht und so üppig blüht, wie hier in den Kulturen von Sanssouci.

Der dekorative Wert der Blüten Canna ist ein außerordentlich hoher. Im architektonischen Rahmen großer Gartenanlagen wie in Sanssouci kommt er doppelt zur Geltung. Über dem schönen breiten Laube erheben sich stolze, farbensatte Blüten. – Bilder M. Steudel.

Waldhaus — Bild Schmettow

Im August

BERTHOLD KÖRTING / ZWEI GÄRTEN

VON zwei Gärten will ich berichten, die ich baute und bepflanzte, die nun in der Fülle und Freudigkeit blühen, die ich damals, als Pflänzchen neben Pflänzchen wie lauter kleine runde Häufchen auf der frischen Erde saßen, den Besitzern versprach, die, wie mir schien, etwas skeptisch dazu lächelten.
Beide Gärten sind verhältnismäßig klein, beide sollten die Möglichkeiten der Staude ausnutzen, in beiden wächst fast das gleiche Staudenmaterial, in beiden sollte versucht werden, den Anschein möglichster räumlicher Weite zu erzielen, in beiden sollten Wasserspiegel die Anlage beleben. Lagepläne der Grundstücke erforderten ganz abweichende Mittel zur Erreichung desselben Zweckes.
Der eine Garten ist der Staudengarten von Julius Springer in Zehlendorf. Ich fand eine Rasenfläche vor von etwa 15 zu 25 Metern quer vor einer breitgelagerten Terrasse. An dieser Stelle habe ich bereits geschildert (III. Band, Seite 201), wie ich durch starke Vertiefung des vorderen Teils und einer Erhöhung des zurückliegenden Teils ein System von Pflanzenterrassen schuf. Langgestreckte Stützmauern setzten die Architektur des Hauses nach der Tiefe fort bis zu einem langen schmalen rechteckigen Teich voller Seerosen. Dahinter steigt das Terrain in ähnlichen Terrassen an, die aber hier sich stark überschneiden, um die Tiefenwirkung vom Haus aus zu verstärken. Der Mittelteil dieser sonst in Kalkstein ohne Mörtel hergestellten Anlage ist in Rathenower Ziegelmauerwerk gebaut, um die symmetrische Architektur des Gartens in ihrem Zentrum noch zu unterstreichen und zusammenzufassen. Dieser gemauerte Teil umschließt ein kleineres oberes quadratisches Becken mit gemauertem Boden, in den ständig aus einem Bronzehahn Wasser zufließt, das durch einen anderen Bronzeauslauf abfließt in den unteren Teich, sodaß in diesem dauernd Wasser über den Rand tritt und

großen Orchesterstück, das ein Garten sein kann und soll.
Ein schmaler, hoher Wacholder, ein kleiner Fächerahorn und zwei große Cytisus bilden das Skelett der Bepflanzung, genügen als die Jahreszeit überdauernde feste Punkte, um die feste Architektur zu betonen und gleichzeitig aufzulösen. Niemals sollen Pflanzen den Eindruck machen, daß sie gepflanzt, an ihren Platz hingestellt sind — sie sollen an ihrem Platz wurzeln auch für das Auge, als etwas natürlich »Gewachsenes«. Schon dieser Hinweis genügt, um der Regelmäßigkeit der Anlage die Regellosigkeit des Pflanzenwuchses gegenüberzustellen. Und doch glaube ich, diese »Kontrapunktik« zum ersten Male auf gärtnerischem Gebiete bewußt geschaffen zu haben. Regellosigkeit ist natürlich ein schlecht gewähltes Wort, das einer sehr genauen Auslegung bedarf. Es sind eher im Gegenteil unendlich differenzierte Gesetze, nach denen die Pflanzenwelt die Erde mit ihrem Grünen und Blühen überkleidet. Diese Gesetze zu erfüllen, noch mehr, sie in den Grenzen des Gartens zu steigern zu einer ästhetischen Einheit, das sollte das Wesen des Pflanzens sein. Wie der englische Park in seinen besten Schöpfungen für eine bestimmte Vegetationsform den letzten gesteigerten Ausdruck fand, so warten unendlich viel andere Akkorde, die die Natur anschlägt, darauf, in unseren Gärten zu erklingen. Blühender Grund im Frühlingsbuchenwald —

an seinem Ufer das Gedeihen feuchtigkeitsliebender, ans Wasser gehöriger Pflanzen ermöglicht. Ganz im Zentrum der Anlage ist ein kleines schmiedeeisernes Gitter in etwa zwei Drittel der üblichen, dem Auge gewohnten Größe, und diese kleine optische Mogelei ist das Geheimnis, das den Garten im Bilde wie auch in der Wirklichkeit so sehr viel größer erscheinen läßt, abgesehen davon, daß die reiche Tiefengliederung auch ihren Teil dazu beiträgt.
Wenn nun der bauliche Teil der Anlage streng architektonisch, streng symmetrisch gestaltet ist, so ist der pflanzliche Teil natürlich — so unsymmetrisch wie möglich. Pflanzen sind lebendige Wesen und wollen als solche behandelt sein. Sie hineinzwingen in die Starrheit geometrischer Linien, Flächen oder Körper heißt ihnen ihr Bestes nehmen, ihren Charakter verkümmern, ihre lebendige Freudigkeit beschneiden. Gerade das unbekümmerte, wachstumsfrohe Überquellen blühender Polster, das Überschneiden hochragender Blütenschäfte gegen die ernsten Linien des Steins gibt in seinem Widerspiel, seinen Kontrasten und Auflösungen den lebendigen Garten. Räumlich und zeitlich immer neue Melodien klingen auf, grüßen sich von einem Winkel zum anderen, und werden doch immer wieder getragen und eingefangen von dem Grundakkord der Architektur, die alles Blühen zusammenschließt zu dem

Dunkel unter Kiefern, im Adlerfarn in Preißelbeeren, Heidelbeeren — weiter Himmel über Moor und Heide — Dünensand, Sonne und blaues Gras — leises Flüstern im Schilf am See — Abruzzenwildnis voll Ginster und Rosen — grüne Matten über grünen Tälern — trotziges Blühen am starren Fels — eine flatternde Blüte unter tausend Dornen in Afrikas dürftigen Steppen — Tropfenfall im modrigen Busch — eine Rast am Feldrain, wenn die Cicaden zirpen in bunten Wiesen — ein Kahlschlag, Windbruch voller Fingerhut — Natterkopf, Klatschmohn, Kamillen und Kletten über den zerschossenen Trümmern — von allen Seiten flattern die Erinnerungen auf und warten ihrer Gestaltung. Hier ein dichtes Gespinst, das alles Eckige eng verflochten weich überkleidet, dort ein Gewebe fester drahtiger Ästchen, dunkler, glänzender Blättchen, dann Sonnenstrahlen, die durch breites weiches Grün fluten, mal ein Kämpfen der Farben, mal ein Streben zum Licht — immer ist es eine Einheit vom Baum bis zum Moos.

Der Grundgedanke bei diesem Garten war eine Erinnerung aus dem Kriege: da wir im Ort Seedranken in Ostpreußen waren. Noch standen die Grundmauern im rechtwinkligen Schutt der Gebäude. Aber wie ein Festzug, wie ein Sturmlauf des Lebens war alles überflutet von unendlichem Blühen, da sprang Blau, floß Rot, brandete Violett, schäumte Weiß, spritzte Gelb unbekümmert über alle gewesene Form. Hie Tod, hie Leben! Das versuchte ich wiederzugeben. Da sind Stellen, wo blau, rot und violett, wo rosa und rot von Aubrietien und Saxifragen, wo Rosa und Lila der niedrigen Phloxe, schäumendes Weiß von Iberis von Stufe zu Stufe in flammenden Kaskaden hinunterfließen — Stellen, wo sich blaue Eryngien gegen das wuchernde Blühen der Helianthemen spreizen, Feuerlilien kämpfen sich durch, rosa Lythrum streitet mit Achillea ptarmica um den Platz, den ihnen Euphorbia polychroma übrig läßt. Cerastium, silbergrau, hängt alles überwuchernd, allein herrschend über Wände, silbergraue Teppiche von Antennaria sind durchwirkt mit braunen, rotgrauen, wachsbläulichen Sedummustern, Campanula pusilla streitet mit den roten, grauen, silbrigen, spinnenden Polstern von Semperviven um die Mauerfugen. Wo im Frühling Primula Juliae seinen Purpurmantel über die Terrassen breitet, schwingen im Sommer über deren grünes Laub die weißen, blauen Glocken von Wahlenbergia. Und unten im Grunde am Uferrand üppiges Wachsen von Iris sibirica, Iris germanica, Kämpferi, von Trollius, Anemone japonica, Astilben, Kaiserkronen und hohen Eulaliabündeln, im Frühjahr als erstes ein Primelteppich.

Jetzt blühen in dem unteren Teich die Nymphäen, unter ihren Blättern spielen Goldfische, die sich seit dem

erſten Sommer regelmäßig vermehrten. Sie bleiben auch über Winter im Teiche. Goldfiſche gehören in jedes Gartengewäſſer, und ſei es nur ein Regenfaß — ſie räumen reſtlos auf mit aller Mückenbrut.

*

DER abgebildete Plan ſtellt den Garten des Reichskunſtwarts Dr. Redslob in Neubabelsberg dar. Der Plan zeigt, wie der Vorgarten nichts als ein ſchlichter rechteckiger Kiesplatz und »Empfangsraum« iſt, eingefaßt mit Buxus, Taxus, Efeu und Immergrün, wie an der Straße hinter Hecken und Büſchen verſteckt der Platz für eine Kompoſtecke und eine Erdbeer-Anlage gefunden wurde. Ein kleines Roſengärtchen in der Achſe der Veranda — eingeſchloſſen von grünen Wänden wie ein Zimmer — wiederholt den Stil der Inneneinrichtung des Hauſes. Altererbte Möbel im Innern, geſchnittene Hecken draußen, Tulpen und Roſen hinter Buxbaumkanten, ein paar altmodiſch geſchnittene hohe Buxbaumſpindeln am Eingang. Das iſt der Hausgarten, von dem es hinausgeht in die freie Landſchaft des Hintergartens. Ein grader, breiter Weg führt längs hindurch bis zu einem Brunnen am Zaun des gegenüberliegenden Nachbargartens. Wege ſollen zu einem Ziel führen in möglichſt grader Linie; ſie ſollen Steigungen vermeiden, oder ſie ſind unſachlich gebaut. Deshalb durchſchneidet dieſer Weg die Höhen der Landſchaft wie ein Bahneinſchnitt einen Hügelrücken, führt er auf gemauerten Böſchungswänden über Senkungen hinweg und verſtärkt durch ſeinen ſachlichen Kunſtbau den natürlichen Charakter des gründlich »entplanierten« Terrains. Es iſt ein Jammer, wie oft wundervolle, von Natur hügelige Grundſtücke der Planierungsſucht zum Opfer fallen. Es könnte als Spielerei gedeutet werden, nun umgekehrt ein ebenes Gelände zu Bergen und Tälern umzuformen. Wer aber geſehen hat, wie außerordentlich die ſcheinbare Größe des Grundſtücks durch Überſchneidungen wächſt, wird die Berechtigung verſtehen. Allerdings, ein willkürliches Aufwerfen von Hügeln, Ausſchachten von Senkungen — und die Spielerei iſt fertig. Es bedarf langer und gründlicher Studien der Eroſion durch Wind und Waſſer, der bauenden Kräfte der Natur und der Geſetzmäßigkeit ihrer Wirkungen, und mir ſcheint, daß dieſe Geſetze erheblich ſtrenger noch ſind, als die aeſthetiſchen und konſtruktiven Geſetze der Baukunſt, vor allem bedeutend komplizierter. Der Plan, auf dem Senkungen durch dunkle Schattierungen, Höhepunkte durch kleine Kreuze ge-

Sommer im Naturgarten

kennzeichnet ſind, zeigt meinen Verſuch, die Aufgabe zu löſen, beſonders auf der Oſtſeite des Hauptweges. Zwiſchen Randhöhen, die ſich in der Südoſtecke zur größten Höhe ſteigern, falten ſich Seitentäler, die ſich in ein langes Haupttal ſenken. Ganz allmählich beginnt dieſes Tal vor dem Hauſe und fällt als weiche, geſchwungene Mulde immer tiefer ab, bis an die Ufer eines kleinen Teiches. An ſcharffallenden Steilhängen tritt Fels zu Tage. Wo ſolche Stellen an das Teichufer treten, fällt das Terrain auch unter Waſſer als Steilküſte ab, während am flachen Ufer auch Waſſer flach iſt, ſo flach, daß die Bachſtelzen und Finken hineintrippeln können und baden. Es iſt erſtaunlich, welche Anziehungskraft ſolche naturgemäß angelegte Waſſerſtellen auf die Vogelwelt ausüben. Wer dann noch gut mit ſeinem Teſching umgehen kann bezüglich Katzen, erlebt bald ein eifriges Neſtbauen in allen Büſchen und Sträuchern. Um die Landſchaft gegen die Grenzen natürlich abzuſchließen, iſt ſie umſäumt mit einem unregelmäßigen Dickicht von Koniferen, Ginſtern und Wildroſen. Im Innern ſtehen nur einzelne Acer palmatum und andere reizvolle Zwergſträucher. Aber alles iſt überſponnen von einem dichten, bunten Staudenteppich. Die Stauden ſind ſo gepflanzt, daß an jeder Stelle eine Art überwiegt und ihrem Standort ihr beſonderes Gepräge gibt. Kleine Wieſen aus Sagina subulata. Silberne Hänge von weißbuntem Bandgras. Mooſige Gründe von Saxifragen. Trockene, graue Hügelrücken mit Antennaria, Veronica incana. Andere Stellen ſtehen unter dem Zeichen von niederem Phlox und Aubrietien. Eine große Fläche iſt überſponnen mit Acaena und Wildnelkenpolſtern. Maſſen von Aſter amellus krönen mehrere Höhen. Und hohe Stauden treiben hier und dort aus den Teppichen hervor. Kleine Wege aus fauſtgroßen Granitkatzenköpfen führen durch die bunte kleine Welt.

Jenſeits des Weges ſind zuerſt die gegenüberliegenden Pflanzenmotive wieder aufgenommen, aber dann ändert ſich das Bild. Birken, Berberitzen und Wacholder ſchirmen ein ſchattiges Wäldchen über Waldmeiſter, Farnen und Akelei, Anemonen und Leberblümchen, Efeu, Haſelwurz und Walderdbeeren. Zwiſchen umgrenzenden Höhen breitet ſich ein großer Raſenfleck, der ſich an den Randhöhen hinaufzieht und dazu einlädt, ſich auf ihm niederzulaſſen. Hinter dem Raſen iſt Platz geblieben für einen Sandſpielplatz mit Turngeräten. Durch eine kleine Mauer in Sitzhöhe iſt er abgeſprengt gegen den Raſen, der an der Mauer bis zu deren Oberkante hochgeböſcht iſt. Dadurch iſt der Sandplatz dem Blick vom Hauptweg aus entzogen. Alles, was gebaut, geböſcht, gepflanzt wurde, geſchah nach ganz beſtimmten Abſichten. Daß ich jetzt dieſe Abſichten verwirklicht zeigen kann, verdanke ich dem liebevollen Eingehen der Beſitzer auf meine Pläne, die noch heute in allen Fragen, etwaigen Änderungen und Verbeſſerungen meinen Rat einholen, ſowie der ebenſo liebevollen Pflege, die ſie ihren Anlagen zuwenden. Mir ſcheint immer, daß Blumen dankbar ſind für freundliches Betrachten und ſo ſelbſt dafür ſorgen, daß jeder den Garten hat, den er verdient.

Bilder C. S.

CAMILLO SCHNEIDER / EINJAHRSBLUMEN

Verbene

FÜR den Liebhaber iſt es ganz außerordentlich ſchwer, ſich unter den Einjahrsblumen zurecht zu finden. Die Kataloge unſerer großen Samenfirmen ſind, das muß immer wieder bedauernd betont werden, noch immer vollgeſtopft mit unzähligen Namen, bei denen ſich der Einjahrsblumenfreund nichts rechtes denken kann. Wenn darin ab und zu auch ein winziges Bildchen in ſchematiſcher oder verzerrter Form die Tracht der Pflanze andeutet, ſo wirkt es eher abſchreckend als empfehlend. Wollen wir den Einjahrsblumen eine immer größere Zahl ernſter Freunde zuführen und dieſen wunderſchönen Pflanzentypen im Garten den Platz an der Sonne ſichern, der ihnen gebührt, ſo müſſen wir ſie in anderer Form darſtellen. Wir müſſen aber vor allem mit dem Ballaſt ungezählter Sorten aufräumen und daran gehen, von jeder Gattung Auswahlen der allerbeſten Formen aufzuſtellen. Es muß eine größere Einheitlichkeit in dieſe Formengruppen kommen, ſowohl in Bezug auf die Einteilung als auch hinſichtlich der Benennung, die jetzt viel zu willkürlich von einzelnen Firmen gehandhabt wird. Herrſcht ſchon unter den Stauden eine recht bedenkliche Sortenfülle bei den großen Gattungen, ſo iſt das nichts, verglichen mit den Einjahrsblumen. Hier muß ja infolge der ſtetigen Anzucht aus Samen der Formenreichtum naturgemäß ein viel größerer und ſtändig wechſelnder ſein. Liegt nun auch in dieſer Vielheit, dieſem unruhevollen, aber doch überraſchenden Wechſel ein Teil des Reizes, den gerade dieſe Blumen auf viele ihrer Freunde ausüben mögen, ſo wirkt andererſeits die Formenzerſplitterung und das Unſtete des Verhaltens auch abſchreckend.

Man muß immer mehr verſuchen, den Zauber dieſer Formenwelt, ſei es in Farbe oder Form, in Bilder zu bannen, die eine möglichſt deutliche Vorſtellung davon vermitteln. Wir haben dies im letzten Hefte durch einige Farbenbilder angeſtrebt und auch in den früheren Bänden und im Einjahrsblumenbuche die Aufmerkſamkeit der Gartenfreunde auf alle bei uns verbreiteten Typen gelenkt. Heute zeigen wir wieder eine Reihe von Bildern, die nach anderen Geſichtspunkten aufgenommen ſind. Sie ſollen die Tracht, die Art der Verzweigung, die Haltung der blühenden Triebe und Blumen erkennen laſſen, während bei früheren Bildern zumeiſt

Nemophila maculata

in erſter Linie die Farbenpracht und die Form und Größe der einzelnen Blume in Erſcheinung trat. Bei Beetbildern löſen ſich die einzelnen Pflanzen nicht aus der Maſſe heraus, man empfindet nur deren Geſamtwirkung. Für den Einjahrsblumenfreund iſt es aber auch wichtig, ſich ein rechtes Bild davon zu machen, wie die einzelnen Formen ſich aufbauen. Wie das gemeint iſt, wird am klarſten, wenn wir etwa das Bild der *Nemophila maculata* (Band VI, Seite 132) mit unſerer heutigen Aufnahme vergleichen. Erſt dieſe vermittelt uns eine deutliche Vorſtellung davon, wie eine ſolche Nemophila eigentlich wächſt und ſich verzweigt.

Es gibt nun eine ganze Reihe von niedrigen, raſenartig wachſenden Einjahrsblumen, bei denen von einer Tracht im Sinne wie bei den höheren nicht geſprochen werden kann. Hier ſitzen die Blumen auf den Stengelchen auf, und dieſe bilden erſt grüne, dann farbige Teppiche. So etwa bei den Lobelien, die ja in den Formen der Lobelia Erinus compacta den Namen Teppichlobelien führen. Andere nana- und compacta-Formen gleichen ihnen darin ſehr, ſo etwa die niedrigen Ageratum mexicanum, Myoſotis alpeſtris-Formen, Silene pendula compacta, niedrige Verbenen, Alyſſum Benthami procumbens und ähnliche. Dieſe Polſterformen ſpielen eine Rolle zur Bekleidung von Beetflächen, die ſonſt mit Roſenhochſtämmen bepflanzt oder etwa mit hochſtämmigen Fuchſien und ähnlichen Topfgewächſen, die man im Sommer gern auspflanzt, beſetzt ſind. Auch im Steingarten kann man manche raſigen Einjahrsblumen zur Erzeugung eines lebhaften Sommerflors verwerten. Ich denke dabei nur etwa an Sedum coeruleum und an verſchiedene Meſembryanthemen wie auch an Portulakröschen. Solche können zwiſchen Geſtein ſehr natürlich wirken und dabei während des Sommers dem Steingarten einen erwünſchten farbigen Aufputz geben. Hierzu eignen ſich auch *Verbenen*, wenn ſie ihre Triebe über das Geſtein legen und ihr uns ſo altväterlich anheimelndes Farbenbunt darüber breiten. Rufen ſie doch, wie vor allem auch die Phlox Drummondii-Formen, farbige Reize hervor, wie ſie in der Welt der Stauden kaum vertreten ſind. Ähnlich geht es uns mit den Kriechwinden, Convolvulus tricolor, die wir in Band VI, Seite 133, zeigten. Ihre Blüten wieder gemahnen uns an die der einfachen kleinblumigen Petunien, die als Allerwelts-Balkonblumen unerſetzlich ſind. Alle dieſe Annuellen lieben beſonders warme Winkel im Steingarten. Da breiten ſie ſich behaglich aus und blühen ſich vor Freude ſchier zu Tode. Doch der Einjahrsblumen-Steingarten iſt noch nicht ausgeführt worden. Vielleicht

Delphinium Ajacis

ſträubt ſich etwas in uns gegen ſeine Vergänglichkeit, während doch der echte Steingarten ein Dauerſchmuckſtück im Kreislaufe des Jahres bildet. Nun braucht man ja auch nicht die Steingartenform im ſtrengen Sinne für ſolche Einjahrsblumenverſuche zu verwenden, ſondern kann ſich mit flachen Terraſſen und ähnlichem begnügen, um mit den oben angedeuteten Formen, deren Zahl ſich leicht ſtark vermehren läßt, beſtimmte Wirkungen im Garten zu erzielen. Man muß nur die rechten Sonnenkinder wählen. Auch nicht die allzu ſteifen, wie Tagetes oder Zinnien, die wieder an anderem Platze, im Schmuckparterre, im Beet des Blumengartens unentbehrlich ſind. Warme ſonnige Lagen zwiſchen Geſtein lieben aber beiſpielsweiſe noch die Gazanien, die ihre Blumen erſt in der Sonne voll öffnen. Dimorphoteca aurantiaca mit ihrem ſchönen Laubwerk und ihrer ganzen Tracht paßt durchaus an ſolche Stellen. Ebenſo auch Gazania-Arten; dieſe ſind ja auch Kinder des ſüdlichen Afrika, wo ſie allerdings viel mächtigere, ſtrauchartige Formen annehmen als während ihres Eintagsfliegenlebens bei uns im Norden.

Clarkia pulchella

Doch wir wollen uns noch einige andere Trachttypen anſchauen. Da iſt die bekannte einjährige Iberis, nicht minder ſchön in ihrer Art als das ſtaudige Schneekiſſen. Sie hat es in der Farbenwirkung ſchon weiter gebracht als jenes. Das Bild zeigt *Iberis umbellata* in einer leuchtend roſa Form. Die Tracht iſt eine ſo ganz andere als bei den Stauden; freilich achten wir ſonſt wenig darauf, wenn zunächſt die Maſſenwirkung in Erſcheinung tritt.

Iberis umbellata purpurea

Auch der zierliche einjährige Waldmeiſter, *Asperula orientalis* oder azurea, der dieſen zweiten Namen ſo gut verdient, ſei heute in ſeiner Tracht gezeigt. Er verbindet das herrliche reine Himmelblau mit einem angenehmen Duft der Blüten. Freilich iſt dieſer nicht ſo ſtark wie beim Duftſteinrich, Alyssum odoratum, deſſen Form Benthami wahre Schneeteppiche bildet. Blau iſt allezeit eine mit Freude begrüßte Farbe im Garten. Es bringt buchſtäblich den Himmel auf die Erde. Bei den Stauden erleben wir es in ſeinen ſtärkſten Erſchütterungen bei den Delphinien. Auch bei den Einjahrs-

Gazania Noch ein anderer Typ sei heute vorgeführt, der der sogenannten einjährigen Sommerfuchsie, *Clarkia elegans fl. pl.* Dieses Nachtkerzengewächs aus Nordwestamerika hat doch eigentlich in seinem Aussehen selbst mit einer sehr stark gefüllten Fuchsie kaum etwas zu tun, es entstammt aber der gleichen Familie, woraus sich der Name Sommerfuchsie erklären dürfte. Wenn man die Clarkien zweimal stutzt, so erhält man kompaktere, noch stärker verzweigte Pflanzen. Je nach der Zeit der Aussaat blühen sie vom Juni ab bis in den Hochsommer oder beginnen erst dann, um bis in den Herbst hinein zu währen.

Ritterspornen ist es in den mannigfaltigsten Schattierungen vom duftigen Himmelblau bis zum Schwarzblau oder sattesten Violett ausgeprägt. Doch bei den Abkömmlingen des Garten-Rittersporns, *Delphinium Ajacis,* treten noch ganz andere Farbenwerte hinzu, die dem Reiche der Staudendelphinien ganz fremd sind wie die roten Töne oder erst allmählich dort zur Entfaltung kommen wie so manche Nüance in Blau. Bei diesen Sommerdelphinien liegt das Moderne der Farbe in solch eigenartigen Schattierungen wie etwa bleifarben, silbergrau, mohngrau, leinengrau, kupferrosa, aschgrau und wie man diese feinen Abtönungen noch bezeichnen mag. Die Tracht niedriger Delphinium Ajacis zeigt unser Bild.

Es ist immer schwer bei einer Schilderung von Einjahrsblumen, sich auf einige Typen zu beschränken. Sie besitzen in ihren Reihen so viele Formen, die uns im übrigen Reiche der sommerlichen Gartenpflanzen so ganz fehlen. Wo gibt es staudige Gegenstücke zu den Balsaminen, den Celosien, namentlich den Hahnenkämmen, den Nigellen, Schizanthus, Salpiglossen oder der Kapuzinerkresse? Auch die Immortellen darf man nicht übersehen. Unter den Helichrysen haben wir jetzt sehr aparte Farben. Schließlich sind auch die Riesen im Reiche der Annuellen, die Sonnenblumen, in ihren Blumenausmaßen und ihrer ornamentalen Gesamtwirkung kaum zu übertreffen.

KARL FOERSTER / DAUERBEOBACHTUNG

Es gibt keine engere Verbindung als die zwischen Qualitätssteigerung und Dauerbeobachtung. Abhängigkeit von dauernden Gedanken ist Wachstum der Freiheit, d. h. Bewegung auf das begrenzte, uns gewährte Maß von Freiheit hin, dessen Grenzen noch nie ermessen worden sind. Auf allen Gebieten werden uns die lebendigsten und interessantesten Aufschlüsse gewährt durch die Abkehr von kurzfristigen Beobachtungen und Gedanken und die Hinwendung zu dem, was durch den Filter der Zeiten gegangen ist.

Hier wird oft gekrönt, was einer Zufallslaune vorübergehenden Charakters zu entspringen schien und siegt über etwas, was uns Anwartschaft auf höchste Ausdauer und Zuverlässigkeit zu haben schien.

Plötzlich kommt eine unerwartete Probe und beleuchtet zwei wetteifernde Dinge neu. Vielleicht bist du zufällig der Erste, dem die Natur die überlegene und nie geahnte Sieger- und Dauerkraft eines Dinges so eindrucksvoll enthüllte. Überall bekommen einzelne Individuen in der Pflanzenwelt, also aus Saat erschaffene Exemplare, von Gott und Natur her Parolen für ihr Dauerverhalten mit, die uns umsomehr überraschen, je länger wir sie beobachten. Selbst Geschwister aus gleicher Saatkapsel offenbaren Dauerunterschiede, die sie fast verschiedener Varietäten angehörend erscheinen lassen.

Seit langen Jahren beobachte ich nun jetzt an sehr verschiedenen Stellen das Verhalten der beiden juliblühenden lila Phlox decussata Antoine Mercier und Fellbacher Porzellan, um der zweiten schließlich doch den Preis zuzuerkennen. Mercier fällt als alte Pflanze in feuchten Jahren immer teilweise um, was dem Fellbacher Porzellan nie passiert.

Eine große Masse Phloxe muß durchaus den Katalogvermerk bekommen: »zuverlässiger Selbstversorger in der Haltung« auch bei langem Wachsen an gleicher Stelle und im Halbschatten, nämlich die Juliphloxe Mia Ruys, Buchner, Laßberg, Purpurmantel, Königshofer, Widar, Wanadis, Dutrie, Württemberg, Imperator, Immelmann, Scholten, Hindenburg, Firmament, Raleigh, U-Deutschland und unter den August-Phloxen Vollmöller, Loki, Gertz, Bouchon. Von den schönen Septemberglut und Wiking gilts nicht unbedingt, doch sind auch sie in ausreichendem Maße windfest. Viele im Handel befindliche Phloxe bringen vom vierten, fünften Jahre festen Wachsens an gleicher Stelle kleine Dolden, während die Nachbarpflanze einer anderen Sorte unmittelbar daneben fünfmal so große Büsche behielt. Manchmal, wenn auch selten, bleibt man doch bei einer im Alter kleindoldigen Sorte, weil sie so dicht blüht und so große Büsche bildet, daß die Vorteile halbwegs die Nachteile wieder ausgleichen.

Auch in Farbenbeurteilungen gewöhnt man sich auf die Dauer Eigensinn ab, um seine Geschmackentwicklung in Fluß zu halten.

Lange Jahre habe ich mich von allen irgendwie blauroten Phloxsorten völlig fern gehalten, bis ich wieder einmal erkannte, welche pikante Würze in bunten und warmroten Phloxpflanzungen ganz kleine kalte Farben-Einsprengungen bisweilen bedeuten können.

Einmal hatte ich ein Rundbeet um eine große bemooste Bachusfigur herum mit Phlox zu bepflanzen. Es wurden dort dreißig brandrote Phlox Königshofer gesetzt. Dahinein war aber ein Phlox Nordlicht durch irgend ein Versehen geraten. Ein zufälliger Besucher hatte es gesehen, als großes Farbenraffinement bezeichnet und sofort Beratung in eigenen Pflanzungen erbeten.

Ungemein langwierig und schwierig sind die Dauerbeobachtungen bei neuen Goldrauten, ob sie auf die Dauer ohne Stütze völlig sturmfest und regenfest sind. Manche bestanden das Examen vier, fünf Jahre lang, um dann im nächsten Jahr, verpflanzt in fruchtbaren Boden, plötzlich ein windgefährdetes Gerüst hervorzubringen, während eine benachbarte Examenkollegin völlig ausreichende Haltung bewahrte.

Wie schwer ist auch bei den Päonien, diese Frage zu entscheiden. Bei mir steht die Sorte Wiesbaden sieben Jahre in einem Gartenteil und trägt sich völlig. Eine Einzelpflanze in einem anderen Gartenteil, welcher dort der Boden etwas besser zusagt, ist ebenso alt und doppelt so groß und muß ein Schnurhalter haben, um bei schwerem Regen nicht zu weit auseinander zu fallen. Man kann deswegen nicht in alle Ewigkeit auf diese Sorte verzichten. Solche Pflanzen sollte man etwa durch eine kleine

In den großen Staudenphloxen liegt eine ſchier überquellende Blumenfreude. Sie bilden einen der freudigſten Akkorde des ſommerlichen Gartenlebens, der erſt ſpät ausklingt. Doch ihre allzugroße Weichheit braucht ſchroffe Gegenſätze in Form und Farbe. Dieſe finden ſie in der hohen Zeit ihres Lebens in ſpäten dunklen Ritterſpornen und ſchlanken gelben Stauden. – Bild Stiller.

grüne Eisenkrinoline durchwachsen lassen. Alles Dauerverhalten in der Welt geht andere Wege, als wir dachten. Qualitätvolle Dinge enthüllen immer mehr Qualitäten, die andern immer mehr Schwäche.
»Es freut mich, Sie kennen gelernt zu haben«, sagte jemand zu einem Fünfundachtzigjährigen. »Das ist ja merkwürdig,« sagte der Angeredete, »mir ist es noch nie gelungen!«
Was glauben wir nicht alles zu kennen, das noch unendliche Überraschungen für uns in sich birgt, unendliche Fähigkeiten und Mächte, die uns immer wieder ganz neu und ungewohnt zu erscheinen.
Lange Jahre beobachte ich das so leicht vermehrbare Sedum spurium auf alle seine teppichbildenden Gartenkräfte hin und dachte oft, wie unbezahlbar schön es wäre, wenn es ganz immergrün bliebe. Schon öfter glaubte ich, an einen wenigstens wintergrünen Sämling davon gelangt zu sein, der die Blätter garnicht oder sehr spät abwarf.
Einmal teilte mir jemand im November mit, daß er ein immergrünes Sedum spurium besäße, das im vollsten Laub stände, während andere Bestände, die er woanders bezogen hätte, das Laub fallen ließen. Hier ergab sich folgender Sachverhalt:
Der scheinbar immergrüne Bestand wuchs an einer Böschung, in der Masten mit elektrischem Bogenlicht standen. Der Zusammenhang mit dem elektrischen Lichte war infolge mehrerer Umstände zweifellos erweisbar. Da aber die Natur alle Wünsche erfüllt, wenn wir beweglich genug sind und an sie ebenso wie an unsere Wünsche glauben, so prüfte ich weiter alle erreichbaren Sedum-Arten durch in der Meinung, daß Gärtnereien und botanische Institute eine Fülle von wenig bekannten Dingen besitzen, deren gartenkünstlerische Tragweite weder von ihnen noch von irgend jemand beobachtet wurde. Plötzlich hatte ich mein immergrünes Sedum spurium. Unter dem Aschenbrödelgewand des Pseudonyms Sedum hybridum ochroleucum wurde ein Sedum geführt, dessen Durchprobung hier vollimmergrüne Eigenschaften erwies. Die gelb und rotbraune Blüte deutet auf Kreuzung zwischen spurium und Middendorffianum.
Lange Jahre verfolge ich das Geheimnis des Eisenhut und sein Gartenverhalten und hörte gern einmal von anderen Beobachtern Urteile und Erfahrungen.
Es gibt oft Plätze in Gartenbeeten zwischen anderen Pflanzen, in denen das gewöhnliche Aconitum Napellus versagt und in Läusebefall und sonstiger Schwäche sich nicht entwickelt, während es doch sonst sogar dorfgartenfest ist. Nach bisherigen Eindrücken ist mir das auf freien Beeten, wo nur Aconite standen, noch nie passiert. Jene Misere beobachte ich nun fünf Jahre lang. A. Napellus scheint in besonderer Weise davon betroffen. Es scheint nicht als Einzelpflanze stehen zu wollen. Vielleicht spielen da Erscheinungen des bakteriellen Wurzellebens eine Rolle. Sehr leicht gedeiht eine als autumnale im Handel befindliche Sorte, die sehr straff wächst, aber schon im Juli blüht.
Bei größeren Gruppen durchpflanzte ich mit dieser Sorte gern die herrliche dunkelblaue Sparks Variety, um ihrem breit ausladenden, etwas weichen Wuchs Halt zu geben.
Mit großer Spannung werde ich das gesamte Gartenverhalten der beiden mir interessantesten Eisenhutarten nachprüfen, nämlich Aconitum pyramidale, den August-Blüher, und das echte mannshohe, August-September blühende autumnale. Auch von diesem existiert natürlich wieder ein hellerer unbrauchbarer Doppelgänger.
Wie reich an Fehlerquellen ist die Dauerbeobachtung. Wenn man zum Beispiel jahrelang die wirkliche Blütezeit vieler großer Stauden mit ausreichender Sicherheit festzustellen sich bemüht, merkt man, daß die Zeitangaben vieler Züchter darauf beruhen, daß sie junge Stecklinge und keine alten Pflanzen in Beobachtung hatten, die oft drei Wochen später erblühen als die Stecklinge.
Man muß auch bei alten Pflanzen immer mehrere Exemplare an verschiedenen Stellen stehen haben, da alle möglichen kleinen Schattenwirkungen oder Sonnenrückstrahlungsumstände die Zeit des Aufblühens verändern.
Manchmal genügt schon ein größerer Staudenbusch auf der Nordseite eines kleineren, um den kleineren acht Tage Vorsprung gewinnen zu lassen.
Manchmal ist es aber wahrhaftig nicht herauszubringen, warum eine von zwei gleichen Pflanzen gleicher Art und Sorte, die dicht nebeneinanderstehen, sich gedrungen fühlt, acht Tage eher loszublühen als die Nachbarin.
Wir stehen alle erst im allerersten Anfang der Naturerkenntnis und des wirklichen Lebens mit der Natur, jedes Jahr bringt uns eine Fülle grundlegender neuer Eindrücke auch an allen möglichen sogenannten bekannten Pflanzen vor die Augen, sodaß wir immer erstaunter merken, wie sehr alle diese Dinge wert sind, mit der Zeitlupe betrachtet zu werden. So fangen wir an, auch diese Erscheinungen des Gartens immer weniger blos lyrisch, sondern sozusagen auch dramatisch zu betrachten. Die Dynamik der Dinge beginnt uns immer mehr zu interessieren, scheint uns immer mehr Einfallstore für Beeinflußbarkeiten zu enthalten und läßt auch neue Seitenlichter auf die Dynamik der Gattung homo sapiens fallen.

PAUL KACHE / CATALPEN

Es geht den Trompetenbäumen, diesen prachtvollen Blütengehölzen wie so vielen ihresgleichen, ihr hoher Schmuckwert wird nicht genügend erkannt oder gewürdigt. Dabei liegt doch kein anderer Grund vor, als daß eine Anpflanzung nicht erfolgt, da die Catalpen selbst nicht eine einzige Eigenschaft besitzen, durch die ihre reichliche Verwendung in unseren Gärten irgendwie beeinträchtigt sein könnte.
Obgleich fast alle Vertreter im Verlauf der Jahre einen baumartigen Charakter annehmen, ist ihre Anpflanzung noch in kleineren Gärten möglich. Sie bringen auch als Baum nur kleine Kronen. Um so schöner aber kommt ihr prachtvoller Blütenflor dadurch zur Wirkung. Vor allem dort, wo man einen gewissen Abstand zwischen Weg und Standort der Catalpe beläßt. Man erhält dadurch eine viel bessere Aufsicht auf den gewöhnlich sehr reichen Blütenflor, der je nach Art und Varietät vom Früh- bis Spätsommer erscheint. Erforderlich ist es jedoch, den Catalpen einen freien und sonnigen Standort zu geben. Im Druck hoher Bäume dürfen sie nicht stehen, denn hier ist sowohl ihre ganze Entwicklung als auch ihre Blühfähigkeit recht benachteiligt. Wohl aber sind sie gut in genügend weitem Abstand vor hohe Gehölze zu pflanzen. Denn dadurch ist vor allem ihrem reichen, hellfarbigen Blütenflor ein sehr guter Hintergrund gegeben, so daß er sich viel plastischer und eindrucksvoller zeigt. Beim hellen Himmel als Hintergrund verliert die Blütenmasse an Wirkung.
Die bekannteste der bisher angepflanzten Arten ist Catalpa bignonioides, die in den Baumschulen gewöhnlich unter dem Synonym C. syringifolia geht. Sie ist im östlichen Nordamerika heimisch und bildet bei uns gewöhnlich kleinere Bäume mit etwas unregelmäßiger, mehr in die Breite als in die Höhe gehender Krone. Schon die recht große, fast breitovale, zugespitzte Belaubung ist in ihrer Masse und lebhaft hellgrünen Färbung ein besonderer Schmuck des Baumes. Prachtvoll ist dann im Mittsommer der überaus reiche Flor weißer, innen orangegelb streifig überlaufener und rotbraun punktierter Blüten. Diese sind ziemlich groß und stehen in großer Zahl in einem breitrispigen Blütenstand, der bis über 25 Centimeter Höhe erreichen kann. Da fast jeder kräftige Jungtrieb in einen solch großen Blütenstand endet, ist die Fülle des Blütenflores leicht zu ermessen. Es gibt einige recht schöne Gartenformen von dieser Art, die gleichfalls alle Beachtung verdienen. So ist besonders die var. aurea in ihrer lebhaft gelbfarbigen Belaubung sehr gut. Sie ist vor allem im Frühsommer von einer ausgezeichneten Leuchtwirkung. Liebhaber von farbigen Laubhölzern werden an ihr viel Freude finden. Auch die var. Koehnei ist ansprechend. Ihr großes Blatt zeigt um ein unregelmäßiges grünes Mittelstück eine breite goldgelbe Blattfläche. Die Verschiedenheit der Blattfärbung wirkt aber keineswegs unruhig. Eine niedrige Wuchsform, var. nana, sei noch ergänzend erwähnt. Diese ist von ganz dichtem, gedrungenem Bau und bildet kleine, rundliche Kronen. In den Baumschulen geht noch eine purpurnfarbige Catalpe, und zwar unter dem Namen C. hybrida purpurea. Sie wächst stark und bildet kleine Bäume mit ziemlich ausgedehnten Kronen. Ihre tief purpurbraune Belaubung ist besonders im Vorsommer von kräftigster Farbenwirkung. Dazu tritt dann etwa von Mitte Juli an ein reicher Flor weißlicher Blüten. Letztere leuchten aus dem Dunkel des Laubwerkes lebhaft hervor, dem Baume einen besonderen Schmuckwert gebend. Über den richtigen Namen dieser Catalpe ist man sich noch nicht einig, da man sie auch als C. bignonioides var. atropurpurea anspricht.
Der C. bignonioides verhältnismäßig ähnlich, doch starkwüchsiger ist Catalpa speciosa. Es ist ebenfalls eine nordamerikanische Art und infolge ihres starken, hochgehenden Wuchses vielerorts schon als Forstbaum versucht worden, zumal sie auch ein brauchbares Holz liefern soll. Für uns ist sie vor allem als schöner und auch dankbarer Blütenbaum des Sommers wichtig. Sie wächst nicht nur stärker als C. bignonioides, sondern bildet in den meisten Fällen auch eine hochgebaute Krone, die

von einem schlanken, hohen Schaft getragen wird. Bei der Anpflanzung ist das wohl zu berücksichtigen. Das Blatt der C. speciosa ist von ähnlicher Form wie das von bignonioides, nur etwas länglicher geformt, mit längerer Spitze und im ganzen auch größer. Es kleidet die Krone recht voll und dicht aus. Auch die Blüten sind größer, gut fünf Centimeter breit, doch in der gelblichen Streifung und dunklen Punktierung nicht so ausgeprägt. Die breitrispigen Blütenstände stehen locker mit Blütchen besetzt, und die Gesamtheit gibt auch hier einen wirksamen Schmuck. Hinzugefügt muß hier noch werden, daß auch die Fruchtkapseln, langen Bohnenhülsen ähnlich, dem Baum einen auffallenden Schmuck geben. Noch wenn das Laub haftet, fallen die in vielzähligen Büscheln lang herabhängenden Früchte auf. Wirksamer treten sie jedoch im Winterhalbjahr hervor, zumal bei Rauhreif. Sie halten aus bis ins kommende Frühjahr hinein. Die einzelnen Fruchtkapseln von C. bignonioides werden bis 30 Centimeter lang, bei etwa 1 Centimeter Breite, während die von C. speciosa bis über 40 Centimeter lang und fast 2 Centimeter breit sind. Bei wehendem Wind zumal bieten solch reich mit Fruchtkapseln besetzte Catalpen eine recht eigenartige Erscheinung.

Catalpa bignonioides
Bild C. S.

Von ostasiatischen Arten sind bisher wenige richtig bekannt und wohl ganz selten einmal angepflanzt. Am ehesten ist noch C. ovata (C. Kaempferi) bekannt, die gleichfalls einen kleinen Baum von der Tracht der bignonioides bildet. Nur ist das größere Blatt dunkler in Grün. Dagegen sind die Blüten kleiner, mehr gelblich getönt und violett punktiert. Sie stehen in ansehnlich großen Rispen. Die Fruchtkapseln sind denen der bignonioides ähnlich. Eine hübsche Art lernte ich in den Hesseschen Baumschulen in C. japonica, die jetzt als eine Form der C. hybrida angesehen wird, kennen. Diese zeichnet sich durch einen starken Wuchs aus. Die hellgrüne, etwa 20 Centimeter lange Belaubung ist lebhaft dunkelfarbig gestielt. Auffallend war, daß schon recht junge Pflanzen dankbar blühten. Die kleine, nur 2 Centimeter breite Blüte von weißlich schwefelgelber Färbung hat tiefgelbe Streifen und violette Punkte. Die feine Kräuselung und Wellung des Blütenrandes gibt der Blüte ein wunderschönes Aussehen. Der erst von Mitte August an beginnende Blütenflor hielt bis nach Mitte September an. C. Duclouxii (C. sutchuenensis) gibt von Jugend an einen schön schlank in die Höhe strebenden Strauch, fast breit säulenförmig im Bau. Die große, dichte Belaubung ist von lang zugespitzter, oft gelappter Form. Die rosafarbige Blüte konnte ich selbst noch nicht beobachten. Doch sei auch diese Art wie die noch weniger bekannte Fargesii dem Gehölzfreund zum Versuch sehr empfohlen.
Die erstgenannten Arten, wie auch ovata und Duclouxii sind für unsere und selbst norddeutsche Gebiete durchaus hart. Bei japonica und Fargesii muß erst ein längerer Versuch entscheiden. Sicherlich sind beide in normalen Gebieten Deutschlands frostfest genug, doch wird vorerst der Bezug Schwierigkeit machen. Dafür aber sind alle anderen Vertreter leicht zu beziehen. Die Catalpen wachsen noch in wenig guten Böden willig heran und blühen auch hier gut. Man lasse ihnen ihren natürlichen Bau und zwinge sie nicht durch Schnitt in bestimmte Formen. Sie bedürfen nicht der Nachhilfe durch Messer und Säge.

HEINRICH TEUSCHER / AUS DEM MORTON ARBORETUM

Unsere Sammlungen von winterharten Gehölzen haben vortreffliche Fortschritte gemacht, seit ich zum letzten Male den Lesern der Gartenschönheit vom Morton Arboretum berichtet habe. Wir kaufen und tauschen ja auch in aller Welt zusammen, was nur immer zu haben ist. Über 3500 verschiedene Arten und Varietäten zählt unsere Sammlung bereits, nach kaum vier Jahren, und noch immer fügen wir jedes Jahr mehrere hundert neue Arten hinzu.
Doch der, der hierher kommt, um unsere so große Sammlung neuer und fremdländischer Gehölze zu bewundern, muß freilich noch mit der Brille der Zukunftserwartung ausgerüstet sein, sonst erlebt er eine Enttäuschung. Wir sind ja noch so jung, und was wir an Pflanzen herangezogen haben, ist natürlich alles noch sehr klein. Schöne Aufnahmen von seltenen Gehölzen kann ich daher noch ebensowenig vorführen wie interessante Bilder aus unseren Gruppenpflanzungen. Das muß der Zukunft überlassen bleiben. Nichtsdestoweniger erfreut sich das Arboretum bereits großer Beliebtheit bei dem autofahrenden Publikum unserer näheren und weiteren Umgebung, und Hunderte von Besuchern, die auch nicht eine der vielen so sorgfältig ausgearbeiteten Gruppen von seltenen Gehölzen gesehen haben, verlassen doch das Arboretum hoch befriedigt und begeistert von seiner Schönheit.
Auf einem der Bilder sieht man einen der kleinen Seen, die durch Abdämmen eines kleinen Wasserlaufes gebildet worden sind, wo vorher eine sumpfige Niederung war. Die Ufer sind fast unverändert so gelassen, wie sie sich von selbst gebildet haben. Der schöne alte Baumbestand, der sich in der Hauptsache aus Acer saccharum, Ulmus americana, Quercus alba, Qu. borealis, Juglans nigra und Ostrya virginiana zusammensetzt, war natürlich vorhanden. Desgleichen die den Waldrand so abwechslungsreich schmückenden Crataegus-Büsche mit ihrem charakteristischen, kugeligen, pyramidalen oder flach seitwärtsstrebenden Aufbau. Eine große Menge Arten der Gattung Crataegus, die botanisch den Gruppen: Mollis, Punctata, Crus-Galli, Pruinosa und Tomentosa einzugliedern sind, sind hier heimisch und gehören zu den Charakterzügen unserer Landschaft.
Auf einem Waldpfad, der sich in langen Windungen durch einen der schönsten Teile unseres Waldes hindurchzieht, könnte man fast glauben, man sei in Thüringen, trotzdem der Wald natürlich aus lauter für Deutschland fremden Gehölzen besteht. Mehrere Arten Eichen, Zuckerahorn und das Eisenholz, Ostrya virginiana, sind wieder am häufigsten vertreten. Dazwischen sind eingestreut: Ulmus americana und fulva, Celtis occidentalis, Prunus serotina, Tilia neglecta, Fraxinus americana und quadrangulata, Juglans nigra und cinerea, Carya ovata und cordiformis, Populus grandidentata und tremuloides und so weiter. Den Unterwuchs und den Waldrand bilden: Crataegus-Arten, Malus ioensis, Prunus virginiana und americana, Cornus paniculata, Corylus americana, Carpinus caroliniana, Viburnum Lentago und prunifolium, Rhus glabra und toxicodendron, Celastrus scandens und andere.
Viel reichhaltiger noch als die Gehölzflora ist jedoch unsere Staudenflora, und Edelsteine sind darunter, die nur der Fassung harren, der

richtigen Verwendung im Garten, um sich den Dauerplatz im Herzen jedes Gartenfreundes zu erwerben, den sie schon lange verdienen. Auch am natürlichen Standort sind sie jedoch entzückend schön, und gerade der natürliche Standort gibt uns ja die besten Fingerzeige für die richtige Verwendung im Garten; zielbewußte Pflanzung würde aber doch noch manche Steigerung ermöglichen. Es ist unmöglich, hier alle die aufzuzählen, die Erwähnung verdienen. Eine Zusammenstellung aller im Gebiet des Morton Arboretums vorkommenden Wildpflanzen, die kürzlich im Druck erschienen ist, enthält fast 500 Namen, unter denen die Stauden den größten Raum einnehmen.

Eine Lichtung trennt ziemlich scharf zwei Waldtypen. Hinter uns auf trockenem Hügelland liegt Eichenwald. Vor uns geht es in eine Schlucht hinunter, und dort in der kühleren Feuchte herrscht der Zuckerahorn mit dickichtartig aufschießendem Nachwuchs. Zehn Arten der Gattung Solidago sind bei uns heimisch, doch die hier auf der Lichtung herrschende behaarte Varietät der sonst kahlen Solidago canadensis ist eine der stattlichsten von allen. S. gilvocanescens ist der Name dieser Varietät, die viel mehr Trockenheit verträgt als die Stammart. Auch Astern, von denen ich im ganzen auf unserem Gebiet bisher vierzehn Arten gezählt habe, sind reichlich vertreten auf dieser Lichtung. Besonders Aster Drummondii und die wertvollere, zierliche, lavendelblaue Aster Shortii. Auch die leuchtend lilafarbene Aster Novae-Angliae kommt hier in großen Mengen vor und bildet einen prachtvollen Kontrast zu den gelben Goldruten. Im Frühjahr und Frühsommer sind Viola sororia, ein großes blaues Veilchen, das dem bekannten V. cucullata sehr nahe steht, und die gelbe Viola pubescens, die einen lieblichen Gegensatz zu der blauen bildet, sowie die blaue Phlox divaricata, Polemnnium reptans und das purpurne Geranium maculatum die Herren der Lichtung.

Im Vordergrund stehen Vertreter der Gattung Crataegus, die botanisch zwei Arten repräsentieren. Ihnen zur Seite klettert Parrhenocissus quinquefolia, der Wilde Wein, empor, der auch hier heimisch und mit seiner roten Herbstfärbung ein prachtvoller Schmuck unseres Herbstwaldes ist.

Wir wandern weiter und treten in den auf dem Bilde vor uns liegenden Ahornwald ein. Hier ist es dunkel und schattig, und im Herbst kann deshalb nur wenig Staudenunterwuchs aufkommen. Im Frühling aber, lange bevor das Laub der spät austreibenden Ahorne die Sonne absperrt, sieht es hier anders aus. Claytonia virginica, vom Volksmunde mit dem hübschen Namen »Spring-beauty« (Lenzschöne) bezeichnet, bedeckt dann zu vielen Tausenden den Boden mit zartem rosa Schimmer. Ein unbeschreiblich entzückender Anblick. Später blühen hier in großen Mengen Erythronium albidum und die reizende Dicentra cucullaria, die den weniger poetischen als humoristischen Namen »Dutchman's Breeches« trägt, ohne dadurch Schaden an ihrer Schönheit zu nehmen. Die Form der Blüte könnte ja tatsächlich an die weiten holländischen Pumphosen erinnern.

Der Pfad fällt nun immer stärker nach der Schlucht zu ab, die wir auf der Brücke überqueren, die das Bild veranschaulicht. Die glatten Stämme, die die Brücke auf beiden Seiten unmittelbar einrahmen, gehören zu Quercus borealis maxima, in Deutschland im allgemeinen als Quercus rubra oder amerikanische Roteiche bekannt. Die Hänge der Schlucht sind dicht bekleidet mit dem Leberblümchen, Hepatica acutiloba, das sich von seiner deutschen Schwester nicht nur durch die spitzen Blattlappen unterscheidet, sondern sich auch durch einen viel größeren Farbenreichtum und einen zarten Primelduft auszeichnet, der mir von Hepatica triloba nicht erinnerlich ist. In allen Farben, von blau über lila zu rot, rosa und weiß, schimmern diese Hänge im Frühjahr. Ein bunter Teppich von großer

Schönheit. Die ſchattigeren Teile der Schlucht ſind ein bevorzugter Standort der ſchönen Papaveracee Sanguinaria canadensis (Blutwurzel), die mehr einer großen weißen Anemone ähnlich ſieht, als daß ſie an eine Mohnblume erinnert.
Der Wald wird nun lichter und noch viele ſchöne und intereſſante Stauden, die hier wachſen, ließen ſich aufzählen. Ich ſpare ſie jedoch lieber für ein andermal auf. Wir treten nun aus dem Walde heraus. Vor uns liegt das Tal des »Du Page-River«, ein außerordentlich fruchtbares Flußtal, das erſtklaſſigen Weizenboden enthält. Es iſt zum größten Teil ſchon mit verſchiedenartigen Gruppen junger Gehölze bepflanzt, die zu hohen Erwartungen berechtigen. Auf einer Seite des Fluſſes ſind eine Anzahl geographiſch angeordnete Gruppen aneinandergereiht. Balkan, Kaukaſus, Sibirien, Nord-, Oſt- und Weſt-China, Japan und Mitteleuropa ſind hier vertreten. Der Zweck dieſer geographiſchen Gruppen iſt ein mehrfacher.
Erſtens: zu bequemem Studium die Gehölze der verſchiedenen Länder in Gruppen beiſammen zu haben. Zweitens: die für unſer Klima forſtlich wichtigſten Gebiete der Erde in typiſchen Gruppen demonſtrieren zu können. Und drittens: Gehölze, über deren Wert für unſere Verhältniſſe wir noch im Unklaren ſind, erſt mal in einigen wenigen Exemplaren und zugleich in der ihnen natürlichen Gemeinſchaft mit Gehölzen ihrer Heimat ausprobieren zu können, ehe wir weitere forſtliche Verſuche mit ihnen anſtellen. In 5 bis 10 oder beſſer 25 bis 50 Jahren wird über dieſe Verſuche mehr zu ſagen ſein als jetzt.
Typiſche Prärielandſchaft, von der auf unſerem Gelände auch einige vortreffliche Reſte erhalten ſind, hoffe ich auch noch einmal in Wort und Bild vorzuführen. Die mittelamerikaniſche Prärie mit ihrem großen Blumenreichtum iſt für den Gartenkünſtler und Pflanzenfreund eine faſt unerſchöpfliche Fundgrube von Schönheitserkenntniſſen.

KARL FOERSTER / HOCHSOMMERFLOR IM STEINGARTEN

ES iſt Ehrenſache für den Steingarten, im Sommer und Herbſt reich und überraſchend weiter zu blühen. In Gärten, die noch keinen Platz für ſommerliches und herbſtliches Blühen des Steingartens haben, fehlen Urbezirke der feinſten ſommerlichen und herbſtlichen Gartenromantik. Dieſer Steingartenflor der zweiten Hälfte des Gartenjahres trägt ganz beſondere Kräfte in ſich, die ſich für den Zuhauſebleibenden im Einfluß auf die Abmilderung ſommerlicher Reiſeſehnſucht und bei der Rückkehr von Reiſen in der Wärme des Gartenempfanges äußern. Steingartenflor ſtellt gerade in den Zeiten des Jahres, in denen unſer Wander- und Reiſetrieb am ſtärkſten iſt, eine neue reizende Verſöhnung des Dort mit dem Hier dar, welche frühere Zeiten noch gar nicht kannten. Dies Weiterblühen im Sommer und im Herbſt iſt mit einer zweiten und dritten Jugend des Jahres zu vergleichen.
Wir können unſer ganzes Leben nicht reich genug mit äußeren Symbolen erfüllen, welche das Weiterblühen des Lebens über alle Grenzen hinaus, die man früher ſolchem Flor ſetzte, zum Ausdruck bringen. In welcher wunderbaren Entwicklung iſt die Welt nach dieſer Richtung begriffen. Man denke ſich etwa weibliche Weſen noch während der neunziger Jahre des vorigen Jahrhunderts in der Mitte ihres Lebens mit langen Kleidern und mit Kapotthütchen und in der damaligen Geſamterſcheinung matronenhaften Verklingens auf und ab wandelnd in der Blütenarmut der Auguſtgärten jener Zeit, ſchnell zunehmender weiterer herbſtlicher Blütenarmut der Gärten entgegenſehend. Welch eine Verwandlung hat ſeither Gärten und Menſchen ergriffen. Die Welt wird jünger mit jedem Tag... Zurück alſo zunächſt vom Kapotthütchen zur Miſſouri-Nachtkerze.
Eine kleine gewundene Hohlwegtreppe des Steingartens liegt ganz in Miſſouri-Nachtkerzen. An ihrem Fuße blühen Zwerggoldruten, oben, wo ſich die Treppe in Douglasfichten verliert, blüht der Rieſenginſter anderthalb Meter hoch über meterhoher gelber Rieſengarbe. Das dauert noch lange Wochen bis in die zweite Julihälfte hinein, teilweiſe begleitet vom Flor der blauen Zwergritterſporne. Prachtvoll bunt iſt der Geſamtanblick des Juli-Auguſt-Steingartens, wenn man von weitem über die vorſpringenden und zurückweichenden Steinkuliſſen des Hohlweges hinwegblickt, aus dem er gemacht iſt. Einzelne ſehr lange blühende Pflanzen ſpielen eine unverhältnißmäßig ſtarke Rolle im Zuſtandekommen dieſer ſommerlichen Buntheit. Nicht genug zu preiſen ſind manche Gewächſe, die Mutationen aus gärtneriſcher Zucht darſtellen, welche den Erforderniſſen des ſommerlichen Steingartens in einer Weiſe entgegenkommen, wie man den Arten, von denen ſie ſtammen, niemals zugetraut haben würde. Sehr wirkſam iſt die lila Gruppe flacher Blumenteller und ſpitzer Dolden, zuſammengeſetzt aus haltungsvollen Veronica spicata und aus einer neuen, gedrungenen Form der Scabiosa caucasica, genannt Schöne von Eiſenach. Die alte Form, die mit ihren langgeſtielten, verhältnißmäßig wenig zahlreichen Blumen weit herumſchlenkerte, iſt in ein Gebilde von grundſätzlich anderem Gartenverhalten verwandelt. Die Pflanze bleibt niedriger, blüht wohl doppelt bis dreimal ſo reich und gehört mit ihren Kugelbüſchen endloſen Flors in jeden ſommerlichen Steingarten.
Ein ähnliches kleines Gartenwunder iſt Potentilla Gibson's Scarlet in ihrer echten Form, ſtatt der man meiſtens etwas Unweſentliches bekommt. Mit dieſem Kleinod ſollte man im Steingarten an allen möglichen Stellen Verſchwendung treiben. Die vierzig Centimeter hohe Pflanze blüht aus größter Dürre faſt zwölf Wochen lang gerade in jenem milden, reinen und blendenden Rot, von dem man nie genug bekommen kann.
Dieſes Rot dröhnt prachtvoll zwiſchen allen möglichen Farben herum und iſt nur von Lilarot und derbem Gelb zu trennen. Nichts im ſommerlichen Steingartenreiche iſt in der roten Farbe mit dem Werte dieſer anſpruchsloſen, leicht vermehrbaren und doch noch außerordentlich ſeltenen Staude zu vergleichen.

Hippuris vulgaris, Tannenwedel

Wenn man jahrelang vergeblich auf Fehler all solcher kleinen unverwüstlichen Dinge wartet, wie es die großblumige, niedrige, weiße Texas-Nachtkerze oder das blaue Helmkraut vom Baikalsee, das hohe rote kalabrische Sedum oder das Sempervivum mit der roten schönsten Blütenfarbe und dem reichsten Flor, nämlich Sempervivum tomentosum, sind, dann bestaunt man immer wieder die Gesetze der vis inertiae und der plötzlichen, epidemiehaften Beschleunigung, welche die Verbreitung aller schönen Dinge der Welt regieren, und hofft auf künftige »Epidemien«. Der sommerliche Steingarten im ganzen stellt viel höhere Ansprüche an die Widerstandskraft seiner Blütengewächse als der frühlingsfeuchte Garten. Ein mäßig großer Fortschritt des Wachstum-Temperamentes kann eine Pflanze, für die wir früher die Plätze sorgfältig auswählen mußten, zu einer ziemlich derben Beherrscherin aller möglichen Gartenplätze machen. Solch Fortschritt ist in der Campanula kewensis aus Campanula Wilsoni gewonnen. Vom Frühlings-Glockenblumenflor leitet eine lückenlose Kette zum spätsommerlichen Glockenblumenflor hinüber. Zum ersten Mal wuchs und blühte bei mir dieses Jahr Campanula glomerata acaulis und beschämte mein Vorurteil gegen sie. Es ist eine außerordentlich liebliche Pflanze, der man die unverwüstliche Dauer gleich ansieht. Ihr folgen die reizende turbinata, die Wahlenbergien und Adenophora. Schön wirkt eine Gruppe karminroter Potentilla Willmottiae in breiter Lagerung und endlosem Flor, aus dem die spitzen lilarosa Rispen der Liatris spicata und elegans herausragen, umkränzt von großen weißblauen Glockenblumendickichten der Campanula carpatica.

Am Rande flacher Wassergartenbecken und in kleinen Feuchtigkeitsmulden blühen Massen von Parnassia palustris, die von Frühsommer bis Herbst in Blüte steht. Dazu gesellt sich Gentiana pneumonanthe. Wir kennen von hundert Alpenwanderungen im Sommer und Spätherbst die Parnassia als die längstblühende aller Bergblumen.

An leidlich feuchter Stelle im Steingarten in voller Sonne oder an etwas trockneren Plätzen in Beschattung blühen die graziösen weißen und rosafarbenen Zwergastilben. Sie sind wie geschaffen für den Sommerflor an allen solchen Plätzen, hart, unverwüstlich, mit dem Älterwerden immer reicher blühend, höchst liebenswert in ihrer ganzen Wesenheit, legen sie immer eine Frage nahe: wenn selbst das Verbreitungswerteste, Gartenwilligste sich so langsam verbreitet, wie schwer muß es dann bei größerer Schwierigkeit das Andere haben.

Im August fängt noch ein ganz toller kleiner Astilbenbursche an zu blühen, mit spitzen 30 Centimeter hohen rosa Rispen und etwas wuchernden Ausläufern, die man dem langblühenden und kostbaren, kleinen Geschöpf nicht übelnimmt, sondern eher als Wert anrechnet. Dieses derbe und famose Gebilde wird also für seine Weltverbreitung Sor-

Circaea lutetiana

ge tragen. Schon bald zeigte Aſtilbe pumila chinenſis ihre Expanſionsgelüſte durch flotte Unterwucherung ihrer beetbegrenzenden Buchsbaumeinfaſſung. Immer mehr ſolcher unerwarteter Sommer- und Herbſtblüher für Steingärten tauchen auf, die ohne ſolchen Steingarten ganz heimatlos ſind. Als vor langen Jahren zuerſt die Idee des ſommerlichen und herbſtlichen Steingartens auftauchte, wußte man von allen dieſen Dingen noch garnichts. Nun drängt in die neu erdachte Form eine Überfülle neuen, unerwarteten Weltinhalts; und ſo wird es in Zukunft mit allen neuen Gartenbühnen und Gartenprovinzen gehen, die man ſich erdenkt.

Ein herrlicher Gartenſchmuck ſind alte, vieljährige Lavendelbüſche. Stundenlang iſt jeder Buſch von zehn, fünfzehn weißen Schmetterlingen beſtändig beflogen und umflattert. Beſonders abends ſtreift der Duft weit umher: jeder Einzelbuſch blüht zu beſonderer Zeit.

Zwiſchen Steingarten und Gehölzrändern vermitteln jetzt die großen Waldſalbeibüſche, von denen ein Garten nie genug haben kann. Wer ſie als alte Pflanzen kennt, ſucht nach immer neuen Gelegenheiten, eine oder mehrere Pflanzen irgendwo hinzuſetzen. Phantaſtiſch iſt die Leiſtungskraft dieſer großen, Monate lang ſchmückenden Farbenbüſche gegenüber Dürre und Beengung. Schnitt der verblühten Teile erzielt endloſen Nachflor. Das dunkle, ſchwere, violett durchwirkte Lila iſt ſo tief und neutral, daß es überall hinpaßt und vermittelnd wirkt. Salvia nemoroſa ſuperba, die in dieſer ſtraffen Form erſt ſeit dreizehn Jahren im Handel iſt, darf nicht mit dem unordentlichen Wegelagerer Salvia ſylveſtris verwechſelt werden!

Niedrige Zwergformen für kleinſte Steingartenräume ſollen in Vorbereitung ſein. Ihren lila Farbenton, jedoch ausgehend von der Verwendung der einjährigen Verbena venoſa, fand ich in Verſailles auf allen Blütenbeeten in ſolchen Maſſen angewendet, daß alle grelle Buntheit aus dem dichten dunkellila Nebel der Verbenenmaſſen herausblühte. Es ſah außerordentlich elegant und fertig und verſaillesmäßig aus. Jene Staudenſalvie hätte für Rabatten auch ähnliche Bedeutung.

Vor die genannte Salbei pflanzt man die orangerote Potentilla hybrida Veſuv oder verſicolor plena oder perfecta plena. Dieſe drei ſind die eigentlichen Träger der orangeroten Farbe im ſommerlichen Steingarten. Neben ihnen wirken als Salviennachbarn ſehr ſtark die Santolinen, die in recht magerem Boden an ſonnigſter Stelle bratend unſere Winter ohne jeden Schutz genügend überdauern. Von Santolina tomentoſa und chamaecypariſſus kenne ich ſchon zwölf Jahre alte Pflanzungen. Bei Santolina pinnata und pinnata alba gabs allerdings kräftigere Winterſchäden als bei den bisher genannten, doch habe ich noch bisher immer gefunden, daß die Pflanze Schäden ergänzte.

Eine auffallende kleine Gruppe des Steingartens beſteht jetzt aus Zwerg-Glockenblumen unter dem Schleier gefüllter Felſennelken, nämlich der Tunica ſaxifraga fl. pl. Dieſe unendlich leicht und locker gebauten Felſennelken mit ihren kleinblumigen roſa oder weißen Blütenmaſſen bilden eine unſchädliche zweite Blütenetage über den vielen niedrigen kleinen Blütengewächſen. Die Luftigkeit des Blütengeſpinſtes dieſer Tunica, die unterirdiſch garnicht wuchert, ſteht völlig einzig da und fordert zu Blütengeflechten auf, deren Wirkung überraſchend iſt und ſich ohne Nachbarunterdrückung im Gleichgewicht hält. Die gefüllte weiße Form iſt noch ſeltener und blüht noch aufrechter und weniger lagernd als die roſa Form. Dies frühlingszarte Steingartengeſchmeide ſteht durch die Hitzwochen bis in den Herbſt hinein in Flor.

Zwei, drei Meter hoch

Scutellaria baicalenſis

Aſtilbe ſimplicifolia carnea. — Bilder K. F.

Gentiana cruciata
Bild Teuſcher

Santolina pinnata
Bild K. F.

kriecht jetzt in zarte Steingarten-Gehölze, wie etwa Douglasfichten, die weiße und die roſafarbene ausdauernde Staudenwicke. Sie erblüht Anfang Juli und ſteht noch tief im Auguſt im Flor. Wenn man ſie ſo wild in Tannen hineinranken oder zwiſchen den Schleierkraut-Büſchen über Mauern hängen läßt, wirkt ſich wohl die merkwürdig ausdrucksvolle Architektur der langen Rankzweige und Blütengeſcheine ſchöner aus als bei der üppigen Fülle zu dichter Geranke. Nach zwei Jahrzehnten iſt die Pflanze noch in ihrer Jugend. Wer ſie pflanzt, legt den Grund zu lebenslanger Freude und Überraſchung. Sie kommt auf die verwegenſten Kletter- und Hängegebärden, und man ſollte ihre Pflanzung mit gleicher Verwegenheit und Phantaſie betreiben. In den erſten beiden Jahren iſt oft etwas Geduld nötig.

Eine neue zwergige Prachtgoldraute, Solidago Goldſtrahl, rüſtet ſich um Mitte Auguſt herum an den Gehölzrändern zum Flor, nachdem vorher die etwa fünfzig Centimeter hohen Zwerggoldrauten der wilden Form Solidago virgaurea nana abgeblüht hatten, beginnt nun dieſe achtzig Centimeter hohe Gartenhybride in bald meterbreiten Büſchen aufzublühen und eine Fülle und Prächtigkeit des Goldrautenflors zu entfalten wie bisher keine andere. Immer wird man leicht irgend einen oder den anderen Steingartenplatz für mindeſtens ein ſolches Exemplar finden. Für Steingärten, in denen auch dieſe ziemlich zwergige Goldraute noch zu groß und wuchtig iſt, ſind zwei weitere, etwas ſpäter blühende, nur fünfzig Centimeter hohe Zwerggoldrauten bereitgeſtellt, die der Züchter 1927 in den Handel geben wird. Sie werden beſonders reizvolle Nachbarn der zwergigen Amellus-Aſtern wie Kobold und Perkeo darſtellen, deren Reiz ja auch auf keine Weiſe intimer zu entbinden iſt als durch Steingärten.

Langſam nimmt die Zahl der hochſommerblühenden Gentianen in den Gärten zu. Gentiana lagodechiana hat ſich gut eingewurzelt und iſt wirklich erfreulich im Steingarten. Sie ſollte aber wie die herrliche Gentiana asclepiadea nur mit feſten Topfballen angeſiedelt werden. Die ebenfalls ſehr ſchöne, bei uns noch nicht genügend erprobte Gentiana sino-ornata, die ſich in England und Holland ſehr bewährt hat, verdient es, daß man ihr überall Beachtung ſchenkt. Sie ſoll ſich außerordentlich leicht vermehren. Zu gleicher Zeit Mitte Juli wie jener Enzian beginnen wieder die ſommerlichen Alpenveilchen zu blühen. Zuerſt tritt Cyclamen europaeum in Flor, dann folgt ſpäter hederaefolium. Vorläufig iſt letzteres noch völlig von der Bildfläche verſchwunden und ruht ſich unter der Erde von ſeinem ſonderbaren Leben aus. Dann kommen die fünfzehn Centimeter hohen Blütenbüſche und ſpäter die wundervoll gezeichneten Blätter hervor, die bis zum Frühſommer von auffallender Schmuckkraft bleiben, um dann unterzutauchen. Dieſe in der Kultur bequemſte aller Alpenveilchenarten ſollten vom Anfänger bevorzugt werden. Ich kenne fünfzehn Jahre alte Exemplare in verwildertem Garten an unfruchtbarer, vernachläſſigter Gehölzſtelle.

*

Mit allem hier erzählten Pflanzenleben iſt natürlich nur ein kleiner Teil des ſommerlichen Steingarteninventars aufgezählt. Dem Anfänger graut vor der Fülle, der Kenner verlangt nach mehr, ſchließlich kann keiner genug bekommen. Der Sommer iſt lang, die Gartenflächen verſchlingen überraſchend die größte Mannigfaltigkeit, die ſich plötzlich als nur eine Handvoll Wirkungen erweiſt, und im Nachbargarten will man doch gern auch wieder ganz etwas anderes ſehen als im eigenen Garten.

W. SCHACHT / IM BURGGARTEN ZU ROTHENBURG

ROTHENBURG ob der Tauber! Wer hörte noch nicht von ihm, dem Kleinod altdeutſcher Baukunſt inmitten Frankens Gauen, hochgebaut am Tauberhange zwiſchen Wettringen und Creglingen? Wer kennt es nicht, und wer möchte es nicht genau kennen lernen? Weit fern vom Trubel der Großſtadt in jenem ſtillen, verträumten Städtchen mit ſeinen plätſchernden Brunnen, ſeinen altersgrauen Türmen und Mauern, ſeinen lauſchigen Winkeln, Höfen und Gaſſen, voll von Poeſie und urwüchſiger Schönheit, Stunden verleben — verträumen? Sich zurückverſetzt fühlen um Jahrzehnte, da noch die gute, alte Zeit und tiefſtes Kunſt- und Naturempfinden Gemeingut der Menſchheit war? Doch ich will hier weder der herrlichen Architektonik biederer Patrizierhäuſer mit prunkvoll geſchnitzten Türen noch der Intimität der kleinen Häuschen innerhalb der Stadtmauer huldigen, nicht der uralten, mauerumklammernden Efeuſtöcke an dem Wehrgang gedenken und nicht die ſchönen, maleriſchen Bäume näher erwähnen, die, angeſchmiegt an graue Mauern, ihr Geäſt über roſtbraune Ziegeldächer ausbreiten, als wollten ſie das kleine Häuschen vor jeglicher Gewalt ſchirmen. Ich will hier nur den Burggarten des reizvollen Tauberſtädtchens ſchildern. In einer ſtarken Krümmung windet ſich die Tauber im Weſten der Stadt um eine ſteile, langgeſtreckte Bergnaſe, die weithin das ganze Tal beherrſcht. Gelockt durch die ungemein günſtige Lage erbaute hier der Sage nach ein fränkiſcher Herzog im 10. Jahrhundert, zum Schutze gegen die Hunnen, eine Burg. Durch ein ſchweres Erdbeben wurde in einem ſpäteren Jahrhundert dieſe Feſte bis auf ein paar Überreſte zerſtört, und jetzt beſchatten alte Linden und Ahorne große Raſenflächen, wo ehedem der aus Muſchelkalkquadern gebaute Palaſt, Wehrmauern und Türme ſtanden. Das Terrain iſt etwas bewegt, und das Ganze, ausgenommen von der der Stadt angelehnten Seite, von einer niederen Mauer begrenzt, die nach außen hin mehrere Meter tief abfällt.

Hoch und wuchtig ſteht der Burgtorturm am Eingang zum Garten, und da dieſer von der ehemaligen Stadtmauer und von Gebäuden aller Art ganz abgeſchloſſen iſt, ahnt der Fremde nicht die Fülle von Schönheit, die dahinter geborgen liegt. Nur durch den Eingang gewinnt das Auge, über die kleine Brücke hinweg, zwiſchen den zwei inneren Tortürmchen hindurch, einen Blick in die Anlage. Wie herrlich empfängt an einem ſonnigen Frühlingsmorgen der Garten ſeine Beſucher! Wenn die Sonne noch tief ſteht und ihre Strahlen durch das Geäſt der alten Linden ſendet, wenn die goldgrünen jungen Blättchen aufleuchten, die grünlichen Licht-

reflexe auf dem Boden ſpielen und bis ins Innere des ſonſt in Halbdunkel gehüllten Torturmes fallen. Tauigfriſch iſt die Luft, und tauſendfältig jubelt einem der Chor der gefiederten Sänger entgegen. Man tritt ein — wendet ſich und betrachtet das märchenhaft ſchöne Tor von innen. Leuchtendrote Geranien und Fuchſien, mit zierlichen blauroten Glöckchen, von einer alten liebenden Handgezogen, ſchmükken die kleinen Fenſter der Tortürmchen. Kletterroſen, ſorgfältig an die Wand geheftet, beleben die Flächen, und das ganze Idyll, voll von irdiſchem Frieden und Glückſeligkeit, rahmt die knorrige Linde mit ihrem Gezweige ein. Man geht den Weg rechts bis zur Mauer und blickt hinab in das Taubertal. Durchſichtiger blauer Dunſt liegt noch unten auf den Wieſen und Halden. Von Erlen, Weiden und ſchwankenden Pyramidenpappeln begleitet, zieht der kleine Fluß in großen Schleifen durch das Tal. Das Klappern und Rauſchen von Mühlenrädern dringt ans Ohr, — hier und dort überſchneiden Brücken das munter fließende Waſſer, und in der Ferne, halb verſteckt im Grünen, liegt das alte maleriſche Dorf Dettwang. Die Höhen und Hänge jenſeits der Tauber ſind bewaldet. Dunkel iſt die Benadlung der Fichte und Kiefern, wie ein leichter Schleier durchſpinnt es das zarte Grün der austreibenden Lärchen und Birken.

Der Weg führt weiter, vorbei an blühenden Vogelkirſchbäumen. In der Nähe eines runden Holzpavillons wurden ſie vor Jahren gepflanzt; ſie haben ſich zu ſtattlichen Exemplaren entwickelt und ſind Jahr für Jahr im Frühling beladen mit ihrem Blütenſchnee. Finken ſchlagen im Geäſt, leiſe fallen ab und zu die weißen Flocken zur Erde nieder, bedecken den Raſen und die darin ſprießenden Gänſeblümchen und Goldſterne. Etliche Tage ſpäter duftet hier der Flieder und die gelben Blütentrauben des Goldregens glühen in der Sonne. Veilchenduft durchzieht die ganze Gegend, und jauchzende Kinder pflücken mit vollen Händen unterhalb der Burgmauer vom Überfluſſe der Natur. Weiter kommt man zu einer alten Linde, die, von einer Rundbank umgeben, auf einer kleinen Anhöhe ſteht. Von hier aus führt der Weg durch lichten Laubholzbeſtand bis an die ſchmale Weſtfront des Gartens. In einer großen Schleife umfließt die Tauber den Bergvorſprung, und man genießt von der weſtlichſten Spitze des Hochplateaus herrliche Blicke ins Tal flußauf und flußabwärts. Schräg unten am Fluß liegt das reizende Topplerſchlößchen aus dem 14. Jahrhundert, überall ſind wieder die Getreidemühlen mit ihren bemooſten Dächern verſtreut, hell leuchten ihre weißgetünchten, durch braune Balkenlagen hingewürfelten Wände. Üppig iſt die Wieſenflora dort unten. Zuerſt eröffnet Ende April das Wieſenſchaumkraut den Reigen. Wie ein zartlila gefärbter Dunſt ſchweben die tauſend und abertauſend Blütchen über dem feuchten Raſen und wogen im Frühlingswinde auf und ab. An ganz naſſen Stellen aber leuchtet das klare Gelb der Sumpfdotter-Blumen.

Doch wenn im Sommer der prächtigblaue Wieſenſtorchſchnabel blüht, der Schierling ſeine weiße Häkelarbeit ausgebreitet hat und der Ampfer ſeinen kupfrigen Blütenſtand entfaltet, iſt das Idealbild einer blühenden Wieſe erreicht, und man ſitzt gern unter der Traueresche, die mit ihrem Gezweige ein Gartenhäuschen überdacht und ſieht hinab in den großen bunten Garten an der Tauber.
Zu den ſchönſten Anblicken gehört die Holzpergola an der Südſeite des Gartens. Vom wilden Wein berankt führt ſie direkt an der nur wenige Fuß hohen Mauer vom Kinderſpielplatz bis zum ehemaligen Schützenhaus entlang. Unbeſchreiblich ſind die Szenerien beſonders im Herbſt. Wenn das Weinlaub in Purpur glüht, die Buchen ihr ſattes ockerfarbenes Kleid angelegt haben, dazwiſchen die Birken golgelb überſchüttet ſtehen und ihr Gezweige über den Laubengang vom Windhauch leiſe hin und her ſchwenken laſſen, dann ſteht dieſe Stätte auf der Höhe herbſtlicher Gartenſchönheit. An einem ſolchen ſonnigen Herbſtabend ſaß ich am Laubengang auf der Mauer und ſchaute hinüber zu den braunroten Ziegeldächern der alten Stadt; die rotgoldene Sonne ſandte ihre letzten Strahlen, ſpiegelte ſich in den Fenſtern und ließ herbſtgeſchmückte Birken, Kaſtanien und Ahorne aufflammen. Die Quittenbüſche, die den Abhang zur Tauber hinab bekleiden, waren geſchmückt mit ihren duftenden gelben Früchten und ganz unten im ſchattigen Tale floß, ihre großen Bogen beſchreibend, die Tauber. Wolkenlos und klarblau war der Himmel. Grillen zirpten vereinzelt noch im Gras, und leicht glitzernd zogen die Fäden des Altweiberſommers durch die Luft. Ganz ſtille war es ſonſt im Garten, ſo ſtill, daß ich das Aneinanderſtreifen der Flügel des ſich vor mir an der Mauer ſonnenden Pfauenauges hörte; nur ab und zu raſchelte leiſe ein fallendes Blatt.

Dann ging ich weiter bis zum Roſengärtchen, das am Ende der Pergola, neben dem Schützenhäuschen liegt. Vier alte Steinplaſtiken ſtehen hier in der Mitte des Raſens verteilt, und ringsherum liegt, wie ein farbiges Band, der Flor der Roſen und Einjahrsblumen. Unweit davon ab liegt dem Gebäude vorgelagert eine kleine Fontäne. Aus einem großen Stein, über und über mit einer dunkelgrünen Moospatina bekleidet, ſprudelt nur wenige Centimeter hoch quellenartig das Waſſer empor und plätſchert dann in das runde, mit Funkien umſäumte Becken. Die alten Linden, die dieſen Platz umſtehen, und das in ihrem Schatten liegende Gebäude machen dieſe Stelle reizvoll. Von hier aus gelangt man mit wenigen Schritten zu dem einzigen noch vorhandenen Gebäude der ehemaligen Burg, zur Blaſiuskapelle. Ein Trupp alter Lärchen und ein Nußbaum verdecken das mit Efeu bewucherte Überbleibſel von zwei Seiten. Den Eingang und die um dieſen herum aufgeſtellten Reliquien der ehemaligen Feſte beſchatten zwei echte Kaſtanienbäume und geben dadurch dem Motiv ein faſt ſüdliches Gepräge.
Es war inzwiſchen dämmerig geworden. Fledermäuſe gaukelten ab und zu wie ſchwarze Schatten durch die Bäume, im Tal unten blinkten vereinzelte Lichter in den Mühlen auf, und weich ſummte das Geläute einer Abendglocke durch die klare Herbſtluft. Noch einmal trat ich an die Mauer, ſchaute hinab in die Tauber, ſah den Nebel auf den Wieſen liegen und lauſchte dem Rauſchen des Waſſers. Dann ging ich dem Tore zu. Hell leuchteten die weißen Stämme der Birken aus dem Halbdunkel der Gehölze über die Raſenflächen.
So oft man dieſen Stadtgarten beſuchen mag, im Winter bei Rauhreif, im Frühling, Sommer oder Herbſt, immer wieder hinterläßt er neue Eindrücke von gärtneriſcher, landſchaftlicher und architektoniſcher Schönheit.

SIEGFRIED DECKER / DAHLIEN IN BRASILIEN I

DAHLIEN ſind hier in jedem Garten zu finden. Und ſie verdienen dieſe Bevorzugung vollauf, gehören ſie doch zu jenen Gartenpflanzen, die größte Blühwilligkeit und Anſpruchsloſigkeit mit ſchönſter Farbenpracht und darum höchſter Gartenwirkung vereinen. Sie paſſen ſich ausgezeichnet den hieſigen Klima- und Bodenverhältniſſen an, daß ihnen nur ganz wenige Blütenpflanzen überhaupt gleichkommen. Allerdings trifft dies nur für »moderne Dahlien« zu, die deutſchen, holländiſchen, teilweiſe franzöſiſchen oder amerikaniſchen Urſprungs ſind; doch ſind die letzten des hohen Preiſes willen meiſt unerſchwinglich, ſie müſſen erſt den Weg über Europa finden. Die engliſchen Sorten haben oft den großen Fehler, daß ſie verſteckt im Laube blühen oder daß die Blumen infolge eines zu ſchwachen Nackens hängen. Dahlien aber müſſen frei über dem Laube blühen; ihre Blumen müſſen auf feſten Stengeln in einwandfreier Haltung tronen, da ſie nur ſo ihre bezwingende Macht ausüben können. Und dann haben die engliſchen Sorten oft den Fehler, daß die Blumen den ſchweren Tropenregen, der brennenden Tropenſonne nicht widerſtehen. Wir aber hatten 1924/25 ein ganz unglaubliches Trockenjahr! Mit Ausnahme einiger Januarregen und etwa dreier Tage im März und zweier im Mai dauerte die abſolute Trockenheit bis in den Oktober hinein. Unter ſolchen Umſtänden half kein Gießen, wie ich überhaupt Dahlien niemals gieße, ſofern ſie nicht im Vorgarten ſtehen. Mitte Oktober 1925 ſetzten dann die erſten Sommerregen ein, und im Dezember 1925, beſonders aber im Januar 1926 goß es dermaßen, daß Sao Paulo rings von einem weiten Waſſergürtel umgeben war. Erſt der Februar brachte normale Witterung. Daß unter dieſen wirklich ungewöhnlichen Verhältniſſen meine aus Deutſchland bezogenen Dahlien ihre Wertprüfung für braſilianiſche Verhältniſſe »summa cum laude« beſtanden haben, darf jeden deutſchen Blumenfreund erfreuen.
Meine Dahlien wurden Ende Juli, Anfang Auguſt gepflanzt und blühten von Ende Oktober bis Mitte April ohne Unterbrechung; nur im Januar machten einige Sorten eine leichte vierzehntägige Ruhepauſe durch, trieben aber nach dem ſchweren und andauernden Sommerregen aufs kräftigſte aus. Durch früheres oder ſpäteres Legen (bis in den Dezember hinein, wo die Knollen dann immer durchtreiben) und in froſtſicheren Gegenden durch Herausnehmen im Januar und Einpflanzen im März-April, kann man Dahlien das ganze Jahr über haben, ſelbſt in den Wintermonaten Mai – Juli. Man kann ſie auch ſtändig im Boden belaſſen, doch werden die Blumen dann kleiner, einfacher; nur die Pompondahlien, Georginen und ſtark gefüllten Rieſen-Schmuckdahlien bleiben unverändert in der Füllung. Sonderbarerweiſe erblühen auch die in der Erde belaſſenen zu gleicher Zeit mit den andern, und ebenſo hören ſie Ende April mit dem Blühen auf. Sämtliche Sorten wurden in der noch rohen »roten Erde« ohne Dünger, wie auch im trockenen ſchwarzen Moorboden, wie er ſich um Sao Paulo ſtellenweiſe findet, gepflanzt; eine Zugabe gut verrotteten Stalldüngers wirkte ausgezeichnet, beſonders in bezug auf die ſtaubtrocken und unten ſteinhart werdende »rote Erde«; in etwas beſſerer Gartenerde aber erlebte man wahre Blütenwunder. Die Höhenlage iſt 750 Meter über dem Meeresſpiegel; die Winde ſind ſcharf, die Wetterumſchläge innerhalb 24 Stunden ſehr bedeutend, oft 20 bis 30 Grad erreichend! Wie ſich die einzelnen Sorten benahmen, mögen die folgenden Zeilen beſagen.

Deutſche Dahlien

WENN ich nur eine Dahlie pflanzen könnte, ſo wäre es die Sorte *Adler.* Wie üppig ſind die dichtbelaubten Büſche, wie mächtig die kerzengeraden, wind- und wetterfeſten Äſte; wie feſt und immergrün ſind die ſchönen Blätter, die weder unter Sonnenbrand noch Regengüſſen leiden; wie feſt ſind die halbmeterlangen, fingerdicken Blumenſtengel, deren jeder von einem prachtvollen, rieſigen, ſchneeweißen Blütenball gekrönt iſt. An Blütenreichtum iſt ſie allen über, und hier ſind die Rieſenblüten ſtets vollgefüllt, ſodaß ihnen Trockenheit nichts anhaben kann. Als mannshohe Gruppenpflanzen von ſelten guter Wirkung, als Dekorationsdahlie von größtem Wert, äußerſt haltbar im Waſſer, und wenn mit anderen Dahlien, wie Aureola, Demut und ähnlichen untermiſcht, von unausſprechlichem Reiz, beſonders bei elektriſchem Licht, wobei die mehr im Schatten ſtehenden unteren Blüten der Sorte einen ganz eigenartigen Schmelz erhalten.
Weltfrieden iſt eine milchweiße, überreich blühende Kranzdahlie; als Gartenſchmuckdahlie blüht ſie nicht andauernd genug, in dieſer Beziehung wird ſie von Schneekoppe, Prinzeß Irene und beſonders von Heideprinzeß übertroffen. *Schneekoppe* hat zwar ſchöne, ballförmige Blumen, die einen leichten, grünen Schimmer zeigen, aber die Pflanze, beſonders die Blätter leiden ſehr unter Sonnenbrand, noch mehr unter den ſchweren Tropenregen, wodurch die Blätter fleckig werden. *Tugend* iſt eine mittelhohe, unermüdlich blühende Hybriddahlie. Wenn Blühwilligkeit eine Tugend iſt, dann beſitzt ſie dieſe Sorte in hohem Maße und wird hierin unter den weißen Dahlien nur von Adler übertroffen. Bei trockenem Wetter ſind die Blüten nur halb gefüllt, gleichen dann aber rieſigen japaniſchen Herbſtanemonen; gegen Trockenheit iſt dieſe Sorte ſonſt ſehr widerſtandsfähig. Reichblühend iſt auch *Prinzeß Irene.* Auch ſie iſt nur mittelhoch und bereitet jedem Dahlienliebhaber, wenn voll erblüht, hohen Genuß; ganz ſo anſpruchslos wie Tugend ſcheint ſie hier nicht zu ſein, wochenlange Trockenheit nimmt ſie ſehr übel; doch ſind die herrlichen Blüten ein prächtiger Zimmerſchmuck. Auch ſie wird bei Waſſermangel ziemlich einfach, und zeigt dann einen wenig ſchönen Aufbau, genau

Laubengänge

LAUBENGÄNGE gehören zu den wirkſamſten Motiven, die wir in Gärten verwenden können. Ihre verſchwiegenen Reize laſſen ſich gar mannigfaltig geſtalten. Wir zeigen heute zwei Motive, die zur Nachgeſtaltung anregen können. Das erſte iſt ein Laubengang allereinfachſter Art, deſſen Holzaufbau ohne weiteres durch das Bild verdeutlicht wird. Er iſt mit edlen Reben überſponnen und vereint das Nützliche mit dem Angenehmen. Das Motiv ſtammt von der durch ihre Pflanzenſchätze ſo bekannten Inſel Mainau im Bodenſee. Hier reift der echte Wein in ſeinen edelſten Vertretern. In unſeren Lagen würde man dafür die amerikaniſchen Duftreben, Vitis odoratissima, oder auch einige der ſich ſo reich im Herbſt färbenden oſtaſiatiſchen Vitis-Arten wählen, wie etwa Vitis Coignetiae oder V. pulchra. Das zweite Motiv ſtammt aus dem Nymphenburger Botaniſchen Garten. Er iſt ein weit anſpruchsvollerer Aufbau, der an den Enden mit Schmucklauben abſchließt. Er dient hier ſowohl der Ausſchmükung der Anlage wie der Anbringung verſchiedenartigſter Schlinger. Nicht nur Reben aus der alten und neuen Welt, auch Clematis, Pfeifenſträucher, Jelänger-je-lieber-Formen, Strauchroſen, Baumwürger und wie ſie alle heißen, umſpinnen ſteinerne Säulen und das kräftige hölzerne Tragwerk. Er bietet ſo zu allen Jahreszeiten Abwechslung in Blüte, Frucht, Belaubung und der Struktur der verſchiedenen Ranker.

C. S.

wie Weltfrieden. Köstliche Blüten schenkt uns *Samariterin.* Sie gleicht herrlichen, gefüllten Cereusblüten, und hätten sie deren köstlichen Duft, so wären sie schöner, begehrenswerter als die jeder anderen Sorte. Fehlt es aber an Wasser, macht sich die Trockenheit Wochen hindurch geltend, ist der Boden zu roh und trocken und humusarm, dann pflückt man lauter einfache Blumen, die nicht einmal schön zu nennen sind, das Laub wird fleckig, die Blätter schrumpfen ein und die Pflanze weist einen unschönen sparrigen Aufbau auf. Als Gartendahlie ist sie hier nicht allgemein zu empfehlen, wo man aber fleißig wässern und ihr einen guten Boden geben kann, da nehme man sie unbedenklich, eine einzige vollkommene Blüte entschädigt für all die hohen Ansprüche, die sie stellt. *Insulinde* ist Adler fast ebenbürtig, sie erblüht als erste, verblüht als letzte. Jede Blütenknospe, auch die der Nebentriebe, entwickelt sich, und sind die letzten Blüten auch kleiner, so sind sie dennoch recht brauchbar. Wunderschön ist die bronzegelbe, leicht amethyst überhauchte und geblich abgetönte Blüte, und wahre Riesenblumen sind jene, die sich an den Haupttrieben entwickeln. Sie hat nur den Fehler, daß die Blätter nach monatelangem Blühen, zur Zeit, wenn Adler noch im schönsten Blätterkleide prunkt, vergilben und braun werden, so die Pflanze verunstaltend; man muß sie entfernen, wonach der Aufbau recht sparrig und unschön wirkt. Allerdings treiben sofort neue Augen durch, bald ist der Aufbau wieder voller, aber trotz allem unermüdlichen Blühen haftet ihr dieser Mangel an. Und noch einen Fehler besitzen die einzig schönen Lockenköpfe: zur Zeit der schweren Sommerregen saugen sie sich mit Wasser voll und sehen aus wie verfaulte Blüten. Trotz dieser Untugend gehört sie zu den allerbesten, allerdankbarsten Dahlien. Alle diese Vorzüge und Nachteile hat sie mit der ähnlich geformten und gebauten *Porthos* gemein. Selten hat mich eine Blüte so erfreut wie diese überaus zahlreich erscheinenden, violett-lila-farbenen Porthosblüten, die beim Erblühen ein so herrliches Veilchenblau aufweisen. Ihre Widerstandskraft ist enorm, an windigen Orten braucht sie aber eine Stütze, die Adler und Insulinde stets entbehren können, genau so wie die überaus schöne und nützliche *Herbstkönigin.* Sie erblüht hier später als die vorhin genannten. Die einzig schöne Herbstfarbe zeigt sie auch hier, als langstenglige Vasenschmuckdahlie ist sie von hohem Wert, im Garten aber sind die Blumen gegen Nässe und Trockenheit gleich unempfindlich, stets gut gefüllt. Im allgemeinen zeigte sie sich recht windfest, das Blattwerk widerstandsfähig, der etwas lockere Aufbau dennoch gut. *Salmonea* zeigt selbst im größten Sonnenbrand gute Füllung, gute, unverblaßte Färbung und ist sehr blühwillig, glaubt man, sie habe ausgeblüht, so kommen nach wenigen Tagen neue Blumenmassen. Ganz wunderbar werden die Blüten, wenn sie sich bei bewölktem Himmel oder im Halbschatten öffnen, die Farbe ist dann von ungemeiner Wärme, und dennoch seidenartig weich. Aufbau, Wind- und Wetterfestigkeit, Blattwerk und deren gute Eigenschaften lassen kaum etwas zu wünschen übrig. Erwähnenswert ist, daß sich diese Sorte ungemein leicht durch Stecklinge vermehren läßt, es genügt, sie einfach im Schatten der Mutterpflanze in die Erde zu stecken! Schwere Regen machen die Blüte matschig, aber es kann nicht alles vollkommen sein. Als allererste erblüht stets die alte *Breslau.* In der Färbung sehr veränderlich, bringt sie bald prachtvolle, gutgefüllte, bald schlechte oder weniger gute, nur mäßig gefüllte Blumen hervor. Sie blüht sich zu Tode und weiß sich dann zu keinem neuen Blühen emporzuschwingen. Es geht ihr so, wie der mittelhohen, das heißt eher niedrigen *Perle von Dresden.* Hundert und mehr Blüten gleichzeitig offen und im Öffnen sind keine Seltenheit, und dann erglüht der Busch buchstäblich in einem orangekarminroten, amethyst überhauchten Feuerkleid; dann aber ist es aus, ja, manche Pflanzen gehen dann einfach ein. Als Gartenpflanze kann sie hier nicht gelten. Da ist *Schönes Farbenkönigin* etwas anderes. Mag die Sonne Tag für Tag auf sie niederbrennen, mag der Boden wochenlang von den sengenden Sonnenstrahlen ausgeglüht werden, stets ist sie in Blüte und immer sind die rosaroten, besser gesagt scharlachkarminrosaroten Blüten schön gebaut, selten nur an den Rändern etwas verblaßt. Die eher dünnen, dunklen, drahtharten Stiele machen die Blumen zum Vasenschmuck sehr geeignet. Der Gesamtaufbau, die Widerstandsfähigkeit von Stengel und Blattwerk ist gut, eine empfehlenswerte Sorte. Rote und gelbe Dahlien sind überhaupt Sorgenkinder. Wohl blüht *Kalif* reich, aber die Blüten erscheinen zu gehäuft, die Farbe ist für meinen Geschmack zu unrein, die Windfestigkeit ist nicht einwandfrei, und ferner saugen sich die Blumen voll vom Regenwasser, so daß die Pflanzen dann einen jämmerlichen Anblick bieten; dasselbe gilt von der oft nur halbgefüllten und in den Tropen und Subtropen wenig widerstandsfähigen Blüte und dem Aufbau des gelben *Hindenburg.*

(Ein Schlußartikel folgt.)

Aus dem Blumengarten der Literatur

In Chinas Zaubergärten

Frühling am Westsee

Am Berge ragt die schlanke Felspagode,
Der Pavillon blickt zierlich in den See.
Des Wassers Fläche ist so glatt wie Spiegel,
Und Schäfchenwolken schweben in die Höh.

Schon streiten sich die frühen Oriolen
Um eines Baumes schlank gebogne Aeste.
Die Schwalben fliegen emsig dort zum Hause
Und bauen an dem neuen Frühlingsneste.

Die bunten Blumen füllen Tal und Haine
Und durch die Wirrnis klingt's wie Zauberruf.
Das zarte Gras sproßt auf den Wiesenplanen,
Bedeckt nur eben erst der Rosse Huf.

O, unermüdlich muß in solchen Tagen
Ich wandeln an des Sees belebtem Rand.
Die Pappeln geben warme, weiche Schatten,
Darunter leuchtet weiß der Dämme Sand.

Po Kü J.

Pflaumenblüte

Alle duft'gen Blumen sind zerflattert,
Du allein bist frisch und hold,
Und ich hab dich liebevollen Sinnes
In mein Gärtchen hergeholt.

Deiner feinen Züge wirrer Schatten
Auf dem seichten Grunde schwebt,
Blüten duften, Mondesspiegelschwanken
In der Dämmrung heimlich lebt.

Schneeig weiße Reiher nahen spähend
Mit gesenkter Schwinge sich,
Wüßten es die zarten Schmetterlinge,
Grämten sie zu Tode sich.

Glücklich bin ich, daß dir zu gefallen
Ich dies Liedchen ausgedacht.
Nicht begehr ich Goldpokal und Zimbeln
In der selig stillen Nacht.

Lin P'u

Aus: Richard Wilhelm „Die Seele Chinas"
Berlin, bei Reimar Hobbing.

Gartenarbeit und Blumenpflege

KURT POETHIG / STEINE IM GARTEN I

DIE Verwendung von Steinen in den Gartenanlagen gehört wohl zu den schwierigsten Aufgaben des Gartengestalters, und trotz der vielen Belehrungen in Wort und Bild sieht man immer wieder flache Hügel und Böschungen, die mit auf die Spitze gestellten Steinen gespickt sind wie ein Hasenrücken. Gerade die Steine erfordern ein besonders sorgfältiges Naturstudium und eine eingehende Naturbeobachtung wie wenige andere Elemente der Gartengestaltung. Hier ist jedes Schema ausgeschlossen, denn nicht nur jede Gesteins*art* hat ihre bestimmte Schichtung und Lagerung, sondern auch jeder *einzelne* Stein zeigt ein besonderes Gesicht. Aber dafür ist das Einbauen von Steinen, sei es als einzelne Blöcke oder als zusammenhängende Gesteinsanlagen, eine der reizvollsten und interessantesten Arbeiten des Landschaftsgärtners, die er wohl nur in seltenen Fällen einem Gehilfen überlassen kann.

An dieser Stelle soll nach und nach die Physiognomie der verschiedenen Gesteinsarten besprochen und in charakteristischen Abbildungen nach ihrem *natürlichen* Vorkommen gezeigt werden, um gute Vorbilder für ihre Verwendung im Garten zu erhalten.

Zunächst seien folgende allgemeine Gesichtspunkte für die Verwendung von Steinen hervorgehoben: Man verwende in einem Garten nur eine Gesteinsart, und zwar in der ihr eigentümlichen, natürlichen Ausdrucksform. Der Aufbau erfolgt in ganz einfacher und naiver Weise; jede gewollte Romantik und gekünstelte Mannigfaltigkeit ist gefährlich und daher besser zu vermeiden. Die Befürchtung, daß die Anlage bei dieser Art des Aufbaues langweilig wirken könne, ist gänzlich unbegründet. Die wechselnde Beleuchtung, die malerischen Umrißformen der Polsterstauden, Rankgewächse und Gehölze, die den Felsen besiedeln, der verschiedene Feuchtigkeitsgrad an der Nord- und Südseite der Felsen und die damit zusammenhängenden Unterschiede in der Vegetation, die verschiedene Größe der für das Auge zusammengehörigen Massen und eine Menge anderer Zufälligkeiten, die kein noch so phantasiebegabter Gestalter vorher auszudenken vermag, schaffen genügend Abwechslung und Mannigfaltigkeit.

Als Vorbilder sind nur solche Felsengebilde zu wählen, deren Größenverhältnisse in den Garten übertragen werden können. Es ist geschmacklos, Gebirge oder Bergketten en miniature im Garten darstellen zu wollen. Vielmehr sind kleine Trümmermassen, dichtbemoost, von Gewächsen stark überwuchert und nur ganz bescheiden zutage tretend, meistens die rechten Vorbilder für die Nachgestaltung im Garten. Nur die kleinen Motive aus der Natur sind der Wiedergabe mit unseren schwachen Kräften zugänglich. Damit soll aber nicht gesagt sein, daß man nur kleine Steine im Garten verwenden soll; sondern im Gegenteil, ein großer Stein ist besser wie zehn kleine. Die unruhige Wirkung vieler Gesteinsanlagen beruht auf der Verwendung zu kleinen Steinmaterials. Ein großer Block lohnt die Mühe und aufgewendeten Transportkosten stets reichlich durch seine Wirkung. Hierbei wird der Gartenbesitzer sehr oft das Bestreben haben, diesen Stein, der so viel Mühe und Kosten verursacht hat, recht zu zeigen. Das ist aber ein großer Fehler. Die Gesteinsanlagen sind nicht um ihrer selbst willen im Garten, sondern sie dienen dazu, bestimmten Pflanzen den biologisch und physiologisch richtigen Standort zu geben. Von diesem Gesichtspunkte aus sind auch Anlagen zu bauen, die einem praktischen Zwecke dienen, etwa die Abstützung einer steilen Böschung. Draußen in der Natur sind die Steine meist tief in den Boden eingelassen oder so überwuchert, bemoost und verwurzelt, daß man sie mehr ahnt als sieht. Sie sind mit der Erde und den Pflanzen zu einer Lebensgemeinschaft verwachsen, und so soll es auch im Garten sein. Diese Erkenntnis darf aber nicht dazu führen, die Lagerung und Schichtung beim Bauen nachlässig zu behandeln; der geübte Blick wird auch bei noch so verwachsenem Gefelse sofort erkennen, ob gegen die physiognomischen Gesetze beim Aufbau verstoßen ist oder nicht.

Kleine Steine und Geröll verwendet man am Fuße der Felsenanlage und auf schwach geneigten oder wagerechten Flächen zwischen den größeren zusammenhängenden Massen zur Bedeckung des Bodens. Selbstverständlich muß das Geröll von dem gleichen Material sein wie die großen Blöcke und so erscheinen, als ob es von diesen abgesprengt und abgerollt sei. Sollen größere Felsblöcke als abgesprengt erscheinen, so ist zu beachten, daß diese am meisten von ihrem Ursprung wegrollen, weil sie infolge ihrer Masse und Schwerkraft viel später zur Ruhelage kommen, als die kleinen Steine, wenn sie nicht ein sichtbares Hindernis, beispielsweise eine Baumwurzel, aufhält (Bild 1). Große Steine benutzen die kleineren oft als Transportmittel und rollen auf ihnen in die Tiefe; dabei schieben sie sich oft treppenartig übereinander.

Der Bau einer Gesteinsanlage hat, da, wie schon gesagt, die Bewachsung eine wichtige Rolle dabei spielt, immer so zu erfolgen, daß die Pflanzen später einmal genügend Boden und Feuchtigkeit zum guten Gedeihen vorfinden und erhalten. Dadurch darf natürlich nicht der naturwahre Aufbau gestört und beeinflußt werden. Senkrechte Fugen, die bepflanzt werden sollen, sind nicht durch einen Stein abzudecken, sondern müssen oben offen bleiben, damit von dort das Regenwasser eindringen kann. Die Bodennester zwischen den Felsen müssen immer im Zusammenhange mit dem gewachsenen Erdreich bleiben; sie dürfen nicht durch Steine gebildeten Blumentöpfen gleichen, die vielleicht nicht einmal einen Wasserabzug haben. Schon beim Bau muß man sich überlegen, welche Arten man anpflanzen will und an welchen Ort sie kommen sollen. Erfahrungsgemäß fehlt es sehr oft an absonnigen, bodenfrischen Pflanzstellen. Zum Hinterfüllen der Steine benutzt man am besten gleich die für die zu verwendenden Pflanzen richtige Erdmischung. Für viele Gewächse wird man die Erde stark mit kleingeklopftem Steinschotter untermischen. Dies gilt besonders für kalkliebende Pflanzen, die in solchem von Kalksteingrus durchsetzten Boden sehr freudig gedeihen. Ebenso ist die reichliche Verwendung von Torfmull für viele Arten zu empfehlen.

Für die Verwendung von Steinen bieten sich im Garten die verschiedensten Möglichkeiten. Beim Ausschachten der Baugrube oder anderen Erdarbeiten vorgefundene Findlingssteine geben ein gutes Material für reizvolle Motive in Heidepartien, waldartigen Pflanzungen und dergleichen. Geländeeinschnitte, Hohlwege, Böschungen, die Wände von Sand- oder Lehmgruben, Vertiefungen zur Bodengewinnung und viele

andere können durch Geſelſe geſtützt und für eine Bepflanzung geeignet gemacht werden. Steine in Verbindung mit Waſſer an Quellen, Bachläufen oder Waſſerfällen ſind beſonders reizvolle Motive für den Garten und ein Kapitel für ſich.

Die Findlinge

ZUERST ſollen die Baugeſetze für die Findlingsſteine beſprochen werden, weil viele dieſer Geſetze auch für die andern Geſteinsarten gelten, ſobald es ſich um die Lagerung einzelner abgeſprengter Blöcke handelt. Die Findlinge oder erratiſchen Blöcke, jene mehr oder minder großen Steine, die vor allem in unſerm norddeutſchen Flachlande in großer Zahl verbreitet ſind, haben die Wiſſenſchaft lange Zeit beſchäftigt. Man ſtand vor einem Rätſel über die Herkunft, weil weit und breit kein anſtehendes Geſtein zu finden war. Alle möglichen Theorien wurden aufgeſtellt. Sie ſollten durch Vulkane auf Rieſenentfernungen ausgeſpien ſein. Flutwellen nach Art der Sintflut ſollten ſie von fernen Gebirgen zu uns gebracht haben und was dergleichen mehr iſt. Sogar Goethe hat ſich mit ihnen beſchäftigt, er glaubte, daß ſie die letzten Reſte eines verwitterten Urgebirges ſeien. Heute wiſſen wir, daß die Findlinge während der Eiszeit durch Gletſcher und Inlandeis von den ſkandinaviſchen Gebirgen zu uns transportiert worden ſind. Am häufigſten finden ſie ſich in den großen Endmoränenzügen, welche in oſtweſtlicher Richtung die norddeutſche Tiefebene durchziehen. Eine der bekannteſten iſt die uckermärkiſche Endmoräne, die ſich von Oderberg über Liepe, Chorin, Joachimstal, Alt-Temmen bis nach Wendorf in Mecklenburg erſtreckt.

Die Findlinge haben meiſt abgerundete Formen und zeigen nicht ſelten die charakteriſtiſchen Zeichen des Gletſchertransportes: Schliffflächen und Schrammen. Neben ihrer ſchönen, meiſt rötlichen oder gelblichen Farbe imponieren ſie oft durch ihre Größe.

Findet man draußen in der Natur einen ſolchen erratiſchen Block, ſo ſieht man es dem alten Knaben an, daß er ſchon recht, recht lange an ſeinem Orte liegt. Er hat ſich gemütlich auf die faule Seite, alſo auf ſeine breiteſte Fläche gelegt und iſt tief in den Boden eingebettet. Mooſe und Flechten haben ſich auf ihm angeſiedelt, nur die Sonnenſeite glänzt blankgewaſchen in rötlichbrauner Farbe. Einzelne Findlinge im geneigten Gelände ſind auf ihrer Reiſe zum Tale entweder durch beſondere Widerſtände, wie Baumwurzeln, oder dadurch zur Ruhe gekommen, daß ſie ſich mit ihrer Längsrichtung parallel zur Neigungsrichtung des Geländes gelegt haben (Figur 1 A richtig, Figur 1B falſch). Weil die Steine der Abſchwemmung des Erdreiches oberhalb ihres Lagerungsortes Widerſtand bieten, wird ein ſtufenförmiger Abſatz gebildet. Unterhalb wird das Erdreich weiter abgeſchwemmt, und ſo hat es oft den Anſchein, als ob die Steine immer an der ſteilſten Stelle des abſchüſſigen Geländes lägen. (Figur 2.) In vielen Fällen können an Abhängen Findlingsblöcke auch dadurch zu Tage treten, daß ſie infolge energiſcher Abſchwemmung vom Erdreich freigelegt werden. Wird in Endmoränengebieten durch Menſchenhand, etwa bei Straßenbauten, das Gelände angeſchnitten, ſo kommt man häufig in ein ſo dichtes Steingeſchiebe hinein, daß die Böſchungswände förmlichen Steinpackungen gleichen. Untrennbar iſt auch das Bild der deutſchen Heide mit dem Findling verbunden. Wacholder, Birke, Heidekraut, Ginſter und einige erratiſche Blöcke ergeben auch für den Garten ein gutes Geſtaltungsmotiv.

Nach dieſen Geſichtspunkten ſind die Findlingsblöcke auch im Garten zu verwenden. Sie müſſen immer auf der faulen Seite im Boden eingebettet liegen (Figur 3) und dürfen nie oben aufgelegt oder gar aufgeſtellt erſcheinen. Am häßlichſten und unnatürlichſten wirken ſie, wenn

walzenförmige Steine hoch aufgerichtet werden oder wenn bei stark abgerundeten Formen durch Auflegen auf den Boden ausgeprägte Untersichten entstehen (Figur 4). Das dankbarste Motiv im Garten ergibt neben dem schon geschilderten Heidemotiv die Verwendung von Findlingsblöcken im geneigten Gelände zur Bildung von Geländestufen (Bild 2); hierbei lassen sich vorhandene Bruchflächen leicht verdecken.
In geneigtem Gelände können die Findlinge auch leichter zu Gruppen zusammengebaut werden und zwar dadurch, daß man die verschiedenen Ursachen der Hemmungen auf der Talwanderung darstellt. Die Steine kommen, wie schon gesagt, dadurch zur Ruhe, daß sie sich mit ihrer Längsrichtung parallel zur Steigerungsrichtung des Geländes legen. Ist es ein ausgesprochen länglich geformter Stein und kommt er außerdem noch mit seiner schwersten Seite nach unten zu liegen, so hat er eine so stabile Ruhelage gefunden, daß er auch andere Steine in der Bewegung auszuhalten vermag. Dabei schieben sich die Steine oft auf- oder übereinander, und es entstehen dadurch treppenartige Absätze (Figur 5). Besonders reizvolle Gruppen können entstehen, wenn man die gegenseitigen Hemmungen und Stauungen gewölbeartig aufbaut. Hierbei ist aber zu beachten, daß sich die Gewölbekappe gegen die Böschung stemmen muß; niemals umgekehrt, wie es aus dem Bestreben heraus, die Steine recht zu zeigen, oft geschieht. Das ist statisch unmöglich. In Bild 3 und Figur 6 ist ein solches Gewölbe nach Aufmaß dargestellt.
Zu starke Anhäufung von Steinen wirkt leicht unnatürlich. In der Natur sind die Findlinge meist einzeln verstreut. Nur bei Geländeeinschnitten, die sich offensichtlich als Menschenwerk darstellen, dürfen sie in größerer Menge als an den Böschungswänden freigelegte Steinpackungen erscheinen. Sehr große Steine können durch Sprengen in mehrere Stücke zerlegt werden, um den Transport zu erleichtern. Im Garten werden sie wieder sorgfältig zusammengefügt. Hierbei ist aber die Verwendung von Zement zu vermeiden, sondern die Fugen sind mit Erde auszufüllen und am besten zu bepflanzen. Selbstverständlich muß der Stein entsprechend seiner Schichtung und Struktur gespalten sein, dann werden die Fugen nach dem Zusammensetzen auch nicht unnatürlich wirken. Zeigen sich beim Spalten schöne Kristalle, interessante Bruchflächen, deren Erhaltung uns wünschenswert erscheint, so verwende man solche Bruchstücke nicht in der Felsengruppe, sondern baue sie an einem geeigneten Architekturstück (Gartenhaussockel, Futtermauer) ein. Beim Transport ist die bemooste oder glatte Oberfläche der Steine zu schonen und dürfen keine Schrammen und Schlagstellen entstehen. Beim Bauen muß die schönste und charakteristischste Seite zur Ansicht kommen. Die durch die natürliche Verwitterung schön abgerundeten, glatten Flächen sollen aus dem Boden hervorragen. Wenn auch die Steine oft tief in den Boden eingebettet werden müssen, so wird der geschickt Bauende sie doch immer so zu legen wissen, daß ihre Größe noch genügend zur Geltung kommt.
Damit sind die wichtigsten Baugesetze für Findlinge oder einzelne abgesprengte Blöcke behandelt. Der sicherste Führer beim Bauen von Felsenanlagen bleibt indessen immer das durch viele intensive Beobachtungen und Studien geschulte Taktgefühl des Baumeisters.

Bepflanzungspläne

Eine große englische Staudenrabatte

WENN es ein Land gibt, in dem seit Jahrzehnten mit Erfolg versucht worden ist, das so schwierige Thema der Staudenrabatte zu lösen, so ist dies England. Sind nun auch die Verhältnisse, unter denen dort geschaffen wird, den unsrigen nicht gleich, so wird man durch ein aufmerksames Studium bestimmter Rabattenlösungen immer lernen. Deshalb sei heute auf einen von der auch bei uns durch ihre Schriften wohlbekannten Gartenfreundin *Miss Gertrude Jekyll* ausgeführten Plan einer großen Staudenrabatte hingewiesen. Dieser wurde im November 1924 in The Garden veröffentlicht. Miss Jekyll versucht hier eine möglichst den ganzen Sommer über blühende Rabatte zu schaffen, wobei sie allerdings nicht nur Stauden, sondern auch einige Einjahrsblumen, Dahlien und Gladiolen verwendet. Es ist aber kaum eine Pflanze darunter, die wir nicht auch bei uns haben könnten.
Die Art der Anordnung und Nebeneinandergesellung der Formen und Farben zeigt den individuellen Geschmack dieser Gartenfreundin an. Das Ganze soll nicht zu getreuer Nachahmung, sondern zur Nachschöpfung anregen. Die Rabatte ist 4,5 Meter breit. Für die einzelnen Pflanzentypen sind meist große Flächen vorgesehen. Dadurch entsteht eine wesentlich einheitlichere Wirkung, als wenn man nur kleinere Trupps jeder Sorte verwendet. Die Art, wie sie ineinander verwachsen sollen, wird erst ganz verständlich, wenn wir uns in die Pflanzenliste vertiefen. Dabei läßt aber Miss Jekyll dem persönlichen Geschmack doch insofern recht freie Hand, als sie in vielen Fällen nicht eine ganz bestimmte Sorte vorschreibt, sondern nur die Gattung oder höchstens den Farbenton. Das letzte ist aber notwendig, da ja jede solche Rabatte eine Farbensymphonie darstellen muß, deren Akkorde wechselnd und doch harmonisch sein sollen. Miss Jekyll betont, daß der Flor noch früher im Jahre beginnen kann, wenn man Goldlack, Asphodelen, frühe Tulpen und dergleichen hinzufügt. Platz dafür läßt sich ohne weiteres erübrigen. Die stärkste Wirkung tritt erst später im Sommer ein. Ferner denkt sich Miss Jekyll noch anderes hinzu. So beispielsweise hinter die Delphinien Nr. 2 eine Clematis Flammula. Wenn nun im Juli der Rittersspornflor zu Ende ist, schneidet man die Pflanzen auf ungefähr einen Meter Höhe zurück und zieht die Clematis über diese Stengel. Diese wird dann auch die Anchusa (3) und später auch die Spiraea Ulmaria (4) überwuchern und das Abgeblühte verhüllen. Ähnlich geht es bei 66 mit Lathyrus latifolius. Dieser bedeckt dann den Echinops (16), die Lupine 62 und den Digitalis 67.

Bepflanzungsplan

1 Anemone japonica, rosa
2 Delphinium
3 Anchusa italica Opal
4 Spiraea Ulmaria fl. pl.
5 Chrysanthemum maximum
6 Antirrhinum, mittelhoch, weiß
7 Myosotis dissitiflora
8 Hemerocallis, gelb
9 Weiße Dahlie
10 Thalictrum purpureum
11 Campanula lactiflora
12 Pentstemon, weiß
13 Polygonum affine
14 Malven, rosa
15 Thalictrum flavum
16 Echinops Ritro
17 Phlox, weiß
18 Oenothera Fraseri
19 Gypsophila paniculata fl. pl.
20 Gladiole Panama
21 Gaillardia
22 Iris
23 Oenothera missouriensis
24 Spiraea Aruncus
25 Lupinus, weiß
26 Gypsophila paniculata
27 Veronica amethystina
28 Buphthalmum salicifolium
29 Iberis
30 Helenium striatum
31 Antirrhinum, hoch, dunkel
32 Pentstemon, scharlach
33 Calendula officinalis, orange
34 Iris
35 Oenothera riparia
36 Rote Dahlie
37 Malven, rot und dunkelrot
38 Tritome
39 Rote Dahlie
40 Papaver orientalis
41 Monarda didyma, scharlach
42 Gladiolus brenchleyensis
43 Antirrhinum Orange King
44 Pentstemon, scharlach
45 Tropaeolum Empress of India
46 Lychnis chalcedonica
47 Phlox Coquelicot
48 Rudbeckia speciosa
49 Malven, weiß
50 Campanula macrantha alba
51 Helenium pumilum magnificum
52 Helenium cupreum
53 Geranium grandiflorum
54 Alyssum saxatile fl. pl.
55 Gelbe Dahlie
56 Artemisia lactiflora
57 Rudbeckia Golden Glow
58 Eryngium Oliverianum
59 Anthemis tinctoria
60 Coreopsis lanceolata
61 Arabis albida fl. pl.
62 Lupinus, purpurn
63 Spiraea venusta
64 Iris
65 Nepeta Mussinii
66 Lathyrus latifolius, weiß
67 Digitalis, weiß
68 After Beauty of Golwall
69 Veratrum nigrum
70 Erigeron speciosus
71 Iris pallida dalmatica
72 Geranium sibiricum
73 Aubrietia
74 Santolina

C. S.

Die Pflanze in der Wohnung

Eine neue Ampelpflanze

PLECTRANTHUS OERTENDAHLII. Diese gärtnerisch höchst beachtenswerte Erscheinung ist insofern eine Neuigkeit schwedischen Ursprungs als Dr. Thore E. Fries jun., der die neue Art beschreibende Autor, der das Genus Plectranthus in einer Monographie behandeln will, in Upsala die Entdeckung machte, daß diese sowohl in Dahlem wie in Kew teils ohne, teils unter dem irrtümlichen Namen P. saccatus Bentham kultivierte Art sich von der letzteren sowohl wie von der Art ciliatus E. Meyer deutlich unterscheidet. Dieser Plectranthus gehört zu jenen unglaublich anspruchslosen Gewächsen, denen man nicht einmal das gewöhnlich erforderliche Maß an Licht zu sichern braucht und die sich kinderleicht aus abgebrochenen Seitensprossen vermehren lassen. Das von Professor Carl Skottsberg im November aufgenommene Bild bezeugt den Reichtum an weißen Blüten mit einem Anflug von Violett. Der erste Ableger, den ich mir von einer Pflanze im vergangenen Dezember nahm, hat die Probe bestanden, daß er in diesem lichtarmen, langen Winter anwurzelte und jetzt schon einer ganzen Kolonie von Ablegern für eine große Hängeampel das Leben gegeben hat. Auch an Wärme stellt es geringe Forderungen, ein Vorzug für die Sommerkultur als halbharte Staude. *Goodwin.*

Vom Werkstoff des Gartens

Für Unterpflanzung von Gehölzen

PACHYSANDRA ist als Unterpflanzung bei Gehölzen noch recht unbekannt, wie man sie überhaupt selten zu sehen bekommt. Zu finden ist sie fast nur in den Botanischen Gärten. Das liegt einesteils daran, daß die staudenführenden Firmen diese Pflanzen in ihren Katalogen nicht anpreisen (obwohl sie es wirklich wert sind), andernteils wollen die meisten Gartenliebhaber als Unterpflanzung, selbst für die dunkelsten Teile ihrer Strauchgruppen immer und immer wieder möglichst schönblühende Sachen haben, obgleich das pflanzenphysiologisch ein Unding ist. Um leuchtende, intensive Farben hervorzubringen, braucht die Pflanze Licht. Das sehen wir schon an unserem heimischen Waldunterwuchs (Leberblümchen, Lerchensporn, Buschröschen), die alle Frühlingsblüher

sind, also ihre Blüten entwickeln, solange das Laubdach ihnen das Licht noch nicht fortnimmt. Es gibt verhältnismäßig nur wenige Pflanzen, die auch bei gedämpftem Licht zahlreiche, farbenleuchtende Blumen haben. Doch das nur nebenbei.
Von den zwei Arten Pachysandra, die es bis jetzt gibt, ist die P. terminalis aus Japan hier schon gezeigt worden (Band IV, Seite 5). Sie kann in der Blüte mit der jetzt dargestellten P. procumbens nicht wetteifern. P. terminalis wird ungefähr 15 bis 20 Centimeter hoch, hat glatte, glänzende, lederartige, grobgezähnte Blätter, die gegenständig auf ebensolchen glatten, runden, niederliegenden bis aufrechten Stengeln sitzen.
P. procumbens, aus den Bergwäldern des Alleghanies, ist dagegen im ganzen (Blätter und Stengel) behaart, matt und nicht lederartig. Bei den Blättern, die ungefähr doppelt so groß sind, tritt die Nervatur stark hervor, auch sind sie noch gröber gezähnt als bei der vorigen. Den Pachysandren fehlen die Hochblätter und was man auf dem Bilde von der Blütenähre sieht, sind nur die weißen Staubfäden mit den braunen Staubbeuteln. P. procumbens ist bei einigermaßen humosem Boden wüchsiger als terminalis, dafür wird letztere aber widerstandsfähiger gegen ihr weniger behagliche Bodenarten und Standorte sein. Beide Arten sind vollkommen winterharte und niederliegende, immergrüne Stauden. Besonders die letzte Eigenschaft macht die Pflanzen als Unterpflanzung für Gehölze wertvoll. Man kann beide Arten aber ebenso gut in schattiger bis halbschattiger Lage zur Bodenbegrünung für jede andere Stelle gebrauchen. In allen Fällen gebe man den Pflanzen einen lockeren, humosen Laubboden (gut verrottet), auf dem sie freudig entlang kriechen können, um die Bodenfläche so schnell und dicht wie möglich zu bedecken. Ist der Boden im Laufe der Jahre von Wurzeln verfilzt, dann empfiehlt es sich, im zeitigen Frühjahr gute Erde einige Centimeter hoch zwischen die Pflanzen zu streuen. Dieses gilt besonders da, wo die Pflanzen unter schon älteren Bäumen stehen. Hier muß das Aufstreuen alle Jahre geschehen. Als Unterbrechung und Zwischenpflanzung eignen sich recht gut verschiedene Polygonatum-Arten, besonders das etwas hohe, reichblühende japonicum. Für sonnige Standorte sind beide Pachysandra-Arten nicht zu verwenden. Die Vermehrung geschieht am besten durch Teilung oder Stecklinge. In deutschen Katalogen findet man immer nur *P. terminalis* angeboten, während *P. procumbens*, soviel ich sehe, nur von H. Correvon, Chône-Bourg bei Genf, und englischen Firmen geführt wird. *C. R. Jelitto*

Aus der Werkstatt der Pflanzenzüchter

In Ronsdorf

EIN Besuch bei Georg Arends, dem Altmeister deutscher Staudenzüchter, ist immer ein Erlebnis. Zumal, wenn man nach langer Pause die Kulturen wiedersieht und feststellen kann, daß die Nachkriegszeit so gut wie ganz überwunden ist. Ich hatte in Dresden die Azaleen-Kreuzungen gesehen, die infolge ihrer Härte eine große Zukunft für Gärten und Parks haben. In Ronsdorf bekam ich zuerst den rechten Eindruck. Der Züchter selbst wird noch darüber berichten, und Hunderte werden sie allerorten in Mitteleuropa in den nächsten Jahren erproben. Ihr Blütenreichtum entschädigt für die jetzt noch etwas fehlende Farbenintensität, aber auch die rote Farbe wird des Züchters geschickte Hand noch erreichen. Stehen wir hier doch am Anfang von wichtigen Versuchen. Die japanische Kurume-Azaleen sind nicht ohne weiteres für uns verwertbar. Es steckt aber sehr viel in ihnen, was wir uns nutzbar machen müssen. Arends machte dabei einen erfolgversprechenden Anfang.
In unermüdlicher Schaffenskraft weist er auch in anderer Hinsicht uns neue Wege. Seine Primula obconica sind allbekannt. Nirgends findet man dies Farbenspiel wieder. Doch das für uns Wichtigste liegt im Bereiche der winterharten Stauden. Als ich in Ronsdorf war, blühten noch die Aubrietien. Unter diesen stehen an der Spitze die verbesserte Lavendel, Lloyd Edwards, die Dr. Mules übertrifft, Purpurteppich, die gute üppige W. Marshall, die schöne große rosa Moerheimi und rosea splendens. Unter den niedrigen herrscht tauricola. Auch die kleinblumige graeca superba ist schön. A. croatica wächst schwach, ist aber für niedrige Trockenmauern unentbehrlich. Überhaupt finde ich immer mehr, daß wir für solche Stellen recht niedrige, ganz flachpolsterige Steinstauden brauchen, da viele der Aubrietien, Alyssum, Helianthemum und anderer Gattungen sehr bald zu üppig werden und die Mauern dann völlig verschwinden lassen. Wir müssen beim Züchten noch viel mehr als bisher die Wünsche der Gartengestalter beachten. Diese ihrerseits müssen enge Fühlung nehmen mit den Staudenzüchtern und den Baumschulleitungen. Nur auf diese Weise kann ein für die Gartengestaltung erfreuliches und notwendiges Handinhand-Arbeiten sich ergeben. Solche Betrachtungen drängen sich einem ganz unwillkürlich auf, wenn man an einer Zuchtstätte wie Ronsdorf, weilt, zumal wenn man gerade von eifrigen Gartenstudien in Köln kommt. Dort entbehrte man vieles, von dessen Möglichkeit und Notwendigkeit einen Ronsdorf überzeugt.
Hier gibt es so unendlich viel zu sehen. Bald sind es Saxifragen-Züchtungen, in denen neue Töne der Farbenskala uns entgegenleuchten, wie beispielsweise Saxifraga decipiens lutescens. Bald sind es Polster von Phlox Douglasi-Hybriden, die auch ohne Blüten durch ihre Belaubung so schön wirken. Weiße Phlox setacea sind vielversprechend. Späte Primeln gingen aus Kreuzungen der Primula denticulata mit auriculata hervor. Viola cornuta Hansa oder Perle von Vierlanden leuchtet uns tiefblauviolett entgegen. Die Cytisus praecox und albus und ihre Mittelformen geben eine lange prächtige Blütenfolge. Im Alpinum ist gleicherweise manche Überraschung bereit. Seit ich es vor dreizehn Jahren zuletzt sah, hat sich vieles prächtig entwickelt und zeigt nun seine vollen Reize.
Ronsdorf ist noch immer die Stätte intensivster deutscher Staudenzucht. Noch viele Aufgaben hat sich Arends gestellt und wird sie, wie wir hoffen dürfen, lösen können. Sein Vorbild sollte jeden ernsten Züchter aneifern. Die letzten Jahrzehnte haben dem Staudenreiche viel gebracht, es muß aber mehr System in solche Bestrebungen kommen. Es fehlen uns noch rechte Versuchsgärten, um die Spreu vom Weizen zu sondern und das Wertvolle schnell der Allgemeinheit zuzuführen. Wir schleppen noch zuviel Ballast in unseren Kulturen mit. Jeder Züchter und Kultivateur ist sein eigener Richter. So zersplittern wir uns, statt daß Erzeuger und Verwerter Hand in Hand arbeiten. *C. S.*

Anbau von Primelsamen

DIE Dauer der Keimfähigkeit ist für alle Pflanzensamen eine begrenzte. Bei manchen Samen erstreckt sich diese Keimfähigkeit über Jahre, bei anderen erlischt sie schon nach einigen Wochen vollständig oder mindert sich wenigstens sehr rasch. Diese Tatsache spielt auch im gesamten gärtnerischen Samenbau eine äußerst wichtige Rolle. Es wäre wünschenswert, diese Zeitdauer auch für möglichst viele Gehölze und Stauden experimentell festzustellen, wie es für Gemüsesamen schon seit langem ziemlich vollständig geschehen ist. Freilich hängt diese Keimfähigkeitsdauer selbst bei den Samen der gleichen Pflanze von vielerlei Umständen ab, die sie oft sehr verändern können. Es beeinflußt diese Zeitdauer sehr stark, ob die Samen völlig ausgereift oder vor der Reife gesammelt wurden, ob die als Vorbeugung gegen Schimmelpilz bezw. Fäulnisbefall nötige Austrocknung im Schatten vorgenommen wurde oder ob die Samen in der direkten Sonnenhitze ausgedörrt wurden, wie es des schnellen Trockenwerdens wegen oft geschieht. Letztgenanntes Verfahren ist für die Samen nicht vorteilhaft, weil die Keimfähigkeit an einen gewissen (allerdings sehr niedrigen) Prozentsatz des Wassergehaltes gebunden ist, weshalb auch die Aufbewahrung nicht zu warm und trocken geschehen soll. Vorteilhaft gegen zu starkes Austrocknen der Samen ist ferner das Aufbewahren in den Hülsen oder Kapseln bis zum Anbau, bei Samen mit fleischigen Hüllen erreicht man dies durch Stratifizieren in feuchten Sand.
Zu den Stauden, deren Samen am besten bald nach der Ernte angebaut werden, gehören unter anderen die Primeln. Sobald die Kapseln beginnen aufzuspringen, werden sie gesammelt, acht bis vierzehn Tage an der frischen, trocknen Luft im Schatten nachgereift, bis die Samen ausfallen. Diese werden dann gleich angebaut und bis zur Keimung im Dunkeln feucht gehalten. Samen von Primula rosea grandiflora, P. denticulata, P. cashmeriana Rubin, die Anfang Juni vorigen Jahres gesammelt und am 17. Juni angebaut wurden, keimten offen unter Sphagnumbedeckung liegend schon nach sechs Tagen mit beinahe hundertprozentiger Keimfähigkeit im Kalthaus. Anfang Juli verschult und in einem Mistbeetkasten, anfangs unter Glas aufgestellt, dann ohne Bedeckung aber halbschattig und immer ziemlich feucht gehalten, waren die Pflänzchen bereits Anfang August eintopfungsfähig und wachsen bei halbwegs günstiger Witterung bis zum Herbst zu verkaufsfähigen Pflanzen heran, die im Mistbeetkasten geschult überwintert schon im nächsten Frühjahr blühbare Pflanzen geben, dodaß auf diese Weise, abgesehen von

dem günstigen Prozentsatz der gekeimten Pflänzchen, ein ganzes Jahr gewonnen ist. Für die übrigen Primeln gilt ähnliches. Primula luteola, Mitte Juli gesammelt, Anfang August angebaut, keimte in der ersten Augustwoche ebenfalls schon nach knapp einer Woche. Es folgten nun im Anbau P. pulverulenta, P. japonica und eine Reihe anderer, meist feuchte Standorte liebender Primeln, wie secundiflora, sikkimensis, involucrata. Den Abschluß bildeten die erst Ende August reifenden P. Bulleyana, P. Beesiana, P. Bullesiana.

Für die alpinen Primeln, deren Samen meist sehr lange liegen, bis sie keimen, ist zu beachten, daß manche hochalpine Formen vorteilhaft vor den ersten Winterfrösten angebaut und so aufgestellt werden, daß sie der Kälte und dem Schnee zugänglich sind, weil einige von ihnen viel rascher oder überhaupt nur dann gut keimen, wenn sie eine Zeitlang durchgefroren sind oder unter einer Schneedecke gelegen haben.

W. Kriechbaum

Die Rankrose Marietta Silva Tarouca.

IM Herbstkataloge 1925 führt Peter Lambert-Trier bei den Rankrosenneuheiten an erster Stelle die Rose Marietta Silva Tarouca, eine Züchtung von Inspektor Zeman aus den Sorten Kolibri, die zu den Polyantha gehört, deren Abstammung wir aber nicht sicher stellen konnten, und der bekannteren Flower of Fairfield, als deren Züchter Ludorf genannt wird und die 1908 durch H. Schultheis in Steinfurth in den Handel kam. Sie geht auch als öfter blühende Crimson Rambler und hat dieses Remontieren auf die neue Sorte vererbt. Während bei Edelrosen vor allem auf Formenschönheit der Knospe und Blüte, auf Farbenpracht, Stärke und Feinheit des Duftes Gewicht gelegt wird, muß man an eine Rankrose andere Anforderungen stellen, die mit ihrer Verwendungsart im Zusammenhange stehen. Schöne und dabei gesunde, gegen die bekannten Rosenkrankheiten widerstandfähige Belaubung, Wüchsigkeit, Winterhärte, Blütenreichtum und lange Blütendauer, womöglich wiederholtes Blühen, sollen eine gute Rankrose auszeichnen. Diesen Ansprüchen wird Marietta Silva Tarouca gerecht. Sie erreicht in einigen Jahren eine Höhe von fünf bis sechs Metern, die rotbraunen Blattstiele stehen in hübschem Gegensatz zu der glänzend grünen Belaubung, sodaß die Rose selbst im nichtblühenden Zustande auffällt. Zur Blütezeit aber schmückt sie sich mit einer reichen Fülle von karminrosa Blumen in herrlichen Doldenbüscheln. Die Farbe entspricht ziemlich genau dem leuchtenden Rosa des Phlox Württembergia. Die Einzelblüten sind halbgefüllt, und fünf Centimeter breit. Der Wert der Rose, die ihren Namen nach der Gemahlin des Grafen Ernst Silva Tarouca führt, wird durch ihre Winterhärte erhöht.

W. K.

JOHANNES KÖSTER / BLÜTENNOTIZEN

Iris germanica

IRIS sind in den letzten Jahren etwas ins Hintertreffen gekommen, Pyrethrum, Phlox und Delphinium drangen mit so starken Fanfarentönen im Wettbewerb vor, daß die stilleren Iris etwas übersehen wurden. Sie gehören aber zum wichtigsten Bestande unserer Gärten, allein schon wegen ihrer zähen, unzerstörbaren Lebenskraft.

Seit ihrem Eintritt in die Gärten haben die Iris glänzende Farben besonders in tiefem Violett gezeigt. Geschickte Vereinigungskunst kann die Farbentöne zu hohen Akkorden vereinen und durch artfremde Farben heben, es sei nur an die Pracht der alten und neuesten Darwin- und Landtulpen, an den orientalischen Riesenmohn und vieles andere erinnert. Unendliche Möglichkeiten liegen auch in der gleichzeitigen Verwendung von Flieder, Goldregen, Azaleen und Rhododendron und vielen anderen ungenutzten Reichtümern.

Es gibt so unendlich viele Sorten, und trotzdem erwarten wir noch viel von den Iriszüchtern. Alexander Steffen hat hier in der Gartenschönheit einmal die akademischen Standardforderungen an die Züchterarbeit aufgestellt. Wir Gartenpflanzer haben dazu unsere besonderen Wünsche. Der Zug unserer Zeit läßt die Versenkung in die Einzelschönheit der schlangenhautfarbenen Iris mit Variegata-Einschlag nicht zu. Wir wollen im Garten Farbe, reinen Farbenschmelz, den wir auch einmal breit verstreichen können. Mit den tiefblauvioletten Sorten der Iris sind wir seit langen Jahren vollauf zufrieden, wir würden aber Steigerungen und namentlich die Übertragung dieser Farbe auf die späten Sorten begrüßen.

Mit großer Freude haben wir uns die neuen Töne der violettroten, rotvioletten und sogar der lilarosa Farben schenken lassen. Im tieferem Blau, im Blau mit Weiß ist einiges Gute geleistet, weiße Sorten haben wir wenige.

Uns fehlen aber ganz besonders freiblühende, klargelbe und robuste zartblaue Sorten mit mehr substanziellen Blüten, die nicht so leicht verwehen und verbrennen und die ihre Blütenstiele in überquellender Fülle in jedem Jahre hervorbringen.

	1922				1923				1924				1925			
	Erblüht	Vollblüte	Noch ansehnlich bis	Verblüht	Erblüht	Vollblüte	Noch ansehnlich bis	Verblüht	Erblüht	Vollblüte	Noch ansehnlich bis	Verblüht	Erblüht	Vollblüte	Noch ansehnlich bis	Verblüht
Alan Gray	24.5.	3.6.- 6.6.	13.6.	20.6.	25.5.	4.6.- 9.6.	13.6.	25.6.	28.5.	2.6.-11.6.	14.6.	18.6.	18.5.	20.5.-27.5.	—	30.5.
aurea	7.6.	12.6.-16.6.	27.6.	1.7.	9.6.	16.6.-27.6.	2.7.	7.7.	9.6.	14.6.-21.6.	23.6.	28.6.	27.5.	1.6.-12.6.	—	17.6.
atropurpurea	25.5.	29.5.- 6.6.	9.6.	13.6.	28.5.	11.6.- 9.6.	16.6.	2.7.	29.5.	2.6.- 9.6.	14.6.	18.6.	16.5.	18.5.-25.5.	—	2.6.
Caprice (lila)	25.5.	29.5.- 6.6.	9.6.	13.6.	23.5.	2.6.- 8.6.	13.6.	27.6.	29.5.	2.6.- 9.6.	11.6.	14.6.	15.5.	18.5.-25.5.	—	27.5.
Céleste	1.6.	7.6.-12.6.	19.6.	20.6.	9.6.	13.6.-27.6.	28.6.	2.7.	4.6.	7.6.-11.6.	14.6.	16.6.	20.5.	23.5.- 2.6.	—	8.6.
Dorothy		———				———			11.6.	14.6.-21.6.	25.6.	28.6.	27.5.	30.5.-10.6.	—	13.6.
Eckesachs	31.5.	3.6.-13.6.	20.6.	24.6.	6.6.	11.6.-23.6.	27.6.	2.7.	4.6.	7.6.-14.6.	16.6.	21.6.	23.5.	25.5.- 2.6.	—	6.6.
flavescens	31.5.	3.6.-14.6.	21.6.	24.6.	9.6.	16.6.-30.6.	2.6.	7.7.	7.6.	11.6.-16.6.	18.6.	23.6.	23.5.	27.5.- 8.6.	—	17.6.
florentina alba	21.5.	25.5.- 3.6.	9.6.	13.6.	26.5.	4.6.-11.6.	16.6.	2.7.	29.5.	2.6.-11.6.	14.6.	21.6.	13.5.	18.5.-27.5.	—	3.6.
Fro	3.6.	6.6.-14.6.	20.6.	27.6.	9.6.	13.6.-27.6.	2.7.	7.7.	9.6.	11.6.-16.6.	18.6.	25.6.	25.5.	28.5.- 8.6.	—	13.6.
Fürstin Lonyay		———			20.6.	25.6.- 2.7.	5.7.	9.7.	9.6.	11.6. —	—	—	25.5.	28.5.-12.6.	—	22.6.
Maori King	6.6.	11.6.-16.6.	20.6.	24.6.	18.6.	23.6.- 2.7.	5.7.	9.7.	7.6.	11.6.-21.6.	23.6.	25.6.	29.5.	2.6.-12.6.	—	17.6.
Mithras	6.6.	9.6.-20.6.	24.6.	27.6.	16.6.	20.6.-30.6.	7.7.	11.7.	11.6.	14.6.-25.6.	28.6.	30.6.	27.5.	30.5.-13.6.	—	20.6.
Mrs. Darwin		———			10.6.	23.6.- 5.7.	9.7.	11.7.	9.6.	11.6.-18.6.	21.6.	21.6.	25.5.	30.5.-10.6.	—	17.6.
Mrs. Reuthe	6.6.	7.6.-14.6.	24.6.	27.6.	11.6.	16.6.-23.6.	7.7.	11.7.	11.6.	14.6.-18.6.	25.6.	2.7.	23.5.	27.5.-10.6.	—	15.6.
Mrs. Neubronner	3.6.	7.6.-14.6.	24.6.	27.6.	9.6.	16.6.-27.6.	2.7.	7.7.	9.6.	12.6.-18.6.	21.6.	25.6.	25.5.	28.5.- 8.6.	—	13.6.
Pollux		———			16.6.	20.6.- 2.7.	5.7.	7.7.	9.6.	14.6.-18.6.	25.6.	28.6.	25.5.	28.5.-10.6.	—	13.6.
Rheingauperle		———			20.6.	25.6.- 5.7.	9.7.	14.7.	11.6.	14.6.-21.6.	25.6.	30.6.	25.5.	28.5.- 8.6.	—	15.6.
Rheinnixe	6.6.	9.6.-20.6.	24.6.	1.7.	16.6.	23.6.- 2.7.	7.7.	14.7.	11.6.	14.6.-21.6.	25.6.	2.7.	27.5.	1.6.-12.6.	—	17.6.
Rheintraube	6.6.	9.6.-24.6.	30.6.	30.6.	20.6.	25.6.- 5.7.	9.7.	17.7.	11.6.	14.6.-21.6.	25.6.	5.7.	27.5.	1.6.-13.6.	—	17.6.
Riese von Könnern	31.5.	9.6.-14.6.	24.6.	30.6.	9.6.	18.6.-30.6.	5.7.	9.7.	4.6.	7.6.-18.6.	21.6.	25.6.	22.5.	25.5.-10.6.	—	15.6.
interregna Frithjof	24.5.	26.5.- 6.6.	8.6.	9.6.	26.5.	30.5.- 4.6.	13.6.	25.6.	28.5.	30.5.- 7.6.	14.6.	21.6.	14.5.	18.5.-27.5.	—	2.6.
„ Gerda	23.5.	26.5.- 3.6.	6.6.	9.6.	30.5.	6.6.-11.6.	18.6.	27.6.	31.5.	2.6.- 7.6.	9.6.	21.6.	16.5.	18.5.-26.5.	—	2.6.
„ Halfdan	22.5.	25.5.- 3.6.	4.6.	9.6.	21.5.	26.5.- 6.6.	11.6.	20.6.	29.5.	2.6.- 9.6.	11.6.	14.6.	18.5.	20.5.-26.5.	—	30.5.
„ Helge	23.5.	25.5.- 3.6.	6.6.	6.6.	23.5.	28.5.- 9.6.	14.6.	16.6.	28.5.	31.5.- 7.6.	9.6.	11.6.	15.6.	18.5.-25.5.	—	27.5.
„ Ingeborg	24.5.	26.5.- 1.6.	3.6.	6.6.	28.5.	6.6.-11.6.	18.6.	27.6.	2.6.	7.6.- 9.6.	11.6.	14.6.	15.5.	18.5.-25.5.	—	30.5.
„ Walhalla		———			28.5.	2.6.- 8.6.	11.6.	20.6.	28.5.	31.5.- 7.6.	11.6.	14.6.	15.5.	18.5.-25.5.	—	30.5.

Gartenrundschau

NEUES AUS ALLER WELT

Dresden im Zeichen der Rose

DIESE Überschrift stimmt nur bedingt. Programmgemäß sollte die Ausstellung in allen ihren Teilen vom 10. bis 13. Juli von Rosenfarben und Duft durchwogt sein. Der Himmel jedoch hatte es anders beschlossen. Schon etwa zwei Wochen vorher hatten im Riesengroßen Rosengarten und den vielen anderen Sondergärten die hochstämmigen Rosen einen Vollflor entfaltet, der überraschend gewesen sein soll. Die niedrigen Rosen hatte man durch Pincieren so zu lenken versucht, daß sie zur programmäßigen Zeit sich in ihrer ganzen Schöne einstellen sollten. Doch die Witterung war derart, daß dieser Flor erst eine Woche nach der Schau eintreten konnte. Da haben denn auch die niedrigen Rosen des Riesengroßen Rosengartens über Erwarten reich geblüht. Während der Rosenschau aber mußte sich das rosendurstige Auge der glücklicherweise überaus zahlreichen Besucher im Freien mit ganz wenigen Einzelheiten begnügen, mit einem flüchtigen Aufleuchten hier und da. Dafür drängten sich manchmal Rosen und Delphinien in einigen Sondergärten prächtig farbig zusammen. Doch auch der Garten zum blauen Rittersporn war vorüber. Er hat wohl überhaupt nicht das gezeigt, was er bei günstigerem Witterungsverlaufe hätte zeigen können und sollen. Hier waren auch auf dem grünen Mittelparterre ein paar zu kümmerliche Eckbeete mit Celosien, die garnicht in den Rahmen dieser sonst recht eigenartigen Anlage hineinpaßten.

Auch der erste Flor der Einjahrsblumen war der Ungunst der nassen Witterung zum Opfer gefallen. Man muß aber den Opfermut der Aussteller anerkennen, die sofort eine für den Spätsommer und Herbst vielversprechende Neupflanzung durchführten. Um diese Zeit muß die Ausstellung in den Dahlien und dem, was sonst noch blüht, bei günstiger Witterung nochmals voll zeigen, was sie bieten kann. Möge ihr dazu der jetzt noch immer wankelmütige Himmel gnädig sein. Sie hat es verdient, daß sie nochmals in voller Pracht aufstrahlen darf, wie im Frühjahr. Denn die große Parterre-Anlage kann auch erst in der lezten Bepflanzung von neuem wirkungsvoll werden. Zur Zeit der Rosenschau war nur das kleine Parterre mit Benarys prächtigen Semperflorens-Begonien schön, wenn auch der Farbenzusammenklang nicht recht stimmen wollte.

Lehrreich war der Besuch der Ausstellung in jeder Weise. Die Beurteilung vieler Rosensorten wurde allerdings durch den abnormen Witterungsverlauf erschwert. Im großen Ganzen hatten sich alle Rosen als Pflanzen überaus gut entwickelt. Sorten wie Red Star waren leuchtende Wunder im flammenden Rot. Der neue Orléans-Sport Th. Simmgen trat unter den üppigen Polyanthen stark hervor. Es würde zu weit führen, all die Sorten zu nennen, die bei einer kritischen Betrachtung sich auszeichneten. Gar manche sonst sehr geschätzte Sorte versagte hinwiederum in der Färbung des Wetters halber, so daß man manchmal leicht zu falschen Schlüssen kommen konnte. Dies galt namentlich für die Pernetiana-Sorten. Niemand konnte beispielsweise anfangs Juli Wilhelm Kordes wieder erkennen. Auch Sorten wie Ophelia, Golden Ophelia und ähnliche waren damals unvollkommen gefärbt.

Es war staunenswert, daß es in der Hallenschau gelungen war, noch so viel blühendes Material von Rosen zusammen zu bekommen. Leider waren nur wenige Sorten dabei, die ganz normal entwickelte und gefärbte Blumen zeigten, doch das Gesamtbild wirkte recht eindrucksvoll. Indes sind Rosenausstellungen vielleicht das Schwerste, was man sich denken kann. Man muß dabei Rankrosen in überquellender Fülle verwenden können und darf nicht alles in zu steife ornamentale Flächen und Formen bannen. Die rechte Lösung hierfür hatte man auch in Dresden nicht gefunden, so wenig wie bei der großen Rosenschau zu Hamburg. Bedauerlich war, daß die Aufgabe, die Rose im Heim in zeigen, die sich die Leitung gestellt hatte, nicht einmal in der rechten Weise zu lösen versucht worden war. Was man bot, war eine sehr mäßige Möbelschau. In die sogenannten Räume hatte man einige banale Rosensträuße hineingestellt. Das Ganze war nur dürftig beleuchtet. Statt dessen hätte man nur Motive aus Wohnräumen geben sollen. Ecken, in denen die Rosen, in liebevoller Weise angeordnet und in die rechten Gefäße gebannt, vorgeherrscht hätten. So fehlte den Raumnischen jede Rosenfreudigkeit. Und wie drängten sich doch die Besucher durch die Hallen! Wie dürstete alles nach Blumenfreude. Es gibt heute kaum eine Ausstellung, für die das große Publikum dankbarer ist als eine solche von Blumen und Pflanzen. Jeder schöne Tag führt Tausende und Abertausende in die Gartenschau. Wenn die letzten Monate nur halbwegs durch das Wetter begünstigt werden, so wird die Leitung nicht über einen finanziellen Mißerfolg zu klagen haben. Das kann man Dresden von Herzen wünschen, auch wenn man nicht mit all dem einverstanden ist, was getan wurde.

Die Ausstellung bedeutet eine wichtige Etappe in der Entwicklung des gärtnerischen Ausstellungswesens in Deutschland. Man wird wertvolle Lehren daraus ziehen können. Sie recht einzuschätzen, ist erst nach der Herbstschau möglich, die hoffentlich einen vollen farbigen Ausklang bietet. *C. S.*

Rosa Hardii

DIESE ebenso seltene, wie interessante Rose wurde nach Gardeners' Chronicle (no. 2058) auf der letzten Chelsea Show gezeigt. Sie stellt einen bereits 1836 im »Jardin de Luxembourg« in Paris durch den damaligen Garteninspektor Hardy erzogenen Bastard zwischen der R. berberifolia oder R. simplicifolia, wie man sie auch ihrer einfachen Blätter halber nennt, und der ostindischen R. clinophylla dar. Diese letzte ist für uns kaum mehr als eine Glashausrose, der Bastard aber dürfte in recht warmen Lagen im Weinklima auch im Freien versuchswert sein. Die Blüten sind lebhaft gelb mit einem karminfarbenen Grundfleck und etwa fünf Centimeter breit. Die Hybride bildet niedrige aufrechte Büsche. R. berberifolia ist bekanntlich zwerghaft. Sie ist ebenfalls selten, aber hier und da hat sie sich in Felsgärten gut eingebürgert.

Schneckenbekämpfung

IN The Garden berichtet John H. Kittow über eine erfolgreiche Art der Schneckenbekämpfung oder besser des Schutzes heikler Pflanzen gegen Schneckenfraß. Sind doch manche Arten, wie etwa Campanula Zoysii oder C. alpestris (C. Allionii), Leckerbissen für Schnecken, denen diese meilenweit nachgehen. Die Schnecken sind nun sehr empfindlich gegen irgendwelche elektrischen Ausstrahlungen. Wenn man solche Pflanzen mit zwei konzentrischen Metallstreifen, den einen aus Kupfer, den andern aus Zink, umgibt, so wird ihnen keine Schnecke nahe kommen.

Neue Bücher

ILLUSTRIERTES GARTENBAU-LEXIKON. Seit Jahrzehnten vermißte man eine Neuauflage des bei Paul Parey, Berlin, verlegten, von *Th. Rümpler* begründeten und zuletzt 1902 von *L. Wittmack* in 3. Auflage herausgegebenen *Illustrierten Gartenbau-Lexikons.* Jetzt ist von der neuen 4. Auflage Band I erschienen, der A bis K umfaßt. Es ist unstreitig sehr zu begrüßen, daß ein solches Nachschlagewerk in neuer Fassung vorliegt. Die Herausgeber sind *Paul Graebner* und *Willy Lange.* Ihnen gesellen sich eine Anzahl von Mitarbeitern zu, unter denen außer C. Encke (öffentliche und fürstliche Gärten) und R. Otto (Bodenkunde und Düngerlehre) keiner bei früheren Auflagen beteiligt war. Ehe man kritisch an ein solches Werk herantritt, muß man sich fragen: was kann man von einem solchen Buche, das ernst und objektiv über den heutigen Stand des Gartenbaues, der Gartengestaltung, der gärtnerischen Naturwissenschaften und was sonst mit dem Gartenbau verknüpft ist, berichten soll, verlangen?

Vor allem eine zweckmäßige Umgrenzung des Stoffes. Da fällt sofort auf, daß von Graebner, der die Botanik bearbeitete, auch die lateinischen Art- and Varietätsnamen der beschreibenden Botanik, wie etwa abbreviatus, abietinus, abruptus, mit kurzer deutscher Übersetzung einbezogen sind, über die es doch einige billige Wörterbücher gibt und deren Einfügung in ein solches Lexikon meiner Meinung nach lediglich unerwünschten Ballast bedeutet. Ihre Weglassung hätte einige Bogen für wertvolle Ausführungen freigemacht. So vermisse ich zum Beispiel Stichworte wie Baumschule oder Betriebslehre mit den nötigen eingehenden Erläuterungen ganz und gar.

Eine zweite wichtige Voraussetzung ist eine neutrale, sachliche Darstellungsart. Der Leser sucht doch nicht subjektive Anschauungen, sondern von einem den Stoff beherrschenden Fachmanne gegebene objektive Darstellungen. In diesem Punkte hat der zweite Herausgeber, der das Thema Gartenkunst bearbeitete, versagt. Mögen seine Ausführungen im einzelnen auch noch so interessant sein, es sind in den meisten Fällen

rein subjektive Anschauungen, die in recht einseitiger Weise das Gebiet behandeln. Seine Darstellungsart ist auch recht breit. Man stößt auf Schlagworte, wie »Bildzauber«, »Brautschmuck« und andere, die überflüssig dünken, wenn man dagegen sieht, wie unzulänglich etwa das Thema Friedhöfe behandelt ist. Auch die Bildauswahl in puncto Gartenkunst ist einseitig und unkritisch. Überhaupt muß der Bildschmuck sehr bemängelt werden. Man begreift nicht, wie man heute noch mit so vielen ganz belanglosen alten Katalogbildern ein solches Werk schmücken kann, dessen Ausstattung doch sonst sorgfältig genannt werden darf. Es wird Zeit, daß diese Bildchen verschwinden.

Eine dritte Voraussetzung bei einem Gartenbau-Lexikon dürfte doch sein, daß bei den darin besprochenen Pflanzen besondere Rücksicht auf deren Wert für den Gartenbau genommen wird. Da hat nun im ersten Bande der botanische Herausgeber ganz versagt. Er ist rein botanisch eingestellt und läßt jedes Eingehen auf die neuen wichtigen Zierpflanzen vermissen. Man hätte durch Weglassung der Autorabkürzungen und vieler Synonyme viel Raum gewinnen können für die Erwähnung wichtiger neuer Kulturarten und Formen. Auch eine Hervorhebung des gärtnerisch Bedeutsamen ist dringend nötig. So fehlt beispielsweise bei Buddleia die Hauptkulturart B. Davidii (B. variabilis). Unter Dahlia, die doch heute zu den wichtigsten Gartenpflanzen zählt, ist die ganz veraltete Darstellung beibehalten worden. Von den neuen Formen, überhaupt von der Entwicklung dieses Blumentyps, erfährt der Leser nicht das Geringste. Die Gattung Enkianthus kommt schlecht weg; man könnte glauben, daß Verfasser keine bei uns harte Art kennt. Bei Ginkgo fehlt die Kennzeichnung der systematischen Stellung. Bei den Stauden ist es nicht besser. Man lese nur mal, was über Aubrietia steht. Auch Begonia ist mehr als unzulänglich bearbeitet vom Standpunkte des Gärtners. So findet man bei fast allen Gattungen das hier Wichtige geradezu verschwiegen. Dagegen ist der Abschnitt Brunnenkresse wiederum mehr als ausführlich.

Wenn man schon Literatur zitiert, was sehr erwünscht ist, so soll man auch hier nicht einseitig sein. Zur Nadelholzliteratur unter Abies dürfte doch wohl Silva Tarouca-Schneider, Unsere Freiland-Nadelhölzer, gehören, und das große, wenn auch unvollendete Werk von Pardé, wie auch einige wichtige englische sollten genannt werden.

Von großem Wert sind unstreitig sorgfältig bearbeitete Personalnotizen. Hier ist die Auswahl, wie gern zugegeben sei, nicht leicht. Da muß auch gut abgewogen werden, damit nicht unbedeutende Personen lange und sehr verdiente Männer kurze Notizen erhalten oder weggelassen werden. Vor allem müssen veraltete und belanglose Angaben ausgemerzt und die Geburts- und Todesjahre korrekt gegeben werden. Einige Beispiele mögen zeigen, was ich sagen will. Otto Hans Beyrodts Bedeutung hätte sich mit halb so viel Worten charakterisieren lassen. Johannes Böttner ist leider schon lange tot und hätte denn doch eine bessere Würdigung verdient. Dagegen erfreut sich Karl Friedrich Bouché noch recht guten Wohlseins. Es ist mehr als Nachlässigkeit hier zu sagen, daß er in Dresden gestorben ist. Der Amerikaner Burbank dagegen ist tot. Der Forschungsreisende Dinter, dem wir so viele wertvolle Sachen aus Südafrika verdanken, hätte eher eine Erwähnung verdient als Max Fleischer, da Moose mit Gartenbau doch nichts zu tun haben. Die Angaben über die bekannte Gärtnerfamilie Haage in Erfurt hätten auch neu durchgesehen werden sollen. Wenn man A. Janson eine so lange Würdigung widmet, hätte Karl Foerster nicht vergessen werden dürfen. Auch Alwin Bergers ist nicht gedacht worden. Noch willkürlicher als die Deutschen sind die Ausländer behandelt. Wann wurde Carl Hansen geboren? Der Irismonograph Dykes fehlt beispielsweise, er war dem Gartenbau der Welt sicherlich wichtiger als A. F. Hardy oder C. Gérard. George Forrest ist nicht erwähnt. Diese Beispiele ließen sich sehr vermehren.

Die Ungleichmäßigkeit in der Behandlung wichtiger Themen ist groß. Der Begriff »Alpinum« fehlt. Über Bulgarien gibt es einen riesigen Artikel, während von Frankreich nur die Gartenkunst gewürdigt wird und auch der englische Garten*bau*, der führende der Welt, nicht besprochen wird. Das Stichwort »Frühjahrsschnitt« ist kürzer behandelt als »Frühlingssuppen«, ein merkwürdiger Gartenbaubegriff. »Geräte« oder »Gartengeräte« gibt es nicht. Was unter Harke (Rechen) gesagt wird, ist ganz unzulänglich. Über Hyacinthen ist verhältnismäßig viel geschrieben. Dagegen hätten die Gewächshäuser und Frühbeete (das Stichwort fehlt) viel besser behandelt werden sollen.

Es bleibt zu hoffen, daß im II. Bande manche der hier geäußerten Mängel vermieden werden können. Am vorbildlichsten sind die Darstellungen von Encke, Kache und Höftermann, soweit man sich nach dem ersten Bande ein sicheres Urteil bilden kann. *C. S.*

GÄRTNERISCHE LEHRHEFTE. In dieser bei Paul Parey, Berlin, erscheinenden Sammlung, liegen wieder zwei neue Hefte vor. Heft 20, »Formobstbau auf neuzeitlicher Grundlage« von *Otto Illing*, ist recht ansprechend geschrieben. Der Verfasser sagt einleitend, daß sein Büchlein den deutschen Gartenbau vor den Auswüchsen der Formobstkünstelei bewahren und die Formobstzucht in gesunde Bahnen lenken soll. Das ist sehr zu begrüßen. Das Buch wendet sich mit Recht auch an den Gartengestalter. Wünschenswert wäre es gewesen, wenn statt all der schematischen Idealzeichnungen ein paar gute Photographien blühender und tragender, richtig erzogener Formobstbäume eingefügt wären. Das würde den Wert des Buches sicherlich in jeder Weise erhöhen. — Das 21. Heft behandelt »Die Pflege des Gartens«. *Carl Rimann* will darin, wie es im Untertitel heißt, eine Anleitung über die richtigen Arbeiten und Leistungen geben, die nötig sind, um einen Park und Garten dauernd in gutem Zustande zu erhalten. Dies Thema auf knappen fünfzig Seiten zu erschöpfen, ist natürlich unmöglich. Das Wort Park könnte ruhig aus dem Titel gestrichen werden. *C. S.*

Zeitschriften

BELGIEN

No. 503 und 505 von *La Tribune Horticole* enthalten eine Anzahl Kakteenbilder auf zwei Tafeln. In no. 504 wird das Thema Rosengarten behandelt. Auch in no. 506 befinden sich Aufnahmen von Kakteen und Mesembryanthemen.

ENGLAND

Die Juli- und August-Nummer von *The Orchid Review* ist wieder reich an wichtigen Notizen. Broadways Ausführungen über Trinidad Orchids werden fortgesetzt. Ein schönes Stück von Dendrobium macrophyllum var. moluccense wird im Bilde gezeigt. Die Mai-Ausstellung der Amerikanischen Orchideen-Gesellschaft wird besprochen. Eine blühende Pflanze von Cymbidium Ceres zeigt 12 Ähren und 200 Blüten. Auch Oncoidium Papilio und Kramerianum werden geschildert. — *The Gardeners' Chronicle* bringt in no. 2062 ein Farbenbild einer Varietat von Clivia miniata. N. E. Brown setzt seine Studien über die Gattung Mesembryanthemum in dieser und den folgenden Nummern fort. Grove bespricht neue Primeln aus Tibet und ein Bild zeigt Meconopsis quintuplinervia. Durch diese und die nächste Nummer zieht sich ein wichtiger Aufsatz über Viola-Arten von E. E. Todd. In no. 2063 setzt E. Friend seine Artikelreihe über klassische und legendäre Gärten fort. Arctotis breviscapa wird abgebildet. Die folgende Nummer zeigt Bilder der neuen Rosensorten Lady Helen Maglona und Billy Boy; die Tafel eine Szene aus den Anlagen zu Millwater, Ripley, die in einem Artikel geschildert werden. Interessant ist das in no. 2065 in einer blühenden Pflanze gezeigte Senecio Smithii aus dem südlichsten Südamerika, ebenso Olearia insignis aus Neuseeland. Als sehr gut gilt die abgebildete neue Theehybrid-Rose Lady Worthington Evans, sammtig scharlachrot, von A. Dickson & Sons. — In no. 2840 von *The Garden* werden Regelio-Cyclus-Iris besprochen, ferner Iris-Arten für den Anfänger. Abgebildet sind unter anderen I. sindjarensis und I. Vartani. Auch I. germanica-Formen werden behandelt, mit Sorten wie Mm. Gaudichau und Lady Forster. Es folgt ein Bericht über die Sommer-Rosenschau. Auch in folgenden Heften finden sich einige Irishybriden besprochen, von denen I. Delfor und I. Tewat dargestellt werden. Aus Heft 2851 seien Artikel über Lachenalien und Wildrosen hervorgehoben. In no. 2852 beginnt A. Hardley seinen Aufsatz über Enzien-Arten. E. H. Wilson bespricht die Pterocarya-Arten.

FRANKREICH

Das Juliheft von *Jardinage* ist im wesentlichen ein Rosenheft. Eine Auswahlliste von Kletterrosen ist von Interesse. — Im Juliheft von *La Revue Horticole* bespricht der Stadtgartendirektor von Paris, C. Potrat, das Projekt eines kleinen Platzes. Mottet beschreibt Coronilla elegans. Die Farbentafel zeigt Fuchsia gracilis und die oft mit ihr verwechselte F. Biccartoni. Weitere Arten werden besprochen.

HOLLAND

Onze Tuinen beginnt im Juli den 21. Jahrgang. No. 1 behandelt vorzugsweise Kakteen für den Liebhaber, no. 2 verschiedene Saxifragen. No. 3 ist ein Rosen-Ausstellungs-Heft. In no. 4 werden Dictamnus albus-Formen besprochen und abgebildet. — In no. 27 der *Floralia* setzt Ch. de Boschere seine Reise-Erinnerungen aus Norditalien fort. Das folgende Heft ist eine Rosen-Nummer mit einer Farbentafel, die die Sorten John H. Mensing, H. C. Valeton und Souv. de Claudius Pernet zeigt. Auch no. 29 ist in der Hauptsache ein Rosenheft.

NORDAMERIKA

Das Juliheft von *Horticulture* bringt Scenerien aus dem Garten von Mrs. W. C. Endicott in Danvers, Maß., und zeigt eine schöne blühende Pflanze von Cornus Kousa. — D. Ebel schildert im Juliheft von *The Gardener's Chronicle of America* die Besitzung Holmwood in der Berkshire Bergen. — No. 9 bis 13 des *Bulletin of Populver Information of the Arnold Arboretum* sind voll von interessanten Einzelheiten. No 9 behandelt Rhododendron-Arten, no. 10 Philadelphus, no. 11 verschiedene Wildrosen, no. 12 vor allem Catalpen.

VERLAG DER GARTENSCHÖNHEIT G. m. b. H. in Berlin-Westend / Verantwortlich für die Schriftleitung OSKAR KÜHL in Berlin-Westend, für den Anzeigenteil DOROTHEA KLETT, Berlin-Lichterfelde / Druck von W. SOMMER, Buch- und Kunstdruckerei in Berlin-Schöneberg.

KARL FOERSTER

BORNIM bei POTSDAM-SANSSOUCI

KULTUR UND VERSAND WINTERHART AUSDAUERNDER BLÜTENSTAUDEN UND RANKGEWÄCHSE

Anemone japonica Schneekönigin

Mein neuer STAUDENKATALOG, zugleich ein Wegweiser durch das Staudenreich, mit ca. 100 neuen schwarzen und farbigen Bildern wird gegen Voreinzahlung von 2 M. (Postscheckk. Berlin 30 893) oder Nachnahme zugesandt.

Preisliste ohne Bilder kostenfrei.

Blumenzwiebeln als Gartenschmuck

Ixien

Beste Bezugsquelle in holländischen Blumenzwiebeln in wirklich allerersten Qualitäten. Reichhaltige Auswahl, neueste Sorten. Illustrierter Blumenzwiebel-Katalog auf Verlangen umsonst.

F. C. Heinemann, Samenzucht, Erfurt 405

Soeben erschienen:

Edelgladiolen

ihre Entwicklung, Anzucht, Pflege und Verwendung

von **Paul Pfitzer**

mit beschreibendem Sortenverzeichnis führender europäischer und amerikanischer Züchtungen u. 43 Abbildungen

In Großformat auf feinstem Kunstdruckpapier Mark 2.50

Bei Voreinsendung von Mk. 2.60 auf Postscheck-Konto Stuttgart Nummer 3200 portofreie Lieferung. Bei Nachnahmesendung Mk. 2.80

Gutschein: Jedem Buche liegt ein Gutschein bei, der bei einer Gladiolenzwiebel-Bestellung im Betrage von wenigstens Mk. 10.— mit einer Gladiolen-Packung im Werte von Mk. 2.50 vergütet wird.

Zu beziehen durch:

Wilhelm Pfitzer G. m. b. H.
Stuttgart 44

Groß-Gärtnerei und Samenhandlung

Blumenzwiebeln

für Garten und Zimmer

Das Sonderverzeichnis über

Blumenzwiebeln Knollengewächse und Sämereien

zur Herbstaussaat und zur Frühtreiberei

nebst einem Anhang über Gartenwerkzeuge, gärtnerische Bedarfsartikel und Bücher

wird auf Wunsch kostenlos zugesandt.

Pape & Bergmann G. m. b. H.

Spezialhaus für feine Gartensamen und Blumenzwiebeln

Samenbau — **Quedlinburg 5** — Großgärtnerei

Sammelmappe

PFLANZEN ALS ZAUBERMITTEL

BEI dem Glauben an Zauberei, der zu allen Zeiten und bei allen Natur- und Kulturvölkern verbreitet gewesen ist, kommt die hervorragendste Rolle unter allen Zaubermitteln den Pflanzen zu. Obwohl es im allgemeinen nicht möglich ist, aus den Beschreibungen der Alten von ihren Zaubergewächsen die Pflanzenarten unserer heutigen Systematik mit Gewißheit zu erkennen, so ist dies bei einer Anzahl doch gelungen.

Zu den ältesten Zauberpflanzen gehört ohne Zweifel die Alraune oder Mandragorawurzel (Mandragora offizinalis L.). Ihre Verwendung zieht sich bis in das früheste Altertum zurück. Pythagoras erwähnt schon das fleischige, zuweilen wirklich recht seltsam geformte Gewächs und nennt es die »menschenähnliche Wurzel«. Ja, viele Forscher wollen aus Berichten der Chaldäer, Hebräer und alten Perser erkennen, daß das Alraunmännchen bereits von den ältesten Kulturvölkern zu allerlei geheimnisvollen Handlungen benützt wurde. Wie bei vielen anderen Zauberpflanzen knüpfen sich an das Sammeln dieser Wurzeln besondere Vorschriften, deren Außerachtlassung ihre Zauberwirkung wesentlich beschränken oder ganz aufheben. Der Geschichtsschreiber Flavius Josephus behauptet, daß die Mandragorawurzeln

sehr schwer zu sammeln sind, denn sie verschwinden nicht nur häufig, sobald sie der Wurzelgräber erspäht, sondern es ist mit ihrer Beschaffung überhaupt große Lebensgefahr verbunden. Um sie aus der Erde zu ziehen, muß mit größter Vorsicht vorgegangen werden. Zuerst muß man, ohne sie zu berühren, das Erdreich um sie herum lockern. Sobald die Wurzeln nur mehr mit einem kleinen Teile im Boden stecken, müsse man einen schwarzen Hund daran anbinden, einige Schritte nach rückwärts treten und das Tier an sich locken. Durch die Bewegung des Hundes würde sodann die Wurzel ausgerissen, aber der arme Vierfüßler fiele im nächsten Augenblicke an

Dem vorliegenden Augustheft der Gartenschönheit ist ein Prospekt über die

PROPYLÄEN-KUNSTGESCHICHTE

insbesondere den neuesten Band: **Carl Einstein, Die Kunst unserer Zeit in 500 Bildern** beigefügt.

Wir empfehlen diese Ankündigung unseren Lesern zu besonderer Beachtung.

Stelle des Menschen tot zur Erde. Erst jetzt könne die Pflanze auch von Menschen ohne Gefahr ergriffen werden. Auch die heilige Hildegarde, die gelehrte Aebtissin eines am Rhein gelegenen Klosters, machte sich noch sonderbare Vorstellungen von der Alraune, die sie Galgenmännlein nannte, weil sie am häufigsten unter Hochgerichten zu finden wäre. Sie glaubte, beim Ausreißen eines solchen Galgenmännleins schreie dieses so heftig und grauenerweckend, daß man sich die Ohren verstopfen müsse. Im Mittelalter entstand in unserer Heimat der Mandragorawurzel in der überall wildwachsenden Zaunrübe (Bryonia L.) eine häufige Konkurrentin. Scharlatane stutzten diese Rübe oft mit großer Geschicklichkeit zurecht, so daß man ihr Erzeugnis wirklich als menschenähnlich ansehen konnte. Man zog diesen Puppen samtene oder seidene Kleider an und verwahrte sie in kostbaren Kästchen als glückbringende Talismane. Bei gewissen Gelegenheiten holte man sie hervor und badete sie in wohlriechenden Essenzen oder Wein. Auch der Allermannsharnisch oder die Siegwurz (Allium victoralis L.) wurde häufig zu diesen Zwecken herangezogen. In der Wiener Nationalbibliothek wird noch gegenwärtig ein solches Wurzelmännchen gezeigt, welches aus dem Besitze des Kaisers Rudolf II. stammt, der sich bekanntlich Zeit seines Lebens lieber mit Magierkünsten als Regierungsgeschäften befaßte.

Eine ziemlich harmlose Bedeutung als Liebeszaubermittel steht der weißen Zaunrübe (Bryonia alba L.), auch Körfcheswurzel genannt, noch immer in einigen Gegenden Deutschlands zu. Wenn die jungen Dorfschönen zum Tanze

gehen, stecken sie sich mitunter ein kleines Stückchen dieser Rübengattung in den Schuh, wobei sie sprechen:
»Körfcheswurzel in meinem Schuh, Ihr Junggesellen lauft mir zu.«
Den nächsten Rang unter den Zauberpflanzen gebührt den Farnkräutern. Vom gemeinen Waldfarn (Nephrodium filix) behauptete die heilige Hildegarde, daß er sich als Abwehrmittel gegen den Teufel vorzüglich bewähre, denn dieser wagt es nicht einmal, nur in die Nähe einer Person zu kommen, welche Farnkraut bei sich trägt. Freilich müssen auch beim Sammeln dieser Pflanze gewisse Vorschriften beobachtet werden. Farnkrautsamen, der einen zum Meisterschützen macht, Glück in Liebe und Spiel bringt und dem Besitzer verborgene Schätze zu entdecken hilft, wird am besten in der Johannisnacht gesammelt, da diese Pflanze nur um diese Zeit blüht. In Westfalen ist die Sage heimisch, daß Farnsame den Besitzer unsichtbar macht.
Das Eisenkraut (Verbena offizinalis L.) wird am vorteilhaftesten am Karfreitag oder zu Sankt Peter und Paul ausgegraben, und wenn man hierzu ein goldenes oder silbernes Werkzeug benützt, so ist dies für die Zauberkraft der Pflanze ungemein förderlich. Konrad von Megenberg, ein Botaniker des 14. Jahrhunderts, dem wir die erste in deutscher Sprache verfaßte Naturgeschichte zu verdanken haben, spricht vom Eisenkraute mit besonderer Ehrfurcht und bemerkt ausdrücklich, über die Geheimnisse dieser Pflanze nichts ausplaudern zu wollen. Da übrigens dem Eisenkraute tatsächlich auf gewisse Krankheiten eine wohltuende Wirkung nicht abzusprechen ist, so finden wir es erklärlich, daß es sich jahrhundertelang im Arzneischatze unserer Vorfahren erhalten hat.
Die Einflußnahme auf die Gestaltung des Wetters gehörte bekanntlich zu den Hauptbeschäftigungen der Zauberer und Hexen. Auch hierzu dienten Pflanzen vorzugsweise als Hilfsmittel. Namentlich das Bilsenkraut (Hyoscyamus niger L.) wurde gerne dazu benützt. Um dessen Wirksamkeit sicherzustellen, mußten vollkommen nackte Mädchen die Pflanzen mit dem kleinen Finger der rechten Hand pflücken. Nur auf diese Weise besaßen sie die Macht, nach langer Dürre erquickenden Regen herbei zu ziehen. Diese wahrscheinlich aus Gallien stammende Sitte war im 11. Jahrhundert häufig in den Rheingegenden zu treffen und soll in einigen Balkanländern noch heute geübt werden. Gegen Blitz und Donner wurde die Hauswurz (Sempervivum tectorum L.) am häufigsten verwendet. Donner- oder Jupitersbart aufs Dach gepflanzt, sollte das Blitzeinschlagen verhüten. Karl der Große, der sich um das Wohl seiner Untertanen bis ins Kleinste kümmerte, ordnete an, daß jedermann Donnerbart auf seinem Hause haben müsse. Zu Kränzen oder Sträußchen gebunden, wurde aber auch noch manch anderer Pflanze dieselbe Kraft angedichtet. Das Johanniskraut (Hypericum perforatum L.) wird besonders in den österreichischen Alpenländern noch heute gerne an die Eisenstäbe der Fenstergitter von Wohnungen und Ställen gebunden, um Menschen und Vieh vor der Blitzgefahr zu beschirmen.
Alle angeführten und noch Hunderte anderer Pflanzen genügten dem Zaubermittelbedarfe unserer Ahnen nicht. Ihre Phantasie erfand noch solche, die in Wirklichkeit niemals existierten. Wir erinnern in erster Reihe an die sogenannte Spring- oder Spechtwurzel, mit der man angeblich die stärksten Schlösser und Fesseln hätte öffnen können sollen. Die mittelalterlichen Schatzgräber bedienten sich häufig derselben bei ihren abenteuerlichen Geschäften. Um einer solchen Springwurzel, die nur der Specht aufzufinden weiß, habhaft zu werden, bedurfte es einer besonderen List. Man verkeilte den Zugang zu einem in einem hohlen Baume befindlichen Spechtneste zur Zeit, wo sich Junge

darin befanden und die Alten ausgeflogen waren. Der von seiner Nachkommenschaft abgeschnittene Specht weiß sich aber zu helfen. Er holt eine Springwurzel herbei und öffnet sich damit den Nestzugang. Erschreckt man nun den Vogel bei seiner Arbeit, so läßt er die kostbare Wurzel fallen, die man sodann leicht an sich nehmen kann. An den Gebrauch der Springwurzel war aber noch eine wichtige Bedingung geknüpft. Wer ein Schloß oder dergleichen damit öffnen wollte, mußte dabei unbedingt mit den Füßen den Erdboden berühren. Der Glaube an die Wirkung der Springwurzel sowie an die Notwendigkeit der Erfüllung dieser Bedingung war ehemals so groß, daß man in alter Zeit schwere Verbrecher, namentlich Zauberer und Hexen oft in eigenen Schaukeln in ihren Kerkern schwebend unterbrachte, um so die Verwendung einer Springwurzel zu Befreiungszwecken zu verhindern. *Hans Winter*

Gartenschönheit

eine Zeitschrift mit Bildern

für Garten- und Blumenfreund · für Liebhaber und Fachmann

September 1926

in Gemeinschaft mit Karl Foerster und Camillo Schneider
herausgegeben von · Oskar Kühl
Verlag der Gartenschönheit G.m.b.H. Berlin-Westend

7. JAHR / HEFT 9 SEPTEMBER 1926

GARTENSCHÖNHEIT

*eine Zeitschrift mit Bildern
für Garten- und Blumenfreund
für Liebhaber und Fachmann
in Gemeinschaft mit Karl Foerster
und Camillo Schneider
herausgegeben von Oskar Kühl*

Inhalt des Septemberheftes:

Seite

Perowskia atriplicifolia / Bild 225
Camillo Schneider / Die Einteilung der Dahlien / Mit 15 Bildern 225
Th. Hoog jr. / Dahlien in Holland 230
Anni Epstein / Herbst in Palästinas Gärten 233
Nochmals Iris susiana / Bild 234
Erich Wocke / Herbstliche Wiesenpracht im Schlesischen Vorgebirge 234
R. Bergfeld / Von malerischer Gartengestaltung / Mit 4 Bildern 235
Paul Kache / Schmuckvolle Blattformen / Mit 7 Bildern 237
Richard Rothe / Amerikanische Gärten / Mit 4 Bildern 240
Siegfried Decker / Dahlien in Brasilien II . 242

Gartenaufgaben

H. Kayser / Das Gartenbad / Mit 2 Bildern 243

Aus dem Blumengarten der Literatur

Der schöne Garten von Ewald von Kleist 244

GARTENARBEIT UND BLUMENPFLEGE

Leberecht Migge / Neue Gartentechnik I / Mit 4 Bildern und 5 Zeichnungen 245
Karl Micksch / Das Färben lebender Blumen 247
J. Köster / Blütennotizen 250

Vom Werkstoff des Gartens

C. R. Jelitto / Für den Heidegarten / Mit 2 Bildern 249

Auf dem Balkon

H. Gehringer / Im September 250

GARTENRUNDSCHAU

Neues aus aller Welt

Lebende Einfassungen von Staudenrabatten / Wertvolle Stauden-Paeonien / Japanische Zierkirschen / Corylus-Hybriden / Die Romneya-Arten / Schneckenbekämpfung / Das Recht im Garten 251

Neue Bücher

Der Steingarten / Marktgemüsebau / Deutsche Binnen-Kolonisation / Edelgladiolen / Sukkulentenkunde / Jahrbuch für Tier- und Gartenfreunde / Amerikanische Dahlien-Gesellschaft 251
Zeitschriften 252

BILDBEILAGE
Eingang zum Generalife in Granada

FARBIGE BILDBEILAGEN
Einjahrsblumen-Gärten im Hamburger Stadtpark und in Stuttgart
Canna Präsident und Teichmann

Monatlich ein Heft

Bezugspreis für das Vierteljahr
in *Deutschland* 4 G.-M. und 0.75 G.-M. Versandkosten (Postscheckkonto Berlin 76290),
im *Ausland* einschließlich Versandkosten: 5.25 Goldmark = 1,25 U. S. A.-$ oder entsprechend in der Landeswährung.

Preis des Einzelheftes
1.50 Goldmark zuzüglich Versandkosten

Verlag der Gartenschönheit G.m.b.H.
Berlin-Westend / Akazien-Allee 14.

In dem Hamburger Stadtpark ſind durch Direktor Linne mancherlei Verſuche mit Einjahrsblumen gemacht worden, die Gelegenheit gaben, wertvolle Beobachtungen über die Verwendung dieſer wichtigen Sommergewächſe zu machen. Das Bild veranſchaulicht, wie ſchön dieſe Blumen wirken können, wenn man ſie als Farbenflächen und -Streifen behandelt. Wählt man gute Sorten von Tagetes, Petunien, Tropaeolum und dergleichen, ſo ergibt es ein buntes und doch harmoniſches Ganze. – Bild Fr. Meyer

In Stuttgart hat Gartendirektor Ehmann ein reizendes Sondergärtchen geſchaffen, das den ganzen Sommer- und Herbſtzauber der Blumen in ſich bannt. Das Gelände ſteigt langſam an, und mit dem Anſteigen der Fläche vergrößern ſich auch die Pflanzenformen. Sie endigen in Gladiolen, Canna und Dahlien, die das Ganze beherrſchend herabſchauen auf Petunien, Phlox, Ageratum, Verbenen, Calendula, Calliopsis, Antirrhinum, Tagetes, Bartnelken, Clarkien, Iberis und Nigella. – Bild Hildenbrand

Perowskia atriplicifolia. – Bild Goos

Im September

CAMILLO SCHNEIDER / DIE EINTEILUNG DER DAHLIEN

BEI der Ausarbeitung des Dahlienbuches in der Reihe der Bücher der Gartenschönheit, dessen Herausgabe bevorsteht, war es nötig, zur Frage der Klassifizierung der Dahliensorten bestimmt Stellung zu nehmen. Es erscheint angebracht, darüber auch an dieser Stelle zu berichten, da die Klassenbezeichnung gerade bei uns in Deutschland bisher noch sehr zu wünschen übrig läßt. Wir können allerdings hier diese Frage nicht so ausführlich behandeln, wie es im Buche im Anschluß an die historischen und botanischen Betrachtungen geschieht; wir möchten jedoch die Grundzüge möglichst anschaulich erläutern, auf denen eine solche Einteilung beruht.

Die ersten Einteilungsversuche der Dahliensorten vor Erscheinung der Kaktus-Dahlien, wie wir sie etwa aus den Schriften der dreißiger Jahre des vorigen Jahrhunderts kennen, in denen es ja schon weit über tausend Sorten gab, legten auf Merkmale im Wuchs, in der Form und auch in der Haltung der Blumen Wert, die uns heute mit Recht belanglos dünken. Die erste, wenn man will, wissenschaftliche Einteilung versuchte 1896 A. Voß bei der Bearbeitung von Vilmorins Blumengärtnerei zu geben. Er legte damit bis zu einem gewissen Grade den Grund für unsere heutige Gliederung, gebrauchte aber schwerfällige, lateinische und deutsche Bezeichnungen und konnte sich damit nicht einbürgern. Viel glücklicher sind die Angaben in Vilmorins bekanntem Buche »Les Fleurs de pleine terre« von 1909. Hier treten schon die Schmuck-Dahlien als Dahlias décoratifs auf. Im wesentlichen das Gleiche wie Vilmorin schlug der Franzose F. Cayeux 1916 vor.

Wirklich grundlegend war die 1921 und 1924 von der National Dahlia Society in England im Verein mit der Royal Horticultural

Kleinblumige einfache Dahlie: Apfelblüte

Halskrausen-Dahlie: Kätchen von Schwarzathal. – Bild C. S.

Society gegebene Klassifizierung. Wir haben darüber bereits berichtet (Band V, Seite 200) und wiederholen heute kurz die Klassen. I. Einfache Dahlien: sie zerfallen in zwei Unterklassen: A. Einfache Schau-Dahlien (Show Single Dahlias) und B. Einfache Schmuck-Dahlien (Decorative Single Dahlias). II. Einfache Mignon-Dahlien (Mignon Single Dahlias). III. Halskrausen-Dahlien (Collerette Dahlias). IV. Anemonenblütige Dahlien (Anemone-flowered Dahlias). V. Paeonienblütige Dahlien (Paeony-flowered Dahlias). VI. Kleinblumige paeonienblütige Dahlien (Small-flowered Paeony-flowered Dahlias, eine Klasse, die man jetzt auch »Charm or Miniature Paeony Dahlias« nennt. VII. Niedrige paeonienblütige Dahlien (Dwarf Paeony-flowered Dahlias). VIII. Schmuck-Dahlien (Decorative Dahlias). IX. Kleinblumige Schmuck-Dahlien (Small flowered Decorative Dahlias). X. Niedrige Schmuck-Dahlien (Dwarf Decorative Dahlias). XI. Camellienblütige Dahlien (Camellia-flowered Dahlias). XII. Schau-Dahlien (Show Dahlias). XIII. Pompon-Dahlien (Pompon-Dahlias). XIV. Stern-Dahlien (Star Dahlias). XV. Kaktus-Dahlien (Cactus Dahlias). XVI. Niedrige Kaktus-Dahlien (Dwarf Cactus Dahlias).

Inzwischen hat sich in Amerika die Dahlienkultur und Zucht zu außerordentlicher Höhe entwickelt. Es ist da natürlich, daß die in den Vereinigten Staaten zur American Dahlia Society zusammengeschlossenen verschiedenen Dahlien-Gesellschaften auch zur Frage der Klassifizierung Stellung nahmen. Ihre Einteilung ist nach den Angaben im Bulletin dieser Gesellschaft (ser. VI. no. 32 vom April 1925) folgende, die wir getreu wiedergeben:

Kaktus-Dahlie (Cactus Dahlia): a. echter flötenförmiger Typ, Blumen ganz gefüllt, Strahlenblüten (Petalen) lang, schmal, einwärts gebogen oder verbogen, mit scharfen, geteilten oder flötenartigen Spitzen mit rückwärts gerollten Rändern, sodaß sie in den äußeren Blütchen auf mehr als die Hälfte der Strahlenlänge eine mehr oder weniger vollkommene Röhre bilden. – b. *Kaktushybride* oder Halb-Kaktus-Typ (Hybrid Cactus or semi-cactus type): Blumen ganz gefüllt, Strahlenblüten verglichen mit denen des vorhergehenden Types kurz, breit, flach, zurückgebogen oder verbogen, nicht scharf gespitzt, außer wenn die Enden (geweihartig) geteilt sind, Ränder leicht zurückgerollt, und Röhre der äußeren Blütchen, wenn vorhanden, weniger als halb so lang wie der Strahl.

Schmuck-Dahlie (Decoratif Dahlia): Gefüllte Blumen, eher flach als ballförmig, mit breiten, flachen, etwas locker angeordneten Strahlenblüten, die breite Spitzen oder runde Enden haben, die gerade oder herabgebogen, nicht einwärts gekrümmt sind, und deren Ränder zurückgerollt, wenn überhaupt gerollt sind.

Ball-Dahlien (Ball-Shaped, Double Dahlias): a. *Schau-Typ* (Show type): Gefüllte Blumen, eher kugelig oder ballförmig, als breit oder flach, bis zur Mitte gefüllt, eine regelmäßige spiralige Anordnung der Blütchen zeigend, Strahlenblüten mehr oder weniger federkielartig (quilled) oder mit deutlich einwärtsgebogenen Rändern und gerundeten Enden (Die Fancy Dahlias genannte Klasse wird bei dieser Einteilung nicht besonders anerkannt, sondern ist unter Untergruppe a eingeschlossen). – b. *Riesen-Schau-Typ* (Hybrid show, giant show or collosal type): Blumen ganz gefüllt, breit halbkugelig oder flachkugelig in Form, locker gebaut, sodaß die spiralige Anordnung der Blütchen nicht sofort deutlich ist: Strahlenblüten breit, schwer, becherförmig, oder federkielartig mit runden Enden oder eingebogenen Rändern. – c. *Pompon-Typ* (Pompon type): Form und Farbe wie bei a und b, aber Blumen unter fünf Centimeter Durchmesser.

Stern-Dahlie: Ifield Star. – Bild Malby

Großblumige Duplex-Dahlie Schneekönigin

Paeonienblütige Dahlien (Paeony-flowered or Art Dahlias): Halbgefüllte Blüten mit offener Mitte, die inneren Strahlenblüten sind gewöhnlich gelockt oder gewunden, die anderen oder äußeren Petalen sind entweder flach, mehr oder weniger unregelmäßig.

Duplex-Dahlien (Duplex Dahlias): Halbgefüllte Blumen, deren Mitte beim Aufblühen fast ganz frei ist, Petalen in mehr als einer Reihe, mehr als 12, lang und flach oder breit und gerundet, nicht deutlich gelockt oder gewunden. Viele sogenannte Paeoniendahlien gehören hierher.

Einfache Dahlien (Single Dahlias): Blumen mit offener Mitte, klein oder sehr groß, mit 8 bis 12 Strahlenblüten, die mehr oder weniger in einem Kreise stehen, Ränder oft herabgebogen (nach unten oder rückwärts gewendet). In Bezug auf Farben gibt es keine Unterschiede. Der Typ umfaßt die großen Formen des zwanzigsten Jahrhunderts (the large Twentieth Century), wie auch die kleinen englischen Varietäten.

Halskrausen-Dahlien (Collarette Dahlias): Einfacher Typ; Blumen mit offener Mitte mit nicht mehr als 9 Strahlenblüten, bei denen je eine oder mehrere kleinere Strahlen von einer meist verschiedenen Farbe am Grunde jeder Strahlenblüte entspringen und eine Krause um den Diskus bilden.

Diese nordamerikanische Einteilung wird, wie wir noch sehen werden, den heute vorhandenen Typen besser gerecht als die englische. Wir wollen zunächst einmal sehen, welche Haupt- oder Grundtypen sich ganz natürlich bei einem Überblick über die Formen, die wir kennen, und deren Entwicklung ergeben.

Zunächst doch der Typ der *Einfachen* Dahlie, der mehr oder minder der Wildform, wie sie uns Dahlia pinnata (Dahlia variabilis, D. coronata) zeigt. Hier ist nur eine einzige Reihe von etwa 8 bis höchstens 12 breiten und flachen Strahlenblüten vorhanden. Die Mitte des Blütenköpfchens (es braucht wohl nicht betont zu werden, daß wir es hier mit einem solchen und nicht mit einer Blüte im normalen Sinne zu tun haben und daß die Ausdrücke einfach, gefüllt und halbgefüllt nur im übertragenen Sinne angewendet werden) wird eingenommen von den kleinen Röhrenblüten der Scheibe (des Diskus). Zu diesen einfachen Dahlien zählen auch die Gruppen der Halskrausen-Dahlien und der Anemonen-Dahlien. Auch hier ist stets nur *eine* Reihe (ein Kreis) breiter großer Strahlenblüten vorhanden. Die Blütchen, die die Krause bilden, sind allerdings auch Strahlenblüten und keine Röhrenblüten, aber in der Form, Färbung und Anordnung so auffällig, daß man die Halskrausen-Dahlien doch nicht zu den halbgefüllten stellen kann. Hinwiederum sind bei den Anemonen- oder Clematis-Dahlien die Röhrenblüten in ihrer Gesamtheit vergrößert, aber nicht zu Strahlenblüten ausgebildet. Alle diese Gruppen der einfachen Dahlien zeigen nun zwei oft sehr scharf geschiedene Formentypen, die die Engländer nicht mit Unrecht als Show Singles und Decorative Singles bezeichnen, wobei die erste Gruppe rundblütige Formen umfaßt, bei denen die breiten stumpfen Strahlenblüten stark übereinander greifen, während bei der zweiten Gruppe die spitzeren Strahlenblüten (Petalen) an den Enden getrennt sind, sodaß die Blumen mehr sternartig wirken. Allerdings zeigen nur extreme Formen diese Typen sehr klar, und in Deutschland sind die rundblütigen Formen, die man in England in letzter Zeit gut durchgezüchtet hat, noch sehr wenig bekannt. Auch die Amerikaner unterscheiden sie ja nicht. In beiden Ländern hebt man auch die großblumigen einfachen Sorten nicht hervor, die in der Gruppe der »Decorative Singles« jetzt immer mehr in Erscheinung treten. Eine scharfe Trennung zwischen kleinblumigen und

Kleinblumige Schmuck-Dahlie: Juweeltje. – Bild J. F. Ch. Dix

Schmuck-Dahſien: Emiſie Nageſs und Trésor Anversois, heſſ.

rieſenblumigen Sorten ſcheint aber bei allen Typen ſehr angebracht, da die Gartenwerte ſolcher Formen recht verſchiedenartige ſind. Und auf den Eindruck, den die einzelnen Typen der Dahlien im Garten machen, muß man doch ganz beſonders bei der Einteilung ſein Augenmerk richten.

Das was für die einfachen Dahlien gilt, hat auch für den zweiten Grundtyp, den der *halbgefüllten*, ſeine volle Berechtigung. Dieſe halbgefüllten Formen werden bei uns, nachdem ſie doch bereits in den neunziger Jahren und um die Jahrhundertwende eine Rolle geſpielt hatten und die Vorläufer der Schmuckdahlien und Rieſen-Schmuckdahlien ſind, noch viel zu wenig beachtet. Man ſieht in ihnen zumeiſt nur unvollkommen gefüllte Formen, wie ſie ſich ja bei manchen ſonſt gut gefüllten Sorten nicht ſelten zeigen. In England aber, wie auch in Amerika und Holland, hat man die Schönheit gerade halbgefüllten Formen längſt gebührend anerkannt und ſehr hübſche Sorten herausgezüchtet, die in die oben genannten Klaſſen der Paeonien-Dahlien, Stern-Dahlien und Duplex-Dahlien eingereiht ſind. Wir wenden auch manchmal den Ausdruck Paeonien-Dahlien für gefüllte Formen an. Es iſt aber notwendig, was aus dem Folgenden noch zwingender hervorgehen wird, daß wir uns endlich über den Begriff ſolcher Bezeichnungen klar verſtändigen. Jetzt herrſcht in unſerer Katalogſprache noch eine beinahe babyloniſche Verwirrung.

Wir kommen nun zu den *gefüllten* Formen, alſo ſolchen, bei denen die Blütchen des geſamten Blütenköpfchens in Strahlenblüten umgewandelt ſind. Dieſe Formen ſtellen vom gärtneriſchen Standpunkte den Endtyp der Entwicklung dar. Unter ihnen dürfte wiederum der Balltyp das Extrem bilden, während die Schmucktyp-Formen zu den halbgefüllten deutlich überleiten. Jedenfalls kommt bei einer zuweilen vorgeſchlagenen Aneinanderreihung der Klaſſen nach dem Zeitpunkte ihres Erſcheinens in der Kultur der eigentliche Zuſammenhang der Typen und Klaſſen nicht recht zur Geltung. Es ſei nebenbei bemerkt, daß die erſte überhaupt bekannt gewordene, von Cavanilles in Madrid 1791 kultivierte und beſchriebene Dahlie eine halbgefüllte Form darſtellte, ja ſelbſt die noch älteren Abbildungen aus dem Werke von Hernandez von 1651 zeigen ſchon mehr oder weniger gefüllte Formen.

Bei uns traten um 1808 die erſten ganz gefüllten Dahlien auf, die den alten Georginen im gärtneriſchen, nicht im botaniſchen Sinne entſprachen. Botaniſch iſt der Name Georgine gleichbedeutend mit Dahlie, ſchon aus dieſem Grunde läßt man mit Recht jetzt dieſe Bezeichnung ganz fallen und ſpricht von Ball-Dahlien.

Die Zahl der gefüllten Sorten iſt nun heute eine überreiche und ihre Formenſprache iſt gleichfalls eine verwirrende. Es laſſen ſich aber heute noch drei Haupttypen ſehr wohl auseinander halten. Dies ſind der *Kaktus-Typ*, der in den neunziger Jahren ſeine große Zeit hatte, nachdem er ſich langſam aus Dahlia Juarezi, einer mexikaniſchen Gartenform, die 1872 nach Europa kam,

Kaktus-Hybrid-Dahſie: Kaſiſ. – Biſd Biſſinger

Eingang zum Generalife in Granada

Riesen-Schmuckdahlie: Gletscher. – Bild C. S.

und anderen Formen heraus entwickelt hat. Er ist durch die oben gegebene Kennzeichnung der Amerikaner und durch das Bild der Sorte Goldene Sonne hier wohl zur Genüge charakterisiert.

Vergleicht man ihn mit dem *Schmuck-Typ* (Decorative type), wie er oben beschrieben und durch die Sorten Frau Frieda Falkenhagen, Juweeltje, Emilie Nagels und Trésor Anversois im Bilde festgehalten ist, so springt der Unterschied sofort in die Augen. Nicht minder scharf kennzeichnet sich der *Ball-Typ* in den Bildern der Sorten Cardua, Secretaris Voors und Sunset, sowie durch die oben gegebene Beschreibung.

Es fragt sich nun, ob und wie man gewisse Zwischenformen eingliedern soll, die heutzutage als Kaktushybriden, Hybrid-Dahlien und auch Edel-Dahlien in den Katalogen geführt werden. Sowohl das Wort Edeldahlie, wie der Begriff Hybrid-Dahlie müssen verschwinden, da sie nichts Rechtes besagen. Der Ausdruck Schmuck-Dahlie ist längst durch die Bezeichnungen Decorative Dahlien und Dahlia décoratif festgelegt worden. Der in England übliche Ausdruck Show Dahlia für das, was wir bisher Georginen nannten und jetzt Ball-Dahlien nennen, müßte durch Schau-Dahlie übersetzt werden, doch ist der durch die Amerikaner eingeführte Name Ball-Dahlie vorzuziehen. Nehmen wir also als die drei Grundtypen der gefüllten Dahlien den Kaktus-Typ, den Schmuck-Typ und den Ball-Typ an, so haben wir eine Grundlage erreicht, auf der man sich international sehr gut zusammenfinden kann.

Meines Erachtens müssen wir aber doch weiter gehen in der Unterscheidung. Zunächst sollten auch wir im Sinne der Amerikaner den Begriff Kaktushybride festhalten für Formen, die zwischen den Kaktus-Dahlien und dem Schmuck-Typ stehen. Hierfür ist die bekannte Sorte Kalif, die unser Bild zeigt, vielleicht mit am charakteristischsten. Jedenfalls fallen unter den Begriff Formen, die sich noch deutlich an den Kaktus-Typ anschließen. In unserem Buche haben wir zunächst die Klasse Kaktushybrid-Dahlien nicht abgetrennt, ich tue dies aber zur schärferen Betonung und zur Anregung für künftige internationale Vereinbarung im folgenden. Beim Schmuck-Typ ist nun fraglos die Klasse der Riesen-Schmuck-Dahlien festzuhalten, da diese in ihrem ganzen Wesen sich gärtnerisch von dem eigentlichen, kleinerblumigen Schmucktyp recht gut scheiden. Wir gaben bereits im September letzten Jahres in der Beilage das Bild der Riesen-Schmuck-Dahlie Mevrouw Ballego, das diese Klasse sehr gut veranschaulicht.

Zum *Schmuck-Typ* gehören noch zwei Formengruppen, die als Rosetten-Dahlien und als Seerosen-Dahlien gehen. Die durch die Sorte Juweeltje im Bilde charakterisierten Rosetten-Dahlien kann man mit Recht als Kleinblumige

Kaktus-Dahlie: Goldene Sonne. – Bilder Pfitzer

Schmuckdahlie: Frau Frieda Falkenhagen

Schmuck-Dahlien den Schmuck-Dahlien im engeren Sinne unterordnen. Der Seerosentyp ist in seinen Vertretern, wie der allbekannten Sorte Schönes Farbenkönigin recht bezeichnend. Auch Sorten wie die hier gezeigte Lachmöve gemahnen etwas an diese Form. So sind denn die Grenzen gegen die Schmuck-Dahlien wie gegen gewisse Ball-Dahlien recht schwer zu ziehen. Das gilt ja auch für den in England üblichen Begriff der Camellia Dahlias, die Typen wie Lachmöve und Seerosen-Dahlien ähneln. Man beachte das Bild der Sorte Mauerblümchen (Bd. VI, Seite 162), die man in England unbedingt als Camellien-Dahlie ansprechen würde. Man sieht jedenfalls, wohin die Herausgreifung solcher kleinen Klassen führt. Dies gilt auch für die sogenannten Chrysanthemum-Dahlien, die man aus den Kaktushybriden herausschälen könnte und wozu man Sorten wie Insulinde oder Porthos bringt. Alle diese sollte man nach ihrer Gesamtwirkung im Garten bei den ihnen darin ähnlichen Klassen einreihen.

Wir kommen nun zum *Ball-Typ,* der in der Klasse der Ball-Dahlien (Show Dahlias) und der der kleinblumigen Pompon-Dahlien zwei gut umschriebene Gruppen aufweist, die unsere Bilder der Sorten Secretaris Voors und Electros (wer die Sorte nicht mag, kann sich darunter eine beliebige andere Pomponsorte vorstellen) zeigen. Es gibt nun aber eine Reihe großblumiger neuer Sorten, die sich gewissermaßen zwischen den Schmuck-Typ und Ball-Typ einschalten, dabei aber doch wohl dem Ball-Typ näher stehen. Diese führen die Amerikaner, wie schon bemerkt, als Giant show or Collossal type. Ich möchte deshalb auch bei uns den Begriff Riesen-Schaudahlien in diesem Sinne als eine Klasse unter dem Ball-Typ festgehalten wissen, die der der Riesen-Schmuckdahlien unter dem Schmuck-Typ entspricht. Solche neuen deutschen Sorten, wie etwa die abgebildete Gletscher, fallen meinem Gefühl nach darunter. Doch haben wir in dem Buche auch diese Klasse vorläufig noch nicht geführt.

Nach dem bisher Gesagten fasse ich das meines Erachtens Wichtige in der auf Seite 232 gegebenen Einteilung zusammen, die eine internationale Verständigung anbahnen möge.

Pompon-Dahlie: Electros. – Bilder C. S.

Vielleicht gibt der Internationale Gartenbau-Kongreß, der im September 1927 in Wien tagen soll, dazu Gelegenheit.

Dahlien in Holland

IM Gegensatz zum Jahr 1924 hat das vergangene Jahr uns in Holland viele Neuheiten beschеert, die allerdings längst nicht alle erwähnenswert sind. Unzählige Kometen erscheinen am Dahlienhimmel, um nach kürzerer oder längerer Laufbahn spurlos zu verschwinden. Denn nur ganz wenige Neuheiten werden den Fixsternen einverleibt. Großes Aufsehen erregten insbesondere ja amerikanische Neuheiten, von denen folgende wohl unbedingt als gut gelten können: Ambassador, Amun-Ra, Giant Ruby, Mrs. Carl Salbach, Mrs. I. de Ver Warner und Robert Treat. Alle gehören zu den Riesen-Schmuck-Dahlien.

Ambassador nähert sich in der Form den Kaktus-Dahlien beziehungsweise den Kaktushybriden. Die Blumen sind sehr groß, sternförmig, gelb mit bronze Schattierung, und stehen auf starken langen Stielen. *Giant Ruby* dürfte eine gute Zukunft haben, ist doch in knallroten Sorten der Höhepunkt noch lange nicht erreicht. Von scharlachroten seien hervorgehoben die holländischen Nelson's Xariffa, die den Fehler hat, zuviele halbgefüllte Blumen zu bringen, Richard Heuckeroth, die zu spät in Blüte kommt, und Vuurbaak, deren Stiele nicht gut sind. Eine im Auge zu behaltende Neuheit ist *Mrs. I. de Ver Warner* mit flachen Riesenblumen auf ziemlich guten Stengeln. Die Färbung ist mauve-lila mit rosa Schein. *Robert Treat* füllt wirklich die traditionelle Lücke aus, weil die aparte kirschrote Farbe noch nicht vertreten war. Die großen Blumen stehen auf guten Stielen. *Amun-Ra* ist bereits mehr verbreitet; die Riesenblumen zeigen ein angenehmes, Kupfrig-orange mit alt-gold Schattierung. Die Blume steckt leider etwas im Blatt. *Mrs. Carl Salbach* ist eine gute, zart lila abgetönte Sorte auf weißem Grunde. Ich hatte leider nur wenig Gelegenheit, die Sorten auf dem Felde zu beurteilen, da in den meisten Fällen infolge verzögerter Auspflanzung der Stecklinge der Flor erst spät im Herbste eintrat. Die innige Beziehung zwischen Größe der Blumen und Blühwilligkeit war auch hier zu bemerken. Selbst-

redend tragen die übergroßen Dahlien nicht ſo viele Blumen wie die kleinerblütigen älteren Sorten.
Von den holländiſchen Sorten ſei als erſte die liebliche bunte Erſcheinung von *Clown* erwähnt, deren mäßig große Blumen orangerot und weiß gefleckt ſind. Sie ſoll angeblich aus einer Kreuzung der altbekannten und in ihrer Art wohl immer noch unübertroffenen Sorte Prinses Juliana mit der einfachen Helvetia, die auch als Soleure oder Däniſche Flagge geht, hervorgegangen ſein. Die Blühwilligkeit von Clown iſt eine erſtaunliche.
Von den Aalsmeerſchen Neuheiten hat *Maria Houtman* bereits großen Beifall gefunden. Die guten, 75 bis 100 Centimeter langen Stiele heben die bronzeterrakottafarbenen Blumen gut aus dem Laub. Die dunkelkarminrote Johan Mensing macht in Aalsmeer auf dem feuchten Boden in den geſchützten Gärten einen ſchönen Eindruck, in ſchlechteren Lagen erfüllt ſie jedoch die guten Erwartungen nicht. Sie dürfte in erſter Linie eine Dahlie fürs Glashaus ſein.
Eine bedeutungsvolle Sorte haben wir in *Witte van Heemstede*, die angeblich eine Verbeſſerung der bekannten Jonkheer van Teets bildet. Dieſe iſt eine großblumige, ſchneeweiße Schmuckdahlie, die ſich aber in den Kulturen nicht halten wird, da die Knollen ſchlecht durch den Winter kommen und als Gartenpflanze die langen kahlen Stengel nicht angenehm ſind. Der Varietätsname der Neuheit iſt bezeichnend gewählt, da er die Erinnerung an einen ſchon ſeit dem Mittelalter bekannten Namen feſthält und anzeigt, daß dieſe weiße Sorte aus Heemstede bei Haarlem ſtammt.
Ein anderes Zentrum der holländiſchen Dahlienkultur iſt Baarn. Die von hier ſtammende *Salmonea* iſt im Laufe der Jahre eine Weltſorte geworden, und die zwei Worte »ähnelt Salmonea« bedeuten eine Empfehlung, die mehr ſagt, als die Angabe vieler Einzelheiten. In der Farbe iſt ſie heute noch unübertroffen. Eine ſchöne Variante mit orange-lachsfarbenen Blumen iſt *Mevr.* (Frau) *Dix*. Ein weiterer Salmonea-Sämling iſt *Orion* mit malvenroſafarbenen Blumen, die mir eine gute Verbeſſerung von Princeß Mary zu ſein ſcheint. Aus Baarn ſtammt auch die neue *Pink Favourite* mit großen ſternförmigen Blumen,

Rieſen-Schaudahlie: Cardua. – Bild C. S.

deren Farbe roſa mit ſilbernem Schimmer iſt. Erwähnt ſei auch Firebrand, eine Kaktushybride mit leuchtend karminſcharlachfarbenen Blumen, die gut gefüllt ſind. Die Pflanze wird etwa 1.40 Meter hoch.
Andere Neuheiten ſind noch *Roſe Elegance*, reichblühend mit rein roſa Blumen, deren Mitte etwas gelblich ſchattiert iſt, was das Roſa noch hebt; *Secretaris Voors*, eine Balldahlie mit lachsroſafarbenen Blumen, ferner Pax mit ſchmalen Zungenblüten und bräunlichem Farbton. Es iſt intereſſant zu beobachten, wie ſich das Gebilde der modernen Dahlie immer mehr vervollkommnet. Stufenweiſe erreichen die Farben den Gipfel. So läßt ſich unter den lila Farbentönen kaum noch etwas beſſeres denken, als *Remembrance*, eine Schmuckdahlie, bei der Farbe, Form, Haltung und Blühwilligkeit ideal ſind. Durch ſie werden ihre Vorgänger, wie Lady Derby, Rev. John Robinſon, Amethyst und wie ſie ſonſt heißen mögen, entbehrlich. Gelb hat in *Lemon Queen* vielleicht den letzten Schritt getan. Die Pflanze wird bis zwei Meter hoch und iſt den ganzen Sommer hindurch überdeckt von einer Menge guter Blumen auf ſtarken Stielen, ſodaß die Sorte nicht genug empfohlen werden kann. In Weiß iſt noch immer *Prinses Juliana* Favorit und im Blütenreichtum bisher noch nicht geſchlagen. *Menny Carlée* mit großen ſchneeweißen Blumen iſt von den neueſten die beſte. In Roſa gibt es die jetzt etwas veraltete Princess Mary, ferner die reichblühende Mr. Dreſſelhuys, deren ſilbriges Roſa leider zwiſchen roſa und weiß ſchwankt. Mr. Dix iſt dunkel ſatinrot, und Murillo beſitzt ein angenehmes glänzendes Roſa. In Purpur iſt *Jack Dempsey* zu beachten. Mme. Curie, Kind Albert, Roem van Nykerk haben ſich auf die Dauer nicht bewährt.
In den ſogenannten Herbſtfarben gibt es eine Unmenge Sorten. King of the Autumn war die erſte, die Pflanzen tragen jedoch meiſt halbgefüllte Blumen. Sehr ſchön ſind noch immer die alte *Insulinde*, in der Form wohl noch unübertroffen, und Panorama. Unter den orangefarbenen iſt *Orange King* gut; Artis iſt mit rot ſchattiert. Die letzte hier zu erwähnende iſt *John Kingdon Smith* von blendend orangeroter Färbung.

Balldahlie: Secretaris Voors. – Bild Abbing

Riesen-Schmuckdahlie: Orange King

Riesen-Schmuckdahlie: Firebrand – Bilder Abbing

In den öffentlichen Parkanlagen und an Stellen, wo man im Sommer eine Massenwirkung erzielen will, verwendet man jetzt massenhaft Mignon-Dahlien, eine Gruppe einfacher Dahlien, deren Höhe zwischen 40 und 70 Centimeter schwankt. Die bekannte deutsche Züchtung Rotkäppchen mit rein scharlachroten Blumen, wie auch die Schwarz-rot-gold, deren kosmopolitischer Name Rouge-et-Noir ist, werden meist noch zu dieser Gruppe gerechnet. Man bringt angetriebene und abgehärtete Knollen gleich nach Entfernung der Frühjahrsblumen, wie Lack, Stiefmütterchen, Vergißmeinnicht und Bellis auf die Beete und setzt sie in 50 bis 60 Centimeter Entfernung. Ihre Pflege macht dann kaum mehr Sorge als die regelmäßige Entfernung abgeblühter Blumen, damit der Samenansatz den Flor nicht hemmt. Die besten Sorten sind etwa: Coltness Gem, eine englische Einführung mit lebhaft scharlachroten Blumen, die sehr früh erscheinen; Dunecht Yellow und Morgenlicht, zwei gute gelbe; L'innocence, schneeweiß; Kobold, amarathrot; Oranje Vlag, gut orangefarben; Prins Hendrik, weiß mit rosa Schein, und Vesuvius, blutrot.

Th. Hoog jr.

Übersicht

A. EINFACHE DAHLIEN:

Klasse I. Kleinblumige einfache Dahlien:

Blumen nicht über 7,5 Centimeter im Durchmesser. Diese Klasse ist im wesentlichen identisch mit den Show Single Dahlias der Engländer.
a. Hohe Sorten: Pflanzen über 1,25 Meter hoch; Beispiel die Sorte F. C. Heinemann.
b. Mittelhohe Sorten: Pflanzen 60 Centimeter bis 1 Meter hoch; Beispiel die abgebildete Sorte Apfelblüte.
c. Niedrige Sorten: Pflanzen unter 50 Centimeter hoch; hierher gehören die sogenannten Mignon-Dahlien; Beispiel die Sorte Prins Hendrik.

Klasse II. Riesenblumige einfache Dahlien:

Blumen über 8 Centimeter im Durchmesser. Hierher gehören die meisten Decorative Single Dahlias der Engländer. Die Sorten sind im allgemeinen hoch, sodaß sich wenigstens vorläufig eine Unterteilung der Klasse erübrigen dürfte; Beispiel die Sorte Beethoven.

Klasse III. Halskrausen-Dahlien:

Zwischen die großen flachen Strahlenblüten und die Scheibe schaltet sich ein krausenartiger Kranz von kleineren, meist abweichend gefärbten, etwas unregelmäßigen Strahlen ein. Beispiel die abgebildete Sorte Kätchen vom Schwarzathal.

Klasse IV. Anemonen-Dahlien:

Hier sind die röhrig bleibenden Scheibenblüten eigenartig verlängert. Beispiel die Sorte Ada Finch.

B. HALBGEFÜLLTE DAHLIEN:

Die Unterscheidung von Klassen ist hier ziemlich schwer. Vielleicht hält man am besten die Duplex- und die Stern-Dahlien fest.

Klasse V. Stern-Dahlien:

Blumen etwa wie Bild der Sorte Ifield Star oder mehr an eine halbgefüllte Kaktus-Hybrid-Dahlie erinnernd, kaum über 8 bis 10 Centimeter breit. Höhe meist 75 Centimeter bis 1 Meter.

Klasse VI. Duplex-Dahlien (Paeony Dahlias zum Teil):

Blumen etwa den Eindruck halbgefüllter Schmuck-Dahlien machend, Strahlenblüten meist flacher aufeinander liegend als bei den Stern-Dahlien, Blumen rundlicher, gewöhnlich auch etwas mehr gefüllt. Pflanzen 0,80 bis 1,30 Meter hoch.
a. Großblumige Sorten (Large Paeony Dahlias): Blumen über 10 bis 12 Centimeter breit; Beispiel die abgebildete Sorte Schneekönigin.
b. Kleinblumige Sorten (Charm or Miniature Paeony Dahlias), Blumen unter 10 Centimeter breit; in Deutschland bisher nicht vertreten.

C. GEFÜLLTE DAHLIEN:

Allgemeine Kennzeichnung siehe oben; man vergleiche sonst die drei Typen.

KAKTUS-TYP:

Blumen mehr oder weniger strahlig oder krallig. Strahlenblüten flötenartig oder wenigstens im unteren Teile engröhrig, Ränder also deutlich zurückgerollt.

Klasse VII. Kaktus-Dahlien:

Blumen wie die der abgebildeten Sorte Goldene Sonne, stark halbkugelig, Strahlenblüten oft noch länger und enger röhrig und mehr krallig; der Durchmesser der Blumen schwankt etwa zwischen 10 und 17 Centimeter; die Pflanzenhöhe im allgemeinen zwischen 1 Meter und 1,50 Meter. Niedrigere Formen werden jetzt kaum geführt.

Klasse VIII. Kaktus-Hybrid-Dahlien:

Diese Klasse bildet den Übergang zum Schmuck-Typ; Blumen wie etwa die der Sorte Kalif; Strahlenblüten minder stark röhrig und weniger krallig als bei den echten Kaktus-Dahlien. Blumengröße und Form, ebenso Pflanzenhöhe etwa wie in Klasse VII. Auch hier werden niedrige Sorten jetzt kaum geführt.

Die wahre Schönheit der modernen großblumigen Canna kommt immer noch viel zu selten in unseren Gärten zur Geltung. Dies mag zum Teil daran liegen, daß riesenblumige Sorten gegen Wind und Witterung ziemlich empfindlich sind und sehr geschützte warme Lagen brauchen. Solche sind aber nicht zu schwer zu schaffen. Wir haben bereits in Band I, Seite 162, über Züchtung und Kultur berichtet und in Band III, Seite 226, verschiedene Formen dargestellt.

Heute können wir zwei prächtige Neuheiten aus den Canna-Kulturen von Wilhelm Pfitzer, Fellbach, vorführen, die einen Begriff von der Farbenpracht und der Blumengröße vermitteln. Es sind oben die prächtig rote Sorte Präsident und nebenan das sattgelbe Gegenstück von Teichmann. Eine vielversprechende satt lachsrosa Neuheit mit orange Hauch ist ferner Dr.-Ing. Dürr, und auch die Dr. Eckener genannte hell karminrosa Sorte ist wertvoll. – Bilder Hildenbrand

SCHMUCK-TYP:
Blumen im allgemeinen flacher als bei dem Kaktus-Typ und beſonders bei dem Ball-Typ. Ihre Form etwa wie bei den Bildern der Sorten Frau Frieda Falkenhagen, Juweeltje, Emilie Nagels und Trésor Anverſois.

Klaſſe IX. Schmuck-Dahlien
Blumen wie oben beſchrieben, etwa zehn bis fünfzehn Centimeter (Frau Frieda Falkenhagen) Durchmeſſer, Pflanzen über einen Meter hoch. Hierher als Untergruppe: Kleinblumige Schmuck-Dahlien (Roſetten-Dahlien): Blumen unter 7,5 Centimeter Durchmeſſer; Bild Juweeltje.

Klaſſe X. Rieſen-Schmuck-Dahlien
Dieſe Klaſſe wird vielfach mit den Rieſen-Schau-Dahlien zuſammen geworfen, doch die Bilder der Sorten Emilie Nagels und Trésor Anverſois dieſer Klaſſe verglichen mit dem Bilde einer Sorte der Rieſen-Schaudahlien, wie etwa Cardua, zeigen gut den Unterſchied. Blumendurchmeſſer 18 bis 30 Centimeter; Höhe der Pflanzen bis 2 Meter.

Klaſſe XI. Seeroſen-Dahlien
Dieſe Gruppe beſchränkt ſich auf einige wenige deutſche Sorten, von denen Schönes Farbenkönigin ſozuſagen der Typ iſt.

BALL-TYP
Blumen deutlich oder flach kugelig. Die mehr oder weniger deutlich tütenförmigen Strahlenblüten ſind in regelmäßigen konzentriſchen Kreiſen angeordnet, wie die Bilder der Sorten Cardua, Secretaris Voors und Sunſet erkennen laſſen.

Klaſſe XII. Rieſen-Schaudahlien
Blumen flachkugelig, Größe wie bei den Rieſen-Schmuck-Dahlien, ebenſo Pflanzenhöhe.

Klaſſe XIII. Ball-Dahlien (Georginen)
Blumen deutlich kugelig, ſiehe das Bild der Sorte Secretaris Voors; Blumendurchmeſſer zwiſchen 7,5 und etwa 12 Centimeter; Pflanzen über 75 bis 150 Centimeter hoch.

Klaſſe XIV. Pompon-Dahlien
Wie Klaſſe XIII, aber die kugeligen Blumen nur 4 bis 6 Centimeter Durchmeſſer, ſiehe Bild der Sorte Sunſet Unterklaſſe Zwerg-Pompon-Dahlien (Liliput-Dahlien): Pflanzen unter 75 Centimeter hoch: Beiſpiel die Sorte Effekt.

ANNI EPSTEIN / HERBST IN PALÄSTINAS GÄRTEN

SCHON ſeit einigen Wochen zeigen ſich morgens und abends weiße Wolken am ſonſt ſo reinblauen Himmel. Und ſchon kommt an manchen Tagen wieder der »Chamſsie«, der heiße Wind aus der arabiſchen Wüſte, von dem wir in den ganz heißen Sommermonaten verſchont blieben. Eines Morgens wacht man auf mit brennenden Augenlidern und dumpfem Kopf. Der Himmel iſt grau und ſchwer wie Blei, die Luft zum Erſticken ſchwül und der Wind heiß, als käme er aus einem Backofen. Am Abend beginnt es zu blitzen, und in der Nacht geht unter heftigem Gewitter der erſte wolkenbruchartige Regen nieder. Dann weiß man: es iſt Herbſt, wenn auch noch vier bis ſechs Wochen ohne Regen folgen. — Und dieſer erſte Regen ſchon wirkt Wunder. Nach ein paar Tagen zeigt ſich auf der braunen, ausgedörten Erde das erſte Grün. Noch ein paar Tage, und alles iſt überſät mit zarten, lilafarbenen Colchicum, mit Scilla autumnalis und den feinen, zierlichen blaßblauen Muscari parviflorum. Die Feigenbäume beginnen ihre Blätter abzuwerfen, der Johannesbrotbaum, der zum Teil noch ſeine Früchte trägt, bringt neue, kätzchenförmige Blüten, und Quercus Ilex ſteht im vollſten Schmuck ihrer prächtigen Früchte. Man iſt ja zuerſt ein wenig erſtaunt, unſere rieſigen deutſchen Eichen hier als kleinen Strauch wiederzufinden. Aber immerhin ſind es Eichen, und die Früchte ſind ſogar beſonders groß und ſchön mit ihren ſtarken, ſtachelig-ſchuppigen Bechern. Nach einigen Wochen fällt zum zweitenmal Regen, der nun alle acht bis vierzehn Tage kommt. Und nun findet man draußen die weißen Tazettennarziſſen, deren berauſchenden Duft man nie genug atmen kann. Wo nur ein Fleckchen Erde iſt zwiſchen den tauſend Steinen an den Abhängen des Carmel, den wir zu unſerm Wohnſitz gemacht haben, ſprießen Crocus: weiße wie friſchgefallener Schnee, weiße mit dunkelblauen Streifen und Crocus vom zarteſten Lila. Die ſchönen Blätter von Cyclamen latifolium ſchauen ſchon aus jeder Ritze hervor, wer weiß, wie bald auch ſie ihre Blüten bringen mögen.
Man ſollte glauben, daß in einem Lande, wo die Natur den Werkſtoff ſo überreichlich bietet, die Gartenkultur ungeahnte Höhen erreicht haben müßte. Aber da erfährt man hier die größten Enttäuſchungen. Während Damaskus, Ägypten und ein großer Teil des übrigen Orients berühmt ſind wegen ihrer Gärten, findet man in Paläſtina aus älterer Zeit nichts. Nicht allein der Mangel an Waſſer iſt daran Schuld, ſondern zum großen Teil die Herrſchaft der Türken, die das ganze Land in unerhörter Weiſe verkommen ließen. Sie ſaugten das Land aus, ohne ſich um ſeine Kultur zu kümmern. So war der arme Araber, der damals den Hauptbeſtandteil der Bevölkerung bildete, froh, wenn er ſein Stück Brot und ſeine Oliven hatte. Die wenigen reichen Scheichs lebten nicht im Lande, ſondern in Kairo oder Konſtantinopel, und nahmen kein Intereſſe an ihren Beſitzungen in Paläſtina. So ſind arabiſche Gärten ſo gut wie garnicht vorhanden, und die wenigen Anlagen, die es gibt, ſind Europäern ſtreng verſchloſſen.
Sehr viel beſſer iſt es heute in den neuen jüdiſchen Siedlungen noch nicht. Sie ſind noch jung und haben vorläufig all ihre Kräfte nötig zur Bekämpfung der Malaria und Entſumpfung des Bodens. Dennoch iſt ein kleiner Anfang in der Gartenkunſt vorhanden, man ſieht in den neuen Stadtvierteln ganz hübſche Vorgärtchen.
Rechte Oaſen in dieſem gartenloſen Land ſind die deutſchen Kolonien, die Siedlungen der Templer, die vor etwa 50 Jahren aus religiöſen Gründen hierherkamen. Große kunſtvolle Gärten findet man auch dort nicht. Aber es iſt nicht ein Haus, das nicht ein Vorgärtchen hätte, oder, wenn auch dazu kein Platz war, das nicht umſtellt wäre mit Petroleumblechkäſten — die hier zu allen möglichen Dinge nützlich ſind — voller blühender Blumen. Und mit welcher Liebe dieſe deutſchen Gärtchen gepflanzt und gepflegt ſind! Da findet man alles an Pflanzen, was man ſich nur denken kann, von Bellis und Veilchen bis zu den leuchtendſten Canna und den ſtachligſten Agaven, von Löwenmäulchen und Phlox bis zu den ſchönſten Lilien und Chryſanthemen. Wo nur Platz iſt für einen Baum, da ſteht ſicher eine Pinie oder eine Dattelpalme oder wenn genug Waſſer vorhanden iſt, auch eine Muſa mit ihren großen geſchliffenen Blättern. Und ich glaube, nirgends ſonſt ſah ich ſo ſchöne Hibiscus, ſo üppige Bougainvilleen und ſo gut geflegte Granatapfelbäumchen, von denen man nie weiß, ſind ſie ſchöner, wenn ſie ihre entzückenden hellroten Blüten bringen, oder wenn ihre ſchweren runden roten Früchte im dunkeln Laub leuchten.
Eine beſondere Liebe und eine ſchon alte Kultur in bezug auf Gärten findet man bei den wenigen Perſern, die in der Gegend von Haifa und Acco wohnen. Sie gehören zu der Gemeinſchaft des Abbas Baha, der auch in Deutſchland eine Anzahl Anhänger hat. So hat das Grabmal des Sohnes vom Abbas Baha in Haifa einen wundervollen Garten. Eigentlich iſt es nicht richtig zu ſagen, daß das Grabmal einen Garten hat; denn Architektur und Garten ſind ſo zu einer Einheit verbunden, daß man nicht fühlt, daß eins um des andern willen geſchaffen wurde. Das Grabmal iſt ein arabiſcher Steinbau mit flachem Dach und ganz ſtrenger Linienführung. Es liegt etwa auf halber Höhe des Carmel. Der Garten, der zu ihm hinleitet, iſt ein Terraſſengarten, aus vier Abteilungen beſtehend. Zwiſchen jeder Terraſſe, die durch ſtarke Steinmauern abgeſtützt ſind, beſteht ein Höhenunterſchied von etwa 4 Metern. Auf vielen Steinſtufen ſteigt man von einer Terraſſe zur andern, und alles, Treppen, der ſtets ſauber mit Muſcheln beſtreute Weg, die grünen, von rot und weißen Pelargonien eingefaßten Raſenflächen mit den Reihen von Fächerpalmen zu beiden Seiten des Weges, die ſchmalen Rabatten mit Löwenmäulchen, Roſen und Chryſanthemen und die ſchlanken Cypreſſen, die den Abſchluß nach außen hin bilden, leiten auf das Gebäude zu. — Auch der Garten vom Grabmal des Abbas Baha in Acco iſt ſchön. Doch wirkt er nicht ſo ſehr durch ſeine Architektur als durch die Fülle von Blüten, die es dort gibt. Da leuchtet es durcheinander von gelben und weißen Chryſanthemen, roten Roſen, ſtrahlend blauen Winden und brennend rotem ſpaniſchem Pfeffer. Das Schönſte in Acco iſt aber der Hof der Moſchee, ſo würdig ernſt und wohltuend ruhig. An die Moſchee, ein einfaches Gebäude im arabiſch-mohammedaniſchen Stil, ſchließen ſich in weitem Kreis die Gebäude an, in denen die Schüler des Scheichs ihre winzigen Stübchen haben. Der Mittelpunkt dieſes Kreiſes iſt der ſechseckige Brunnen, an dem die Gläubigen ihre Waſchungen vornehmen, bevor ſie zum Gebet gehen. Er iſt ſehr ſchön mit ſeinen kuppelförmigen, tief niedergezogenen Dach, umſtanden von hohen Pinien und Cypreſſen. Rings um den Steinplattenweg, der an den Gebäuden vorbeiführt, ſtehen ſchöne alte Bäume, zwiſchen denen Bougainvilleen klettern, Hibiscus und Datura blühen und die hier ſehr geliebten Zinnien und Löwenmäulchen ihre bunten Blüten bringen. Auch hier iſt Architektur und Pflanzung innig miteinander verſchmolzen.

NOCHMALS IRIS SUSIANA

UEBER Iris susiana wurde im Maiheft (Seite 122) von Friedrich Bauer geſchrieben, und wir gaben dazu ein Bild, das uns als Iris susiana zuging. In Wirklichkeit handelte es ſich wohl um eine andere Art dieſer Gruppe, nämlich um Iris ſofarana magnifica. Das Bezeichnende der Iris susiana iſt von Bauer ſehr genau beſchrieben worden und liegt darin, daß die Petalen ſich hier oben nicht domartig ſchließen und im Verhältnis zu den Hängeblättern recht groß ſind, wogegen die abgebildete Iris ſofarana im Vergleich etwas größere Hängeblätter hat. Wir geben daher heute noch ein Bild Friedrich Bauers, das die echte Iris susiana ſehr gut kennzeichnet und den Unterſchied deutlich macht. *C. S.*

ERICH WOCKE / HERBSTLICHE WIESENPRACHT IM SCHLESISCHEN VORGEBIRGE

EIN lachender Frühherbſtmorgen zu Anfang September. Aus der nebelumflorten Ferne hebt ſich der weite Gebirgskranz hervor; Kuppe um Kuppe taucht auf: — das Eulengebirge, die Silberberger Kämme mit ihrem ſcharf umriſſenen Feſtungswerk, der Königshainer Spitzberg mit ſeinen Trabanten, die Reichenſteiner Berge, jetzt auch noch ſchwach aber deutlich umriſſen die Menſe, die Heuſcheuer, der breite Rücken des Glatzer Schneeberges und nun gar die feine Linie des Altvatergebirges; ſo ſind ſie alle wach geworden. Verklärt vom roſigen Hauche der Morgenſonne heben ſie ihre ewigen Häupter in die tiefer und tiefer blauende Morgenluft.

Ich ſchreite durch das taufeuchte Wieſental; links neben mir der hurtige Pauſebach, zu dem ſich zwiſchen wehendem Weidengebüſch grell rotbeerige Schneeballſträucher gefunden haben, die mit lila beſterntem und zugleich hochrotfrüchtigem Bitterſüß (Solanum Dulcamara) und weißen, trichterblütigen Wildwinden (Calystegia sepium) behangen ſind. Weiter ab zur Rechten zu ſanften, fruchtbaren Weizenhügeln und unermeßlichen, duftenden Kleegärten anſchwellende Hänge mit blühenden Roſen, wilder Heide (Calluna vulgaris), würzigem Thymian (Thymus vulgaris), gelben Ginſterbüſchen (Genista tinctoria) und buntem Wachtelweizen (Melampyrum silvaticum), Reſte verblichener Kiefernbeſtände. Und nun beginnt es ſich auch hier unten zu erhellen. Die letzten, grauen Schwaden wallender Morgennebel teilen ſich, zerfließen im Äther, ein erſter lachender Sonnenblick gleitet über die Wieſen hin, »es glänzt der Tau in den Gräſern der Nacht« ... Ich mache Halt in meiner Wanderung in kaum wahrnehmbarem Pfade; ein weites, ſtilles Blumenfeld liegt zu meinen Füßen, und ich zögere, die liebliche Pracht zu durchſchreiten.

In das ſaftig taufriſche Wieſengrün haben ſich breite, ſchwellende Kiſſen des großblumigen Wieſenaugentroſtes (Euphrasia pratensis) geſchlichen, wie weitoffene, träumende Kinderaugen blicken ſie ſcheu in die ſchimmernde Morgenhelle und ſchmiegen ſich wie Schutz ſuchend in die Gehege des gewöhnlichen Wieſenſtorchſchnabels (Geranium pratense), mit deſſen wunderlieblich feinem Blaulila ſie unüberſehbare Weiten in ein wohligfriedliches Farbenkleid von zarteſter Keuſchheit hüllen.

Und dieſe unermüdlichen Geranien, die ſeit Ende Mai ihre Zier zur Schau tragen, ſind erſt wenige Wochen vorher der klingenden Senſe des Schnitters im Hochſchmuck ihrer Sommerpracht zum Opfer gefallen; ihr Neutrieb in zarterer, beſcheidenerer Verjüngung birgt aber immer noch genug warmer Lebens- und Farbenwonnen und zählt zum erleſenſten Schmuck der Herbſtwieſe.

Wo im Frühjahr Schneeglöckchen (Galanthus nivalis) und Märzbecher (Leucojum vernum) mit hellgelben Himmelſchlüſſeln (Primula elatior) wetteiferten, wo um die liebliche Pfingſtzeit unzählige Orchideen (Orchis Morio, mascula und sambucina) in ſattem Karmin oder Gelb das bunte Alltagsheer der wilden Wieſenkräuter an Vornehmheit überragten, quillt jetzt nochmals letzter, reicher Erdſegen aus dem ſchier unerſchöpflichen Schoß dieſer fruchtbaren Scholle, ſchmückt ſich nochmals die Aue mit blendendem Geſchmeide und ſpendet auch dem nüchternen Bauer noch eine reiche, volle Ernte duftenden Heues als Erſatz für die etwas magere Sommerung.

Und was ſich da alles noch zum Abſchiede Stelldichein gegeben: Weiße Wucherblumen (Leucanthemum), hell- und dunkelblaulila, kraftvolle Skabioſen (Succisa pratensis), allerlei gelbe Korbblütler, (Crepis, Hieracium, Picris), dunkelrotbrauner Wieſenknopf (Sanguisorba officinalis), der die anderen langhalſig ſtolz überragt, hellgelbe und tiefkarminrote Wieſendiſteln (Cirsium oleraceum und canum nebſt ihren Miſchlingen), tiefdunkel lila Glockenblumen (Campanula glomerata), roſa Lichtnelken (Melandryum rubrum und Verwandte) und andere mehr. Wo eine Geländeſenkung ſumpfartigen Charakter annahm, heben ſich die ſtolzen Kerzen leuchtend karminroter Weiderichſtauden (Lythrum Salicaria), von herzig einfältigem Vergißmeinnicht und ſilbrigem Wollgras (Eriophorum angustifolium) umſtanden empor. — Alle aber durchblinkt der lieblichſte aller Spätlinge: die zart roſige Herbſtzeitloſe (Colchicum officinale), deren ſonnenlüſterne Blütenſchalen der jetzt noch blattloſen, tiefgebetteten, giftigen Knolle entſteigen und zuweilen in weithin beherrſchender Flut die ganze holde Blumengemeinſchaft in ein märchenhaft roſiges Licht tauchen, das an orientaliſche Spät-Krokuswieſen heranreicht. Welche Schmuckmöglichkeiten eröffnen ſich da für weite, freie Parkwieſen, deren herbſtliche Langweiligkeit noch einmal launige Lebensluſt verklären könnte!

R. BERGFELD / VON MALERISCHER GARTENGESTALTUNG

DER Landſchaftsmaler weiß es recht gut, weshalb ein neuerrichtetes Gebäude ihn niemals reizen kann, den Pinſel zur Hand zu nehmen. Erſt wenn die Zeit ihre Spuren überall eingegraben hat, wenn der allmähliche Verfall eingeſetzt hat, eine Folge des Kampfes der Naturgewalten gegen alles menſchliche Schaffen, tritt der unerſchöpfliche maleriſche Reiz ein, den die Naturform den Dingen verleiht. Nicht allein in den menſchlichen Kulturwerken tritt dieſe Naturform als die Wirkung der kosmiſchen Einflüſſe auf, ſondern ebenſo in den Dingen der Natur ſelbſt, in den Organismen, zumal den Pflanzen, in allen Einzeldingen, in den typiſchen Charakteren der Landſchaft, die bei den gleichen phyſikaliſchen Vorausſetzungen ein gleiches Geſicht tragen müßten, wenn nicht die unüberſehbare Mannigfaltigkeit in der Wechſelwirkung der Naturgewalten die Wiederholung gleichförmiger Bildungen ausſchlöſſe. Der Baum trägt in ſeiner Keimanlage den Willen zu einer beſtimmten Geſtalt, deren Entwicklung durch die Einwirkung von Froſt, Wind, Beleuchtung, Dürre und viele andere Umſtände beeinträchtigt wird, was inbezug auf die maleriſche Erſcheinung des Baumes eine Steigerung bis in das höchſte Alter bedeutet.

In der Unberechenbarkeit des kosmiſchen Geſchehens liegt das Geheimnis des Zaubers einer reizvollen Landſchaft verborgen. Es liegt darin aber auch die Erkenntnis, daß ein Naturformgarten niemals konſtruktiv im Sinne des Bauens, ſondern nur gefühlsmäßig entſtehen kann. Nur die Freude an der Schönheit von Linie, Form und Farbe, die Freude an dem Gehalte der Stimmungen, welche die überreichen Mittel der Naturform möglich machen, läßt die Geſtaltung des Naturformgartens berechtigt erſcheinen. Und weil Kunſtſchaffen nicht gleichbedeutend iſt mit Naturnachbildung, ſo werden auch naturwiſſenſchaftliche Begründungen oder pflanzenökonomiſche Theorien niemals ein Schritt zur Kunſt im Garten ſein können. Zwiſchen dem Künſtler, welcher mit dem Formengedächtnis ſeiner Naturbeobachtungen frei ſchafft, und ſeinem Werke, dürfen nicht Geſtaltungs-Theorien ſtehen, die von jeher zu einer Verflachung geführt haben. Es iſt weder die panoptiſche Naturwahrheit, noch überhaupt das Gegenſtändliche, ſondern die Wirkung von Form, Linie und Raum, was zuletzt über den Wert des Kunſtwerkes entſcheidet.

Werfen wir nun einen Blick auf den früheren Landſchaftsgarten, der durch die Richtung unſerer Zeit zur architektoniſchen Geſtaltung beiſeite gedrängt worden iſt. Es iſt wohl anzunehmen, daß ſich in der zeitlichen Auffaſſung, die damals Geltung beſaß, nicht nur unfähige Köpfe um künſtleriſche Ziele in eben dieſer Auffaſſung bemüht haben, und gerade deswegen wird es lehrreich ſein, die Irrtümer aufzudecken, an denen ſchließlich der Landſchaftsgarten zugrunde gehen mußte.

Wie behandelte man beiſpielsweiſe die Wege? In ſchön geſchwungenen Kurven, mit gleichlaufenden, gepflegten Rändern gezogen, vermieden ſie auch in der Höhenführung jede maleriſche Eigenart, um in ſanfter, gleichmäßiger Steigung oder Senkung dem gehaltloſen Ideal einer Schönheitslinie zu entſprechen, die mit der Naturform eine harmoniſche Verbindung niemals eingehen konnte.

Nicht viel anders war es auch mit der Modellierung der Bodenoberfläche. Die »gefällige« Form eines ſanft und gleichmäßig geſchwungenen Kurvenprofils wuchs ſich hier zu einem handwerklichen Schema aus, und wo dieſe »ausgebügelte« Bodenplaſtik fehlte, ließ die ausdrucksloſe Horizontale des ganz flachen Geländes das Bild nur noch unerträglicher erſcheinen.

Das »Anmutigliebliche« der ſchönen Kurven ſpielte auch bei den Uferführungen der Gewäſſer eine Rolle, und es milderte auch hier nicht den Eindruck der Manieriertheit, wenn man das Ideal der Aulandſchaft als Vorbild für den Park ausgab.

Bei den Maſſen der Gehölzpflanzungen ergab ſich die gleiche, unfruchtbare Schematik aus dem Grundſatz, dieſe Maſſen auf konzentriſcher Grundform zu pflanzen, weil ſich die Gehölzmaſſen auch in der Natur konzentriſch und gleichmäßig nach allen Seiten ausbreiteten und verjüngten. Der Irrtum in dieſer Behauptung iſt unſchwer zu verſtehen, wenn man ſich erinnert, daß die Naturform gerade das Ergebnis des Widerſtreits der Naturgewalten gegen das Geſtaltungsprinzip des einzelnen iſt.

Im Aufbau der Laubmaſſen und in der Beziehung dieſer zu den offenen unbepflanzten Teilen des Parks, den Wieſen und Waſſerflächen, galt das Verhältnis des goldenen Schnitts als Ideal der höchſten Schönheit. Mit dieſem Hauptlehrſatz und mit vielen anderen Theorien, die für den Landſchaftsgarten feſtgelegt waren, entfernte man ſich immer weiter von dem eigentlichen Weſen der Naturform und ließ den Garten zu einem klug angelegten, aber künſtleriſch unfruchtbaren Schema werden.

Wenn man bemerkt, zu welcher Verarmung in künſtleriſcher Erfindung die Entwicklung einer faſt durch 200 Jahre gepflegten landſchaftlichen Gartenkunſt in Europa geführt hat, muß es beſonders verwundern, daß der Hauptanſtoß zu dieſer Kultur von

dem japanischen Garten ausgegangen ist. Von den rituellen Beziehungen dieses Gartens ganz abgesehen, offenbart sich darin ein erstaunlich feines Stilempfinden und künstlerischer Erfindungsreichtum, ein hochentwickeltes Verständnis der malerischen Erscheinung landschaftlicher Linie, an charakteristischer Eigenart von Baum, Strauch und Gestein. Die oft an das Bizarre grenzenden Erscheinungen sind viel weniger Eigentümlichkeiten des östlichen Klimas als eine Folge des gestaltenden Willens, der seine Naturobjekte mit bestimmter Absicht wählt und ihren Eigenarten gemäß behandelt.

Für die Beurteilung der Möglichkeiten einer Naturformgestaltung im Garten erscheint es besonders wesentlich, daß der eigentliche Werkstoff des Künstlers in dem beweglichen, in natürlicher Fortentwicklung befindlichen Körper der Neuanlage gesehen wird, aus welchem im Laufe der Zeiten beständig neue Schönheiten herauszuentwickeln sind. Es wäre durchaus verkehrt, wollte man einen Garten so anlegen, daß die Vollendung einer beabsichtigten Wirkung erst mit den erwachsenen Bäumen einsetzt. Um zu dieser Wirkung zu gelangen, müßte der Garten zum mindesten unter der Leitung seines Urhebers bleiben können. Was ein für allemal in den Hauptzügen festgelegt sein muß, ist vielmehr als die Pflanzung eine durchdachte Modellierung der Bodenoberfläche, die gleichzeitig die Gestaltung stehender oder fließender Gewässer mit einschließt. Denn mit dem Anwachsen der Gehölze ist auch die Bodenform dauernd festgelegt. Auch ist es für den Gesamteindruck nicht ohne Bedeutung, daß die Bäume einen reizvollen Ansatz des Wurzelhalses erkennen lassen, wie er sich besonders schön an abhängender Lage bei möglichst hoher Pflanzung des Gehölzes entwickelt.

Die plastische Behandlung des Bodens ist für die Gestaltung des Naturformgartens von so großer Bedeutung, daß man der Neuanlage unbedingt einen Modellentwurf voraufgehen lassen sollte. Die perspektivischen Überschneidungen der Bodenprofile, wie unerheblich auch die Höhenunterschiede sein mögen, ermöglichen erst die harmonische Linie im Gesamtbilde des Gartens, die mit einer ausgewogenen Fläche nicht zu erreichen sein würde. Das Gleiten einer Kurve wird hier unterbrochen durch die mannigfaltigen Zufälligkeiten der Naturform, oder ihr Schwung wird durch eine entgegengesetzte Bewegung plötzlich aufgehalten, und der Reiz des Profils wird erhöht, indem das Wachstum des Grundes je nach der örtlichen Eigenart des Bodens von Wiese, Ried, Heide und Moos oder anderen wildwachsenden Rasenpflanzen gebildet wird, oder indem stellenweise der nackte Boden zum Vorschein kommt. Der Fels ist als wertvolle Unterstützung einer Bodenplastik sehr zu schätzen, wird aber nur bei natürlichem Vorkommen im Gelände umfangreich zu verwenden sein. Einzelne Findlingsteine sind dagegen technisch zu meistern und ermöglichen mit geringem Aufwande oft überraschende Wirkungen. All die unzähligen Einzelheiten, zu denen der Gartenkünstler die Tätigkeit seiner Mitarbeiterin, der Natur, nicht entbehren kann, wie das Auswaschen und Unterspülen des bewaldeten Ufers, die Entwicklung von Pflanzenwuchs am Wasserstand, das Wirken des Blumenteppichs einer Wiese, sie lassen sich vom Gestalter nur in großen Zügen vorbereiten und dann in ihrer Entwicklung überwachen. Ein bedingtes Gewährenlassen der Natur ermöglicht erst die malerische Uferbildung auch kleiner Wasserflächen, die reizvolle Entwicklung des Bachlaufes. Nicht große, ungeteilte Wasserflächen, breite langgestreckte Flußläufe eignen sich für die bewegte Linie des Naturformgartens, die mehr zu der Form inselreicher, kleiner Gewässer mit vielgestaltiger Uferführung neigt, und zum schmalen Bachlauf, der sich teilen oder zu Inselteichen erweitern läßt.

Die Raumbildung des Gartens, zu der die Bodenbewegung nur eine Andeutung geben kann, entwickelt sich mit der Gehölzpflanzung. Solche Gehölzarten, die von Natur zu einer malerischen und phantastischen Bildung neigen, wie etwa der Wacholder oder die Hainbuche, kommen dem bewegten Linienspiel der Naturformen am meisten entgegen, und es wird für den Aufbau des Gartens wesentlicher sein, eigenwillige Pflanzenpersönlichkeiten zu gewinnen, als eine große Artenzahl zu vereinigen. Es sollten überhaupt nur Vertreter der einheimischen Flora in dem Garten verwendet werden, der doch auf die Physiognomie einer engeren Heimat abgestimmt ist. Wenn man sich an die Art der Pflanzung in Baumschulabständen, an das Anpfählen der Baumstämme zur Erreichung eines geraden Aufwärtswachsens im alten Landschaftsgarten erinnert, so hat man den sichersten Anhalt, wie es im Naturformgarten nicht gemacht werden soll. Phantastische Neigungen, Windungen und Verästelungen der Stämme lassen sich durch Auswahl der Arten, durch die Art der Pflanzung und durch künstliche Maßnahmen, wie Bildung von Stockausschlag, erzielen. Eine ausgiebige Verwendung der einheimischen Schlingpflanzen ist für Belebung des Baumschlages sehr wertvoll, und es scheint in dieser Richtung ein noch unerforschtes Gebiet zu liegen, das für diese Linienführung neue Möglichkeiten verspricht.

Um eine Lösung für die Einfügung menschlicher Kulturwerte, wie Wege und Baulichkeiten, in den Naturformgarten zu finden, ist es notwendig, einen Ausdruck zu

suchen, der in der Erscheinung des Gartens harmonisch mitschwingt. Die Bildung der Wege ergibt sich in zwangloser Weise, sobald die Anlage des eigentlichen Gartens vollendet ist. Und es werden sich hierbei malerische Bereicherungen des Bildes erzielen lassen, wenn man die Naturformlinie auch im Wege wieder aufnimmt, wenn man sie in wechselnder Breite, mit malerischen Zufälligkeiten in Perspektive und Höhenführung, zuweilen geteilt oder platzartig erweitert und mit natürlicher Randbildung, infolge der Bodenbewegung immer nur teilweise sichtbar, verlaufen läßt.
Auch die erforderlichen Bauwerke werden sich in den schlichtesten heimatlichen Formen ohne Nachbildung bestimmter Motive als Steigerungen des Ausdrucks erweisen. Die Schwierigkeiten der Aufgabe erfordern hier, wie überhaupt, das feine Taktgefühl des Künstlers und seine malerische Begabung. Der Naturformgarten ist kein Wohngarten im eigentlichen Sinne. Er stellt eher eine Galerie plastischer Gemälde vor und kann mit den Nutz- und Wohngärten, die um das Wohngebäude gelagert sind, in keine überleitende Verbindung gebracht werden, soll vielmehr dem architektonischen Komplex etwa als ein dekorativer Hintergrund ganz unvermittelt angegliedert sein.
Durch die schroffe Gegenüberstellung der Natur- und Kulturformen ergibt sich eine bedeutende Steigerung der gegensätzlichen Charaktere. Jedenfalls sollten in diesem Zusammenhang die Bauformen ein bodenständiges Gepräge tragen und nicht exotische Stilexperimente darstellen, wie es der moderne Betonstil schließlich doch ist. Das Wohnhaus ohne jeglichen Ausklang in die Naturformen hineinzustellen, wird künstlerisch kaum möglich sein.

PAUL KACHE / SCHMUCKVOLLE BLATTFORMEN

DER Reichtum an Blattformen ist unerschöpflich. Es ist, als ob die Natur hierin eine Parallele geschaffen hätte zur Formengestaltung der Blütengebilde, als ob sie den mit wenig auffallenden Blüten bedachten Gewächsen einen Ersatz in der wechselvollen Form der Belaubung verliehen hätte. Dies gilt für alle Gewächsgruppen, insonderheit für Laubgehölze. Man vergleiche hier die Blattformen einer artenreichen Strauchgattung, etwa die von Philadelphus, von Prunus oder anderen, mit denen baumartiger Gehölze, etwa der Gattung Acer oder Quercus. Hier ist, wie es die Ahorne so recht deutlich zeigen, die Variabilität der Blattformen innerhalb der zahlreichen Arten erstaunlich groß. Wer diese Gehölze nicht kennt, kann bisweilen im Zweifel sein, ob er tatsächlich ein Ahornblatt vor sich hat oder nicht. Andererseits mag vielleicht eine Grundform vorhanden sein, wie sie das Eichenblatt zeigt, die aber dennoch je nach den Arten solch wechselvolle Abänderungen nach zwei Richtungen zeigt, daß die Endglieder schließlich auch die Frage aufkommen lassen, ob es sich tatsächlich noch um ein Eichenblatt handelt. Denn die Blattform unserer heimischen Eichen, die uns allen so vertraut ist, ist eben nur als Grundform anzusehen. Andere Arten, wie nordamerikanische, zeigen nach einer Richtung hin die typischen Einbuchtungen nach und nach tiefer, schärfer, die Abschnitte zackiger, spitzer werdend, bis schließlich von der typischen Form nichts mehr übrig geblieben ist. Andererseits tritt aber auch eine Vereinfachung der Form auf. Die Einbuchtungen werden flacher, geringer, die Abschnitte runden sich ab, fallen zusammen, bis allmählich nur noch eine seichte Wellenlinie herauskommt, die letzten Endes sich völlig streckt und straff vom Stielende bis zur Spitze verläuft. Von der typischen Eichenblattform ist nur eine Art Weidenblatt übrig geblieben, wie etwa bei Quercus phellos.
Doch abgesehen von der Blattvariabilität bei den Arten, ist auch eine solche im Formenkreis mancher Arten selbst zu beobachten. Die für die betreffende Art typische Blattform löst sich auf in Spielformen, dabei völlig neue, eigenartige, bisweilen bizarre Gestalten annehmend. Ein wundervolles Beispiel bietet Acer palmatum. An sich ist sein Blatt schon von schöner ornamentaler Form. Doch wie ganz anders ist sie bei dem prachtvoll fein, fast fiederig zart geschnittenen Blatt von palmatum ornatum oder dem ähnlichen und doch anders ausschauenden rubellum. Fast wie feines Spitzengewebe muten diese Blattformen an. Eigenartig fein ist wiederum die Form Frederici-Guilelmi, fast bizarr sind die Formen von crispum oder cristatum. Aber auch alle die anderen sehr zahlreichen Formen haben völlig verschiedene Blattgebilde, so ähnlich sich auch manche sein mögen. Wohl kaum eine andere bekannte Art unserer Laubgehölze weist diesen Reichtum an Blattformen auf. Höchstens kommt noch Ilex aquifolium ihr einigermaßen nahe. Dafür aber übertrifft Acer palmatum diese in der Schönheit ihrer Farbenfreudigkeit.
Eine bestimmte, fast überall an erster Stelle auftretende Variation der typischen Blattform ist die geschlitztblättrige oder laciniata-Form. Sie stellt das Auflösen des typischen Blattes in das Gerippe feiner Aderung dar. Mehr oder minder tiefe Einschnitte in das Blatt holen die Hauptform des Adernetzes bisweilen überraschend scharf und klar heraus. Die ganze Blattspreite beschränkt sich auf ganz schmale Bänder beiderseits der Hauptadern. So kommt es, daß manche dieser Blattformen von wundervoller Feinheit sind. Recht anschaulich zeigt dieses die im Bilde wiedergegebene *Sambucus nigra laciniata*, die aber oftmals, zumal an älteren Kurztrieben, noch weit feinere Blattformen bringt. Wie streng, ja fast pedantisch sachlich andererseits aber diese laciniata-Formen werden können, bringt der ebenfalls abgebildete Zweig von *Quercus robur pectinata* zum Ausdruck. Hier ist das Blatt bis auf schmale Ränder entlang der Nervatur zurückgegangen, sodaß es fast einer Fiederung nahe kommt. Diese neue Blattform kann von ganz besonderer Schönheit sein. Bisweilen allerdings verliert sie etwas von ihrer festen Regelmäßigkeit.
In der Art des erstgenannten Beispiels gibt es eine ganze Reihe geschlitzter schöner Formen. Viele Gattungen besitzen sie. Um bei Sambucus zu bleiben, zeigt *S. nigra latisecta* eigentlich etwas Gegensätzliches zur laciniata. Die Einschnitte schälen breitere, stumpfere Abschnitte heraus, die viel massiger wirken, als es bei laciniata der Fall ist. Aber auch S. racemosa bringt in seinen Formen laciniata und plumosa ganz eigenartige Blattgebilde, die besonders bei plumosa dem Strauch etwas Zartes, Duftiges geben. Selbst bei S. canadensis kommt eine laciniata-Form vor. Sie hat gleichfalls ein sehr fein zerteiltes, geschlitztes Blatt, das aber von regelmäßigerer Form ist als bei S. nigra.
Von starkem Wuchs und durch große, wirksame Belaubung auffallend sind die laciniata-Formen von Rhus glabra und R. typhina, die als sehr schmuckvoll gelten können. Sie sind es zumal dann, wenn man die gepflanzten Büsche in jedem Winter stark zurückschneidet, so daß sie üppige Langschosse hervorbringen.

Quercus sessiliflora heterophylla

Quercus robur pectinata

dentlich fein zersägte, scharf eingeschnittene Blattformen zeigt auch Corylus Avellana urticifolia, eine mäßig wüchsige, gut buschige Form. Auch die Hainbuchenform, Carpinus Betulus incisa, hat eine fein geartete Belaubung. Außerordentlich fein ist dann das Blatt von Betula verrucosa laciniata, das auch bis auf die Grundformen der Nervatur zerteilt erscheint. Da das Gezweig dieser Birke recht dünntriebig und hängend ist, zeigt der Baum in seiner ganzen Form ein zierliches, duftiges Bild. Er ist wohl mit zu den Baumformen zu zählen, die nicht nur den feinsten, ja durchsichtigsten Aufbau haben, selbst bei voller Belaubung, sondern diese Eigenschaft auch im Sommer wie im Winter zur Schau stellen. Noch sei an Caragana arborescens Lorbergii erinnert, eine Form mit auffallend zierlich geformter Belaubung, die im Gesamtbild jedoch durch die Kleinheit des Blättchens unruhig wirkt.

Diese haben eine unendlich fein zerschnittene, zersägte Belaubung von wundervoller Feinheit. Ganz unerklärlich bleibt, weshalb diese schmuckvollen Formen bisher so gar keine Liebhaber fanden.

Eine weitere eigenartige Schmuckform ist Fagus silvatica asplenifolia, deren schmales und feines Blatt das dichte Geäst voll kleidet und dem Gesamtbild des Baumes ein sehr charakteristisches Gepräge gibt. Es ist im Äußeren eine recht angenehme schöne Baumform. Gewisse regelmäßige Blattgebilde zeigen dann verschiedene weitere laciniata-Formen, wie etwa Alnus incana laciniata oder A. glutinosa laciniata und A. glutinosa imperialis. Bei ihnen ist das Blatt wiederum mehr oder weniger in die Grundform seiner Nervatur aufgeteilt, fast ähnlich der oben schon genannten Quercus. Nur ist das Blatt der Alnus-Formen weit zierlicher, bei der starkwüchsigeren imperialis-Form von bestimmter Schönheit. Es ist gerade bei diesen Alnus zu beachten, daß üppige Langschosse die schönere, regelmäßigere Blattform zeigen, während schwache Kurztriebe ein recht unregelmäßiges, auch kleines Blatt haben. Darum ist hier Rückschnitt erforderlich. Außerordentlich

Sambucus nigra filifolia

Waren die laciniata-Formen mehr oder minder schmuckvoll in ihrem Ausdruck, so wirkt eine andere Gruppe, die mit der Benennung heterophylla so treffend gekennzeichnet ist, mehr eigenartig als schön. Ein gutes Beispiel gibt das Bild von *Quercus sessiliflora heterophylla*. Es zeigt so deutlich die Verschiedenartigkeit der Blattformen. Neben dem fast völlig typisch ausgebildeten Blatt stehen allerlei Abweichungen und Übergänge, die bis zur vollendeten, weit in die Länge gezogenen, schlank oder fast lockig herunter hängenden Fadenform gehen. Eine ganze Reihe anderer Arten zeigt ähnliche heterophylla-Formen, so Q. robur heterophylla, Fagus sylvatica heterophylla und Juglans regia heterophylla. Allerdings ist es nicht so, daß in den Blattformen zwischen diesen Gehölzen eine bestimmte Gleichartigkeit besteht. Sie kann nur darin liegen, daß eben die Heterophyllie die sonderbarsten Blattgebilde nebeneinander stellt.

Sambucus nigra laciniata

Die eigentliche Grundform des Blattes der be-

treffenden Art gibt dann Anlaß zu den sonderbarsten Abänderungen.

Quercus sessiliflora Louettei

Daß aber auch andere Formen recht sonderbare Blattgebilde hervorzaubern können, zeigt das Bild von *Sambucus nigra filifolia.* Hier sind nur noch Ansätze der eigentlichen Blattform der Art vorhanden. Sonst ist die verschiedenste Verschmälerung der Fiederchen zu erkennen, die gewöhnlich in lange Fäden auslaufen. Ob man allerdings hier von einer gewissen Schmuckwirkung reden kann, muß stark bezweifelt werden. Und dennoch werden auch solche sonderbaren Blattvarietäten ihre Liebhaber und Freunde finden. Auch Quercus robur filicifolia zeigt eine ähnliche, fadenartig gestaltete Belaubung, die wie bei der vorher genannten Form natürlich ebenfalls sehr variabel ist.
Noch weniger zierend dem Aussehen nach als eigenartig-bizarr sind die sonderbar blasig aufgetriebenen, ganz verschieden gekrümmten und gelappte Blätter unregelmäßig aufgeblasen sind. Hübsch ist ferner noch die eigenartige, niedliche Spiraea bullata, die ein ganz charakteristisches Bild darstellt und dem Gehölzfreund durchaus zu empfehlen ist, wie auch die Sp. Bumalda crispa.
Schließlich sei noch einiger ganz besonders auffälliger Blattformen gedacht, die aber auch nicht für die allgemeine Verwertung im Garten oder Park, sondern nur für Sammler solcher kurioser Formen in Betracht kommen. Ein Beispiel starker Verschiedenheit in der Blattausbildung bietet der Papier-Maulbeerbaum, Broussonettia papyrifera, dessen ungemein feinzerteilte Blattvarietät laciniata den Eindruck macht, als sei der ganze Busch von Raupen zerfressen oder von einem schleierartigen Gespinst überzogen. Er wirkt in der Tat krankhaft. Auch die echte Maulbeere, Morus alba, hat eine höchst variable Blattracht. Es sei nur auf var. multicaulis verwiesen, die etwa der oben bei Quercus erwähnten var. cullata entspricht und auch unter diesem Namen bekannt ist. Ferner auf var. nervosa oder urticifolia, bei deren monströsen Blättern die Nervatur stark hervortritt.

Quercus sessilifolia cucullata

genen festen Blattformen, wie sie im Bilde von *Quercus sessiliflora cucullata* angedeutet sind. Auch hier ist natürlich der Variation kaum eine Grenze gesetzt. Freunde solch seltsamer Blattformen finden in ihnen dankbare Objekte. Der an Ordnung und Peinlichkeit gewöhnte Gartenfreund wird allzu leicht die Ursache der vorliegenden Blattvariationen im Befall von Ungeziefer, wie Blattläusen, suchen. Und doch ist dies nicht der Fall, denn dieses Gehölz erhielt seine so seltsame Belaubung von Mutter Natur mitgegeben. Andere Gehölze, wie Acer platanoides crispum, Colutea arborescens crispa, Fagus sylvatica cristata zeigen wiederum andere krause, recht interessante Blattformen. Derjenige, der sich dafür interessiert, wird fast in allen größeren Gattungen ähnliches finden, ohne besonders suchen zu müssen. Selbst heute kommen noch derartig neue Formen in den Handel, wie es Sambucus racemosa Hessei beweist, deren kaum ge-

Sambucus nigra latisecta.
Bilder C. S.

RICHARD ROTHE / AMERIKANISCHE GÄRTEN

Lynwood Hall

WER während der letzten drei Jahrzehnte Gelegenheit nahm, den fortſchreitenden Werdegang in der allgemeinen Verſchönerung des wohlhabenden amerikaniſchen Heimes zu beobachten, dem dürfte die Tatſache nicht entgangen ſein, daß wir in dieſer Zeitſpanne auch in allem, was die Verfeinerung unſerer Gärten betrifft, einen ganz bedeutenden Aufſtieg zu verzeichnen hatten. Man mag die Entwicklung der Dinge der erſt in neuerer Zeit erſchienenen, zumeiſt auf durchaus beachtenswerter Höhe ſtehenden, einheimiſchen Gartenliteratur zuſchreiben. Außerdem iſt auch die erſte Generation der Abſolventen unſerer jungen Fachſchulen in den vergangenen beiden Jahrzehnten mehr hervor getreten. In letzter Inſtanz hängt jedoch der Erfolg jeder nach der gegebenen Richtung hin angeſtrebten, fortſchrittlichen Bewegung immer von der Haltung des Publikums ab. Seitens der intellektuellen, mehr oder weniger wohlhabenden Schichten ließ ſich von Anfang an für die einſchlägigen Bücher und Journale eine entſchieden lebhafte Aufnahmefreudigkeit feſtſtellen.

Als eine Folgeerſcheinung begegnen heute Landſchaftsgärtner und Gartenarchitekten durchgängig höheren Anſprüchen und einer höheren Bewertung von gartenſchönheitlichen Schöpfungen, was zumeiſt auf einem erfreulichen Maße von Verſtändnis beruht. Ohne beſonderen Wert auf das Studium kunſtgeſchichtlicher Zeitepochen des alten Europas mit ihren verſchiedenen Gartenſtilen zu legen, ohne eine eigene Geſchichte, ja ſelbſt ohne markante Spuren einer bisherigen bodenſtändigen Tradition ſind wir im letzten Jahrzehnt in eine Aera intenſivſter Tätigkeit eingetreten, die in der Geſamtheit des Entſtandenen beſonders an mittleren und kleineren Vorſtadtgärten eine erfreuliche Anzahl von »vom amerikaniſchen Standpunkt aus geſehen« vorbildlichen Ausführungen zeigt. Vorbildlich allerdings immer nur für die gegebenen Staaten, beſonderen Örtlichkeiten und das jeweilige Klima. Bei dem liebenden Intereſſe, das heute eine große Anzahl von Heimbeſitzern ihren Gartenproblemen perſönlich entgegenbringen und bei der Verſchiedenartigkeit an Ideen und Wünſchen beſonders ſeitens der hierin zumeiſt tonangebenden Frauenwelt, iſt die Möglichkeit einer Verödung in oberflächlichen Schematismus, die in Perioden ſchnellſter allgemeiner Entwicklung nahe liegt, für den amerikaniſchen Garten der wohlhabenderen Kreiſe beinahe als ausgeſchloſſen zu betrachten. Natürlich bezieht ſich das Geſagte gegenwärtig in erſter Linie auf die verfeinerten Vorſtadtbezirke unſerer großen und reichen Finanz-, Induſtrie- und Handelsmetropolen, und ſelbſt hier ſehen wir als Straßenpaſſanten in der Anordnung und Ausſchmückung des zumeiſt offen liegenden Vordergrundes verhältnismäßig wenig, was über die vornehm konventionelle Geſte hinaus geht. Der Schauplatz, auf dem ſich die Freude des amerikaniſchen Heimbeſitzers an bis zum Künſtleriſchen geſteigerter Gartenſchönheit auslebt, iſt gewöhnlich dem Auge der Außenwelt entzogen. Dies gilt auch beſonders für dem Hauſe direkt angegliederte, als erweiterte

Lynwood Hall mit franzöſiſchem Parterre

Mittlerer Teil des Parterres aus der Vogelperſpektive

Teilansicht der oberen Terrasse rechts und links vom Hauptportal

Wohnung im Freien dienende, architektonische Gärten. Als Eigentümlichkeit möchte ich schließlich noch die häufig anzutreffende Abneigung gegen das Imposante zum Zwecke der Repräsentation nach außenhin erwähnen, die sogar dort noch in die Erscheinung tritt, wo Jahreseinkommen nach Millionen berechnet werden, und es sich um Heimstätten auf großen ausgedehnten Landsitzen handelt. Diese Eigentümlichkeit wird erst verständlich, wenn wir in Betracht ziehen, daß in unserer jungen Nation, die bisher lediglich an der Entwicklung eines großen Landes arbeitete, dem Einzelnen das ruhige beglückende Gefühl dauernder Seßhaftigkeit heute zumeist noch gänzlich abgeht. Der europäische Begriff des erblichen Stammsitzes ist dem Amerikaner noch fremd. Die Besitzung Lynwood Hall in dem Villenort Elkins Park, ungefähr zwei Kilometer außerhalb der Stadtgrenze von Philadelphia, ist etwa 30 Jahre alt. Aus einfachen bescheidenen Verhältnissen stammend, hatte sich der damals im vorgerückten Alter stehende, zu großem gesicherten Reichtum gelangte Besitzer sein schloßartiges, im georgianischen Stil gehaltenes Heim errichten lassen, um, geschäftlich entlastet, nur noch seinen persönlichen Neigungen zu leben. Daß sich diese vorzugsweise in großzügiger philanthropischer Betätigung zum Wohle des Gemeinwesens, dessen Bürger er war, auswirkten, ist typisch amerikanisch. Als außergewöhnlich müssen wir jedoch sein liebendes Interesse für die Künste bezeichnen, das sich nicht allein in der sehr gewählten inneren Ausstattung seines Tusculums zeigte, sondern im weiteren Sinne sich auf jedwede Förderung und Unterstützung aller würdigen national künstlerischen Bestrebungen ausdehnte. Es finden sich in Philadelphia zur Zeit drei verschiedene, äußerst kostbare private Gemäldesammlungen seltener alter Meister, deren Abgang in Europa mehrfach bedenkliches Befremden erregt haben soll. Die eine davon ist in Lynwood Hall in einer eigens dafür erbauten großen Gallerie untergebracht. Inzwischen erbaute die Stadt ein neues Museum, das bis zur Fertigstellung in einigen Jahren wahrscheinlich etwa 20 Millionen Dollar kosten dürfte, dafür aber auch am Parkway, in vorteilhaftester Lage, einer der schönsten Monumentalbauten des ganzen Landes zu werden verspricht. Alles dies sind Anzeichen, die letzten Endes auf den Ehrgeiz und das gesunde Verlangen nach dem Erstarken einer eigenen bodenständigen Kunst hindeuten, also nach Zuständen, die uns ermöglichen, älteren Nationen gegenüber aus der bisherigen Rolle des lernenden Empfängers gelegentlich in die eines zurückzahlenden Gebers überzugehen.

Lynwood Hall stellte der Gartenkunst die Aufgabe einer Behandlung der nächsten Umgebung des Hauptgebäudes in architektonisch-geometrischen Ausmaßen. Deren Lösung war seiner Zeit der New Yorker Firma Nathan F. Barret anvertraut. Auf einem rundum von öffentlichen Vorstadtstraßen umgebenen Areal von nur etwa 14 Hektar konnte von einem Arbeiten in wirklich großzügiger Weise nicht die Rede sein. Barret hat damals durch geschickte Bodenbewegungen, sowie durch die Anlage zweier ausgedehnter Rasenflächen und durch ingeniöse Gruppierung der als Rahmen dienenden Baum- und Strauchvegetation mit heute sehr angenehm in die bildliche Erscheinung tretendem Erfolge versucht, das Auge über die Unzulänglichkeiten des vorhandenen Geländeraumes hinwegzutäuschen. Die beiden Hauptzufahrten mußten in Verlängerung der von Südost nach Nordwest laufenden Längsachse des Schlosses verlegt werden, während der

Rechtwinkelige Erweiterung am mittleren Teil des Parterres

nur 150 Meter lange offene Raum vom Hauptportal nach der vorüberführenden Straße in drei terrassenförmigen Abstufungen zur Anlage eines vertieften Parterres (sunken garden) diente. Dieser Teil zeigte von Anfang an eine gewisse, auch heute noch unsern meisten Fachleuten eigene Unbeholfenheit im Entwurf und der Ausführung rein formaler Gartenanlagen. Zwar ist im ersten Jahrzehnt versucht worden, durch reiche und abwechselnde Bepflanzung mit Florblumen ein repräsentables Aussehen zu erzielen, aber der inzwischen im Besitz von Lynwood Hall zu maßgebendem Einfluß gelangten zweiten Generation war der Anblick mit der Zeit doch unerträglich geworden. Um bei den notwendigen Renovierungen der ganzen frontalen Gestaltung sicher zu sein, den erforderlichen Schwung in die Sache zu bekommen, ging man diesmal ins Ausland und beauftragte die Firma Jaques Grebèr in Paris mit den erforderlichen Arbeiten. Grebèr erzielte durch Vereinfachung der bisher zu sehr zerstückelnden Abstufungen, sowie durch geschickte und natürlich auch stärkere Betonung der architektonischen Seite, nicht zu vergessen durch Ausschmückung mit den bisher fehlenden Skulpturen, sehr bald die erwünschte einheitliche Gesamtwirkung, der natürlich die das Ganze belebenden Sprudel von Fontänen nicht fehlten. Die Mitte des vorhandenen Raumes nimmt das mit Buxus eingefaßte französische Parterre ein, das mit der großen, runden Fontäne abschließt, die nur um ein Weniges tiefer liegt. Die Entfernung von der unsere Ansicht von Lynwood Hall im unmittelbaren Vordergrunde beeinträchtigenden Balustrade nach dem kleinen für Fußgänger bestimmten Thor zur vorbeiführenden Straße beträgt nicht mehr als sechs Meter. Jedenfalls kommt die Grebèrsche Lösung des Vordergrundproblems der amerikanischen Vorliebe für überlichtliche Einfachheit, deren Reiz durch den natürlichen Rahmen von Baumpflanzungen ungemein gewinnt, sehr entgegen.

Leider war es mir nicht möglich, eine Gesamtansicht des von Grebèr in Lynwood neu angelegten Rosengartens zu erhalten. Um der dort ins Leben gerufenen Schönheit gerecht zu werden, müßte man vom Aeroplane aus Aufnahmen machen. Mit Teilbildern wäre uns nicht gedient.

Über das bisher Gesagte und bildlich Dargestellte hinausgehend, lassen die Gartenanlagen von Lynwood Hall auf Schritt und Tritt eine begeisterte Pflanzen- und Blumenliebhaberei seitens der Bewohner erkennen. An Material mit dem besten und schönsten im verfeinerten Geschmack angeordnet aufzuwarten, ist hier die ständige Aufgabe der gärtnerischen Oberleitung. Diese liegt seit über zwei Jahrzehnten in den bewährten Händen von William Kleinheinz, einem in Stuttgart geborenen und dort aus der Schule von Pfitzer und der Wilhelma hervorgegangenen Fachmanne. Er und so mancher andere deutsche Gärtner landete hier mit einer in namhaften europäischen Betrieben erworbenen Ausbildung auf breitester Grundlage. Sie befähigte ihn, nicht nur die stetige Entwicklung von Lynwood immer im besten Sinne zu beeinflussen, sondern auch den sich dauernd steigernden Ansprüchen seiner Stellung gerecht zu werden. In einer der größten und modernsten privaten Gewächshausanlagen des Landes, von Kleinheinz nach einem denkbar vereinfachten Betriebssystem geleitet, befindet sich an auserlesenem Pflanzenmaterial alles, was für Innen- und Außenschmuck, sowie für die hier sehr wichtige Schnittblumenerzeugung benötigt wird. Neben einem jegliche Verschwendung ausschaltenden Organisationstalent werden in den Vereinigten Staaten von den Leitern großer privater Betriebe selbstverständlich auch hervorragende Leistungen als Kultivateure erwartet.

SIEGFRIED DECKER / DAHLIEN IN BRASILIEN II

ALS unermüdlicher Blüher wäre *Goldene Jugend* entschieden zu empfehlen, nur mittelhoch werdend ist sie stets blumengeschmückt, aber die Blüten neigen bei nur mäßig schwerem Regen etwas über und die Folge ist, daß sie dem Regen erst recht eine gute Aufschlagsfläche darbieten, dadurch werden sie von der Rückseite her und an den Rändern unansehnlich und wie aufgeweicht. Sonst wäre die reingelbe Farbe schön, gut ist der Aufbau jedenfalls.

Prachtvoll in der Farbe und Form sind die Blüten von *Aureola*. Sie blüht überreich, besonders nach den starken und andauernden Dezember — Januarregen. Mag dann das Wetter auch wochenlang noch so trocken sein, Blätter und Stengel sind prall wie mit Wasser gefüllt, die Blumen selbst von erstaunlicher Stofflichkeit, sie leuchten förmlich aus der Vielzahl der anderen heraus. Ihre Verwendungsmöglichkeit als Schnittdahlie ist ganz bedeutend. Gerade durch ihre überreiche Herbstblüte ist sie besonders empfehlenswert, ihre prachtvoll kupfergold getönten Blumen sind zu dieser Zeit intensiver und reiner als sonst. Charlotte hat hier versagt. *Altgold* ist dagegen eine immerwährend blühende, äußerst anspruchslose Dahlie, ich mag die so regelmäßigen, seerosenartigen Blumen sehr gern, denn ihre Altgoldfarbe, die an den Rändern in gelb übergeht, ist recht entsprechend. Sie hat sich an ausgesetztem Standort, in trockenstem rotem Boden hervorragend bewährt. Wuchs und Haltung sind gut, sie wird mannshoch wie die prächtige *Ehrliche Arbeit*. Als aus Versehen die schon blühende Pflanze abgeschnitten wurde, trieb sie wieder freudig aus, aber wurde nur mittelhoch und blühte ganz verschwenderisch. Wenn sie unter normalen Verhältnissen an fingerdicken langen Stengeln blühen, dann sind sie wahrhaft imposant. Ihre indischrote Farbe verblaßt im Herbst und wird mehr schmutzigorangerot, blasser an den Rändern und mit blaßgelber Mitte. Gegen Regen sind sie widerstandsfähig, bei längerer Trockenheit aber verliert die Pflanze sehr, die Blätter verdorren, rollen sich ein, sodaß der sparrige Aufbau recht unangenehm auffällt. Immer gutbelaubt und sehr reichblühend ist *Walhalla*. Prachtvoll ist das Orangenrot der mächtigen Blüten und entzückend die federige, schwefelgelbe Kronenmitte, nie verblassen sie, auch nicht in der größten Sonnenglut. Diese hervorragende Sorte wird nur mittelhoch. Als Gartenschmucksorte blüht sie nicht reichlich genug, es fehlt ihr jener Reichtum an Blüten, der andere Sorten, wie »Purpurkaiserin« so sehr auszeichnet. Diese ist wirklich eine Gruppensorte. Die Blüten sind nur mäßig groß, aber so überreich erscheinend, daß die Blumenkrone tatsächlich in Purpur erglüht.

In Zinnober ist *Brennende Liebe* unübertrefflich. Nur wenige Sorten zeigen eine solche Blütenfülle. Ist die Einzelblüte auch kein Modell, so wird dies durch die Masse der gleichzeitig offenen Blüten reichlich aufgewogen. In trockenen, moorigem oder torfigem Boden wird sie mannshoch, in trockenstem, fast rohem Boden bildet sie nur einen mittelhohen Busch und eignet sich daher vorzüglich als Kübelpflanze, sodaß sie zum Schmuck von Verandas und selbst als Balkonpflanze vorteilhaft Verwendung finden kann. Die blutapfelsinenfarbige, nur leicht gefüllte Elftrud hat in der ungemein reichblühenden, weniger hochwachsenden Sonne im Herzen einen ausgezeichneten Ersatz gefunden: bei Elftrud ist nämlich der Wuchs zu sparrig, das Laub nicht genügend widerstandsfähig gegen Trockenheit, und die Blüten haben einen zu wenig festen Nacken, sodaß sie bei Regen mehr oder weniger überhängen. Doch sei bemerkt, daß die Haltung der Herbstblüher viel straffer ist. Wer aber eine orangerote Prachtsorte haben will, die einzig schöne, wunderbar geformte Kaktusblumen in verschwenderischer Fülle hervorbringt, der verschaffe sich *Kunigard*. Sie ist unter allen Dahlien eine der schönsten. So tief ist hier das glühende Orangerot, daß es fast seltsam anmutet. Erstaunt steht man vor solchem Blütenwunder. Die Reichblütigkeit dieser Sorte ist ohnegleichen. Hervorzuheben sind die drahtfesten, langen Stiele. Der Wuchs ist sehr gut, die Widerstandsfähigkeit gegen Sonnenglut, Trockenheit, Regengüsse ist ganz außerordentlich. In jeder Beziehung eine hervorragende Sorte. Nun zwei Perlen: *Winzerliesel* und *Wunderhold*. Ob letztere Sorte »namenecht« ist oder ob sie vielleicht identisch ist mit Pfitzers »Tändelei« weiß ich nicht. Jedenfalls ist die halb ockergelb, halb weiß gefärbte Wunderhold entzückend. Reichblütigkeit, schöner, guter Wuchs, eine selten liebliche Farbe, dazu von ganz eigenartiger Farbenzusammenstellung, zeichnen diese Sorte wie auch die ebenso köstliche Winzerliesel vor anderem aus. Es ist dies eine stets prachtvolle, mittelhohe Dahlie, deren rot und weißgefärbte Blumen auf starke Stengeln sitzen und immer gut gefüllt und gut ausgebildet sind. In jeder Beziehung ist sie eine famose Verbesserung der ebenso gefärbten, aber oftmals recht unvollkommen ausgebildeten und nicht gut gestielten, auch wenig hübsch aufgebauten »Schützenliesel«. Wenn ich schon bei den zweifarbigen Dahlien bin, so sei gleich noch die ausgezeichnete »Prinz Carneval« erwähnt. Wie hübsch sind doch die schwarzroten Blumen, bei denen jedes Blumenblatt oben mit einem entzückenden, kleinfingernagel großen weißen Fleck geziert ist. Auch »Schmetterling« hat sich hier als eine sehr reichblühende, gegen alle Klima- und Wetterunbilden gefeite Sorte entpuppt, es liegt etwas Reizendes in der strohgelben, kirschrosa abgetönten Farbe der flachen Blumen. Macht im Blumenarrangement einen sehr guten Effekt. Zum besten, was es gibt, gehört *Schwarzwaldmädel*. Jede Blüte dieser Sorte ist ein Kleinod an Vollkommenheit der Form und Farbe. Es liegt auch ein eigenartiger Schmelz auf dem blassen, mit zartem Lachsrosa überhauchten Strohgelb. Die Blumen sitzen in bester Haltung auf festen Stengeln. Die Blühwilligkeit ist gut, der Wuchs ebenfalls, hervorragend ist die Widerstandsfähigkeit

GARTENAUFGABEN / ALTE UND NEUE LÖSUNGEN

Das Gartenbad

GARTENBÄDER in gewitterschwülen Sommertagen sind ein besonders reizvolles Gartenmotiv. Sie sollten viel allgemeinere Verwendung finden. Zwei Beispiele mögen dazu anregen.

Im Park P. war mir die Aufgabe gestellt, ein Gartenbad in Koniferenbestand einzubetten. Es erhielt zunächst als Schutz gegen Einblicke seiner kreisförmigen Grundrissanlage entsprechend einen Rand von Pyramidenpappeln und eine Thujahecke, die den erhöht liegenden Umgangsweg fassen und vollkommen nach außen decken. Die Innenseite des Weges begleitet eine niedrige Taxushecke. Böschungen als Liegeflächen umrahmen mit angrenzenden vertieften Rasenflächen das von Platten eingefaßte Wasserbecken. Putten und Bänke zieren den Raum und beleben die Stille des hoch umrahmten Ruheplatzes.

Im zweiten Falle stellt das Gartenbad in einem kleineren Garten das Hauptmotiv dar. Der Rasenplatz, der sonst als Zierrasen oder Bleichplatz lediglich ästethischen oder rein praktischen Zwecken dient, wird hier als Sonnen- und Luftbad nutzbar gemacht. Voraussetzung ist hierbei, daß der Garten nach außen gut abgeschlossen ist, da Wasserbecken und Rasen im Mittelpunkt des Gartens liegen und nur von Staudenpflanzungen umgeben sind.

Ein breiter Laufrand aus hart gebrannten Klinkersteinen umgibt das Wasserbecken, aus gleichem Material führen Stufen in das Becken, das auf seinen Längsseiten von Sumpfstauden umrahmt ist. Diese stehen in Moorbeeten, die nach außen durch dünne Betonwände abgeschlossen sind, aber mit dem Wasserbecken in Verbindung stehen, derart, daß durch kleine Öffnungen in der Wand das Wasser in den Sumpfbecken auf gleicher Höhe steht wie im Wasserbecken. Dadurch ist erreicht, daß das Wasser stets sauber bleibt, ohne daß auf eine schönblühende feuchtigkeitsliebende Vegetation verzichtet zu werden braucht. Eine solche bietet ebenso eigenartige, wie hübsche Motive, deren man sich im kleinen Garten viel zu selten bedient.

H. Kayser

des saftigen, festen Laubes. Es soll eine ähnliche Verbesserung geben, die ich aber leider nicht kenne; wenn ich einen Wunsch hätte, dann wäre es der, es möchten gleichzeitig noch mehr Blumen offen sein, dann wäre es eine überaus brauchbare Gruppensorte. Wenig befriedigten mich die Sorten »Glutstern« und »Glanzstar« sie mögen in gemäßigterem Klima besser sein, hier aber versagen sie. Dagegen bewährten sich »Rütlischwur« und »Poinsettia«, letzte auch im Schatten von Gesträuch und Bäumen. Rütlischwur hat ein mehr dumpfes Rot, Poinsettia glüht geradezu. Die Reichblütigkeit beider Sorten ist sehr gut, die Farbenwirkung ganz bedeutend. Der Wuchs und die Widerstandsfähigkeit des Laubes ist befriedigend; Rütlischwur wächst noch gedungerer als Poisettia, die ihren Namen mit gutem Recht trägt. Der flache Bau der Blüte und deren gute präsentiertellerartige Haltung machen diese als Gruppenpflanze und für Beete sehr geeignet. »Herzblut« blüht überreich, doch ist die Form der samtig blutroten Blüten nicht immer einwandfrei, auch ist der Wuchs zu sparrig. Wer beschert uns eine so leuchtend reinrote, feuerrote Dahlie wie die alte Sorte »Marie Baumann« aber ohne die etwas rostrote oder blaßziegelrote Rückseite, mit einem starken Nacken, von ebensolch üppigem Wuchs und unterbrochenem Blütenreichtum, das wäre etwas. Lange schien es mir, als ob ich *Schwabenland* ausmerzen sollte; in dem argen Trockenjahr 1924/25 bildete sie einen starken, mittelhohen, mit Hunderten von Blütenknospen besetzten Busch; die Stengel waren dünn, die Knospen öffneten sich nicht, mit Ausnahme von 4—5, die verkrüppelte Blumen brachten. 1925/26 aber stand sie an einem viel ungünstigeren Standort, in schwerem, trockenem rohem Boden, der steinhart war. Eine stand gar unter einem stark Schatten spendenden Jaboticababaum und einer Tribouchina mutabilis. Aber in diesem nassen Jahr waren es prachtvolle, übermannshohe Büsche; Stengel und Blattwerk waren imposant; und welche Prachtblüten auf den drahtharten, gut 40 Centimeter langen, dunklen Stengeln! Das »Generalstabsrot« war geradezu glühend, da sich ihm in der Blütenmitte ein feuriges Lachsorange gesellte. Ich weiß nicht, ob dieser Ausdruck wiedergibt, was ich sagen will. Diese Sorte liebt Feuchtigkeit im Boden und in der Luft und verdient einen Platz in jedem Garten, so gut wie die rosafarbene lilagetönte Marie Kapphan. An Reichblütigkeit und Dauer des Flors steht sie mit an allererster Stelle. Wohl werden die Blüten im Verlauf von 6, 7 bis 8 Monaten kleiner, wohl sind sie bei längerer Trockenheit nur halb gefüllt; aber auch dann sind sie noch schön, — gleichen großen Herbstannemonen. Der Wuchs ist gut, die Stengel sind einwandfrei, nur die Belaubung könnte hier etwas besser sein.

Wo aber ist in dieser Welt die absolute Vollkommenheit erreicht? Wie schön wäre *Heimat*, deren große lilarosa getönte Blüten am Rande in ein mattes Silberlilaweiß übergehen, wenn ihr Bau besser, ihr Blattwerk widerstandsfähiger wäre gegen Trockenheit, der man hier durch kein Gießen beikommen kann, sei es auch noch so reichlich; auch die Blütezeit ist nicht allzulang ausgedehnt. Aber bei etwas nassem Wetter schenkt sie wundervolle, große Prachtblumen, und entknospet man sie, dann erhält man Riesenblumen amerikanischer Sehnsucht. Ich mag sie nicht missen. Wie schön ist doch die fliederfarbige *Meisterstück*. Wie herrlich sind die köstlich geformten Blumen, wenn sie gut geraten. Kommen zur fortgeschritteneren Knospenbildung und zur Zeit des Aufblühens trockene Tage, dann ist alle Schönheit dahin; sie will Wasser, viel Wasser; und wie mit der Blüte ist es mit dem Bau. Dennoch sei sie warm empfohlen. Die beste reinrosarote Sorte ist *Delices*, die hier in Massen für die Blumenbinderei herangezogen ist. Wo viel Feuchtigkeit zur Verfügung steht, da sind die Büsche üppig, gut gebaut, sonst werden sie etwas sparrig; in harten, trockenen oder noch wenig bearbeiteten Böden wird sie nicht ganz mannshoch, in trockenen, mageren, sandigeren Böden wird sie übermannshoch. Sehr dankbar ist *Juweeltje*, ein wahres Kleinod in jeder Beziehung; in brennender Sonne aber verblassen die vollständig erblühten Blumen etwas an den Rändern; ihre Schönheit aber entschädigt reichlich alles. Die feuerrote »Bayern« war prachtvoll im ersten Jahre; in den zwei folgenden bot sie leider nur Enttäuschung; auch verblassen die herrlichen Kaktusblumen in voller Sonne! Ich suche einen Ersatz. Weniger edel aber dankbarer ist »Freibeuter«. Diese ältere Sorte ist so bekannt, daß jede Erörterung unterbleiben kann; ist immer noch hoch empfehlenswert. Eine wirklich immerblühende Sorte für schattige Plätze ist die »Schutzengel«. Es ist keine Prachtsorte, keine gerade edelgebaute Dahlie; aber zwischen Gesträuch und unter ziemlichen Schatten spendenden kleinblättrigen Sträuchern aus der Familie der Myrtengewächse ist diese Sorte ungemein brauchbar. *(Schlußartikel folgt.)*

Aus dem Blumengarten der Literatur

Der schöne Garten

Von blühenden Fruchtstämmen schimmert
Der Garten, die kreuzende Gänge
Mit roter Dunkelheit füllen;
Und Zephyr gaukelt umher,
Treibt Wolken von Blüten zur Höhe,
Die sich ergießen und regnen.
Zwar hat hier Wollust und Hochmut
Nicht Nahrung von Mohren entlehnt
Und sie gepflanzet; nicht Myrten,
Nicht Aloen blicken durchs Fenster —
Das nützliche Schöne vergnüget
Den Landmann und etwa ein Kranz.
Durch lange Gewölbe von Nußstrauch
Zeigt sich voll laufender Wolken
Der Himmel, und ferne Gefilde
Voll Seen und buschige Täler,
Umringt mit blauen Gebirgen.
Die Fürstin der Blumen, die Lilie,
Erhebt die Krone zur Seiten,
Hoch über streifige Tulpen —
O Tulipane, wer hat dir
Mit allen Farben der Sonne
Den offnen Busen gefüllet?
Ich grüßte dich Fürstin der Blumen,
Wenn nicht die göttliche Rose
Die tausendblättrige schöne
Gestalt, die Farbe der Liebe,
Den hohen bedorneten Thron, und
Den ewigen Wohlgeruch hätte?
Die holde Maiblume drängt
Die Silberglöckchen durch Blätter;
Hier reicht mir die blaue Jacinthe
Den Kelch voll kühler Gerüche:
Es steigt unsehbarer Regen
Von lieblichen Düften zur Höhe,
Und füllt die Lüfte mit Balsam.
Die Nachtviole läßt immer
Die stolzeren Blumen den Duft
Verhauchen; sie schließet bedächtig
Ihn ein, im Vorsatz, den Abend
Noch über den Tag zu verschönen!
Seht hin, wie brüstet der Pfau
Sich dort am farbigen Beete,
Voll Eifersucht über die Kleidung
Der fröhlichen Blumen stolziert er,
Kreist rauschend den grünlichen Schweif
Voll Regenbögen, und wendet
Den farbentrügenden Hals.
Die Schmetterlinge, sich jagend,
Umwälzen sich über den Bäumen
Mit bunten Flügeln; voll Liebe
Und unentschlossen im Wählen,
Beschauen sie Knospen und Blüten.
Indessen impfet der Herr
Des Gartens Zweige von Kirschen
Durchsägten Schlehstämmen ein,
Die künftig über die Kinder,
Die sie gesäuget, erstaunen.
Das Bild der Anmut, die Hausfrau,
Sitzt in der Laube von Reben,
Pflanzt Stauden und Blumen auf Leinwand,
Die Freude lächelt aus ihr:
Ein Kind, der Grazien Liebling,
Mit zarten Armen am Hals
Ihr hangend, hindert sie schmeichelnd,
Ein andres tändelt im Klee,
Sinnt nach und stammelt Gedanken.

Ewald von Kleist.

Gartenarbeit und Blumenpflege

LEBERECHT MIGGE / NEUE GARTEN-TECHNIK I

Grundlagen

DIE alte Gartentechnik, auf der die alte Gartenkunst beruhte, entschlief mit Ende des 19. Jahrhunderts; sie hat mindestens 50 Jahre zu lange gelebt. Denn die auf Grund der modernen Naturwissenschaft entfesselte Technik hat es ja während dieser Zeit fertig gebracht, fast die ganze mitteleuropäische Landwirtschaft zu revolutionieren und ihre Erträge zu verdoppeln und zu verdreifachen. Gerade die Garten-Technik nahm an diesem Aufstieg nicht oder nicht nennenswert Teil. Die Gründe hierfür wollen wir an dieser Stelle nicht näher untersuchen.

Künstliche Schutzwände in einer Obstplantage

Zum Teil ist der rapide Aufschwung der neuen Garten-Technik, der mit Beginn des 20. Jahrhunderts einsetzte, vielleicht aus dieser unnatürlichen Zurückhaltung zu erklären. Und wenn, wie wir glauben nachgewiesen zu haben, die Grundlagen der großen alten Gartenkunst in ihren technischen Möglichkeiten eingeschlossen sind, so ist die Frage mehr als naheliegend, welche *gartenkünstlerischen Perspektiven* sich eröffnen könnten, ja müßten, wenn die neuen bodentechnischen Mittel ihre volle Wirkung getan haben werden?

Bevor wir aber unsererseits daran gehen, solche gestalterische Schlußfolgerungen, so weit sie heute schon möglich sind, zu ziehen, möchten wir diese technischen Gartenmittel kurz näher betrachten.

Mittel

Die alte Sonne ist die Mutter aller Jugend. Sonnenenergie ist, wenn nicht die Ursache, so doch bestimmt der Anlaß und das bewegende Moment des Wachsens auf und aus der Erde. Diese Lebenskraft ist umso stärker, je energischer sie auf das Substrat, den Boden, wirken kann. Also kommt alles darauf an, die Empfänglichkeit und Aufnahmefähigkeit der Vegetation und ihrer Träger für Sonnensubstanz zu stärken. Die Pflanze ist auf Sonne trainiert und will es sein. Und in der Tat: so lange Bodentechnik besteht, so hat sie nie eine andere Aufgabe gehabt als diese. In Bezug auf die Mittel, Sonnenenergie einzufangen, hat man von jeher fünf große Gruppen unterscheiden können: Gerätetechnik, Wassertechnik, Dungtechnik, Wärmetechnik und Schutztechnik. Unter ihnen weisen die drei ersten die größten Spannungen in Bezug auf Verfeinerung und Wirkung auf. Wir führen nachstehend einige der modernen bodentechnischen Mittel in organischer Reihenfolge auf — überall unter der Voraussetzung von genügend Sonne als Licht in seinen bekannten unersetzlichen physiologischen Funktionen. Überall auch vorausgesetzt, daß wir hier über Kulturpflanzen und nicht über Wildpflanzen sprechen, und endlich, daß für Nutz- und Zierpflanzen die *gleichen Bedingungen* bestehen. Fair play!

Wärmetechnik

Wärme ist von Natur unbehinderte Sonnenstrahlung. Behindert wird die Sonnenwirkung durch kalte Winde. Überhaupt wachsen bewegte Pflanzen, das heißt Kulturpflanzen, nicht oder geringer. So waren denn seit jeher die Bemühungen der Menschen darauf gerichtet, durch Schutzanlagen für Abhaltung der Winde von ihren Kulturen Sorge zu tragen. Wir zeigen ein neuzeitliches Beispiel von systematischem Schutz der Vegetation in einer Baumschule.

Die moderne Wärmewirtschaft innerhalb der Bodenkultur unterscheidet Großschutz und Kleinschutz. Jener dient der Abhaltung der großen Luftbewegungen und wird durch Schutzpflanzungen und Baulichkeiten oder andere Schutzanlagen bewirkt; er kann, großzügig durchgeführt, zu klimatischen Verbesserungen führen. Der Kleinschutz dient dem inneren Schutz eines Vegetationsausschnittes oder des Gartens und wird durch Mauern, Hecken, Zäune und anderes mehr erreicht. Er wirkt gleichzeitig als Windschutz, Kälteabwehr (Nachttemperatur) und Sonnenfang. In seiner primitivsten Form ist er Erdarbeit; Bakterienarbeit als sogenanntes Mistbeet. Der vollkommenste Schutz für Pflanzen ist Glas: es hindert Zugluft und steigert zugleich die Sonnenstrahlung. Seine Nutzform im Garten ist das Früh- oder Dungbeet; das sogenannte Gewächshaus bildet die Übergangsform zum Glashaus als südliche Inkarnation der vegetativen Vorstellung des Nordländers. Eine weitergehende Form der Wärmetechnik ist die Bodenheizung, die, bei Glashäusern schon allgemein angewandt, auch im Freien noch weitere Perspektiven für die Gartenvegetation eröffnet. Wie das Haus die Zuflucht des Menschen, so ist Windabwehr und Sonnenfang das sichernde Symbol für Pflanzleben und damit für den Garten schlechthin.

Wasserwirtschaft

Die Erde, der Boden allein gibt Wachstum und damit Leben nur vorübergehend und ungewiß. Von Dauer und damit allein von Wert wird alles Dasein erst durch die sichere und reichliche Befruchtung des Bodens mit dem kostbaren Naß. Und so ist denn auch — von der sogenannten großen Geschichte, die immer wesentlich eine irreführende Geschichte von Macht und Repräsentanz war, ignoriert — die mehr oder minder vorgeschrittene Einsicht über die gebärende Gewalt des Wassers und die mehr oder minder entwickelten Fähigkeiten zur Bändigung dieser elementaren Naturkraft für die Zwecke der Bodenbestellung — ist *Wasserbe-*

herrſchung immer der Maßſtab für den Wert einer Kultur, für Glück und Wohlleben der Menſchen geweſen. Von den vorgeſchichtlichen Waſſerwerken Mittelafrikas, Mittelamerikas, über die rieſigen Bewäſſerungsanlagen Ägyptens und Vorderaſiens bis hin zu den in alter Blüte bis heute erhaltenen Waſſerkünſten der Indier und Chineſen (Bild Band VI, Seite 155), geht eine für unſere Gehirne unvorſtellbare Summe von Erfahrungen und Anſtrengungen des Menſchen einher, das Waſſer in ſeinen Dienſt zu ſtellen. Gebräuche und Einrichtungen von einer Wertſchätzung, die ſie oft zu religiöſen Kulthandlungen erhob.

Der moderne Europäer, der, ſelbſt auf den Reſten kühner und ausgedehnter Irrigationen (in Spanien, Italien, Frankreich, Deutſchland u. a.) ſitzend, ſeine neue Welt eroberte, mußte in dieſen Jahren die Unſicherheit und Gefährlichkeit ſeines Daſeinsgefüges, das ſich entſcheidend auf koloniale Verſorgung aufbaute, am eigenen Leibe bitter erfahren.

Dieſe Lehre aber lautet:

Ohne reichliche, mechaniſche Bewäſſerung gibt es keine hohen und ſicheren Ernten! — alſo auch keine geſteigerte und geſicherte Vegetation, alſo auch keine üppigen Gärten!

Ideal-Regenanlage

Die Gartenpflanze beſteht zu 90 Prozent aus Waſſer. Ihr durchſchnittlicher Bedarf beträgt jährlich rund 50 Centimeter Waſſerhöhe. Da bei 70 bis 80 Centimeter Jahresniederſchlag nur 20 bis 30 Centimeter durchſchnittlich in die Vegetationsmonate fällt, ſo braucht 1 Quadratmeter Gartenfläche in unſerem Klima und beſonders auf leichtem Boden durchſchnittlich 20 Centimeter Zuſatzwaſſer oder 200 Liter oder 20 Gießkannen, bei ſchwerem oder humoſem Boden vielleicht etwas weniger. Da dieſes Feuchtigkeitsminimum von rund 20000 Kannen für unſeren normalen Garten von 1000 Quadratmeter unter Umſtänden (Hitzeperioden) in wenigen Wochen gegeben werden muß — was aus techniſchen Gründen faſt nie geſchieht —, ſo iſt grundſätzlich künſtliche Beregnung anzuſtreben.

Kompoſtbereitung in China

Was iſt künſtliche Beregnung? Die Geſchichte des künſtlichen Regens iſt eine Geſchichte langwierigſter, mühſamer Arbeit und Unbeholfenheit. Vom Schießen in die Wolken bis zu der ungeheuren Kapitalinveſtierung in unſeren ſtädtiſchen Waſſerleitungsnetzen iſt ein weiter Weg. Und unſere »Röhrentechniker« mußten erſt eine komplizierte, für unſer Wirtſchaftsleben bedeutungsvolle Berufskaſte werden, ehe ſie fanden, daß der gewöhnliche Druck in den Waſſerleitungen genügt, um Felder zu beregnen, ehe ſie Zeit hatten, um zu entdecken, daß gleichmäßige Waſſerverteilung, Beweglichkeit und Billigkeit der Apparate rein mechaniſche Probleme ſind, die nichts mit dem »Wunder« des Regens zu tun haben.

Das ja auch nur Wunder iſt, weil wir die geſamten Wetterelemente der Erde in unſerem gewöhnlichen Empfinden noch nicht umſpannen — daß es noch nicht auf Kommando vom Himmel regnet. So lange aber halten wir uns an das, was uns ſo viel näher iſt, unſer Erdwaſſer.

In unſeren modernen Beregnungsanlagen, von denen es, eine ganze Reihe hochwertiger Typen gibt, haben wir ſowohl techniſch vollkommene als auch erſchwingliche Geräte für die Waſſerwirtſchaft in unſeren Gärten. Ein Beiſpiel: Für die Beregnung eines Gartens von 1000 Quadratmeter mit ein Centimeter Waſſer (was einem normalen Regen entſpricht), ſind 10 Kubikmeter Waſſer erforderlich. Mit etwa 30 Metern Regenrohr, die von einem modernen Schwenkapparat (beiſpielsweiſe der abgebildeten Ideal-Regenanlage) bewegt werden, bedarf es dazu etwa einer Stunde (einſchließlich Umſtellung). Die ganze Anlage reicht für fünf bis ſechs ſolcher Gärten aus, oder einen entſprechend größeren. Mit Gießkannen bewaffnet würde ein Mann für die gleiche Leiſtung etwa 40 bis 50 Stunden, alſo faſt eine Arbeitswoche gebrauchen. Dieſer Arbeitsleiſtung ſteht eine Inveſtierung von nur 30 bis 50 Reichsmark gegenüber.

So weit die Waſſerverteilung. Die Waſſer*förderung* (Pumpen und Kraftanlagen) hat bei uns ohnedies längſt eine derartige Höhe erreicht, daß ſie für die mechaniſche Bodenbewäſſerung ſelbſt in größtem Maßſtabe kein Problem mehr darſtellt. Waſſertechnik iſt ein Produkt der Stadtkultur. Dementſprechend ſollte auch von der Stadtverwaltung aus Gartenwaſſer als produktives »Kraftwaſſer« dem Hausverbrauchwaſſer gegenüber wie Kraftſtrom zum Lichtſtrom behandelt werden: Der künſtliche Regen iſt über den Gartengebrauch hinaus längſt auch in die Großlandwirtſchaft eingedrungen — als Zeichen ihrer ebenſo unumgänglichen wie tatſächlichen Gärtneriſierung.

Dungſtapel

Schnitt

Worpsweder Garten-Dungſilo

Dungwirtſchaft

Aber auch die beſte Waſſerwirtſchaft iſt relativ, ohne vollkommene Düngung. Gartenpflanzen ſind wie ewige Kinder; als ſolche wollen ſie zubereitete Kindernahrung. Grundſatz: keine rohen, d. h. unvergorenen und vererdeten Dungſtoffe für zarte Pflanzen. Dieſe verlangen fertigen Humus!

Was »Humus« iſt, darüber

wußten und wiſſen heute vielleicht die Chineſen mehr als wir. Kurz geſagt, iſt Humus der Träger der Bodenenergie. Er repräſentiert, wie alle Vegetation, lebenswichtige phyſikaliſche und chemiſche Prozeſſe, ſowie bakteriologiſche Bewegungen. Humus iſt lebendige Erde. Erde an ſich iſt tot, iſt nichts, lebendige Erde iſt alles. Schwerſter »fetter« Boden kann völlig ſteril ſein und Sand fruchtbar — auf den Gehalt kommt es an. In dieſem Sinne macht unſere Düngerwiſſenſchaft in dieſen Tagen die heftigſte Kriſe ſeit Jahrtauſenden durch, allerdings auch die ausſichtsreichſte.
Konzentrierten Humus nennen wir *Kompoſt.* Er ſtellt die an Inhalt reichſte und am leichteſten verdauliche Pflanzennahrung dar. Die Umſetzung der organiſchen Maſſe iſt ſtets eine Gärung. Um dieſe Gärung zu regeln, muß man erſtens das Faulen und Verbrennen der Dungmaſſe ausſchließen, zweitens für Schutz ſorgen, um Wärmeverluſte zu vermeiden und gewiſſe Lebensbedingungen der Bakterien zu ſteigern, ſo daß die Gärzeit gekürzt wird. Kompoſt iſt alſo vergorener (aber nicht verrotteter oder gar verfaulter) Dung oder Abfallſtoffe. Ein Hauptvorteil dieſes Verfahrens liegt darin, daß er dungreiche Nebenprodukte verwertet, wie ſie im Haus- und Gartenbetrieb reichlich abfallen, als Fäkalien, Kehricht, Müll, Aſche, Gartengrün u. a. m.
In Bezug auf das Verfahren unterſcheiden wir heute die Heiß- und Kaltvergärung. Die Heißvergärung von Dünger iſt eine Erfindung, dazu beſtimmt, der Vergeudung der ungeheuerlichen landwirtſchaftlichen Dungſtoffe, die auf dem Lager und dem Acker weſentlich bis 70 Prozent verlieren, Einhalt zu gebieten. Zu dieſem Zwecke werden neuerdings nach dem Patent von Heinrich Krantz ſogenannte *Gärſtätten* errichtet, wo im weſentlichen mittels Regelung von Druck und Temperatur die vorzugsweiſen hitzigen Dungſtoffe einer konſervierenden Zerſetzung und Vererdung zugeführt werden.
Inſoweit hitziger Dungſtoff (aus Ställen, auch ſchieres Grün, wie Gras, Leguminoſen) im Gartenbetrieb gewonnen wird, kann die Heißvergärung angewandt werden. Für die meiſten Stoffe dagegen iſt die Kaltvergärung geboten, wie ſie das Worpsweder Gartendungſilo bewirkt. In dieſem Apparat wird nach den bisherigen Erfahrungen der Nährſtoffgehalt der meiſten Dungſtoffe rund doppelt ſo hoch ausgewertet, als beim üblichen Miſt oder Kompoſthaufen. Bei normaler Dungwirkung beträgt der Dungwert eines guten Kubikmeter Kompoſtes 10 Reichsmark, es werden alſo bei jedem Kubikmeter 4 bis 5 Reichsmark an Dungwerten gerettet. Die Anlagekoſten ſtellen ſich auf 150 bis 180 Reichsmark je

Schnitt durch ein großes Dungſilo

Schnitt durch das Metroclo

Doppelzelle von 3 bis 4 Kubikmeter Inhalt. Dieſer genügt für die Verſorgung eines Kleingartens von 390 bis 500 Quadratmeter Fläche. In jeder Doppelzelle können, bei zwei- bis dreimaligem Umſatz im Jahre, etwa 100 Kubikmeter Dung gewonnen werden. Die Anlagekoſten belaſten alſo den Kubikmeter Abfallkompoſt nur mit etwa 1,50 bis 2,50 Reichsmark (ein gleichwertiger Handelsdünger koſtet das Vier- bis Fünffache). Am rationellſten werden drei oder mehr Zellen verwandt, um ſtets entnehmen und füllen zu können. Drei Zellen und mehr verſorgen einen Garten von 1000 Quadratmeter aufwärts (Villengärten und Parks). Neben der reinen Nährſtofferhaltung, (wobei der Aktionswert des Dungſtoffes, d. h. ſein Reichtum an chemiſchen und bakteriellen Vorgängen heute kaum ſchon abgeſchätzt werden kann), iſt die Sauberkeit und bequeme Handhabung zu beachten, die beſonders in den engräumigen Gärten in hygieniſcher Hinſicht obwaltet. Das freie Lagern von Kompoſt und Abfallſtoffen muß in Zukunft vollſtändig aus unſeren Gärten verſchwinden. Hier vereinigt ſich die hygieniſche und äſthetiſche mit der ethiſchen Forderung, die die Rückgabe aller aus dem Boden gewonnenen Abfallſtoffe wieder hin zum Boden fordert.
Dieſe Forderung gilt auch für die *Abfallwirtſchaft der Städte,* die neuerdings daran gehen, ihre rieſigen Abfallmengen in Dunghäuſern und Kompoſtſilos zu kompoſtieren und das meiſt hochwertige Dungprodukt den Stadtgärten in irgend einer Form wieder zuzuführen.
Wichtig für dieſen ganzen Düngerbereitungs- und Verwertungsprozeß iſt die Einſchaltung eines mechaniſchen *Torfſtreukloſetts* (Metroclo), das den hervorragendſten Dungſtoff der menſchlichen Siedlungswirtſchaft, die Fäkalien, oft zuſammen mit Aſche und Müll in techniſch und hygieniſch hochwertiger Form bindet und konſerviert. Die organiſche Fortbildung des Metroclo geſchieht im Metroſilo, der außer Fäkalien auch den Feinmüll und die Aſche der Hauswirtſchaft aufnehmen kann. Im ganzen iſt die moderne Kompoſtwirtſchaft dabei, alt verankerte, wenn auch reichlich verroſtete Gepflogenheiten und Anſchauungen unſerer Düngerwiſſenſchaft und -Praxis über den Haufen zu werfen. Darüber hinaus eröffnet ſie ganz neue Möglichkeiten der Siedlung. Die Syntheſe: Metroclo, Dungſilo in Verbindung etwa mit Untergrundberieſelung (für die Abwäſſer) umſchreibt ein ganz neues Syſtem der ländlichen Abfallwirtſchaft, das trockene, das dem gewohnten feuchten Kanalſyſtem techniſch bald gleichwertig werden dürfte. Volkswirtſchaftlich, — und darauf kommt es uns heute in erſter Linie an — iſt es ihm jetzt ſchon überlegen.

KARL MICKSCH / DAS FÄRBEN LEBENDER BLUMEN

In der Anregung, die ſchönſten Kinder der Flora, die farbenprächtigen Blumen künſtlich zu färben, liegt ein Widerſpruch. Aber wie die ſchönſte Bühnenprimadonna und die liebreizendſte Filmdiva auf künſtliche Verſchönerungsbeſtrebungen nie verzichten wird, ſo erklärt ſich auch die Neigung vieler Blumenfreunde, die Farbe ihrer prächtigen Lieblinge umzugeſtalten. Schon in alten botaniſchen Überlieferungen wird uns daher von derartigen Künſten berichtet.
Die älteſten Verſuche, die Farben der Blüten umzugeſtalten, ſind anſcheinend an Tulpen vorgenommen. In der 1899 im Verlage von A. Felix in Leipzig erſchienenen »Geſchichte der Tulpen« zitiert Profeſſor Graf Solms-Laubach einiges aus Paſſeus, einer im Jahre 1614 erſchienenen Schrift, und ſagt unter anderem: Die meiſten aus der Türkei bezogenen Tulpen waren ſpitzblätterig, ſie waren rot oder gelb, oder mit beiden Farben geflammt. Es iſt alſo daraus begreiflich, daß bei der ſtarken Zunahme der Kultur dieſer Blumen die raren Sorten mit anderweitigen Farbennuancen und mit ſtumpfen, gerundeten Blättern bevorzugt und vermehrt wurden. In der Zeit der Tulipomanie in Holland begnügte man ſich nicht mehr mit den durch Parangonieren erzielten Sorten. Man ſuchte durch Belichtung und Verdunklung, durch direkte und indirekte Einwirkung der damals verfügbaren Farbſtoffe neue Variationen zu erzielen. Die Zwiebeln wurden allen erdenklichen auf die Umfärbung gerichteten Einwirkungen ausgeſetzt. Die Bemühungen ſcheinen auch nicht erfolglos geweſen zu ſein, denn immer wieder werden die neu geſchaffenen Farbeneffekte hervorgehoben.
Wenn hier einige Anregungen zur Umfärbung lebender Blumen und Gräſer gegeben werden, ſo muß von vornherein vor übertriebenen Erwartungen gewarnt werden. Als unbedingt praktiſch verwendbare Maßnahme können die beſchriebenen Verſuche trotz unleugbarer Erfolge nicht hingeſtellt werden, denn wir werden hierbei an die von der Edelbaumgeſellſchaft in Dresden jahrelang fortgeſetzten Bemühungen, das Holz im lebenden Stamme zu färben, ganz lebhaft erinnert. Die Chemie der Farbſtoffbereitung ſteht heute auf einer hohen Stufe der

Vollendung und hat auch zum Färben des Holzes im lebenden Stamme durchaus geeignete Farbenſtoffe geſchaffen. Das nach dem Verfahren von Reinhold gefärbte Holz hatte gegenüber dem in der Werkſtatt gebeizten mancherlei Vorzüge. Die Farben waren ſatter, dezenter und auch lichtbeſtändiger. Auch die Polituren nahmen dieſe Hölzer bei den Vollendungsarbeiten beſſer auf als die nachträglich gefärbten und gebeizten. Wenn ſich trotz dieſer unſtreitigen Erfolge die an dieſe Maßnahmen geknüpften Erwartungen nicht in vollem Maße verwirklicht haben, ſo iſt das wohl hauptſächlich darauf zurückzuführen, daß die Farbe nur von beſtimmten Holzarten gleichmäßig und in ausreichender Sättigung aufgenommen wird. Obwohl die Struktur der Blumen und Gräſer ganz ungleich poröſer als die des Holzes iſt, wird auch von dieſen die Farbe keineswegs einheitlich aufgenommen.

Wie verſchieden die chemiſche Zuſammenſetzung der Farbe bei den Blumen iſt, erkennen wir am deutlichſten bei getrockneten Blumen. Legt man etwa eine lebende Kornblume zum Trocknen in ein Buch, ſo verblaßt das Blau in kurzer Zeit faſt vollſtändig. Andere Blumen dagegen zeigen eine ganz bedeutende Beſtändigkeit, und man ſucht dieſe Eigenſchaft praktiſch auszunützen. Die Blumen werden zwiſchen weißem Seidenpapier in zierlicher Anordnung befeſtigt und zur Herſtellung von Lampenſchirmen und ähnlichem verwendet.

Dem Farbenchemiker iſt es bekannt, daß unter dem Einfluß von Chlor und ſchwefliger Säure alle Farben reduziert werden und zwar auf Körpern jeder Art. Beſonders Clor zerſtört eine ganze Reihe Farben vollſtändig. Unter der Einwirkung ſchwefliger Säuredämpfe, wie ſolche beim Anbrennen von geſchmolzenem Schwefel erzeugt werden, beleben ſich einige Farben unter dem gleichzeitigen Einfluß des Sauerſtoffs der Luft wieder von neuem. Durch chemiſche Einwirkungen können zahlreiche gefärbte Objekte, aber auch Blumen gegen die Entfärbung geſchützt werden. Eine intereſſante Farbenveränderung kann man bei blauen und violetten Blüten ſchon durch den Rauch einer brennenden Zigarre erzeugen. Nach der Einwirkung von einigen Minuten verändert ſich die Farbe ins Grüne; je dunkler die urſprüngliche Farbe war, deſto ſatter erſcheint die durch die Rauchwirkung erzeugte neue Färbung. Schon Goethe hat in ſeiner Farbenlehre bemerkt, daß Roſen durch Tabakrauch grün werden.

Durch allerhand einfache chemiſche Reaktionen laſſen ſich ſehr verſchiedene Farbenveränderungen an Blumen beobachten. Man ſteckt eine friſch geſchnittene Blume in die Röhre eines Trichters, hierauf gießt man auf einen Teller einige Tropfen Salmiakgeiſt und ſtülpt den mit der Blume gefüllten Trichter darüber. Blau, karmin und violett gefärbte Blüten färben ſich unter der Einwirkung dieſer Ammoniakgaſe grün, dunkelkarmesinrote Nelken werden weiß, faſt alle weißen Blüten nehmen ſchwefelgelbe Färbung an. Die Blumenblätter der weißen Lichnis coronata nehmen eine mattgelbe Färbung an, die roten Adern dagegen erſcheinen grünlich. Eine ganz eigenartige Veränderung erleidet hierbei eine Fuchſie mit weißen Kelchblättern und roſa Blumenkrone, während ſich der Kelch gelblich verfärbt, erſcheint die Blumenkrone grün und blau. Taucht man eine derart veränderte Blüte in Waſſer, ſo erhält ſich das künſtleriſche Kolorit mehrere Stunden. Setzt man blaue, rote oder auch roſafarbene Aſtern den Dämpfen der Salzſäure aus, ſo nehmen dieſe eine karmeſinrote Farbe an und behalten ſie auch nach dem Trocknen.

Die in der Tulpenperiode einſt ſo heiß angeſtrebte grüne Blüte kann man bei friſch geſchnittenen Roſen, Heliotrop und Vergißmeinnicht in ſehr ſatter Farbe erzielen. Man taucht die Blüten in eine Löſung, die man aus zehn Teilen Schwefeläther und einem Teil Ammoniak bereitet. Im Handel ſind beide Chemikalien nur ſelten in konzentrierter Form zu haben. Mit Rückſicht auf die im Handel üblichen unbeſtimmten Konzentrationsgrade dieſer Chemikalien iſt es notwendig, zunächſt Verſuche im unverdünnten Zuſtande anzuſtellen. Eine etwa erforderliche Verdünnung mit Waſſer könnte ganz allmählich unter Wiederholung des Verſuches erfolgen. Weiße Blüten nehmen unter der Einwirkung der Schwefeläther-Ammoniaklöſung in der Regel eine gelbe Farbe an. Bei gelben Naturfarben iſt eine ſichtliche Veränderung kaum wahrnehmbar. Eigenartige Effekte laſſen ſich auf friſch geſchnittene Blumen auch in der Weiſe erzielen, daß man dieſe mit der Miſchung und Ammoniak und Äther mit Hilfe eines kleinen ſteifen Borſtenpinſels beſprengt. Die fleckige Färbung wirkt ganz eigenartig.

Intereſſante und ſehr verſchiedenartige Effekte erzielt man beim Eintauchen der Blumen in ſtark verdünnte Salpeterſäure oder Salzſäure. Die Variationen laſſen ſich bei dieſem Verſuch noch vermehren, wenn man die verdünnten Säurelöſungen mit Teerſtoffarben verſetzt, doch dürfen dieſe nicht wahllos angewendet werden, ſie müſſen ſog. ſauren Charakter haben und waſſerlöslich ſein. Derartige chemiſche Spielereien ſind ſchon vor etwa 30 Jahren von den franzöſiſchen Chemikern Houdas und Blanchon beſchrieben worden. Man ſtellt die friſch geſchnittenen Blumen in das Gefäß mit der Teerfarbenſtofflöſung. Der Farbſtoff dringt durch die Kappillarröhrchen aufwärts und färbt ſelbſt die Blüten. Der Verſuch gelingt aber nur bei friſchen, eben geſchnittenen Blumen. Bei einigen Farbſtoffen, wie beiſpielsweiſe dem roten Eoſin erfolgt die Verfärbung ziemlich ſchnell, andere dagegen, beſonders blaue und braune Farbſtoffe brauchen mehr Zeit zur Veränderung. Auch die innere Struktur der Pflanzen hat hierauf Einfluß. Maiglöckchen färben ſich in etwa ſechs Stunden blau oder auch rot.

Bei weißen Blumen ſind die derart erzielten Effekte immer am eigenartigſten. Eine Pikrinſäurelöſung färbt faſt alle weißen Blumen leuchtend gelb. Pikrinſäure iſt ein ziemlich ſcharfes Gift, und bei der Handhabung dieſer Löſung muß ſehr vorſichtig umgegangen werden. Im übrigen iſt der von der Pflanze abſorbierte Farbſtoff ſo gering, daß Übertragungen von Giftſtoffen durch die Pflanze kaum zu befürchten ſind.

Bemerkenswert iſt bei dieſen Verſuchen die Wahrnehmung, daß ſich die verſchiedenen Pflanzen gegenüber dieſen chemiſchen Einwirkungen nicht einheitlich verhalten. Bei Abutilon dringt ſelbſt die reaktionsfähige Pikrinſäurelöſung nur bis in die Kelchblätter, nicht aber in die Blumenblätter. Bei einigen Pflanzen färben ſich die Blütenblätter netzartig, es bildet ſich eine farbige Aderung. Dies läßt ſich beim Schneeglöckchen und bei der weißblühenden Schlingpflanze Lapageria beobachten. Schon nach vier Stunden werden die roten Äderchen ſichtbar. Leicht angenommen werden die Farben der Tulpen, Levkojen, Hyazinthen, Flieder, Primeln und Kamelien. Bei einigen Arten wurde nach dem Färben auch ein etwas ſchnelleres Verwelken als im ungefärbten Zuſtande beobachtet.

Mit einer weißen Blume kann man auch folgendes Experiment machen: In Waſſer löſt man etwas ſauren grünen Teerfarbſtoff und gleichzeitig etwas Eoſin. Die weiße Blume färbt ſich bunt, teils grün, teils rot. Oft bleiben die Farben rein und unvermiſcht. Man kann aber auch zwei verſchiedene Farblöſungen hintereinander anwenden und auch in dieſer Weiſe intereſſante Färbungen erzielen.

In noch ausgedehnterem Maße als bei gepflückten Blumen wird ſich die einmal angeregte Neigung bei privaten Blumenliebhabern in den Verſuchen auswirken, Topfpflanzen zu färben. Auch hier ſind in der Zeit, als man möglichſt viel Tulpenvariationen zu erzielen ſuchte, ausgedehnte Verſuche gemacht worden. Wenn damals mit der künſtlichen Färbung keine befriedigende Ergebniſſe erzielt worden ſind, ſo erklärt ſich dies dadurch, daß die Induſtrie der Teerfarbſtoffe zu jener Zeit für dieſe Zwecke noch keine Farbſtoffe zu ſchaffen vermochte; aber auch die Vorbedingungen für die Aufnahme der Farbe ſind damals verkannt worden. Das Auffaugen des Farbſtoffes kann vor der Topfpflanze nur dann erfolgen, wenn eine nennenswerte Anzahl Wurzelfaſern an den äußern Ausläufern geſpalten oder doch mindeſtens durch Abſchneiden bloßgelegt werden. Krokus, Hyazinthen, überhaupt alle Zwiebelgewächſe eignen ſich für dieſe Umfärbungen ganz beſonders.

Bei Petunien, Hyazinthen und Dahlien kann man ſowohl bei Topfals auch Gartenpflanzung die Farbe dadurch nachdunkeln und ſättigen, daß man dem Boden Holzkohle beimiſcht. Alkaliſche Beimengung, wie fein pulveriſierte Soda in mäßiger Menge dem Erdboden zugeſetzt, gibt dieſen Blumen eine rote Farbe. Eine ganze Anzahl Blumen läßt ſich in ähnlicher Weiſe auch durch phosphorſauren Natron verändern.

Gräſer, Diſteln, Schilfkolben und Mooſe können im getrockneten Zuſtande ganz ähnlich wie Gewebe gefärbt werden. Nicht nur überſeeiſche Ziergräſer, auch mannigfache heimiſche Gewächſe laſſen ſich in farbenfreudigen Tönen färben. In geſchmackvoller Zuſammenſtellung in eine Vaſe geſteckt, bilden dieſe trocknen Pflanzen eine entſprechende Dekoration. Mit Teerſtoffarben laſſen ſich die trocknen Moosarten, aber auch Gerſte und Hafer ſehr leicht färben. Will man bei Moos helle Farbtöne erzielen, ſo muß dieſes zuvor gebleicht werden. Hierzu genügt in der Regel die Einwirkung des Sonnenlichtes und der Luft. Soll das Moos dunkel gefärbt werden, ſo iſt das vorherige Bleichen entbehrlich. Der Farbſtoff wird in warmem Waſſer aufgelöſt und einige Tropfen Eſſigſäure hinzugefügt, die Verdünnung kann dem gewünſchten Farbenton entſprechend variiert werden. Beim Färben von Moos genügen wenige Sekunden, die überſchüſſige Farbſtofflöſung wird abgequetſcht und das Moos auf reinen Brettern zum Trocknen auslegt und ſpäter in Bündeln zum Nachtrocknen aufgehängt.

Die Dauer und Tiefe der Färbung iſt vom Sättigungsgrad der Farbſtofflöſung und auch von der Tauchdauer abhängig. Die in ein und demſelben Farbbade zuletzt gefärbten Bündel zeigen in der Regel eine etwas weniger ſatte Tönung, weil ſich die Reaktionsfähigkeit in der Löſung allmählich verringert.

Vom Werkstoff des Gartens

Für den Heidegarten

UNTER den Freiland-Eriken gibt es prachtvolle, und es ist zu verwundern, daß man gar keine Heidegärten zu sehen bekommt. Denn kaum ein Garten erscheint stimmungsvoller als der Heidegarten mit unserer heimischen Calluna, der Schneeheide im Frühjahr, dann den vielen, schönen Eriken-Arten, der Bärentraube und Krähenbeere. Dann müssen noch ein paar Krüppelkiefern und Birken und unser herrlicher, heimischer Besenginster hinein, der eine Leuchtkraft wie selten eine Pflanze hat. Dazwischen kommen noch einige prachtvolle große Findlinge, die hier ebenso wichtig und wertvoll sind wie die Pflanzen. Das ganze Jahr kann man in solch einem Garten ein Blühen und Bienensummen haben, im Frühjahr die Schneeheide und den leuchtenden Ginster, dann die anderen Ericaceen bis in den Herbst, und wenn der Garten mit den abgeblühten Blütenstengeln sein Brokatkleid anlegt, und die Birken ihre Goldblätter schütteln, ist die Stimmung ebenso bezaubernd, wie sie wehmütig sein kann bei Regen- und Nebelwetter. Ich kann mir nicht denken, daß ein solcher schöner Heidegarten mehr kosten sollte als Steingärten. Torfmull und Heideerde sind jedenfalls nicht teurer als die Steine. Meistens scheitert es aber am Mangel an Pflanzenmaterial.

Cassiope tetragona

Die beiden Gattungen, die ich heute hervorheben will, sind zwar nicht von so draufgängerischem Wuchs wie die Schneeheide und die anderen Erikenarten, dafür sind sie aber wegen ihrer Seltenheit, und weil sie etwas fürsorglicher behandelt werden müssen, ein um so größerer Stolz für erfahrene Pflanzenliebhaber. Wenn nach der Erica carnea die *Phyllodoce taxifolia* erblühen, weiß man nicht, welche schöner ist, wertvoller ist Phyllodoce. Im Mai erscheinen an den Zweigspitzen in Büscheln die purpurfarbenen glockenförmigen Blüten in einer Größe, wie man sie bei den Freilanderiken nicht gewohnt ist. Die Pflanze erinnert mit ihren Blättern, wie schon der Name sagt, an Taxus, der Synonymname coerulea ist schon wegen der purpurnen Blütenfarbe ganz unberechtigt. Die Verbreitung der Gattung Phyllodoce, von der wir sieben Arten haben, geht von den Gebirgen des atlantischen Nord-Amerika über Labrador, Grönland, Skandinavien bis Kamschatka und Japan. Die Phyllodoce wird sich an passenden Stellen, etwas absonnig, für den Heidegarten wie auch Steingarten, aber nicht für den regelmäßigen, eignen. In Nachbarschaft von Arctostaphylos, anderen schwachwüchsigen Eriken, auch mit der Cassiope zusammen, wird sie sich gut vertragen. Um aber eine etwas bessere Bildwirkung zu haben, pflanze man immer mehrere Exemplare; die Pflanzen gedeihen so immer besser als einzeln. Der Boden soll für sie moorig, mit etwas Torfmull und Sand sein, wie es alle Eriken verlangen. Da Eriken meistens das maritime Klima bevorzugen, wird man für genügende Boden- und auch Luftfeuchtigkeit ständig Sorge tragen müssen; jedenfalls ist ein etwas mehr besser als ein zu wenig. Sollten die Pflanzen im Laufe der Jahre unten die Blätter verlieren, so genügt ein Tieferpflanzen, das sie wieder in dem frischen Boden zu einem freudigen Wachstum anregt. *Cassiope tetragona* ist für den Pflanzenliebhaber noch interessanter. Man

Phyllodoce taxifolia

glaubt eher ein vorsintflutliches Bärlappgewächs in Miniaturbaumform vor sich zu haben als eine Ericacee. Die Blätter liegen in vier Zeilen ganz dicht und fest, dachziegelartig übereinander, fangen manchmal an von unten braun zu werden, was garnicht schadet, denn dieses ist eine ganz natürliche Erscheinung und typisch für sie. Wen dieses stört, pflanze sie auch wie die Phyllodoce in frischem Boden tiefer, sie macht an diesen braunen Stellen wieder neue Wurzeln. Die Blüten ähneln in der Form einzelnen Maiblumenglöckchen und hängen ganz allerliebst an den kleinen Zweigen, sind auch ebenso weiß und ebenso groß, allerdings erscheinen sie manches Jahr wenig oder manchmal auch garnicht, allzu groß ist der Blütenreichtum nie. Dafür ist die Freude umso größer, wenn die Pflanzen plötzlich reichlich blühen. Boden, Standort und auch Behandlung sind wie bei der Phyllodoce.
Die Vermehrung durch Stecklinge im Juli-August ist leicht, hat die Phyllodoce bis zum Herbst noch nicht gewurzelt, so lasse man sie ruhig den Winter hindurch in einem temperierten Haus, wo sie bis April-Mai bestimmt fertig ist. Als Winterschutz für die draußen Ausgeplanzten genügen ein paar Fichten- oder Tannenzweige, man vermeide Laub oder ähnliches, damit die Sachen nicht faulen.

C. R. Jelitto

Auf dem Balkon

Im September

WIR haben im Frühjahr die besten Zusammenstellungen von wirkungsvollen Balkonbepflanzungen, ihre richtige Bepflanzung und Pflege besprochen, bei Befolgung der angegebenen Ratschläge dürfte der Blumenliebhaber mit seinen Erfolgen zufrieden sein.
Die Arbeiten an unsern Balkonpflanzen beschränken sich nun auf richtiges Gießen, das je näch der Witterung sparsamer oder reichlicher bemessen werden muß, und Entfernung gelb gewordener oder abgestorbener Blüten und Zweige. Die verblühten Blumen müssen immer entfernt werden. Samenansatz an den Pflanzen ist möglichst zu unterdrücken. Sobald reichlich Samenansatz an einer Pflanze vorhanden ist, läßt die Blühwilligkeit nach, die Blüten werden kleiner, die Pflanze verwendet ihre Nährstoffe zur Ausbildung des Samens und sucht ihre Fortpflanzung sicherzustellen. Um einen recht lange anhaltenden Flor zu erzielen, ist es daher sehr wesentlich, alle Samenstände auszubrechen. Die Rankpflanzen müssen immer fleißig aufgebunden, und falls sie zu wild wachsen sollten, durch Ausschneiden etwas gelichtet werden.
In vielen Fällen wird sich ein Nachlassen in der Blüte und im Wachstum zeigen, dann ist es angezeigt, mit Dünger etwas nachzuhelfen, sei es durch verdünnte Jauche oder künstliche Dünger, entweder trocken oder oben aufgestreut und mit einem Stäbchen leicht unter die Erde gemischt, oder auch in aufgelöstem Zustand dem Gießwasser beigesetzt. Bei Anwendung künstlicher Düngemittel hüte man sich wohl, das vorgeschriebene Maß zu überschreiten, die heute im Handel befindlichen künstlichen Dünger, wie Harnstoff, sind stark konzentriert, so daß größere als die vorgeschriebenen Dosen leicht ein Verbrennen der Wurzeln und ein Absterben der Pflanzen zur Folge haben können.
Besser ist öfteres Düngen, etwa einmal die Woche, als zu starke Lösungen zu verwenden. Bei zu starkem Rückgang der Blütenbildung und einer allgemeinen Wachstumsstockung ist oft auch ein leichter Rückschnitt der Pflanzen, verbunden mit einigen leichten Dunggüssen, sehr von Nutzen. Das Wachstum wird hierdurch neu angeregt, und die Blütenbildung wird neu einsetzen.
Durch die angegebenen Hilfsmittel läßt sich der Flor bis spät in den Herbst hinein ausdehnen und lohnt so die angewendete Mühe.
In kälteren Gegenden sind oft schon Ende September-Anfang Oktober leichtere Vorfröste zu erwarten. Der aufmerksame Blumenfreund wird, wenn Nachtfröste zu befürchten sind, seine Pflanzen durch Überhängen von Tüchern oder Umbinden von starkem Papier vor den ersten Frösten schützen und so oft noch wochenlang seine Freude daran haben.

H. Gehringer

JOHANNES KÖSTER / BLÜTENNOTIZEN

Einige Juniblüher

AUS der Fülle der Juniblüher hier eine kleine Auswahl, wie sie das Beobachtungsmaterial bot. Paeonien fallen ganz aus, der kleine Bestand mußte vermehrt werden, Blüten fielen einem Fest zum Opfer, wichtige Sorten konnten erst nach einiger Erholung aus der Inflation beschafft werden, ehe sie erstarkt sind, vergehen Jahre, daher können erst 1927 einwandfreie Beobachtungsdaten erzielt werden.

	1922				1923				1924				1925			
	Erblüht	Vollblüte	Noch ansehnlich bis	Verblüht	Erblüht	Vollblüte	Noch ansehnlich bis	Verblüht	Erblüht	Vollblüte	Noch ansehnlich bis	Verblüht	Erblüht	Vollblüte	Noch ansehnlich bis	Verblüht
Achillea Millefolium Kelwayi	16.6.	24.6.-27.7.	9.8.	19.8.	27.6.	7.7.-21.7.	25.7.	11.8.	18.6.	28.6.- 9.7.	28.7.	9.8.				
— — Kirschkönigin	13.6.	1.7.-26.7.	16.8.	21.8.	25.6.	9.7.-21.7.	25.7.	8.8.	14.6.	20.6.- 9.7.	21.7.	28.7.				
Anchusa italica	9.6.	13.6.- 1.7.	20.7.	26.7.	4.7.	15.6.-18.7.	25.7.	28.7.	14.6.	18.6.-14.7.	28.7.	20.8.	27.5.	30.5.-15.6.	20.6.	8.7.
Armeria Laucheana		———				———			7.6.	11.6.-18.6.	21.6.	28.6.	18.5.	23.5.- 2.6.	6.6.	10.6.
Aster alpinus	21.5.	6.6.-16.6.	20.6.	24.6.	9.6.	18.6.-30.6.	7.7.	11.7.	14.6.	18.6.-25.6.	30.6.	3.7.	30.5.	5.6.-13.6.	17.6.	22.6.
— subcoeruleus		———			20.6.	25.6.- 7.7.	11.7.	18.7.	21.6.	25.6.- 2.7.	5.7.	7.7.	2.6.	8.6.-15.6.	20.6.	24.6.
Astrantia carniolica rosea		———				———				———			17.6.	22.6.-11.7.	15.7.	29.7.
— major	13.6.	24.6.-28.7.	2.8.		9.6.	18.6.-21.7.	28.7.	1.8.	18.6.	25.6.-21.7.	30.7.	4.10.	8.6.	13.6.-22.7.	27.7.	3.8.
— — 2. Blüte					15.8.	27.8.-3.10.		15.11.		———				———		
Betonica grandifl. superba	6.6.	9.6.-16.6.	24.6.	1.7.	20.6.	25.6.-18.7.	21.7.	1.8.	18.6.	25.6.- 7.7.	12.7.	21.7.	10.6.	13.6.-24.6.	29.6.	6.7.
Campanula carpatica alba	20.6.	1.7.-20.7.	26.7.	26.7.	16.7.	30.7.- 5.9.	13.9.	27.9.	21.6.	2.7.- 9.8.	13.8.	30.8.	12.6.	27.6.-13.7.	18.7.	8.8.
— — frühe Rasse		———				———			18.6.	25.6.- 9.8.	16.8.	15.9.	27.6.	4.7.- 5.8.	8.8.	15.8.
— — späte Rasse		———				———			25.6.	2.7.-20.8.	27.8.	10.9.	4.7.	8.7.-10.8.	15.8.	19.8.
— glomerata superba	16.6.	24.6.- 4.7.	15.7.	19.7.	25.6.	4.7.-11.7.	14.7.	25.7.	23.6.	28.6.- 5.7.	7.7.	9.7.	2.6.	10.5.-27.6.	1.7.	6.7.
— macrantha	13.6.	20.6.- 1.7.	8.7.	10.7.	30.6.	5.7.- 9.7.	11.7.	16.7.	16.6.	21.6.-28.6.	5.7.	12.7.	10.6.	12.6.-20.6.	24.6.	29.6.
— — alba	24.6.	27.6.- 4.7.	15.7.	15.7.	7.7.	11.7.-14.7.	18.7.	21.7.	25.6.	28.6.- 5.7.	9.7.	16.7.	12.6.	22.6.- 1.7.	4.7.	8.7.
— persicifolia »Die Fee«	14.6.	16.6.-26.7.	—	—	30.6.	5.7.-14.7.	29.8.	20.9.	18.6.	23.5.-30.6.	9.7.	30.7.	5.6.	8.6.-15.6.	22.6.	27.6.
— — Moerheimii		———			9.7.	11.7.-16.7.	29.8.	20.9.	28.6.	2.7.- 9.7.	16.7.	26.7.		———		
— pusilla	16.6.	20.6.- 1.7.	4.7.	19.7.	30.6.	5.7.-14.7.	15.8.	27.8.	11.6.	16.6.- 2.7.	9.7.	11.8.	6.6.	8.6.-27.6.	1.7.	6.7.
— — »Miß Willmott«		———				———			18.6.	23.6.- 2.7.	26.8.	10.9.	2.6.	8.6.- 8.7.	15.7.	22.7.
— turbinata »Isabella«		———			9.7.	11.7.-29.8.	3.9.	15.4	18.6.	28.6.-24.7.	16.8.	1.9.	15.6.	22.6.- 8.7.	13.7.	29.7.
Centaurea dealbata		———				———			14.6.	18.6.-28.6.	2.7.	7.8.	27.5.	2.6.-13.6.	20.6.	29.6.
Delphinium chinense azureum	10.6.	16.6.- 5.8.	16.8.	—	5.7.	9.7.-18.7.	28.7.	8.8.	25.6.	30.6.-14.7.	23.7.	30.7.	6.6.	10.6.- 8.7.	15.7.	29.7.
— atropurpureum						———			14.6.	18.6.-25.6.	30.6.	7.7.	30.5.	6.6.- 4.7.	8.7.	17.7.
— »King of Delph.«	27.6.	1.7.-19.7.	20.7.	26.7.	15.6.	30.6.- 9.7.	14.7.	28.7.	3.7.	7.7.-14.7.	16.7.	23.7.	11.6.	13.6.- 8.7.	13.7.	18.7.
— — 2. Blüte		———				———				———			17.8.	24.8.-26.9.	30.9.	5.10.

Gartenrundschau

NEUES AUS ALLER WELT

Lebende Einfassungen von Staudenrabatten

AUS einer Besprechung dieses wichtigen Themas von R. E. Head in *The Garden* (no. 2839) sei folgendes hervorgehoben, da es auch für Mitteleuropa zutrifft. Die bekannteste Einfassungspflanze ist natürlich Buchsbaum, Buxus suffruticosa, auch Evonymus japonica ist gut, doch leiden die bunten Formen in rauhen Lagen im Winter leicht bei starkem Schnitt. Epheuränder können gut wirken. Hedera hibernica gilt als die schnellst wachsende, ist bei uns aber nicht so hart wie Helix-Formen. In gleicher Weise läßt sich Vinca minor verwenden, nicht aber V. major. Thymus aureus und T. argenteus sind ebenfalls brauchbar, und Erica carnea kann gelegentlich schöne Kanten bilden. — Unter den Stauden nennt Verfasser Nepeta Mussini zuerst, die lange blüht und deren zartes Lavendelblau zu allen anderen Farben paßt. Man soll in rauheren Lagen die alten Blütenstengel bis zum Frühjahr belassen. Von Iberis gilt ihm I. correaefolia als beste, die aber aus Stecklingen zu ziehen ist. Ferner Veronica incana und für den Schatten Saxifraga umbrosa, insbesondere var. Ogilviana. In starkem Schatten Asperula odorata. Schließlich werden noch genannt Armeria maritima var. Laucheana, Tiarella cordifolia und Thalictrum adiantifolium, die letzten zwei für frische Lagen. Trockenheit verträgt Waldsteinia trifolia.

Wertvolle Stauden-Paeonien

BEI der Prüfung im Jahre 1925 durch die amerikanische Paeonien-gesellschaft, wobei ein neues Bewertungsverfahren angewendet wurde, erhielten die folgenden Staudenpaeonien die höchsten Zahlen, wie wir einer Mitteilung in *Horticulture* vom April entnehmen. »Jeannot« (Dessert 1918), hell lavendelrosa mit silbernen Lichtern: »Phyllis Kelway« (Kelway 1908), die Farbe wird als ein »delicate flushed pink crèpe de chêne« bezeichnet, spätblühend, gut duftend: »Mrs. Ed. Harding« (E. J. Shaylor), Farbe nicht angegeben; »Pres. Wilson« (Th. Thurlow), zart rosenrot bis krebsrot und zuweilen einigen karmesinfarbenen Flecken, becherförmig, duftend, spät, gilt als eine der besten in der Welt; »Mrs. A. M. Brand« (Brand), wundervoll reinweiß, sehr groß. Als vielversprechende neuere Formen gelten ferner: A. M. Slokum (Franklin 1920), June Day (Franklin 1920), Mabel Franklin (Franklin 1920), Frankie Curtis (Vories 1924), Nancy Dolman (Vories 1924), Nine Secor (Secor 1924) Florence McBeth (Sass 1924), John M. Good (Good & Reese), Matilda Louis (Saunders 1921).

Japanische Zierkirschen

BISHER werden diese so wundervollen Maiblüher bei uns immer noch viel zu stiefmütterlich behandelt. Nach Beobachtungen im Arnold Arboretum (Bulletin Bd. XII, no. 3.) sind die besten gefüllten Formen folgende. Von Prunus serrulata sachalinensis erwiesen sich als die allerbesten die Formen Albo-rosea (James H. Veitch) und Fugenzo, ferner Sekiyama, Kirin, Horini und Hisakura. Von den Formen der Prunus Lannesiana sind die sechs wertvollsten Formen Jonioi, Miyako, Sirotae, Amanogawa, Ojochin und Ochichima. Sie müssen auf Sämlinge von Prunus serrulata sachalinensis, der echten nördlichen Wildkirschenform, veredelt werden, um gut auszuhalten. Bei Samenbezug aus Japan erhält man meist eine nicht genügend harte südlichere Form.

Corylus-Hybriden

UNTER den Haselnüssen gibt es verschiedene sehr interessante Hybriden zwischen den echten Arten. Die bekannteste ist wohl C. Rehderiana, eine Hybride zwischen C. Avellana und C. Colurna, der Baumhasel. Diese Hybride, die fruchtbar ist und sehr wohlschmeckende Früchte trägt, lernte ich zuerst vor etwa 25 Jahren in dem damals so interessanten Forstgarten zu Hann. Münden kennen. Vor einigen Jahren sah ich ein sehr schönes Exemplar im botanischen Garten zu Münster. Man sollte diesen Bastard stark vermehren. Jetzt beschreibt nun Rehder in Band VII des Journal of the Arnold Arboretum vom April 1926 zwei neue Corylus-Hybriden. Die eine ist C. Vilmorini, zwischen C. Avellana und C. chinensis, der sehr interessanten harten chinesischen Baumhasel. Die Pflanze bedarf noch weiterer Beobachtungen. Die zweite neue Hybride ging aus C. Avellana und C. tibetica hervor und heißt C. spinescens. C. tibetica hat eigenartige Früchte deren Hülle an die einer echten Kastanie erinnert. Auch diese neue Hasel muß weiter erprobt werden.

Die Romneya-Arten

DIE aus Kalifornien stammende mohnartige Staudengattung Romneya ist bei uns meist nur in der zuerst 1875 nach Europa eingeführten Art R. Coulteri bekannt. Ist diese auch in ihrem blaugrauen Blattwerk und den großen atlasweißen Mohnblüten sehr schön, so gedeiht sie doch meist nicht eben besonders und pflegt schwer zu blühen. Viel empfehlenswerter ist, wie H. Correvon im Jardin d'Agrément (Juni 1926) berichtet R. trichocalyx, die etwa zehn Jahre später zu uns kam. Sie breitet sich stärker durch Ausläufer aus, ist üppiper, hat noch blauere, größere, tiefer eingeschnittene Blätter und vor allem stumpfe, fast stachelig behaarte Blütenknospen, die bei Coulteri kahl sind. An geeigneten Orten pflegt sich R. trichocalyx stark zu verbreiten, so hat sie sich nach meinen Beobachtungen auch im Alpengarten zu Pruhonitz in Böhmen als hart, wüchsig und reichblühend bewährt. Nach Correvon hat nun Van Deden in Chatelaine bei Genf eine interessante Hybride zwischen beiden Arten erzogen, die die gleichen guten Eigenschaften, wie C. trichocalyx besitzen soll. Im Süden, wie etwa im Hanburyschen Garten zu La Mortola, sollen diese Romneya allerdings durch allzustarke Ausbreitung lästig werden. Bei uns in großen Steingärten kann man es ihnen schon erlauben.

Schneckenbekämpfung

IM Steingarten haben wir nur zu oft unter Schnecken zu leiden. Nach Beobachtungen in England, die auch bei Georg Arends in Ronsdorf nachgeprüft wurden, hat sich konzentrierte Alaunlösung sehr bewährt. Man begießt damit die von Schnecken befallenen Stellen bei nicht zu feuchtem Wetter. Die Tiere, die etwas davon abbekommen, sollen unweigerlich eingehen, den Pflanzen soll aber die Lösung nichts schaden. *C. S.*

Das Recht im Garten

ZU den Ausführungen im Juniheft wird uns noch geschrieben: Gegen die Beeinträchtigung der Grenze schützt das Gesetz durch die Bestimmung, daß Erhöhungen des Grund und Bodens, wie sie gerade heute in Gärten häufig sind, drei Fuß (94 Centimeter) von der Mauer oder vom Zaun des Nachbargrundstückes entfernt bleiben müssen. Auch Vertiefungen dürfen nur vorgenommen werden, wenn dadurch der Boden des Nachbarn nicht abrutscht, eine genügende Abstützung ist also durchaus erforderlich. § 909.
Um eine Grenzverletzung handelt es sich auch, wenn der Nachbar über die Grenze baut, sei es durch ein Gebäude, ein Gartenhaus oder eine Mauer. Ist der Bau absichtlich, aus Fahrlässigkeit, durch Unterlassung der genauen Feststellung der Grenze oder trotz des Einspruches der Benachteiligten ausgeführt, so kann auf Niederlegung des Baues gedrängt werden. Jedes Einspruchsrecht erlischt aber, wenn der Nachbar während des Baues die Übertretung der Grenze wohl bemerkte, aber keinen Widerspruch erhob. *Karl Wagner*

Neue Bücher

DER STEINGARTEN. Die bei Paul Parey, Berlin, erscheinenden gärtnerischen Lehrhefte haben in no. 23 »Der Steingarten, seine Anpflanzung und Pflege« von *E. Wocke* eine sehr hübsche Bereicherung erfahren. Es ist immer höchst erfreulich, wenn man mal ein Gartenbuch in die Hand bekommt, daß von einem erfahrenen und mit dem Garten liebevoll verwachsenen Autor stammt, der so recht aus dem reichen Borne seiner Erlebnisse schöpft. Wocke hat sich schon vor Jahrzehnten durch sein Alpenpflanzenbuch einen Namen gemacht. Vielleicht steckt auch jetzt noch etwas zuviel der Alpinenpfleger in ihm. Er hat es aber doch verstanden, den Steingarten der heutigen Zeit zu schildern und allen denen, die ihn besitzen oder in ihrem Garten schaffen wollen, wertvolle Anregungen zu geben. Leider kommen die vielen schönen Bilder

auf dem für Autotypien ungeeigneten Papier nicht so zur Geltung, wie es wünschenswert wäre. Vielleicht hätte man auch einige, wie etwa no. 45 und ähnliche, besser weglassen und dafür einige Bilder guter regelmäßiger Steingärten geben sollen, denn dieser Typ ist im Bilde durch die Nummern 58 bis 64 nur unzulänglich vertreten. In der am Schluß gegebenen Pflanzenauswahl wäre es wohl empfehlenswert, die besten Gartenformen bei Phlox, Primeln, Saxifragen, Sedum, Sempervivum und einigen anderen Gattungen noch schärfer herauszuheben. Hier ist manches noch zu sehr auf das Alpinum anstatt auf die Trockenmauer und den Steingarten, berechnet. Doch wird jeder ernste Gartenfreund diese Schrift mit Befriedigung lesen. *C. S.*

MARKTGEMÜSEBAU: In Nr. 8 der Gärtnerischen Lehrhefte die bei Paul Parey-Berlin erscheinen, behandelt *C. Maidorn* die »Betriebsgrundsätze des Marktgemüsebaues«. Diese Schrift macht den Eindruck, daß der Verfasser einen Betrieb gut zu leiten weiß, daß es ihm aber nicht gelang, sein Wissen geordnet darzustellen. Darin liegt ein Lob, denn volkswirtschaftlich muß die erste Leistung über die zweite gestellt werden. Für das Buch wirkt allerdings das teilweise Versagen als Schriftsteller ungünstig. Außerdem scheint die Niederschrift, trotzdem als Ausgabejahr 1924 genannt wird, in der Zeit des Währungsverfalles erfolgt zu sein. Dadurch tritt die Zeitbedingtheit vieler Urteile des Verfassers deutlich hervor. Seine Aufgabe hätte aber sein müssen, über die Zeitbedingtheit hinausgehende Grundsätze der Betriebswirtschaft aufzustellen und zu erläutern. Das geschieht aber nicht. Der Verfasser behandelt diese Fragen im Rahmen der üblichen Gemüsebücher. Der Satz: »Der Jahresertrag, d. h. der voraussichtliche, ist zuerst festzustellen, davon sind die Betriebsunkosten und der notwendige Lebensunterhalt abzusetzen« ist von lapidarer Naivität. Über die Neueinrichtung von Betrieben faßt er sich ebenfalls unerschrocken kurz: »Ohne genügenden Rat von erfahrenen Fachleuten wird auch der befähigste Fachmann nie eine solche Sache unternehmen, und ich halte es für überflüssig, darauf näher einzugehen«. Gerade das war aber doch die Aufgabe des Buches! Gute Vertragsvordrucke für Abschlüsse mit dem Einmachegewerbe hätte der Verfasser aus Braunschweig beziehen können. Er hätte daraus ersehen, daß vielmehr zu bedenken und zu regeln ist, als nach seinem einfachen Vorschlag erwartet werden kann. So meldet sich Widerspruch beim Lesenden noch recht häufig, wenngleich uns auch zahlreiche praktische Winke begegnen, die offenbar bestem Erleben entsprossen sind und uns zu einem sympathischen Gesamteindruck verhelfen. Das ändert aber nichts daran, daß der Buchinhalt dem Titel nur recht unvollkommen entspricht. *A. S.*

DEUTSCHE BINNENKOLONISATION. Im Auftrage der Deutschen Gartenstadt-Gesellschaft, Berlin-Grünau, hat *Leberecht Migge* unter diesem Titel ein Oktavheft von fast 200 Seiten über die Sachgrundlagen des Siedlungswesens im Kommunal-Verlag, Berlin-Friedenau, herausgegeben. Ein Buch von Migge darf immer auf größte Beachtung rechnen. Der Autor ist den Lesern der Gartenschönheit durch seine von Persönlichkeitswillen durchpulsten Artikel bekannt. Das Buch ist temperamentvoll, aber sachlich geschrieben und sollte von jedem gelesen werden, der mit den heute so im Vordergrunde stehenden Siedlungsfragen zu tun hat. Noch wertvoller als dieser erste mehr allgemeine Teil dürfte der geplante zweite »Die Kleinboden-Technik« werden.

EDELGLADIOLEN. In einer kleinen, im Selbstverlage erschienenen Schrift gibt *Paul Pfitzer*, Stuttgart-Felbach, einen kurzen Überblick über die seit 35 Jahren gesammelten Gladiolenerfahrungen. Außer den wichtigsten eigenen Züchtungen werden auch einige neuere amerikanische mit behandelt. Der Gladiolenfreund wird diese kurze Einführung in das Wesen und die Kultur der modernen Gladiolen begrüßen.

SUKKULENTENKUNDE. Die von der rührigen und erfolgreichen Deutschen Kakteen-Gesellschaft durch Dr. F. Vaupel herausgegebene *Zeitschrift für Sukkulentenkunde* bietet in Heft neun bis zwölf (Februar bis Juni) wieder viel Sachliches und Anregendes. G. Schwantes berichtet über mancherlei Beobachtungen an Mesembryanthemen, wobei er auch neue Gattungen aufstellt. Von Farbentafeln liegen solche von Mamillaria mazatlanensis und Rhipsalis robusta bei.

JAHRBUCH FÜR TIER- UND GARTENFREUNDE. Unter diesem Titel hat *Georg Horthum* im Verlage von F. O. Müller, Altenburg i. Th., ein, wie er im Vorwort sagt »zuverlässiges Lexikon« herausgegeben, das den Tier- und Pflanzenfreunden in jedem Falle Rat und Aufschluß gibt. Wenn man nun darauf hin die für den Gartenbau gegebenen Listen durchsieht, so findet man zunächst bei den lateinischen Namen eine Unmenge grober Druckversehen, wie Aster »chinesis«, »Dalia« variabilis oder »Georgenia«, »hydrangea paniculatra«, »Hyacynthus Orientales«, »Tulpia« und so weiter. Prüft man die Sortenauswahl bei den Rosen, so stößt man auf geradezu groteske Namenverballhornungen, wie »Gorgerus« für Gorgeous, »Golden Ophello« für Golden Ophelia, »Belle Honaise« für Belle Lyonnaise Das zeigt doch, daß die Bearbeitung alles andere als zuverlässig ist.

AMERIKANISCHE DAHLIEN-GESELLSCHAFT. Das Bulletin no. 33 vom Juli ist wieder reich an kleinen Mitteilungen meist interner Art. Interessant ist eine Kontroverse über die Frage, ob bei der Pflanzung Stecklinge oder Knollen vorzuziehen sind. Es handelt sich dabei zum Teil um Gegensätze zwischen der Alten und der Neuen Welt. *C. S.*

Zeitschriften

BELGIEN

In no. 507 von *La Tribune Horticole* wird das Programm des Nationalen Gartenbaukongresses in Namur und ein Bericht über die Rosenschau vom 18. bis 19. Juli in Gent gegeben. Auch das folgende Heft behandelt meist Ausstellungsthemen neben den üblichen kurzen Notizen. Im Juliheft von *Le Jardin d'Agrément* werden Endymion (Hyacinthus) nonscriptus und Lymnanthemum nymphaeoides besprochen.

DÄNEMARK

In no. 5 der *Havekunst* wird ein Stadtplatz in einem landschaftlichen und einem architektonischen Entwurfe gezeigt. Außerdem werden verschiedene Vergleichsentwürfe von Hörern aus einem Entwurfskursus am technologischen Institut im Bilde vorgeführt.

ENGLAND

The Garden zeigt in no. 2854 einen hübschen Fruchtzweig des noch seltnen Sorbus Vilmorinii und eine schöne Pflanze von Acer palmatum. Ferner beginnt eine Artikelreihe des verstorbenen Rev. J. Jakob über Blumenzwiebeln. Im folgenden Hefte ist besonders der Artikel von R. G. Walter über Lilien für jedermanns Garten erwähnenswert. Abgebildet werden schöne Pflanzen von L. monadelphum Szovitsianum, L. Martagon album und L. chalcedonicum. — In no. 2067 von *The Gardener's Chronicle* wird auf eine jetzt fast verschollene Einjahrsblume: Sabbatia campestris, ein Enziangewächs aus den mittleren Vereinigten Staaten hingewiesen. Eine wunderschöne neue Orchidee scheint nach dem Bilde Sophrolaeliocattleya Prudence zu sein. Sonst enthält dies Heft auch den üblichen Bericht über die Obsternteaussichten in Großbritannien. Wie ein Bild in no. 2068 zeigt, wächst die Zahl der schönen Odontoglossum crispum-Formen ständig. Var. Mrs. Stanley Baldwin ist sehr bezeichnend. Ein Aufsatz über Hemerocallisformen sei erwähnt. F. Kingdon Ward beginnt seine Berichte über seine 9. Expedition nach Ostasien. In no. 2069 setzt N. E. Brown seine Artikelreihe über Mesembryanthemum fort. Ebenso H. Friend die seine über klassische und legendäre Gärten. Zu welch baumartigen Sträuchern Hydrangea vestita in Südwest-Schottland anwachsen kann, zeigt ein Bild aus Monreith.

FRANKREICH

Im Augustheft der *Revue Horticole* berichtet J. Gerôme über Kakteen und gibt Bilder aus der Heimat. Die Farbentafel zeigt Formen großblütiger Pentstemon gloxinioides-Hybriden. Auch ein Artikel über Bambusen in Algier und Südamerika sei erwähnt.

HOLLAND

In no. 32 der *Floralia* setzt Ch. de Bosschere seine Reiseerinnerungen aus Norditalien fort. Bleekers Artikelreihe über Baumschnitt ist auch in no. 33 noch nicht beendet. — *Onze Tuinen* behandelt in no. 7 die Stauden-Pentstemon. In no. 8 ist ein interessantes Bild aus dem Jahre 1672, das Okulieren von Bäumen darstellend.

NORDAMERIKA

Das Juliheft von *Landscape Architecture* bringt Beiträge von P. H. Elwood über die Villa Rufolo in Ravello, S. Herbert Hare, über die Beziehungen der Gartenarchitekten zur Frage der Staatsparke, Ch. H. Diggs, Bilder aus staatlichen Parks in Iowa, H. G. Cotton, über Anlagen bei einem Wirtshaus an der Landstraße in Brookdale, Kalifornien, E. H. Hood über eine Brückenanlage im Walde, B. Williams, über die Anlagen in Elm Bank bei Boston, H. R. Mosnat über eine neue Pyramiden-Ulme (Moline fastigiate Elm). A. D. Taylor setzt seine wichtigen technischen Betrachtungen fort (über Pflanzung und Verpflanzung). — Das Augustheft von *Horticulture* zeigt unter anderem, wie Rosa virginiana im Arnold Arboretum rabattenartig längs der Hauptwege benutzt wird. — In der Augustnummer von *The Gardener's Chronicle of America* ist die Lilie zur Diskussion gestellt. Als die drei besten Lilien werden angesprochen und im Bilde gezeigt: Lilium candidum, L. auratum und L. speciosum magnificum. — Im *Bulletin of Popular Information of the Arnold Arboretum*, nos. 14 bis 16, finden sich wieder viele dendrologische Einzelheiten, so über Tilia, Fraxinus und Hydrangea-Arten. *C. S.*

VERLAG DER GARTENSCHÖNHEIT G. m. b. H. in Berlin-Westend / Verantwortlich für die Schriftleitung OSKAR KÜHL in Berlin-Westend, für den Anzeigenteil DOROTHEA KLETT, Berlin-Lichterfelde / Druck von W. SOMMER, Buch- und Kunstdruckerei in Berlin - Schöneberg.

Sammelmappe

MEIN HELIOTROP-BAUM

DA ich meinem Obergärtner gegenüber den Wunsch geäußert hatte, recht viel Heliotrop zu haben, so waren vier Beete der schönsten Farben im Garten, und meine Zimmer waren voll der herrlichsten Vasen. Ja, als es zum September ging und bei uns Nachtfröste doch ganz plötzlich auftraten, bat ich mir einige eingetopfte Pflanzen für meinen Salon aus und bekam sie. Nun standen im Treibhaus, unter dem langen Blumentisch hingestellt, einige von diesen zu viel in Töpfen gepflanzten Heliotrop. »Nicht mehr nötig.«

Wie oft im Leben wird etwas von den Menschen wertlos Gedachtes dennoch zur größten Freude. So ging es mit diesen Pflanzen. Keiner kümmerte sich um sie, sie nährten sich nur von den Brosamen, die von der Herren Tische fielen. Beim Besprengen und Begießen bekamen sie immer nur so viel ab, um trotzdem zu »wachsen und zu gedeihen«.

Als vor Weihnachten dann die Töpfe weggetragen werden sollten, stellte es sich heraus, daß zwei von ihnen mit den Wurzeln fest in die Treibhauserde gewachsen waren und deshalb auf meinen Wunsch bleiben sollten. Nun wurden diese Pflanzen meine ganze Liebe und bekamen sehr oft von mir einen Extraüberguß Wasser. Als ich dann nach einer Reise zurück-

kam, waren die Zweige über den Tisch gewachsen. Das ganze Frühjahr und den ganzen Sommer haben diese Heliotrop in unsagbarer Fülle geblüht. Nach drei Jahren waren es buchstäblich kleine Bäume, mit fingerdickem Stamm; die Farbe der Blüten war heller geworden, aber der Duft war intensiv nach wie vor. Elf Jahre habe ich mich an meinen Treibhausbäumen erfreuen können, sie waren ein Unicum, das viele Bewunderer anzog. Als die Revolution ausbrach und ich aus der Heimat fliehen mußte, wurden nicht nur die Treibhäuser vernichtet, sondern auch die Palmen-, die Pfirsich- und Weinstämme durchschnitten und alle Blumen niedergeworfen und zertreten. Natürlich begrub ich in Gedanken unter den Trümmern auch meine Lieblinge.
Da bekomme ich jetzt nach sieben Jahren einen Brief meines alten Dieners mit einigen Heliotropblüten und der Beschreibung meiner zwei Bäume, die mannhaft und stark und reich blühend im Sturm und Braus der Zeiten sich durchgekämpft haben sollen. Sie sollen auf mich warten...
Jedem Treibhausbesitzer aber rate ich, sich einen solchen Baum zu ziehen, er wird ihn stets erfreuen, die Vasen und die Tafel Sommer und Winter füllen und mit dem herrlichen Duft alle Räume durchziehen.

Baronin Helene Dellingshausen-Tois aus Tois in Estland.

EINIGE DURCH PFLANZEN ENTSTEHENDE KRANKHEITEN

EINE sehr interessante durch Pflanzenteile hervorgerufene Erkrankung ist der *Heuschnupfen,* oft auch Heuasthma genannt. Diese in höchstem Grade für den damit Behafteten unangenehme Krankheit kommt besonders oft in Nordamerika und in England vor, ist jedoch auch bei uns nicht selten. Während die meisten Menschen unempfindlich sind und von Heuschnupfen nicht betroffen werden können, besitzen gewisse Individuen eine merkwürdige Ueberempfindlichkeit gegen den Blütenstaub gewisser Gramineen (Gräser). Sie brauchen zurzeit der Grasblüte, also etwa Mai bis Juni, nur durch einen Garten, über ein Feld, oder nur daran vorbei zu gehen, so bekommen sie sofort einen Anfall heftigsten Schnupfens. Die

Nase schwillt zu, die Nasenschleimhäute brennen und jucken, und ein unaufhörliches Niesen mit Absonderung von massenhaft wässerigem Sekret setzt ein. Gleichzeitig entsteht ein Brennen der Bindehäute der Augen, sie werden rot, und die Augen fangen an zu tränen. Dies alles ist so heftig, daß ein sehr lästiger Zustand entsteht. Da nicht nur auf dem Lande, sondern meist auch in der Stadt zurzeit der Grasblüte Pollenkörner in der Luft herumfliegen, kommen diese armen Leute fast gar nicht zur Ruhe, zumal da dieser Zustand jedesmal stundenlang anhält. Diese merkwürdige Krankheit entsteht dadurch, daß die genannten Pollenkörner gewisser Grassorten ein sogenanntes Toxin (Gift) enthalten, das zwar für die meisten Menschen vollständig wirkungslos ist, bei manchen Menschen dagegen auf eine außerordentliche Empfindlichkeit stößt.

Eine andere interessante Krankheit, die ebenfalls nur bei wenigen besonders dazu Veranlagten auftritt, ist ein heftiger Ausschlag durch Blumen. Die meisten Menschen können bekanntlich mit Blumen so viel umgehen, wie sie wollen, ohne irgendwie beeinträchtigt zu werden. Einige Leute brauchen jedoch nur *Primeln* anzufassen, dann bekommen sie auf der Haut einen unangenehmen Ausschlag. Die Haut wird rot, sie brennt und spannt sich, und es entstehen viele ganz kleine Pöckchen. Der Ausschlag juckt sehr stark. Aehnliche Ausschläge entstehen durch Anfassen von Giftsumach (Rhus toxicodendron), Eucalyptus, Thuja (Lebensbaum), Meerzwiebel, Hyazinthenzwiebel, Arnica montana (Wohlverleih), Klematis- und Scilla-Arten, Colchicum autumnale (Herbstzeitlose), Chrysanthemen. Ich kannte einen Patienten, der jedesmal durch Anfassen von Vanillestangen einen sehr heftig juckenden Ausschlag über den ganzen Körper bekam. Wer einen Ausschlag durch Primeln bekommt, braucht noch lange nicht durch die anderen genannten Pflanzen zu erkranken, sondern gewöhnlich haben solche Leute nur eine krank-

hefte Ueberempfindlichkeit gegen eine bestimmte Pflanze.

Eine ebenso interessante, aber erfreulicherweise beim Menschen nur seltene Erkrankung entsteht durch den sogenannten Strahlenpilz (Actinomycose). Diese Krankheit ist beim Rindvieh viel häufiger, weil der Pilz an den Halmen wächst und vom Vieh mitgefressen wird, während eine Infektion beim Menschen meist nur durch einen Zufall zustande kommt. Diese Erkrankung äußert sich in chronischen Wucherungen mit Eiterungen, die in allen Organen vorkommen können. Diese Erkrankung kann sehr gefährlich werden und unter Umständen tödlich enden.

Dr. med. Moses.

*

PFLANZEN-BAROMETER

IN Fechners Buche über das Seelenleben der Pflanzen, das 1848 erschien, finden sich folgende Angaben:

Regen ist zu erwarten, wenn Hibiscus trionum sich nicht öffnet; wenn die Kelche der Carlina insignis sich schließen; wenn Porliera hygrometrica, Oxalis acetosella, und die meisten anderen Arten dieser Gattung ihre (zusammengesetzten) Blätter falten, der Klee die Stengel emporrichtet, Lapsana communis die Blüten nachts nicht schließt; Draba verna, Ranunculus polyanthemos die Blätter herabneigen; Anastatica hierochuntica die Zweige ausbreitet; Ranunculus repens, Caltha palustris die Blätter zusammenziehen; die

Birken stark duften; die Conferven sich mit grüner Haut beziehen; die im Schatten getrockneten, in Leinen eingenähten Blüten von Asperula odorata einen starken Geruch von sich geben; Galium verum sich aufbläht und ebenfalls stark riecht; die Stiele der Kapseln von Fumaria hygrometrica, die, wenn es dürr ist, hin- und hergebogen sind, sich entwickeln und strecken (vorzüglich wenn die Kapseln entleert sind). Stellaria media richtet bei *heiterem Wetter* des Morgens gegen 9 Uhr ihre Blüten in die Höhe, entfaltet die Blätter und bleibt bis gegen Mittag wachend, bei bevorstehendem *Regenwetter* geschieht dies nicht; die Pflanze hängt dann nieder und die Blüten bleiben geschlossen. Calendula pluvialis öffnet sich zwischen 6 und 7 Uhr morgens und pflegt gewöhnlich bis gegen 4 Uhr Nachmittags wach zu sein. Geschieht dies, so ist auf *beständige Witterung* zu rechnen, schläft sie aber nach 7 Uhr morgens noch fort, so ist noch vor Einbruch der Nacht *Regen* zu erwarten. Manche Arten der Gattung Sonchus zeigen für den nächsten Tag *heiteres Wetter* an, wenn sich der Blütenkopf bei Nacht schließt, *Regen*, wenn er offen bleibt. Pimpinella saxifraga verhält sich in dieser Hinsicht wie Stellaria media. Anemone ranunculoides erschließt bei *Regenwetter* ihre Blüten; Anemone nemorosa trägt bei *trübem Wetter* ihre Blüten nickend.

Dr. R. Z.

Gartenschönheit

eine Zeitschrift mit Bildern

für Garten- und Blumenfreund · für Liebhaber und Fachmann

Oktober 1926

in Gemeinschaft mit Karl Foerster und Camillo Schneider
herausgegeben von · Oskar Kühl
Verlag der Gartenschönheit G.m.b.H. Berlin-Westend

7. JAHR / HEFT 10 OKTOBER 1926

GARTENSCHÖNHEIT

eine Zeitschrift mit Bildern
für Garten- und Blumenfreund
für Liebhaber und Fachmann
in Gemeinschaft mit Karl Foerster
und Camillo Schneider
herausgegeben von Oskar Kühl

Inhalt des Oktoberheftes:

Seite

Cotoneaster racemiflora soongarica / Bild . . . 253
Paul Kache / Schöne Fruchtgehölze / Mit 5 Bildern . . . 253
Fr. Wiepking-Jürgensmann / Zwei kleine Gärten / Mit 5 Bildern und 2 Plänen . . . 256
H. Gehringer / Tagetes und Zinnien / Mit 2 Bildern . . . 259
Hedwig Fischmann / Wielands Gartenidylle . . . 261
Siegfried Decker / Dahlien in Brasilien III . . . 262
F. Bucherer / Erziehung durch Gartenarbeit / Mit Bild . . . 263
O. Burchard / Schöne Echium-Arten der Kanaren / Mit 3 Bildern . . . 264
Oscar Reuther / Indische Gartenkunst I / Mit 5 Bildern und 3 Plänen . . . 266

Gartenaufgaben

Hermann Koch / Ein Gartentheater / Mit Plan und 2 Zeichnungen . . . 271

Aus dem Blumengarten der Literatur

Der englische Park von Goethe . . . 272

GARTENARBEIT UND BLUMENPFLEGE

Leberecht Migge / Neue Gartentechnik II / Mit 1 Bild und 4 Zeichnungen . . . 273

Aus der Werkstatt des Pflanzenzüchters

Wilhelm Mütze / Die Gartenbohne / Mit 2 Bildern . . . 274

Vom Werkstoff des Gartens

C. R. Jelitto: Für Moorbeete / Mit 2 Bildern / H. Gehringer: Gruppenbegonien . . . 276

Handwerkliches

B. Voigtländer: Wegebau / Wilhelm Seidl: Vergießen und Vergiftung . . . 277
J. Köster / Blütennotizen II . . . 278

GARTENRUNDSCHAU

Neues aus aller Welt

Amerikanische Rosengärten im Jahre 1926 / Die Erikenzucht in Gefahr . . . 279

Neue Bücher

Kleine und große Gärten / Garten-, Sport- und Spielplätze / Sanssouci / Die Rose in Amerika / Bau und Leben der Pflanze / Der Gemüsegarten / Nützlinge im Gartenbau . . . 279
Zeitschriften . . . 280

BILDBEILAGE
Herbst in Pruhonitz

FARBIGE BILDBEILAGEN
Celosien / Tagetes
Knollenbegonien

Monatlich ein Heft

Bezugspreis für das Vierteljahr
in *Deutschland* 4 G.-M. und 0,75 G.-M. Versandkosten (Postscheckkonto Berlin 76290),
im *Ausland* einschließlich Versandkosten: 5.25 Goldmark = 1,25 U.S.A.-$ oder entsprechend in der Landeswährung.

Preis des Einzelheftes
1.50 Goldmark zuzüglich Versandkosten

Verlag der Gartenschönheit G.m.b.H.
Berlin-Westend / Akazien-Allee 14.

Unter den Einjahrsblumen fallen die Celoſien ſowohl durch ihre Tracht wie durch ihre Farbentöne auf. Sind auch die hier dargeſtellten Federbuſch-Celoſien im Wuchs nicht ſo ſeltſam wie die echten Hahnenkämme, ſo verdienen doch die Celosia argentea-Formen, die als C. pyramidalis plumosa gehen, oft den Namen Feuerſchopf. – Bild Biſſinger

Unter den zahlreichen Formen der allbekannten Studentenblumen, Tagetes, zählen die niedrigen, kleinblumigen T. patula-Formen in ihrem Farbenſpiel, ihrer gedrungenen Tracht und ihrem Blütenreichtum zu den brauchbarſten Einjahrsblumen für den kleinen Garten. Auch ihre Blütendauer iſt ganz außerordentlich. Die hier gezeigte Raſſe ſtammt aus den Dippeſchen Kulturen. – Bild C. S.

Cotoneaster racemiflora soongarica

Im Oktober

PAUL KACHE / SCHÖNE FRUCHTGEHÖLZE

DIE Zahl der im Herbſt durch ihren ſehr reichen Fruchtbehang ſchmükkenden Ziergehölze iſt groß. Sie ſind im Verein mit der oft prachtvollen Herbſtlaubfärbung anderer Gehölze und auch darüber hinaus für jeden Garten eine Zierde. Wie bei der Pflanzung von Blütengehölzen eine ſtrenge Auswahl geübt wird, ſollte es auch bei Fruchtgehölzen geſchehen. Sind ſie doch zur herbſtlichen Jahreszeit für den Garten ebenſo wichtig, wie die Blütenſträucher in früheren Monaten. Die große Unkenntnis der Gehölze, die ſelbſt bei Fachleuten zu finden iſt, wie die fehlende Liebhaberei für Pflanzen ſind die Urſache, daß wir heute nur ganz ſelten eine bewußte Anwendung von Fruchtgehölzen in Anlagen und Gärten finden.

Aus der ſehr großen Zahl ſchönſter und brauchbarſter Arten ſei nur auf einige hingewieſen. Sehr wichtig iſt hier die Gattung *Berberis.* Zunächſt iſt der Preis für dieſe Pflanze recht mäßig, hindert alſo die Anſchaffung keineswegs. Dann iſt die ganze Gattung, ſoweit es ſich um laubabwerfende Arten handelt, ungemein anſpruchslos. Die Sträucher wachſen in jedem Gartenboden, ſelbſt noch im trockenen Sandboden. Schließlich ſind ſie völlig winterhart. Dem oft prachtvollen Fruchtbehang geht aber noch eine ſehr reiche Blütenmaſſe voraus. Jedenfalls gehört die Berberitze zu unſeren dankbarſten Blütengehölzen, ſelbſt für etwas beſchattete Lage. Unter den niedrig bleibenden Arten iſt Berberis aggregata eine der beſten. Die ſchlanken, bogig überneigenden Triebe ſind dicht beſetzt mit kurzen, ſehr dichten Trauben kleiner, hellroter Früchte. In dem reichen Behang ſieht dieſes Fruchtgehölz höchſt reizvoll aus. Einen ganz anderen Eindruck macht die noch etwas kleiner bleibende, dicht veräſtelte B. Wilsonae. Sie iſt für den Gehölzliebhaber ſchon durch die ungemein dichte, feine Beſtachelung auffallend. Im Behang der faſt ſitzenden, lachsroten Früchte (Band I, Seite 180a und 185) iſt der Strauch eine anziehende Erſcheinung. Am ſchönſten wirkt dieſes Gehölz in Verbindung mit Geſtein. Gleiches gilt von B. subcaulialata, die auch als Varietät zu Wilsonae gezogen wird. Der Strauch wächſt nur etwas mehr aufrecht, iſt aber im Herbſt gleichfalls mit leuchtend korallenroten Beeren überſchüttet. Der B. agregata ſteht nahe und wird auch als Varietät von ihr

Ilex verticillata

Aronia melanocarpa grandiflora

multiflora, aber gleich dieser auch als Blütengehölz sehr beachtenswert. In noch späterer Zeit, im Oktober, leuchtet dann *C. Dielsiana* in der unzählbaren Menge kleiner, lebhaft roter Früchte. Auch diese Art ist einzig und mit den eben genannten beiden der schönste Fruchtstrauch der gesamten Gattung. Gut zierend ist noch C. bullata, sehr starkwüchsig, mit großen, lebhaft roten Früchten, dazu tritt bei dieser Art noch eine ganz hervorragende Herbstfärbung des großen Laubes. Schön ist ferner C. divaricata, nur mittelhoch werdend und reich fruchtend. Als letzte Art sei C. Franchetii genannt; die wintergrüne Belaubung und die Fülle der spät reifenden, lachsroten Früchte sind ihre hervorstechenden guten Eigenschaften. Andere gute Arten, die reich fruchten, wie C. Zabelii oder C. Simonsii, seien nur kurz erwähnt.

Auch hier scheiden wie bei Berberis die dunklen, fast schwarzfrüchtigen

angesehen B. Prattii, die aufrecht, mittelhoch im Wuchs ist und überreich fruchtet. Die in langen Trauben sitzenden, leuchtend lachsroten Früchte sind ein köstlicher Schmuck. Sie reifen verhältnismäßig spät und sind von langer Dauer. Von anderen mittelhoch wachsenden Arten ist vor allem noch B. canadensis zu nennen, die im Spätherbst eine Fülle glühend hellroter Früchte trägt; diese sind auch haltbar, sodaß der Strauch lange Zeit hindurch ein Schmuckstück darstellt. Auch die nur 1,5 Meter hoch werdende, aber wüchsige B. Vernae ist ein wundervoller Fruchtstrauch, der schon während der Blütezeit in der Blühwilligkeit kaum seinesgleichen findet. B. koreana, gleichfalls von mittelhohem Wuchse, ist durch ihre vielen und sehr haltbaren, lachsroten Früchte ein hervorragendes Gehölz.

Unter den hochwüchsigen Arten, die zwei bis drei Meter Höhe erreichen, tritt B. amurensis als die auffallendste Art auf. Sie ist schön in jeder Beziehung, vor allem im Fruchtbehang, zu dem noch eine prachtvolle Verfärbung der Belaubung tritt. Auch die ihr sehr nahestehende B. vulgaris ist nicht zu übersehen, und als letzte sei die sehr hoch- und starkwüchsige B. Francisci-Ferdinandii genannt. Sie bringt eine Fülle leuchtend sattroter Früchte von hervorragender Schmuckwirkung. Daß es noch eine große Anzahl anderer guter und schöner Fruchter innerhalb der Berberitzen gibt, sei nur erwähnt. Nicht erwähnt sind alle dunkelfrüchtigen, die trotz ihrer eigenartigen Schönheit doch niemals von so starker Schmuckwirkung sein können wie die rotfrüchtigen. Fast alle genannten Arten sind in Ostasien beheimatet.

Eine zweite, sehr wichtige Gattung ist *Cotoneaster*, die Zwergmispel. Sie besitzt eine ganze Reihe feinster Fruchtgehölze. Am bekanntesten ist wohl die niedrige C. horizontalis, die an Abhängen oder in Verbindung mit Gestein die schönste Wirkung ausübt, hier auch ihren reichen, glühend roten Fruchtbesatz am vorteilhaftesten zur Geltung bringt. Auch die sehr nahestehende C. adpressa bringt schöne, lebhaft rote Früchte. Bei der ganz niederliegenden, immergrünen C. Dammeri verhüllt das Laub etwas die großen, tiefroten Früchte, so daß sie nicht immer voll zur Wirkung kommen. Geradezu hervorragend in ihrer langandauernden Schmuckwirkung ist jedoch C. multiflora, ein bis 3 Meter hoher Strauch, der schon im August geradezu mit glühend roten Früchten beladen ist. Er gehört zu unseren wertvollsten Fruchtgehölzen überhaupt. Auch *C. racemiflora* vor allem in der var. *soongarica* ist ein hervorragender Fruchtstrauch, nur später als

Berberis Vernae

Lycium chinense

Arten, aus. Ihr Zierwert ist ein geringer. Nur die Arten sind zu bevorzugen, deren lebhaft rote Früchte eine starke Leuchtkraft besitzen. Alle genannten Vertreter sind in Asien, hauptsächlich in China heimisch. Gleich der Berberis ist die Gattung Cotoneaster genügsam an Boden, Lage und Pflege. Sie gedeiht eigentlich in jedem Garten. Die Pflege besteht wie bei Berberis in einem gelegentlichen Auslichten oder einer starken Verjüngung der Büsche. Unter den übrigen Gattungen ist die *Aronia* als Fruchtstrauch wichtig. So bringt A. arbutifolia einen sehr reichen Besatz überaus dauernder, rundlicher Beerenfrüchte von lebhaft roter Farbe. Dagegen sind die Beerenfrüchte von *A. melanocarpa* glänzend schwarz, aber auch von schöner Zierwirkung. Die Sträucher gedeihen unter gleichen Ansprüchen wie die der vorher genannten Gattungen. Brauchbar ist auch *Ilex*. Besonders die laubabwerfenden Arten sind gewöhnlich sehr reich fruchtend. Immer noch viel zu selten anzutreffen ist I. decidua, ein ziemlich hochwüchsiger Strauch, mit einer Masse orangescharlachroter und bis in den Nachwinter haftender Früchte. Dasselbe ist von I. laevigata zu sagen, der Strauch bleibt niedriger, fruchtet aber reich. Lange haften auch die lebhaft roten Früchte bei *I. verticillata*, die sonst den anderen ähnelt und weit über mannshoch wird. Als letzte dieser Gruppe ist I. geniculata anzuführen, mit gleich guten Eigenschaften. Die roten Früchte sind wie bei den anderen Arten von zarter Zierwirkung. Schwierigkeiten bieten diese laubabwerfenden Ilex nicht. Nur könnte es in sehr rauhen Lagen vorkommen, daß Frostschäden auftreten. Unter den immergrünen Arten ist eigentlich nur Ilex Aquifolium als vorzüglicher Fruchtstrauch zu nennen. Er ist als Unterholz unter locker gestellten Bäumen in nicht zu trockenem Boden bei genügender Ernährung ein ausgezeichnetes, immergrünes Gehölz. Sehr oft findet man Büsche, die noch im Nachwinter übervollen Behang der schönen roten Früchte zeigen.

Ein sehr guter Fruchtstrauch ist der bekannte Bocksdorn, *Lycium*. Abgesehen von unserm L. halimifolium ist besonders *L. chinense* wichtig. Die langen Jahresruten tragen vom Hochsommer an eine große Zahl der länglichen glänzendroten Beerenfrüchte, die dem Strauch eine besondere Zierde sind. Sonnige, trockene Hänge sind die besten Standorte für diesen Strauch. Ein gelegentliches Auslichten sorgt stets für Nachwuchs. Eine Sonderart dieser Gattung ist das mehr aufrechte sparrige L. pallidum. Schon die zahllosen hängenden Blütchen sind eine eigenartige Zierde, noch mehr aber die darauf folgenden scharlachroten Früchte. Für große Steingärten ist die letzte Art als Kleingehölz vorzüglich geeignet.

Kurz erwähnt sei noch die Gattung *Evonymus*. In unsern einheimischen Arten ist sie gut bekannt. Weit wertvoller als diese ist indessen E. latifolia und noch mehr die dieser verwandte E. planipes. Sie bringt Massen scharf hängender, großer Fruchtstände, die in ihrer lebhaft roten Färbung einen besonderen Schmuck des Strauches bilden. Auch E. yedoensis ist als Fruchtstrauch wichtig. Besondere Ansprüche an Boden und Lage stellen keine der genannten Arten, sodaß jeder die Freude an diesem reizvollen Herbstschmuck leicht in seinem Garten haben kann.

Cotoneaster Dielsiana. — Bilder Lipp

FR. WIEPKING-JÜRGENSMANN / ZWEI KLEINE GÄRTEN

Je kleiner ein Garten ist, um so wertvoller ist die Fläche und der Raum. Im großen Garten mag sich bisweilen auch eine verfehlte Anlage mit den Jahren zu guten Bildern herauswachsen, da die freischaffende Naturgewalt der Bäume und Sträucher menschliche Irrtümer mit dem grünen Mantel der Liebe zudeckt. Im kleinen Garten aber müssen Katastrophen eintreten, wenn nicht von Anfang an eine reife Hand den Raum und die Pflanzenschätze ordnet. Im Gegensatz zur Landschaft und zum großen Park ist das Wachstum in einem Garten immer ein begrenztes.

Es ist noch garnicht so lange her, daß wir einen Vorgarten von dreißig Quadratmetern als eine Zwerglandschaft bauten, mit dem traurigen Unterschied zwar, daß wir nicht wie die Ostasiaten streng in den genauen Maßstäben der freien Landschaft verkleinerten. So entstanden jene schrecklichen Zerrbilder vom sprichwörtlich gewordenen Vierwaldstättersee, der nach wenigen Jahren schon im Schatten eines halberwachsenen Fliederstrauches lag.

Äußerste Beschränkung der Gestaltungsmittel, äußerste Raumausnutzung und die gute Auswahl der stärksten Raumformen werden immer bei der Gestaltung des kleinen Hausgartens wichtige Faktoren bleiben. Es mag manchmal ein kummervolles Planen und Überlegen sein, aber ein Enderfolg winkt, der glücklich uns befriedigen wird, wie die Schaffung eines großen Gartenbildes.

Im kleinen Garten ist der Gartengestalter eng gebunden an Haus- und Grundstücksgrenze, Bauvorschriften, Schattenlage, Baumdruck, Boden und Klima und nicht zuletzt an dem meist kleinen Geldbeutel des Auftraggebers. So eng ist oft diese Bindung, daß wir im neuen Städtebaugesetz in zwölfter Stunde auch Richtlinien für den kleinen Hausgarten festlegen müßten, denn mancher Nachbar und nicht einmal ein böswilliger, kann uns durch ungünstige Lage seiner Bäume und Grenzen zur Sonne die Ausführung unserer Gartenträume verhindern. Je nördlicher wir wohnen, umso mehr haben wir im Garten den Schatten zu fürchten. In den sonnigen Ländern wachsen im vollen Schatten der Steineichen: Rittersporn, Phlox und Lupine, und manche weinübersponnene Pergola des Südens verhindert nicht die Anpflanzung reiner Sonnenkinder zu ihren Füßen. Ängstlich müssen wir daher den Kreislauf des Weltengestirns in unser Gartenschaffen als eine lebenswichtige Bedingung einbeziehen. Das ist nicht immer leicht, da viele unserer Straßenzüge und dadurch unendlich viele Häuser und Wohnungen falsch zur Sonne liegen. Es wäre eine recht dankbare Aufgabe für Städtebauämter, diesen Fragen eine liebevolle Aufmerksamkeit zu widmen, denn ein Garten muß als ein solcher bepflanzt und benutzt werden können — sonst hat er Sinn und Berechtigung verloren.

Der erste Garten liegt in einer Villenstraße der alten Ordnung. Viel zu hohe Häuser mit kleinen Vor- und Hintergärten. Südfront zur Straße. Durch Zukauf konnte der Bauherr den rückwärtigen Garten erweitern, doch sollte der größere Teil des neuen Geländes der Anlage eines Tennisplatzes dienen, sodaß für den eigentlichen Garten keine größere Fläche zur Verfügung stand.

Den Innenausbau des Hauses leitete der Architekt Breuhaus, Düsseldorf, der vollendete Wohnräume schuf. Ein großes Fenster schließt das Eßzimmer zum Garten ab. An diesen Raum konnte der Garten angeschlossen werden, da sonst nur die Küche in Richtung zum Garten lag. Die Travertinfliesen und die freudige Tönung dieses zum Garten atmenden Raumes veranlaßten mich, den von aller Konvention befreienden Gedanken des Zimmers in den Garten zu übertragen und fort-

Zu nebenstehendem Plan

1 *Haus*
2 *Stauden*
3 *Immergrüne Sträucher*
4 *Großer Brunnen*
5 *Sitzplatz unter alter Pappel*
6 *Rosengarten*
7 *Azaleen*
8 *Gartenhaus*
9 *Alte Pappel*
10 *Tennisplatz*
11 *Immergrüne Hecke*
12 *Lindenbaumwand*

Zum Plan auf Seite 257

1 *Haus*
2 *Rasen*
3 *Gartenhaus und Garage*
4 *Rosenspalier*
5 *Obstspalier*
6 *Stauden*
7 *Wasserbecken*
8 *Schling- und Parkrosen*
9 *Plattenweg*
10 *Projektierte Sonnenuhr*
11 *Kinderspielplatz*
12 *Birken*
13 *Ziersträucher*
14 *Sitzplatz am Haus*

Herbst in Pruhonitz

zuſetzen. Da alle Zimmerfarben zwiſchen gelb und rot lagen, ſo wurde ein wundervoller gelbbrauner Kalkſandſtein benutzt, um einen Brunnengarten zu bauen, der das ganze Jahr hindurch grünt und blüht. Immergrün iſt der Raum geſchloſſen durch Sträucher ⟨3⟩ und Schlinger. Davor ſtehen laubabwerfende Alpenroſen ⟨7⟩ mit Orange als Grundfarbe. Ein Plattenweg aus dem gleichen Material bildet den Umgang. Unter einer mächtigen breitkronigen Pappel ⟨9⟩ iſt der Sitzplatz ⟨5⟩, der wenig tiefer als der große Brunnen ⟨4⟩ liegt. Munter plätſchert der Überlauf in das untere Waſſerbecken, das wiederum den Waſſerlauf im Roſengarten ⟨6⟩ mit friſchem Waſſer ſpeiſt. Stauden ⟨2⟩ umblühen den großen Brunnen; keine Krautpflanzen ſind es, ſondern Stauden, die von der Blume bis zum Wurzelſtock voll als eigenartige Pflanzenſchönheiten in Erſcheinung treten ſollen. Lilien und Tritomen, Montbretien und ſeltene Schwertlilien, Chelonen und Feuerriſpen ſtehen als Silhouetten im Polſter niedrigſter Alpenpflanzen. Islandmohn durchwirkt den Teppich. Im Frühling umblühen ungefüllte gelbe und rote Tulpen das Waſſerbecken, in dem die Zitronenfiſche, Goldorphen und Goldſchleie ein hurtiges Spiel unter den erſten Blättern der Seeroſen und im keimenden Schilfwald der Schwanenbinſen treiben. Der Roſengarten liegt in dunkelgrünen Hecken ⟨11⟩ und ein Gartenhaus ⟨8⟩ iſt ſein Abſchluß. Der Tennisplatz ⟨10⟩ iſt eingefriedigt durch eine Lindenbaumwand ⟨12⟩, ſodaß das Gitter dem Auge nicht ſichtbar iſt. ⟨Zur Zeit der Aufnahme waren die Bäume noch nicht gepflanzt.⟩ Die eine Aufnahme zeigt den Blick durch das große Fenſter des Eßzimmers zum Garten. Große und wohlgepflegte Kakteen ſtehen auf der niedrigen Fenſterbank, und überaus ſtark iſt der Eindruck des Zuſammenklanges zwiſchen dem Innen- und Außenraum. Die andere Aufnahme zeigt den Blick vom Platz unter der Pappel zum Haus. Die Stauden wurden vor einem halben Jahr gepflanzt. Ein ſehr verſtändnisvolles Zuſammenarbeiten mit der Bauherrſchaft erleichterte und förderte ſehr die Ausführung.

Der zweite Garten entſtand in ähnlicher Weiſe. Auch hier handelte es ſich um ein Haus in der Straßenreihe der Villenvorſtadt mit kleinen Vor- und Hintergärten. Begeiſterte Blumenfreunde mit geſundem Menſchenverſtaud kauften Gelände vor der endgültigen Bebauung hinzu und ſicherten ſich ſo zunächſt die Freifläche. Wie der Bauherr des oben geſchilderten Gartens, ſo übergab auch der Beſitzer dieſes Grundſtückes die Ausführung des Gartens einem Gärtner mit mangelndem Raumgefühl. Beide Bauherrn mußten ſomit, um endlich in den Genuß eines brauchbaren Gartens zu kommen, den Garten umändern laſſen. Sicherlich kein billiges Verfahren. Ich habe kürzlich einmal feſtgeſtellt, daß meine Gärten in einem größeren Wirkungskreis zu faſt 60 Prozent nicht Neuanlagen, ſondern Umänderungen ſind! Wir brauchen gute Pflegegärtner, aber bekämpfen müſſen wir den falſchen Ehrgeiz der vielen kleinen Meiſter, die oft ehrlich glauben, auch Gärten anlegen zu

können, die Schritt halten mit dem Geist der Besitzer oder der Häuser. Der Bauherrschaft können wir oft nicht den Vorwurf machen, daß sie unüberlegt handelt, wenn sie dem Landschaftgärtner die Ausführung der Gartenanlage überträgt. Gärten sind in unserem Lande doch noch recht neue und ungeklärte Begriffe, da das rasche Wachstum der Städte die alte, einst vorhanden gewesene Gartentradition überrannte, und die Mehrheit unserer Bauherrn ist in der Mietswohnung ohne Garten aufgewachsen.

Auch der Gärtnerschaft ist im weiteren Umfang das Wesen des Gartens und der Gartendinge noch recht unklar. Sie wissen bisweilen viel von Pflanzen, aber die wesentlichen Beziehungen zwischen Haus und Garten, Mensch und Blume sind ihnen fremd. Nicht Anklagen sollen es sein, aber es sind einmal nötige Feststellungen, um Gartenliebhabern die Sinne für diese Dinge zu schärfen. Jüngst baute ich mir ein Haus, und da auch eine kleinere Fläche für einen Garten übrig blieb, so meldeten sich viele Kollegen — die mich und meinen Beruf nicht kannten — und wollten mir meinen Garten anlegen. Mir lag viel daran, die Sachkenntnis dieser Männer des Faches kennen zu lernen, und ich bin jetzt unterrichtet über die Nöte eines Bauherrn, der arg bestürmt wird und der sich endlich nach Treu und Glauben den geeigneten »Gartengestalter« ausgewählt. Ob in anderen Berufen ein ähnliches Massenaufgebot marschiert?

Das Wohngeschoß des Hauses (1 des Planes), das der Architekt Schüller, Köln, erbaute, liegt wenig höher als Straße und Vorgarten. Dagegen liegen hier Hintergarten und Kellergeschoß in gleicher Höhe. Eine mittelbare Verbindung zwischen Haus und Garten war daher ohne große bauliche Veränderungen nicht zu erreichen. Die hohe Lage des Wohngeschosses hat jedoch auch Vorteile. Das Grundstück ist recht lang. Der hohe Standpunkt ermöglichte die Ausnutzung der ganzen Gartentiefe. Im toten Blickwinkel vom Zimmer aus gesehen liegt lediglich der Rosengarten (8), doch sind die Wände dieses Gartenteiles so hoch gezogen, daß sie mit der unteren Höhe der Zimmerfenster abschließen. Überaus üppig sind diese Spalierwände (4) mit Kletterrosen überwuchert, und sie verhindern völlig den Einblick von den Nachbargärten. Verwandt wurden nur Schling- und Parkrosen mit klaren, offenen Blüten. Ein breiter Plattenweg verbindet den Staudengarten (6) und den Kinderspielplatz (11). Die Plattenfugen sind völlig von Sagina durchzogen, und Astilben, Tritomen und Yucca stehen in Trupps an den Seiten und verlängern den Staudenraum. Das obere Bild auf Seite 258 zeigt den Blick durch den Rosengarten zum Gartenhaus vom Sitzplatz (14) am Haus. Der Staudengarten ist durch Obstspalier (5) eingerahmt, und ein Gartenhaus bildet den Abschluß gegen die nächste Straße. Unter dem gleichen Dach (3) hat der Architekt eine Garage untergebracht. Zwischen den Wangen der Aufgangstreppe zum Gartenhaus liegt ein kleines Wasserbecken (7), das durch einen Wandbrunnen gespeist wird. Der Kinderspielplatz (11) liegt ganz unter Birken (12), die mit großblättrigen Immergrünstauden unterpflanzt sind. Ein lustiges Häuschen ist der Mittelpunkt. Ringe, Reck, Barren und Sandkiste stehen im Rasen. Hier treiben die letzten kleinen Mohikaner im selbstgebauten, bunten Zelt ihre Kriegsspiele.

H. GEHRINGER / TAGETES UND ZINNIEN

Zu den Einjahrsblumen, die uns nicht weniger vertraut sind, als sie es unseren Großeltern waren, gehören die Tagetes und Zinnien. Die Sammetblumen oder Studentenblumen, wie wir die *Tagetes* zu nennen pflegen, kamen schon um 1580 aus ihrer mexikanischen Heimat in die Gärten Europas. Und zwar gelangten die beiden Hauptarten, *T. erecta* und *T. patula*, fast gleichzeitig zu uns. Die erste zeichnet sich durch den auffallend strengen Geruch ihres Laubes aus, der ihr im Volksmunde den Namen »stinkende Hoffart« eingetragen hat. Sie weicht auch sonst von T. patula noch dadurch ab, daß ihre Blütenköpfe gewöhnlich nur gelb und nicht mit Rot gezeichnet sind. Sie wird in der typischen Form fast doppelt so hoch wie jene, doch hat die Jahrhunderte lange Kultur die Formen ein gut Teil vermischt. T. patula riecht im Vergleich zur anderen ziemlich angenehm aromatisch, doch geht der Geruch vielen Leuten auf die Nerven. Dafür soll er gewisse Vögel anlocken, wie zum Beispiel Stieglitze.

Es gibt vielleicht keine Einjahrsblume, die bei so geringer Pflege so ungemeinen Blütenreichtum und solch lange Blütendauer entwickelt wie die meisten Sammetblumen. Sie haben sich dadurch in unseren Gärten geradezu unentbehrlich gemacht. Besonders dort, wo es darauf ankommt, kräftige Farbenwirkungen von langer Dauer zu erzielen.

Unter den Sorten der hohen T. erecta, die bis reichlich 80 Centimeter Höhe erreichen können, iſt die dicht gefüllte, orangegelbe Pride of the Garden (Stolz des Gartens) recht ſchmuckvoll. Ein ſchwefelgelbes Gegenſtück iſt sulphurea plenissima. Dieſe hohen Sorten laſſen ſich auch in Stauden-Rabatten einſprengen und in Vorpflanzungsgruppen mit verwenden. Sie geben auch ausgezeichnete Schnittblumen, ſoweit der ſtrenge Geruch des Laubes nicht abſtößt.

Viel reicher iſt die Auswahl unter den Formen der T. patula. Hier ſind beſonders die niedrigen nana-Formen beliebt. Bei dieſen müſſen wir wieder zwiſchen den einfachen und den gefüllten unterſcheiden. Von den erſten verdienen folgende Sorten hervorgehoben zu werden: »Ehrenkreuz« (bicolor, Légion d'honneur), etwa 15 Centimeter hoch, Blumen goldgelb mit ſcharf begrenztem purpurrotem Fleck auf jedem Blütenſtrahl; »Goldrand«, Blumen rotbraun mit deutlichem goldgelbem Rande jeder Strahlenblüte; »Silberkönig« (Silver King), Blumen hell ſchwefelgelb mit braunroter Mittelzeichnung. Von gefüllten Sorten ſeien genannt: »aurea«, goldgelb, »Aurora« (Morgenröte), blaßgelb rot geflammt, »brunnea«, braunrot, »lutea«, hellgelb, ſowie die dunkelpurpurrote »Robert Beiſt«.

Zinnia elegans robusta

Sowohl Tagetes erecta, wie T. patula beſitzen Blütenköpfe mit zahlreichen Strahlenblüten, die man häufig als Petalen bezeichnet. Eine dritte Art aus Mexiko, die erſt im letzten Jahrhundert eingeführt wurde, *T. signata,* hat Blütenköpfe mit meiſt nur fünf Strahlenblüten. Sie iſt beſonders in den pumila-Formen für Einfaſſungen wie geſchaffen. Ihre Blütenköpfe ſind, wie bei erecta, einfarbig orange, ſchwefelgelb oder goldgelb. Die Sorte »Golden Ring« ſei hervorgehoben. Ganz kleine dichte gefüllte Blüten, bei denen die braune Fleckung das Gelb faſt ganz verdrängt, gehen als T. patula nana fl. pl. Liliput.

Für Flächenwirkung ſind dieſe Tagetes wundervoll. Die patula und signata geben farbenreiche ſchmale Rabatten und ſchöne Einfaſſungen für breitere Rabatten und Gruppen. Auch ihre Blumen eignen ſich gut für den Schnitt und zur Füllung kleiner Schalen und Körbchen. In der Kultur gleichen die Tagetes den nun zu beſprechenden Zinnien.

Tagetes patula nana

Die Zinnien verdanken wir ebenfalls der Neuen Welt. Als erſte kam vor mehr als einem Jahrhundert die hohe Zinnia elegans aus Mexiko zu uns. Von ihr ſtammen die meiſten Gartenformen ab. Weitere Wildtypen ſind *Z. Haageana,* die um 1860 eingeführt wurde, und *Z. pauciflora,* die auch in den Anden von Peru auftritt und deren Typ wir heute im Farbenbilde zeigen. Wir finden ſie zumeiſt nur in botaniſchen Gärten. Zwiſchen Z. elegans und Z. Haageana traten um 1875 Hybriden auf, die den Namen *Zinnia Darwinii* tragen, aber auch als Z. elegans oder Z. Haageana hybrida gehen.

Zinnia elegans und Z. Haageana zeichnen ſich durch ein reiches Farbenſpiel aus, das recht aparte Töne enthält. Sie haben zum Teil etwas Altväterliches an ſich, und wer die Zinnien nicht aus irgend einem Grunde von vorn herein ablehnt, wird gerade in ihnen ſehr anſprechende Einjahrsblumen finden. Sie ſind gleich den Tagetes alte Blumen des Bauerngartens, doch die Neuzeit hat uns inbezug auf Farbenſpiel und Blumengröße manche hübſche Überraſchung beſcheert. Es iſt nicht leicht, aus dem Reichtum der Formen beſtimmte herauszugreifen. Einfache Formen ſpielen bei den Kulturvarietäten keine Rolle mehr. Es handelt ſich im folgenden ſtets um gefüllte (fl. pl.) Formen, doch treten bei nicht durchgezüchteten Sorten auch mehr oder minder »einfache« auf. Die größtblumigen und farbenprächtigſten Sorten von Zinnia elegans gehen unter der etwas langatmigen Bezeichnung imbricata grandiflora oder auch grandiflora robusta, natürlich noch mit dem Zuſatz plenissima. Sie entwickeln ſich auf gut gedüngtem Boden zu üppigen Pflanzen mit großen, dicht gefüllten, beinahe kugelrunden Blumen. Man kann ſie zu Gruppen vereinigen oder als Tuffs in Staudenrabatten einſprengen und prächtige Farbwirkungen erzielen, zumal wenn man dabei alle Farben gemiſcht nimmt, ſodaß ſich ein lebhaftes Bild aus Weiß, Orange, Goldgelb, Schwefelgelb, Karmin, Violett, Scharlach mit Einſchluß fleiſchfarbener und aparter roſa, lachsroter, karmeſinroter und dergleichen Töne ergibt. Als Tuffs zwiſchen Stauden ziehe ich vor, die Farben getrennt zu halten; vor dunklem Hintergrunde wirken Gelb und Orange ſehr gut, auch Scharlach iſt weitleuchtend.

Auch zur Bepflanzung beſonderer Rabatten möchte ich den getrennten Farben das Wort reden, entweder alſo nur eine Farbe oder verſchiedene ſtrichweiſe abwechſelnd, jedoch nicht gemiſcht. Für kleinere Beete oder ſchmälere Rabatten laſſen ſich die gewöhnlichen fl. pl.-Formen von Z. elegans gut verwenden. Sie zeigen die gleiche Farbenſkala, wie die eben erwähnten großblumigen. Ganz beſonders eignet ſich Z. elegans atrococcinea für Gruppen und für ſchmale Rabatten; ihr Wuchs iſt kompakter und ihre mittelgroßen Blumen ſind feuerrot.

Die Knollenbegonien gehören zu den Freilandgewächſen des Sommers, die bei günſtiger Witterung bis ſpät in den Herbſt hinein blühen. Auch ſie werden immer mehr von den Züchtern vervollkommnet. Unter den vielen Gartenformen ſind die einfachen rieſenblumigen, wie ſie unſer oberes Bild zeigt, namentlich in lebhaften roten Tönen wirkſam

Eine weitere Form der Knollenbegonie iſt die Varietät crispa mit gekrauſtem Petalenrande. Eine gute gelbe Form, die ebenfalls aus den Kulturen von H. Hinrichſen in Eutin ſtammt, zeigt das nebenſtehende Bild. Auch von dieſer Form gibt es Sorten in Rot, Roſa, Weiß, Gelb und Lachsfarben, die jede für ſich und in Miſchung wirken. – Bilder Diederichs

Allerliebst sind auch die kleinblumigen, niedrigen 10 bis 25 Centimeter hohen Liliput-Formen der Z. elegans. Sie bauen sich sehr regelmäßig und bilden sehr gute Einfassungen. Das Farbenspiel ihrer kleinen kugelrunden Blüten ist fast das gleiche wie bei den großblumigen Sorten.
Von den Sorten der Z. Haageana, beziehungsweise von den hybriden Formen dieser Zinnie mit Z. elegans, seien folgende besonders erwähnt. Durch reiche Farbenwahl zeichnen sich aus die Z. Haageana hybrida Perfection-Formen. Sie bilden nur etwa 25 Centimeter hohe, reich verzweigte Büsche und lassen sich mannigfach verwenden. Eine neue niedrige Sorte, die, wie der Name sagt, in den Blumen an Coreopsis gemahnt, ist Z. Haageana coreopsidiflora. Sie werden 35 Centimeter hoch und sind schön orangegelb. Unter den Haageana-hybrida-Formen sind viele nur halb gefüllte. Bei all diesen Sorten kommt es darauf an, aus zuverlässiger Quelle gut durchgezüchtetes Saatgut zu erhalten. Sonst erlebt man leicht Enttäuschungen, sei es hinsichtlich der Blumengröße, der Füllung und des gewünschten reichen Farbenspiels.
Gleich den Tagetes sind die Zinnien ausgezeichnete Schnittblumen, die sich abgeschnitten lange halten. Je nach der Blumengröße und Stiellänge wird man sie in verschiedener Weise verwenden.
Hinsichtlich des Erdreiches sind die Zinnien etwas anspruchsvoller als die Tagetes. Sie bedürfen zur vollen Entwicklung eines gut gedüngten Bodens; gedeihen wohl in jedem Gartenboden, bevorzugen aber durchlässigen Lehmboden. Man sät sie Ende März Anfang April ins Frühbeet, pikiert sie dann nochmals ins Frühbeet um und bringt sie als kräftige Pflanzen ab Mitte Mai an ihren Platz. Oft beginnen sie schon im Juni zu blühen, und ihr Flor währt, bis die ersten Fröste ihm Halt gebieten. Öfteres durchdringendes Gießen ist bei anhaltender Trockenheit zum guten Gedeihen unerläßlich. Die Zinnien sind während der Hauptwachstumzeit auch für gelegentliche Dunggüsse recht dankbar.
Für die Anzucht und Pflege der Tagetes gilt das Gleiche, doch sind sie genügsamer. Man hüte sich im Frühbeet, sie durch zu spätes Pikieren und zu wenig Lüften spindelig werden zu lassen. Die niedrigen Formen eignen sich auch sehr gut für Balkonkästen-Bepflanzung und sollten hier mehr Verwendung finden.

HEDWIG FISCHMANN / WIELANDS GARTENIDYLLE

ALS sich an einem Frühlingstage des Jahres 1797 die schwere Reisekutsche in Bewegung setzte, die Vater Wieland und seine rüstig schaffende Ehegefährtin, Frau Dorothea, aus dem freudig verlassenen Weimarer Stadthaus dem neu erworbenen Landsitz *Oßmannstedt* zuführte, da war das Wageninnere bis zum Rand erfüllt von einer gaukelnden Schar unsichtbarer Mitreisender: von Hoffnungsträumen eines sonnigen, ungetrübten Gartenglücks auf eigener Scholle. Früher Lebenswünsche lockende Bilder schienen Wirklichkeit geworden. »Alle großen Männer haben gegen den Abend ihres Lebens einen stillen Aufenthalt im Schoße der Natur gesucht«. Dies Wort, das einst der Dreißigjährige im Landhaus des Grafen Stadion gesprochen, besiegelte der Greis nun durch die Tat. Gleich seinem Liebling Horaz wollte er in ländlicher Zurückgezogenheit sich selbst und den Seinen leben, in seinem *„Osmantinum"* ein neues Sabinum auf nordischem Boden schaffen.
So träumte Vater Wieland, ahnungslos, wie kurz bemessen sein ländliches Glück sein sollte.
Da hielt auch schon der Reisewagen vor dem einen der beiden großen symmetrischen Wohngebäude, die, vom Grafen Bünau vor etwa 50 Jahren errichtet, den stolzen Namen »Schloß« führten. War doch auch mit dem Rittergut Oßmannstedt einst, in den Tagen seiner glanzvollen Vergangenheit, die Gerichtsherrlichkeit verbunden gewesen. Heute aber eilten aus der dichten Allee hoher Bäume, die die beiden Gebäude miteinander verband, beim Heranrollen des Wagens frohe Bürger einer heitern Gegenwart und hoffnungsreichen Zukunft herbei: die stattliche Schar der Wielandschen Söhne, Töchter und Enkel, an ihrer Spitze der mit der Würde und Last eines Gutsverwalters belehnte zweite Sohn Karl. So begann jenes nur sechs kurze Jahre währende patriarchalische Idyll von Oßmannstedt, das in seiner Mischung von rührender Schlichtheit und graziöser Lebensanmut so viele der Zeitgenossen bezaubert hat.
Doch zunächst fand der Dichter Wieland hier nicht den stillen Musensitz, den er sich erträumt. Galt es doch, schauend und schaffend, von dem Gute, zumal von dem großen, 25 Acker messenden Garten, der »für sich allein schon ein kleines Landgut ist«, in Wahrheit Besitz zu ergreifen. Da muß er, wie er einem Freunde schreibt, bald in seiner 300 Schritt langen doppelten Lindenallee auf- und abgehen, bald in seinem Wäldchen herumkriechen, nach seinen Spalierbäumen, Kohlpflanzen, Gurken sehen. Dann wieder führt er im Schweiße seines Angesichts einen erbitterten Kampf gegen die Maulwurfshügel des Gartens, die er einzuebnen sich müht; doch wenn — wie so oft — der Philosoph über den neu erweckten Gärtner in ihm die Oberhand gewinnt, so schaut er lange, still versonnen, den rüstigen Minengräbern zu und zollt ihrem Schatzgräbertalent mit den Worten Hamlets bewundernde Anerkennung: »Canst work in the ground so fast! A worthy pioneer!« oder denkt sich wohl auch bei ihrem Anblick diese oder jene Verkörperung aus dem Kapitel der Seelenwanderung. Doch dann ruft ihm das Gebot seiner ländlichen Pflichten wieder aus dem Reich seiner Träume in die Tätigkeit heischende Gegenwart.
Mancherlei Verbesserungen und Neuanlagen im Hof und in den Hofgebäuden gilt es vorzunehmen. Vor allem aber wendet Wieland, dessen heiteres Epikureertum die Freuden einer gut besetzten Tafel wohl zu würdigen weiß, dem Obst- und Gemüsegarten seine liebevolle Fürsorge zu. Da pflanzt er unermüdlich künftigen Geschlechtern zum Segen, sich selbst mit dem Vergnügen des sichtbaren Gedeihens begnügend, und schon im ersten Jahr kann er voll Stolz von 300 neu gepflanzten Obstbäumen berichten, deren erste Früchte er noch zu erleben hofft. So preist er auch die Freuden des herbstlichen früchteschweren Gartens, wenn es Pomona nicht an Äpfeln, Birnen und Pflaumen, der Freudegeber Bacchus nicht an einem reichen Ertrag der Rebstöcke fehlen läßt, in besonders warmen Worten. Den Segen aller Götter Griechenlands ruft der Dichter, der sich so gern in hellenisches Gewand hüllt, auf seinen Garten, sein »Elysium« herab, in dem er und seine Familie als »Arkadier« ein wunschlos glückliches Leben führen. Und sollte sich doch einmal eine Wolke der Kümmernis auf sein »Sorgenfrei« herabsenken, — ei, wozu hat man dann den trefflichsten aller Sorgenbrecher, der Trauben rotes Blut, selbst an schwer behangenen Stöcken? War es doch Wielands eifrigen Bemühungen gelungen, an der mittäglichen Seite seines Gartensaals einen Gutedel zur Reife zu bringen, »so süß und geistvoll — des Lebensgeistes nämlich — als man in diesem ehemaligen Wohnsitz der altdeutschen Bären und Luchse nur immer wünschen darf«. Und gerade als es mit den italienischen Trauben doch nicht recht glücken will, da kommt zur guten Stunde von einem andern dem Gartenleben freudig zugewandten Dichter, von Klopstock, aus seinem Gartenhaus vor dem Alstertor hilfreicher Rat. Denn der Messias-Dichter nahm innigsten Anteil an dem »neuen Schwanennest an der Ilm«, wie er Wielands Besitzung nannte, ließ sich durch den gemeinsamen Freund Böttiger von seinem Gedeihen berichten und eine Grundriß-Skizze der gesamten Gartenanlage zuschicken, um wenigstens in seiner Einbildungskraft mit Wieland zu einer bestimmten Stunde in der großen Gartenallee zu lustwandeln oder vor dem mit Weinranken übersponnenen Gartensaal nach altrömischer Sitte ein durchwärmendes Sonnenbad zu nehmen. Aus seinen in noch nördlicheren Breiten, in dem Garten des Grafen Bernstorff bei Kopenhagen gewonnenen Erfahrungen, spendet er nun Wieland Rat, wie es ihm der Ungunst des Klimas zum Trotz gelingen müßte, vor einer nach Süden gelegenen Backsteinmauer köstliche Trauben zu ziehen, indem die in etwa handbreite Mauervertiefungen gesetzten Weinstöcke vor und oben durch Glasscheiben vor der Rauheit der Witterung geschützt, in den warmen Tagesstunden aber durch das Öffnen der oberen Scheibe der direkten wie der von der Backsteinmauer zurückgeworfenen Sonnenwärme teilhaft werden könnten. Mit enthusiastischem Jubel, in den überschwenglich schwärmerischen Tönen seiner lang entschwundenen Jünglingsjahre preist sich Wieland glücklich ob des Anteils, den der angebetete Dichter an seinen Gartensorgen nimmt. Pünktlich und getreu soll alles, was ihm Klopstock geraten, im nächsten Frühjahr ins Werk gesetzt, die Weintraubenblenden an der Bogenmauer mitten im Park angelegt und von ihr eine Baumpflanzung von Kirschen- und Pflaumenbäumen bis hinab zum Lustwäldchen geführt werden. »Dann mag Pomona mit Lyaeus ihren Wettkampf beginnen!« Pomona blieb Siegerin in diesem Streit; denn während die geplante Obstpflanzung bei Eintritt der milderen Jahreszeit tatsächlich angelegt wurde, mußte von der Befolgung des Klopstockschen Ratschlages um der allzu hohen Kosten willen abgesehen werden.
Zeigte sich Wieland so als eifriger Gärtner bemüht, alle früchtespendenden Gottheiten seinem Besitztum gnädig zu stimmen, so durften doch auch die Musen und Charitinnen dem Garten von Oßmannstedt

niemals fern bleiben. Seiner reinen Natur- und Genußfülle entkeimte die schönste Blüte Wielandscher Alterspoesie, der »Aristipp«, der nach seines Schöpfers eigenem Wort »ohne dies heitere Land- und Gartenleben nie empfangen und geboren worden wäre«. Hier, unter dem Schattengewölbe der dichten Linden auf- und abwandelnd, ward mit Herder der Plan zu dessen »Adrastea« für das neue Jahrhundert erwogen und gestaltet, dort im Gründämmer des Gartensaals hatte Goethe öfters als ein gern in das ländliche Milieu sich einfügender Gast geweilt, und in dem heiligen Bannkreis dieser Friedensstätte schien selbst der auf Heinrich von Kleists unseligem Geschick lastende Fluch für eine Weile zu erlöschen.

Doch Vergangenheit und Zukunft, die ins Grab gesunkene Epoche der Empfindsamkeit und die siegreich am Horizont emporsteigende junge Romantik, huldigten vereint dem Patriarchen von Oßmannstedt, als Frau von La Roche, die Geliebte seiner Jugendjahre, und ihre Enkelin Sophie Brentano dem Zauber des Osmantinum unterlagen. Aber während Frau von La Roche beständig bis zur Ermüdung ihres Gastfreundes die Fäden der Erinnerung dreißig Jahre zurückzuspinnen suchte und in hochgespanntem Gefühlsüberschwang die ganze Anlage des Wielandschen Besitztums, besonders das den Mittelpunkt des Vorhofes bildende Wasserbecken mit dem doppelten Springbrunnen symbolisch auszudeuten suchte: »Dieses Ganze ist ein Sinnbild von Wielands Geist, alles groß, und seine Tätigkeit wie diese Quelle vom frühen Morgen seines Lebens bis an den Abend seiner Tage unerschöpflich strömend«, lebte Sophie, diese seltsam fremde, zauberische Mädchenblüte, ganz in der beglückenden Gegenwart dieser sonnendurchfluteten ländlichen Atmosphäre. Als eine Schwester gesellte sie sich den Wielandschen Töchtern zu, half ihnen bei ihren ländlichen Verrichtungen oder saß in ihrem Kreis auf der Terrasse vor dem Wohnhaus, andächtig den Worten des gütigen Familienvaters lauschend. Doch auch in diesem glücklichen Erdreich war es ihr nicht mehr vergönnt, Wurzel zu schlagen. Todesschatten umschwebten ihre Stirn, als sie wiederum, dem heißen Wunsche ihres Herzens folgend, nach Oßmannstedt zurückkehrte. Da wandelte sie, die Muse des »Aristipp«, in tiefe Gespräche versunken mit Vater Wieland durch das herbstlich müde Wäldchen, das liebliche Ausblicke auf weite Rasenflächen freigab, oder saß traumverloren an der melancholischsten Stelle des Parks, wo sich das eintönige Plätschern der Ilm mit dem schwermutsvollen Rauschen der hohen pyramidenförmigen Fichtenbäume vermischte. Letztes Herbstglück lag über Oßmannstedt. . . Wenige Wochen später bettete Wieland sein »geliebtes Kind« in den ihm nun doppelt teuern Boden. Sie ward ihm zum Schutzgeist dieser Erde. All seine Spaziergänge führten ihn von jetzt ab zu dem Ilm-umrauschten Wäldchen mit den Haselstaudengebüschen, das ihre letzte Ruhestätte barg. Ehe ein Jahr sich schloß, gesellte sich ihr zur Seite ein zweites Grab, unter dem Wielands getreue Lebensgefährtin schlummerte.

Ein düsterer Schatten hatte sich über das sonnig heitere Gartenbild gesenkt. Und dunkler und drohender ballten sich die Wolken. Die Not der Zeit zwang den greisen Dichter, sich von der Stätte seines Glücks, auf der er seine Tage zu beschließen gewünscht, schweren Herzens zu trennen. Vergebens hatte er gehofft, wenigstens das Schloß und den Garten mit den teuern Gräbern behalten zu können. Er mußte von Oßmannstedt scheiden. Und wieder war es ein verheißungsvoller Frühlingstag, da der Siebzigjährige Abschied nahm von der Scholle, die er so hoffnungsvoll sechs Jahre früher betreten. Da wandelte er an der Seite seines treuen Freundes Böttiger noch einmal zu all seinen Lieblingsplätzen und Lieblingsbäumen. Aber nicht mehr war wie sonst in dieser Jahreszeit von Verbesserungen und Neuanlagen die Rede. Keine Zukunft verband ihn mit dieser Stätte. Mit stiller Rührung schritt Wieland Abschied nehmend von Baum zu Baum durch die jungen, reiche Fruchtbarkeit verheißenden Alleen, spendete hier dem Amarellenkirschenbaum an der Mauer, von dessen Zweigen er einst seiner alten Freundin La Roche selbst einen Teller voll Früchte gepflückt hatte, ein besonderes Lob, blieb dort vor zwei schönen Reineclaudenbäumen bewundernd stehen, neidlos der Freude ihres künftigen Besitzers gedenkend. Zu all den Plätzen, die ihm durch teure Erinnerungen unlöslich ans Herz gewachsen, lenkte er noch einmal die müden Greisenschritte — das Idyll von Oßmannstedt war zu Ende.

Zehn Jahre später ward der tote Dichter in seines Osmantinum Boden zur letzten Ruhe gebettet.

SIEGFRIED DECKER / DAHLIEN IN BRASILIEN III

EINE hochedle, sonst meist nur mehr oder weniger gut gebaute Dahlie ist bei reichlichen Wassergaben die gut mittelhohe und aprikosenfarbige »Demokrat«. Sicherlich handelt es sich um eine äußerst reichblühende, widerstandsfähige Sorte, die überall großen Anklang findet; die Farbe ist eben sehr edel. Wachstum, Aufbau und Blattwerk befriedigen. Edler aber ist die Sorte *Demut*. So ein tiefes, sattes, lachsgetöntes Chamoisrosa ist von durchschlagender Wirkung. Dabei ist der Blütenbau immer schön; in leichten wie in schweren Böden, an heißen Sommertagen wie zur Zeit der Herbstnebel lassen Blüte, Aufbau der Büsche, Stengel und Blattwerk nichts zu wünschen übrig. Es ist eine hochedle Sorte. Zu den schönsten Kaktusdahlien gehört die breitpetalige *Schwarzrot*; sie übertrifft die alte, überall verbreitete, aber nicht genügend freiblühende »Jackson«, deren samtschwarzrote Blüten in Trockenzeiten und besonders an brennendheißen Tagen oft verkrüppeln, die Blätter verbrannten. »Schwarzrot« dagegen ist eine in jeder Hinsicht befriedigende, großblumige, gutgebaute und reichblühende Sorte. Für Gegenden mit heißem Klima ist sie kurzweg die schwarzrote Dahlie. Ganz prachtvoll sind *Mevrouw Wurfbain, Mevrouw Ballego* und *Rapallo*. Die erste ist eigenartig gelockt, tief samtigpurpurn, mit einer Art Krone in der Mitte; die zweite ist glühendrot, ebenfalls feingebaut; Rapallo endlich überrascht durch die eigenartige Färbung, ein weiches Braunrot auf goldgelbem Grund. Bei dieser Sorte ist der Blütenbau locker, aber trotzdem ist die Blume von guter Haltbarkeit. Die ersten zwei Sorten aber sind großblumige, gelockte Hybriddahlien, alle drei von mäßig hohem Wuchs. Ihr Aufbau, ihre Widerstandskraft sind ausgezeichnet. Alle drei sind absolut farbenbeständig, auch in brennendster Sonne, größter Hitze, trockenstem und dazu noch leichtem Boden. *Heimweh* ist wieder eine überaus empfehlenswerte Prachtsorte, deren krallige, feste Blüten auf steifen, windsicheren Stengeln getragen werden; selten nur kommen halbgefüllte Blüten vor. Bei genügender Bodenfeuchtigkeit sind sie überhaupt immer gut. Die violettpurpurne Farbe wird durch die grüne, erhaben hervortretende Blütenmitte bedeutend gehoben. Ich weiß leider nicht, ob der Name »Japanische Sonne« richtig ist, denn gar manche Sorten werden der Konkurrenz zuliebe umgetauft, um einen Import von anderer Seite zu verhindern. Schön ist dies nicht, aber erklärlich; warum soll der eine reisen und an Ort und Stelle eine Auslese vornehmen, indes der andere einfach nachbestellt? Wie dem auch sei — die Pflanze ist jedenfalls gut. Stengelwerk und Laub sind massig wie bei Adler, die Hauptstiele trotzen jedem Winde und tragen terrakottafarbene, aufrecht schauende Riesenblumen, die größten, die ich kenne. Diese Sorte trotz langer Trockenheit; sintflutartige Tropenregen können ihr nichts anhaben. Sie ist reichblühend, von guter Wirkung, aber eher Ausstellungsdahlie, die den Titel »Mammuthdahlie« recht gut rechtfertigen würde. Ungemein empfehlenswert sind die ewig bienenumbrausten Anemonen- und Halskrausendahlien. Leuchtenburg, Diadem und Mad. E. Poirier sind besonders zu empfehlen. Ihnen kann lang andauernde Trockenheit nichts anhaben. Ihr Aufbau ist gut, besonders wenn sie in zwei oder drei Reihen gepflanzt und nach vornhin durch niedriger wachsende Sorten verdeckt werden. Von seltener Leuchtkraft ist die scharlachrote, gelbgekrauste *Leuchtenburg*; wundervoll hebt sich die schneeweiße Halskrause vom Rosakarmin der schmalen, sternförmig angeordneten Blumenkrone der Sorte *Diadem* ab. Wie aus altem Brokat verfertigt scheinen die bläulich violetten, mit einer zart lila angehauchten weißen Halskrause geschmückten Blumen der Sorte *Mad. E. Poirier*. Alle drei werden mannshoch bis übermannshoch und sind gleich empfehlenswerte, immerblühende echte Gartenschmuckdahlien, deren Blüten auch zu den mannigfaltigsten Blumendekorationen zu verwenden sind.

Das herzige *Mauerblümchen* ist wirklich entzückend. Wie niedlich ist das weiße, kirschrot schattierte Kleidchen, und wie anspruchslos ist es. Ich fand nur beste Eigenschaften; es ist eine Dahlie für den kleinsten wie für den größten Garten. Herrlich scharlachorange ist *Nagels Wunder*, bei der die Spitze jedes Blumenblattes leuchtend gelb gefärbt ist. Nie verblaßt diese glühende Farbe, auch nicht in brennendster Sonne. Straff ist ihr Wuchs, fest der Stengel, gedrungen üppig der ganze Aufbau; Regen haben dieser Sorte nichts an; sie verdient einen Ehrenplatz. *Schöne Wienerin* ist ebenfalls hervorzuheben. Ihre milchweißen, im Herzen eigenartig ockerfarben und karmin abgetönten Blumen sind zwar nicht übergroß, aber von schöner Hybridform. Auch sie hat einen gedrungenen Aufbau und hat alle guten Eigenschaften von Nagels Wunder. »Prahlhans« und »Hessenland« liefern Paradeblumen für die Blumen-

dekoration und Kranzbinderei; im Garten werden diese Riesenblumen, wie überhaupt alle mehr leicht gebauten Arten in voller Sonne zu rasch erschlaffen und im Garten einen unordentlichen Eindruck machen; Liebhabern von Monsterblumen aber seien diese beiden Sorten empfohlen.
Von vielen anderen möchte ich nur noch »Herzlieb« und »Märchenzauber« erwähnen. Es sind Prachtsorten von hohem Gartenwert.
Die Pompon-Dahlien, die alten Georginen, sind besonders gut für die hiesigen Verhältnisse geeignet; haben sie doch alle feste Blütenbälle, die sie reichlich hervorbringen. Die bronzefarbene »Fashion«, die »White Aster« und die rote »Scharlachperle« sind Glanzstücke. Ich besitze noch eine wundervolle uralte, seit Jahren in der Erde verbleibende gemsfarbene, mit breiter lila übergossener Mitte und eine mit schneeweißen, zart lachsrot übergossenen Blumenbällen.
Zu lang ist schon die Dahlienliste geworden. Sollte ich nur wenige empfehlen, so sind es: Adler, Insulinde, Porthos, Herbstkönigin, Salmonea, Mevrouw Wurfbain, Aureola, Schwarzwaldmädel, Winzerliesel, Wunderhold, Schwarzrot, Delice, Marie Kapphan, Brennende Liebe, Kunigard.

F. BUCHERER / ERZIEHUNG DURCH GARTENARBEIT

DAS Problem der Erziehung beschäftigt jetzt viele Menschen. Neue Schulen mit neuen Grundsätzen und Ideen entstehen an vielen Orten und wirken wieder zurück auf die alten staatlichen Bildungsstätten.
Alle diese Erziehungsbestrebungen gehen eigentlich von zwei Standpunkten aus, die unserer modernen Lebensanschauung entsprechen: Zum ersten glauben wir wieder an die Schönheit des gymnastisch gut entwickelten Menschenkörpers und fordern von der Erziehung die Ausbildung körperlicher Tüchtigkeit.
Zum andern glauben wir an ein allgemeines Menschenrecht, das mit Menschenwürde, mit dem Gefühl der Verantwortlichkeit des Einzelnen gegenüber der Allgemeinheit absolut verbunden ist, und so verlangen wir von der Erziehung, daß sie jedes einzelne Kind, ob arm oder reich, so ausbildet, daß es ein wertvolles Glied in unserer Kulturgemeinschaft darstellen kann.
Unser heutiges Leben verlangt überall Menschen, die mit ganzem Herzen und allen Sinnen und nicht bloß mit einem halb entwickelten Verstand ihr Tun und Lassen regieren. Herz und Sinne werden am besten entwickelt durch die alte Lehrmeisterin aller Menschen: durch die Arbeit. So ist die Arbeit in unsere Schulen eingezogen: Handarbeit, Handwerk, Hausarbeit, Landwirtschaft und Gartenarbeit. Ich glaube, daß von allen diesen Arbeiten die Gartenarbeit die Forderungen unserer Erziehung weitaus am ersten zu erfüllen vermag. Inwiefern sie auch den kindlichen Kräften, dem ganzen Wesen eines jungen Menschen am besten angemessen ist, darüber sollen hier nun verschiedene Gedanken ausgesprochen werden.
Wenn wir eine Pflanze jahraus, jahrein besorgen, auf alle ihre Wünsche richtig eingehen, dann lernen wir sie nicht nur kennen, wie man in der Botanikstunde eine Pflanze kennenlernt, sondern sie steigt allmählich vor uns aus dem Boden als ein lebendiges Wesen. Ihr Leben ist ganz verzaubert in ihrer wunderbaren, ewig rätselhaften Schönheit. Durch diese Schönheit kann sie mit uns reden in einer Sprache, die so alt ist wie die Erde selbst. Jeder Baum, jede Blume hat uns etwas Eigenes zu sagen, etwas, was uns unendlich freuen muß. Die großen Künstler, die Dichter und die Heiligen aller Zeiten haben diese Sprache der Erde verstanden und haben ihr Leben in ihren Dienst gestellt und sind ihre Dolmetscher für uns geworden.
Nun wollen wir nicht mehr blos die Werke jener Großen den Kindern zeigen, in unmittelbarem Umgang mit der Erde und den Pflanzen sollen unsere Kinder die Sprache der Schöpfung wieder selbst vernehmen können.
In einem großen schönen Garten soll jedes Kind ein Flecklein Erde bekommen, wo im Frühjahr die offnen Schalen der Krokus in der Sonne leuchten, wo die Märzbecher an graziösen Stengeln leise im Wind schaukeln, wo Adonissterne und Veilchen und all die vielen Frühlingsblumen die Luft ringsum mit Seligkeit und Schönheit füllen. Die Blumen sollen die Freunde unserer Kinder werden. An verschiedenen schattigen Stellen sollen die Maiglöckchen ihren reinen Duft ausströmen, an sonnigen Hängen sollen Rosen und Lilien und tausend Sommerblumen alle um die Freundschaft unserer Kinder werben; und im Sommer und Herbst müssen viele süße und köstliche Früchte in unserem Kindergarten reifen und den Kindern ohne Worte etwas mitteilen vom Geheimnis des Schenkens.
Ein Garten, in dem das alles wachsen soll, der die alte Sehnsucht der Menschen, den Traum vom Paradies, verwirklichen soll, existiert nicht irgendwo wie ein Schlaraffenland. Mit vieler Mühe muß er erst geschaffen werden, und viel Mühe und Arbeit gehört dazu, ihn immer schön zu erhalten. Könnte diese Mühe und Arbeit nicht eine Aufgabe bilden für unsere heranwachsenden Kinder, für alle Kinder im Alter von 6 bis 15 Jahren?
Wie viele Lehrer sind sich heute schon darüber einig, daß die Fähigkeiten des Verstandes auch in der halben Zeit geübt werden könnten, daß es nicht so sehr auf die Menge des Gewußten ankommt, als auf die innere Ordnung des Beherrschten und auf die Einordnung des Menschen in das lebendige Leben. Zu dieser Einstellung in das Leben gehört vor allem, daß der Mensch in sich selbst, in seiner eigenen Persönlichkeit nicht den Mittelpunkt aller Dinge sieht.
Je mehr wir in den Schulen das individuelle Bewußtsein stärken, um so notwendiger müssen wir den verschiedenen frei gewordenen Kräften einen gemeinsamen Weg zeigen, ein großes Ziel, dem alle Menschen dienen können. Die Gartenarbeit lehrt den Menschen dieses Dienen. Wenn ich die Erde hacke oder einen Baum pflanze, so bin ich nur ein Diener der Natur. Der Baum, die Gesundheit und Schönheit des Wachstums, das aus der wohl durchlüfteten Erde quillt, bilden den Sinn meiner Mühe.
Der Baum ist nicht mein Werk. Er gehorcht nur seinen eigenen Gesetzen, die in ihm wohnen. Wenn ich diese Gesetze mißachte, dann wird er leiden und zuletzt zugrunde gehen. Der Baum in meinem Garten ist wie ein Gast aus einem fremden Land. Solange ich diesen Gast in Ehren halte, ihn schütze und ihn pflege, solange wird mein Garten voll Leben und voll Schönheit sein. Wie der Baum in meinen Besitz, so ist die Erde in die Hände der Menschen gegeben, und es liegt nur an unserer Gesinnung, ob wir aus ihr ein Paradies oder ein Schlachtfeld machen.
Ich weiß keine wichtigere Aufgabe als diese: in den jungen Menschen eine rechte Gesinnung reifen zu lassen. Die Gartenarbeit wäre ein Mittel, um solche Gesinnung zu verankern. Wenn ein Kind einen Kern in die weiche Erde steckt, wenn es selbst mitarbeiten darf und nicht von weitem bloß erzählen hört, wie aus dem Kern zwei dicke runde Blättchen kommen, wenn es vor seinen Augen einen Baum aufwachsen sieht mit tausend fein geformten Blättern, mit entzückenden Blüten, mit wunderbaren Früchten, muß ein solches Kind nicht eine wirkliche Ehrfurcht empfinden vor allem lebendigen Geschehen? Und muß es nicht ein Vertrauen fassen in die wahre Güte, die das Kleinste mit derselben unendlichen Sorgfalt bildet wie das Allergrößte?

Ehrfurcht und Vertrauen sind so der Boden für jede rechte Gesinnung. Wie glücklich könnte allen Kindern ihre Jugendzeit gestaltet werden durch eine wohl erwogene Verbindung von Schule und Garten. Ich denke dabei nicht an unsere jetzigen Schülergärten, sondern an die Arbeit in einem großen schönen Garten vor der Stadt, der als Park mit großen Spielplätzen und hohen Bäumen, mit Obstwiesen und vielen verborgenen Winkeln voller Blumen nach einem einheitlichen Plan angelegt ist. Für jede Altersstufe, für jedes einzelne Kind könnte es in diesem Garten eine besondere Aufgabe geben, deren selbständige Erfüllung mehr Freude als Arbeit bereiten müßte.

Aus meinen Erfahrungen in meiner Gartenbauschule bei Zürich weiß ich, wie fröhlich junge Menschen bei der Gartenarbeit werden können, wenn sie in richtiger Art, ihren Kräften entsprechend, geführt werden. Zur Tüchtigkeit der Arbeit erzieht die Natur ihre Diener selbst. Denn je besser gearbeitet wird, um so fruchtbarer wird die Erde, umso schöner werden die Blumen, umso gesunder und kräftiger alle Bäume und Früchte. Ganz von selbst bekommt ein Kind das Gefühl der Verantwortlichkeit für das, was es tut. Denn es sieht ja mit eigenen Augen, wieviel von der Pünktlichkeit seiner Arbeit abhängt. Jedes Kind wird sich immer größere Mühe geben, immer ordentlicher, aufmerksamer und liebevoller arbeiten. Der Begriff »gute Arbeit« wird in dem jungen Menschen so lebendig, wie er durch Worte niemals werden konnte. Aber tiefer noch als alle Arbeit wirken die Eindrücke der unendlichen Schönheit, die an jedem Morgen neu in allen Dingen erwacht. Wie schal und arm ist oft das Leben vieler junger Menschen in nichtigen Dingen verloren! Nur eine leise Ahnung von dem großen Wirken der Natur, von ihren heimlichen Schätzen, die sich in den Blumen offenbaren, würde einem solchen Leben einen Inhalt geben, einen Reichtum an lebendiger Schönheit, der durch keinen äußeren Reichtum zu ersetzen wäre.

O. BURCHARD / SCHÖNE ECHIUM-ARTEN DER KANAREN

Die Gattung Echium zählt auf den Kanarischen Inseln etwa siebzehn zum Teil prachtvolle Vertreter, von denen die weitaus meisten nur auf diesen Inseln beheimatet, also einheimisch sind, unter ihnen finden sich einige, die zu den größten und schönsten Borragineen der Welt zählen.

Die spezifisch kanarischen Echien sind zumeist strauchartig und kandelaberförmig verzweigt mit auffallend großen, kegelförmigen reichblütigen Blütenständen am Ende der mit schmal- bis breitelliptischen, grünen, meist seidig behaarten Blättern besetzten Triebe und von verschiedenen Farben. Drei Arten, Echium simplex, E. Pininana und E. Bourgaeanum besetzen nur *einen* riesigen Blütenkonus von bewunderungswürdiger Eleganz, der sich — meist im zweiten Jahre — aus der mächtigen unverzweigten Grundrosette von Blättern erhebt. Diese Pflanzen erinnern im Habitus an einige Riesen-Lobeliaceen des Kilimandscharogebirges. Natürlich hat man es versucht, Arten dieser »Simplices« auch in Europa zur Entwicklung zu bringen, und mit Erfolg! Im Mittelmeergebiet ist dies auch ganz leicht. Aber sogar in Deutschland gelingt es auch. So sah ich im Botanischen Garten in Hamburg einmal ein von Inspektor Widmaier gezogenes Echium simplex in recht schöner Blüte. Die Pflanze war — ob ein oder zwei Jahre alt, dessen erinnere ich mich nicht mehr — im Kalthause überwintert worden und im März an einer Südwand ausgepflanzt, wobei Frühbeetfenster vor der Pflanze, oben und unten gut abgedichtet, senkrecht aufgestellt waren. An milden Tagen wurden diese bei Sonnenschein fortgenommen. Und der Flor dieser Echien mit solch großen Blütentrauben dauert naturgemäß recht lange an. Selbst auf Teneriffa ist eine E. simplex-Pflanze bei der höheren Wärme gegen 2 Monate in Blüte, da die zentrale Achse des Blütenthyrsus zahllose Seitenästchen oder »Wikkel« aussendet, welche sich ganz allmählich aufwellen, dergestalt, daß sich stets die tangential nach außen kommenden Knospen öffnen und so die ganze Traube die ganze Zeit über dicht mit Blüten besetzt erscheint, während sie dabei allerdings fortgesetzt an Dicke zunimmt. Die Höhe der Blütentraube von der Erde bis zur Spitze mag bei kräftiger Entwicklung zweieinhalb Meter erreichen. Die Blütenfarbe ist schneeweiß, überragt von rosa Staubfäden mit dunkelrotbraunen Staubbeuteln. Ein Prachtanblick!

Echium giganteum, schneeweiße breitkegelförmige Blütentrauben

Ganz bedeutend höher, etwa fünf Meter erreichend, also wie ein kleines Haus, wird Echium Pininana, eine sehr seltene, von mir an einer Stelle in den Lorbeerwäldern Palmas in etwa tausend Meter Seehöhe wiederentdeckte hellblaue Art mit bis siebzig Centimeter langen Grundrosetten-Blättern. Diese ebenfalls sehr schöne Art möchte vielleicht noch leichter als E. simplex in Europa zur Entwicklung gelangen, aus dem Grunde, weil sie, auch auf den Kanaren, *später* blüht. Ihre Heimat liegt in einer Zone größerer Kühle im Gebirge, in der Region des atlantischen Lorbeerwaldes, dessen spezifisches, durch Nebelbildung viel feuchteres Klima, als die Küstenzone, wo E. simplex heimisch ist, dem deutschen Frühlingsklima durchaus ähnlich ist. Die Temperatur in tausend Meter Höhe kann in klaren Nächten des Winters bis nahe an den Nullpunkt sinken. Infolgedessen treibt E. Pininana erst im April oder Mai eine wahre Riesenlanze von Blütenschaft empor. Das beigegebene Bild zeigt die wunderbare Pflanze an einer offeneren Stelle inmitten der schönen Urwaldvegetation der Insel Palma, wo ich sie an einem Maitage aufzunehmen das Glück hatte. Seitdem haben wir sie in verschiedenen Gärten Orotavas, wo sie prächtig gedeiht, womöglich noch höher wird als in der Wildnis und sehr dekorativ ist. Wegen der Beengtheit der kanarischen Gärten finden wir sie hier meist im Verbande mit Blütensträuchern und kleinen Bäumen. Ganz bedeutend schöner würde sie in kleinen Gruppen als Solitärpflanze auf wellig bewegten Rasenflächen wirken. Zur Heranzucht würde man kleine Kübel oder doch sehr große Töpfe benötigen.

Echium simplex, schneeweiß, in einem Garten bei Orotova, Teneriffa

Echium Pininana, hellblau, das größte Echium der Welt, im atlantischen Lorbeerwalde der Insel Palma

Auch hier auf den Inseln blüht E. Pininana nicht gleich das zweite Jahr nach der Aussaat, die Pflanzen müssen erst eine gewisse, bedeutende Kräftigkeit erlangen, bis sie zur Blüte übergehen. Man merkt aber das Schossen an der Konusbildung schnell und kann in Deutschland die Pflanzen aus den Kübeln getrost Mitte Mai ins Freie auspflanzen.
Die dritte unverzweigte Art ist eigentlich die schönste. E. Bourgaeanum hat eine zartrosa Blütenfarbe, die beim Verblühen in Violett übergeht. Sie stammt aus dem Hochgebirge, wo sie durch ihren etw zwei Meter langen Blütenschaft unzugängliche Felsspalten unvergleichlich schön ziert, und dazu besitzt ihre Belaubung durch dichte weiße Behaarung ein fast silberfarbiges Aussehen. Junge Pflanzen lassen sich bisweilen am Grunde der Felswände auffinden, wachsen auch gut in Orotava weiter, aber die Pflanze gedeiht nicht recht in den feuchten Gärten. Bei der Blüte macht sie anormale Verzweigungen und gewinnt ein laxes Aussehen. Dennoch mag es in besonders sonniger Lage, in Steingärten, bei vorsichtigem Gießen auch gelingen, normale Exemplare zu erzielen, zumal E. Bourgaeanum gegen Kälte unempfindlich ist. Es wurden im Hochgebirge, wo sie wächst, und oft viel Schnee fällt, bis zu sechzehn Grad Kälte beobachtet.
Die kandelaberförmig verzweigten strauchförmigen Echien sind leichter in der Behandlung. Sie werden auf den Kanaren zum Teil baumstrauchartig hoch und wirken auch sehr imposant. Sie kommen aber schon als junge Pflanze zur Blüte, und man kann sie in Töpfen oder Kübeln, die man im Sommer in Deutschland ins Freie setzt, bis zu beliebiger Größe heranziehen, sie im Herbst zurückschneiden und so einen kräftigen Flor erzielen. Eine der schönsten Species ist E. giganteum, reinweiß und sehr reichblütig, mit mehr breiten, pyramidalen Blütenkegeln und rosaroten Staubbeuteln, die weit hervorragen. Sehr schön ist ferner E. bifrons von Palma, weniger verzweigt und ziemlich hoch, mit leuchtend hellblauen Blütenständen, deren Seitenwickel sich zweiseitswendig präsentieren. Ich sah es hier nie in Kultur, doch würde diese Pflanze sich lohnen, da sie in der Tat sehr schön wirkt. Ihr Standort ist sehr entlegen, eng begrenzt und schwer erreichbar, in mittlerer Berglage sehr tiefer Schluchten, sodaß es schwer hält, Samen zu erhalten. Echium aculeatum ist eine kleinere, mehr dicht verzweigte, schneeweiß blühende Art, welche leicht im Topf zu ziehen ist und im Steingarten ausgepflanzt werden kann. Sie verträgt die größte Trockenheit, während der große E. giganteum feuchter gehalten werden will. Letzteres entstammt der höheren, ersteres der tiefen Küstenzone der Kanaren. Die noch zahlreichen übrigen kanarischen Echien besitzen nicht so reine, klare Blütenfarben und selbst das im Hochgebirge Gran Canarias heimische, sehr seltene E. callithyrsum ist nicht so schön wie die beschriebenen. Dagegen besitzt die Insel Madeira eine sehr schöne kandelaberartig verzweigte *ultramarinblaue* Art, Echium candicans, die sehr kulturwürdig ist. Durch die lang hervortretenden Staubfäden erhält der Blütenkonus von weitem einen kupferrötlichen Schein. Ihre Blätter sind zudem sehr hübsch breitelliptisch und weißfilzig. Das kanarische E. virescens, hellila in Farbe, kommt ihr nicht entfernt nahe, wiewohl es auch eine imposante Pflanze aus tausend Meter Höhe ist. Echium candicans zog ich einmal in einigen Exemplaren in meinem Garten in La Paz bei Puerto de Orotava heran und bemerkte, daß *eine* Pflanze nur zwei kleine Nebenzweige entwickelte, bei großer Kräftigkeit der mittleren Blattrosette. Ich schnitt diese Nebentriebe aus, auch einige folgende noch, und hatte die Freude, daß die Mittelrosette sich zu einer größeren Breite entwikkelte und nach der ersten Überwinterung blühte. Die wunderbar schöne Pflanze machte auf den Beschauer den Eindruck eines ultramarinblauen Echium simplex! Die Blütentraube wurde etwas über mannshoch. Man kann also die Kandelaberformen zur Simplexform zwingen.

OSCAR REUTHER / INDISCHE GARTENKUNST

Wenn es als Wertmeſſer für die Kultur eines Volkes gelten ſoll, ob es ſich eine Gartenkunſt geſchaffen hat, ſo ſtehen die Inder unter den alten Kulturvölkern in der erſten Reihe. Man mag wohl meinen, ein Land mit tropiſchem Klima, mit einer Überfülle üppigſten wilden Pflanzenwuchſes biete ſchlechte Bedingungen für das Entſtehen des Kunſtgartens, da alles Menſchenwerk gegenüber dem Wirken der freien Natur klein und kläglich erſcheinen müſſe. Aber gerade im tropiſchen Land wird das Stück Erdboden, auf das der Menſch ſeine Fruchtbäume und Nutzgewächſe gepflanzt hat, ſich von der ungezügelten Natur ringsum abheben, weil der Gartenbauer ſeine Pfleglinge aus Gründen der Überſichtlichkeit und der leichteren Arbeit bei Anbau und Ernte in Reihen und Beete ſetzt. Darin liegt aber als Keim zu einer künſtleriſchen Behandlung des Gartens die Ordnung, die Regelmäßigkeit, die der Inder in ſeiner Gartenkunſt zum leitenden Grundſatz erhoben hat. Der Garten galt und gilt ihm noch als Gegenſatz zur freien Natur in höherem Sinne als etwa uns, denn deren wildes Wuchern iſt ſeinen Werken feindlich. Der Garten iſt dem Inder wie alles urbar gemachte und angebaute Land ein Gleichnis des Sieges der menſchlichen und damit der göttlichen Ordnung über die Gewalten der wilden Natur mit ihren Urwäldern und Sümpfen, iſt »vastu«, Wohn- und Lebensfläche für den Menſchen und deshalb heilig. Im Unterſchied dazu ſucht der Chineſe, der ſich die gewaltigen Lößebenen ſeines Landes völlig unterworfen hat, ſie mit einem geregelten Netz von Kanälen belegt und in ein Schachbrett von Feldern aufgeteilt hat, bezeichnenderweiſe in ſeinem Garten ein Stück freie Natur wiederzugeben. Sein verzwergter Landſchaftsgarten mit gewundenen Waſſerläufen, gebuchteten Miniaturſeen, künſtlichen Felsbergen, der in der Zeit der Chineſerei mit die wirkſamſte Anregung zum engliſchen Gartenſtil des ausgehenden 18. Jahrhunderts gegeben hat, iſt Romantik, gewollter Gegenſatz zur nüchternen Ordnung des Lebens. Der Oſten hat deshalb auch eine Landſchaftsmalerei, die Indien nie beſeſſen hat.

Steinkübel mit Tulſipflanze im Hof des Palaſtes zu Kumbher

Sieht man von wenigen, mehr andeutenden als ſchildernden Reliefdarſtellungen ab, deren hauptſächlichſte ſich auf den Toren des Stupa von Santſchi finden, ſo wiſſen wir von den Gärten des alten Indien einzig durch die Literatur, die allerdings über dieſen Punkt viel mitteilſamer iſt als das Schriftwerk der meiſten alten Völker. Marie Luiſe Gothein hat es unlängſt in ihrem Buche »Indiſche Gärten« unternommen, aus den Schilderungen der großen Epen, des Mahabharata und Ramajana, der buddhiſtiſchen Schriften und der Märchen und Dramen ein Bild des alten indiſchen Gartens wiederzugewinnen. Freilich fehlt dieſen Quellen zu allermeiſt die Abſicht, anſchaulich und genau zu beſchreiben und ein Geſamtbild zu entwerfen. Der indiſche Dichter läßt die Bäume des Gartens von Früchten und Blüten prangen, vergleicht die weißen, roten und blauen Lotusblüten mit dem Mondlicht, der Morgenröte und den blauſchwarzen Gewitterwolken, den blühenden Jasminſtrauch mit dem Schaum des Waſſerfalls, den Asokabaum (Jonesia Asoka) mit ſeinen roten Blumen einem blutbeſpritzten Krieger. Er ergeht ſich in den Alleen aus Siebenblattbäumen (Saptaparna Alstonia scholaris), deren blühende Kronen ſich ihm zu weißen Brücken zuſammenſchließen. Nebenbei erfährt man von ummauerten Bäumen, ſteinernen Bänken, Schaukeln für die Frauen, Gartenhäuſern mit Wandgemälden, Lauben aus Schlingpflanzen und allerlei anderen Dingen, unter denen Häuſer für Bananen und andere Pflanzen für das indiſche Klima ſehr merkwürdig erſcheinen. Die Schilderungen ſchwelgen oft mit orientaliſcher Üppigkeit in elfenbeinernen Zäunen, goldnen Waſſerbecken, kriſtallenen Luſthäuſern mit Bänken aus Saphir, künſtlichen Bäumen aus Korallen, Gold und Edelſteinen, Dingen, die zwar ſicher einen wirklichen, aber ins Märchenhafte geſteigerten Hintergrund haben. Man erkennt indeſſen aus allem, welcher Art die Gärten des alten Indien waren, in denen ſich, dem Klima gemäß, ein weit größerer Teil des Lebens abſpielte, als das bei uns möglich iſt. Dazu helfen weiter die leider nicht ſehr ausführlichen und in ſpäteren Auszügen erhaltenen Bemerkungen, die der als Geſandter des Seleukos Nikator am Hofe des Tſchandragupta lebende Grieche Megasthenes über indiſche Gärten macht. Einmal iſt das die älteſte Quelle über den indiſchen Garten, da die indiſche Literatur uns in eine ſpätere Zeit führt oder doch nur in ſpäteren Bearbeitungen vorliegt, und zum zweiten ermöglichen dieſe Zeugniſſe eines Fremden wie die eines anderen, des chineſiſchen Pilgers Hsüan Tsang, der das buddhiſtiſche Indien im 7. Jahrhundert bereiſte, eine gewiſſe Kritik. Megasthenes beſchreibt die königlichen Gärten in Pataliputra, der Chineſe erzäht von den buddhiſtiſchen Klöſtern Indiens und ihren Gärten, die ihm gegenüber denen ſeiner Heimat fremdartig anmuten. Aus den Gärten, die reiche Gönner den buddhiſtiſchen Mönchen ſtifteten, als erſter der Kaufmann Anathapindika, der Buddha ſelbſt den berühmten Park Dſchetavana zum Geſchenk machte, iſt das buddhiſtiſche Kloſter hervorgegangen und hat daher ſeine Bezeichnung Sangharama: »Luſtgarten« erhalten. »Nicht zu ferne, nicht zu nahe der Stadt, mit zahlreichen Eingängen, leicht erreichbar für alle, die dorthin verlangen, bei Tage nicht zu belebt, bei Nacht ſtill, von Lärm und Menſchen entfernt, ein Ort der Zurückgezogenheit und einſamen Betrachtung« ſoll ein ſolcher Kloſtergarten ſein, »ein köſtlicher Aufenthalt, wohl verſehen mit Waſſer und Schatten«.

Plan für ein Dorf im Sarvatobhadra-Schema nach den Regeln des Manasara

Waſſer, Schatten und Blumen ſuchte der Inder in ſeinem Garten. Waſſerkühle bedeutet dem Menſchen im heißen Lande eine Wohltat, deren Wert der Abendländer kaum ermeſſen kann. Dem Inder insbeſondere gilt das Waſſer in See und Fluß nicht nur als das lebenſpendende Element, ohne das er die Möglichkeit ſeines Klimas nicht ausnutzen könnte, mehrere Ernten im Jahre zu erzielen, weil der Regenfall ſich in wenigen Monaten zuſammendrängt und während eines großen Teiles des Jahres völlige Trockenheit herrſcht. Das Waſſer iſt ihm auch heilig, weil es kühlt und reinigt. Baden gehört im heißen Klima zu den Notwendigkeiten des Lebens, und in allen indiſchen Religionen iſt das Bad zu einer unerläßlichen rituellen Handlung geworden. Die zahlreichen Stauſeen, die einſt weitblickende Fürſten anlegten, um ihr Land durch künſt-

liche Bewäſſerung während der Trockenzeit ertragreicher zu machen, dienten und dienen noch den Gläubigen zum reinigenden Bade, ſind deshalb ſtets einer Gottheit geweiht und vielfach, wie der Puſchkarſee bei Adſchmir, zu beſtimmten Zeiten im Jahr das Ziel zahlloſer Pilgerſcharen. In den Gartenſchilderungen ſpielt deshalb das Waſſer eine große Rolle. Ein großes Waſſerbecken, auf dem »vollaufgeblüht alle Arten von Lotus prangen, durchſchnäbelt und durchſchnattert von Waſſervögeln und durchſummet von Bienen« iſt oft das Prachtſtück des Gartens. Andere Becken dienen zum Baden und betten ſich in einem Stufenkranz ein. Von plätſchernden Brunnen erzählt das Ramajana, und das Mahabharata kennt vielerlei Arten, wie man das Waſſer im Garten zur Geltung bringen kann. Megasthenes und Hsüan Tsang erwähnen beide die ſchönen Teiche der Palaſt- und Kloſtergärten, die ihnen als etwas Beſonderes erſchienen ſein müſſen. Schatten und Blumen boten die Bäume. Der alte indiſche Garten war ein Baumgarten. Das geht aus den Quellen hervor, ſowohl den indiſchen wie den Berichten der Fremden. Megasthenes ſpricht von einem »parádeisos«, wie der Grieche die parkartigen Gartenanlagen der Perſer zu nennen pflegte,

Der Anguri Bagh (Traubengarten) mit dem Chas Mahal im Palaſt zu Agra; unten der Plan

und ſagt von den Palaſtgärten von Pataliputra, ſie ſeien ſehr ſchattig. Außer einheimiſchen Bäumen würden in ihnen auch ſolche aus anderen Teilen Indiens gepflegt. Die indiſchen Dichtungen nennen eine Menge der Pflanzen des Gartens und kennzeichnen ihre beſonderen Eigenſchaften. Die meiſten der aufgeführten Arten haben ſich feſtſtellen laſſen, ſodaß man ſich eine ziemlich genaue Vorſtellung vom Pflanzenbeſtand des alten indiſchen Gartens machen kann. Das Mahabharata ſchildert die Gärten der Stadt Kandhavaprastha, in denen es Fruchtbäume vieler Arten wachſen läßt, den Mangobaum (Mangifera indica), Amalaka (Phyllanthus emblica), Kadamba (Nauclea cadamba), den Tala-Baum, wahrſcheinlich die auf Fresken in Adſchant abgebildete Boraſſuspalme (Boraſſus flabelliformis), die den Beinamen Trinaradſcha, König der Pflanzen, führt, und andere mehr. Wegen ihrer ſchönen und duftenden Blüten werden neben anderen aufgeführt die Patali (Bignonia suaveolens), die Ketaki (Pandanus odoratissimus), der »Schraubenbaum« unſerer Gewächshäuſer, ferner der Atimukta (Gaertnera racemosa) und der Karavira (Nerium odoratum), der großblumige und wohlriechende indiſche Oleander. In anderen Gartenſchilderungen ſpielen die Arekapalme (Areca ca-

techu) und die Banane eine Rolle. Beide sind auf den Fresken in Adschanta abgebildet. Der Gartenbauer hatte aber bei der Wahl der Bäume und Sträucher nicht allein auf deren Schönheit und Nützlichkeit zu sehen. Viele Pflanzen wurden hauptsächlich deshalb im Garten gepflegt, weil sie als heilig galten, weil sie irgend einer Gottheit geweiht waren oder weil ihre Blüten und Blätter zu kultischen Zwecken, vor allem zu Opfern gebraucht wurden. Allerdings hat man eben zumeist solchen Bäumen göttliche Eigenschaften beigelegt, die sich durch Schönheit ihres Wuchses, dichte Belaubung, Pracht und Duft ihrer Blüten oder Nützlichkeit ihrer Früchte auszeichneten und die deshalb zu Symbolen des Werdens und der Fruchtbarkeit wurden. Das indische Weltbild gibt dem Baum sogar eine beherrschende Stellung. Es hat wie das germanische seinen Weltenbaum. In jedem der vier Weltteile, der Dwipas, die den Weltberg Meru mit seinen Himmelsterrassen inselartig im Weltmeer umlagern, erhebt sich inmitten ein mythischer Wunderbaum. Der Buddhismus läßt seinen Stifter unter dem heiligen Feigenbaum, dem Bodhidruma, dem Baum der Erleuchtung, in Buddhagaya zum Buddha werden und übernimmt damit wie so vieles andere den Baumkult von den älteren Religionen Indiens. Heute noch genießt dieser heiligste Baum des Buddhismus, der angeblich noch der ursprüngliche ist, göttliche Ehren wie sein Abkömmling auf Ceylon, den Asoka, der königliche Schutzherr der buddhistischen Kirche, dort pflanzen ließ. Versinnbildlichen diese Bäume den »Baumkönig«, der im »Nabel der Welt« steht, so sicher auch der Baum, den die alten indischen Schriften häufig als Hauptstück inmitten des Gartens stehen lassen. Aber nicht nur die indischen Feigenbäume, Acvatha (Ficus religiosa), meist Pipal genannt, und die Baniane (Ficus bengalensis) sind heilig. Es gibt noch eine ganze Reihe von Baumarten, denen der Inder kultische Verehrung zuteil werden läßt oder die irgend einer Gottheit geweiht sind, so den Asokabaum mit seinen gelben oder roten Blütenbüscheln, der dem Liebesgott Kama Dewa oder auch Schiwa heilig ist, den Nim oder Margosa (Melia Azadirachta), dessen Blüten beim Neujahrsfest, Samvatsaradi, mit Zucker und Tamarinden als Glücksspeise genossen werden, den Phalsabaum (Grewia asiatica), der wie die Mimosa Sirissa Glück bringt, der dem Buddha heilige Dhakbaum, die »Flamme der Wälder« (Butea frondosa) und andere mehr. In jedem indischen Garten sollen der seines herrlichen Wuchses und seiner Früchte halber geschätzte Mango und Amalaka stehen, deren Blüten und Blätter bei Hochzeiten und Geburtsfesten und bei bestimmten Kulthandlungen zu Gewinden benutzt werden. Heilig ist auch der Lotus in den drei verschiedenen in Indien wachsenden Arten, das Sinnbild der unbefleckten Reinheit und über-

Die Palast- und Gartenanlagen in Dig

dies des Weltalls, die Blume, deren Kult der Buddhismus über ganz Asien getragen hat. Heilig ist aber auch ein unscheinbares Kräutlein, die unserem Basilikum nächstverwandte Tulsi (Ocymum sanctum), die insbesondere von den Frauen verehrt und deshalb im Garten oder Hof des vornehmen Hauses in großen, schön gearbeiteten Steinkübeln gepflegt wird. Tulsi, Lotus und Amarant (Amarantus gangeticus) sind übrigens die einzigen krautartigen Gewächse, die die alten Schriften nennen. Blumenbeete in unserem Sinne scheint es im indischen Garten nicht gegeben zu haben. Ihre Stelle vertraten bis zu einem gewissen Grade die mit Lotus bewachsenen Wasserbecken. Blumenschmuck boten die Bäume und Sträucher, sowie die Schlingpflanzen, Windenarten, wie die herrliche Argyreia bona nox und andere Lianen, die man um die Bäume ranken ließ oder zur Herstellung schattiger Lauben verwendete, wie sie schon auch das Mahabharata kennt. Marie Luise Gothein erwähnt eine Stelle bei Claudius Aelianus, der den Megasthenes ausschreibt. Danach verstanden die Inder die Kunst, Bäume und Weiden miteinander zu verbinden. Da dem Megasthenes diese Kunst der Baumverflechtung so merkwürdig erscheint, war sie im hellenistischen Westen offenbar zu seiner Zeit unbekannt, und man darf vermuten, daß der im römischen Garten später auftretende künstliche Baumverschnitt von Indien herübergekommen ist. Jedenfalls wird man sich den indischen Garten mit verschnittenen Hecken vorstellen müssen.
Wasserbecken, deren regelmäßige viereckige Gestalt durch Reliefdarstellungen und die auf Ceylon ausgegrabenen »Pokunas« gesichert ist, und verschnittene Hecken sind nur in einem architektonisch gebundenen Garten denkbar. Auch die häufig erwähnten Baumreihen, die als Alleen die Wege begleiten oder die Anlagen umziehen, lassen auf regelmäßig gestaltete Gärten schließen. Wie allerdings der Garten im Planbild aussah, läßt sich aus den farbenprächtigen Schilderungen der indischen Literatur nicht entnehmen. Eine sehr wichtige Angabe dafür macht der chinesische Pilger Hsüan Tsang. Er beschreibt den Garten, in dessen Mitte der heilige Feigenbaum zu seiner Zeit in Buddhagaya stand, als ein Mauerrechteck mit vier nach den Haupthimmelsrichtungen sich öffnenden Toren. Das läßt auf eine Anlage mit zwei sich unter rechtem Winkel kreuzenden Hauptachsen schließen, und in der Tat finden sich in der indischen Literatur die Belege dafür, daß dies das Grundschema für alle Plananlagen gewesen sein muß. Die buddhistischen Kosmologien, wie sie Beal nach alten chinesischen Übersetzungen gibt, gehen bei ihren Beschreibungen der Götterstädte, der Stadt des Höllenkönigs Dschemma und der Göttergärten stets von diesem Kreuzachsenplan aus, und auch die späteren architekturtheoretischen Bücher der Inder, die Silpa Sastra,

Der Suraaſch-Bhawan in Dig

machen es zur Grundregel, daß Städte oder Dörfer als Vierecke mit Achſentoren und einem viertelnden Wegekreuz anzulegen ſind. Der Urgrund liegt in der uralten indiſchen Vorſtellung von der Geſtalt der Welt, die der Buddhismus mit pedantiſcher Ausführlichkeit ausgebaut hat. Jede menſchliche Anlage, ſei ſie ein Dorf, eine Stadt, ein Palaſt oder ein Garten, muß ein Abbild des Weltganzen ſein. Letzten Endes ſteckt darin der gleiche Gedanke wie im etruskiſch-römiſchen templum mit ſeinem cardo und decumanus, mit dem der Augur das Bild des mundus auf dem zu bebauenden Stück Erde feſtlegte. Wenn alſo inmitten des indiſchen Gartens im Kreuzungspunkt der Achſen ſich ein künſtlicher Hügel, ein beſonderer Bau oder ein heiliger Baum erhebt, ſo bedeutet das je nachdem den Weltberg Meru, den Palaſt des Götterkönigs Indra oder den Weltenbaum.
Das Kreuzachſenſchema iſt nun auch die Grundlage für die Planbildung der meiſten indiſchen Gärten der Neuzeit. Sie ſind als Tſchehar Bagh, wie der Perſer ſagt, als »Vierungsgarten« angelegt. Vielfach wird zwar behauptet, daß erſt die Mogulkaiſer dieſe Planform des Gartens in Indien eingeführt hätten, die eigentlich, wie ihr auch in Indien eingebürgerter Name beſage, perſiſchen Urſprungs ſei. Als Hauptzeuge dafür gilt der Gründer der Dynaſtie der Großmoguln, Kaiſer Baber, der ſich in ſeinen Lebenserinnerungen rühmt, als erſter in Indien Gärten angelegt zu haben, was man dort nicht verſtehe. Daß man in Perſien und im türkiſchen Innerasien die gleiche Gartenform kannte, iſt ſicher. Sie kam dorthin aber zweifellos mit dem Buddhismus aus Indien, wo ſie ihre eigentliche Heimat hat. Sie kam auch mit ihrer ſinnbildlichen Bedeutung, denn dem islamiſchen Perſer gilt ſein Tſchehar Bagh mit den vier im Kreuz ſtehenden Waſſerkanälen als Abbild des Paradieſes mit ſeinen vier Strömen. Die Vorſtellung des Alten Teſtamentes und des Koran vom Gottesgarten wurde im indiſchen Gartenſchema verkörpert gefunden. Der Öſterreicher Aurel Stein hat in den alten buddhiſtiſchen Ruinenſtätten des nördlichen Chotan einen Garten aufgedeckt, deſſen aus Pappeln gebildete Baumreihen ſich anderthalb Jahrtauſende unter dem Sand der Wanderdünen erhalten hatten. Seiner Beſchreibung nach war das ein Tſchehar Bagh, ein Vierungsgarten.

Kanal im Garten zu Dig mit Springbrunnenreihe

Mausoleum des Kaisers Akbar

Somit folgt der indische Garten der Neuzeit im Planschema der uralten Überlieferung. Im übrigen hat er mit den alten Gärten, soweit wir sie uns nach den erhaltenen Schilderungen vergegenwärtigen können, kaum mehr viel gemein. Die mit dem Islam eindringende neupersische Kultur hat der Gartenkunst Indiens viele neue Züge aufgeprägt. Schon die Gärten der türkischen und afghanischen Sultane, die seit dem 13. Jahrhundert auf dem indischen Kaiserthron saßen, können selbstverständlich nicht so ausgesehen haben wie die, die ein Volmiki oder Cudraka vor Augen hatte. Die persische Gartenkunst des Mittelalters bediente sich der gleichen Mittel, wie sie im ganzen weiten Gebiet des Islam üblich waren. Mögen diese teilweise letzten Endes im alten buddhistischen Klostergarten wurzeln, so waren sie doch dem Erbe der antiken Kultur entnommen und weiterentwickelt worden. Was Baber und seine Begs um 1530 in Indien einführten, war das, was zur gleichen Zeit in Persien und im türkischen Zentralasien als Grundlage der Gartenschönheit galt.

Babers Schöpfungen bei Agra sind ebenso untergegangen wie seine Gärten bei Kabul. In seinen Memoiren beschreibt der ritterliche Nachfahre Timurs aber seine Anlagen eingehend genug, um erkennen zu lassen, daß sie im Wesen mit den Gärten der Folgezeit völlig übereinstimmten. Von diesen haben sich in der Umgebung von Delhi, Agra, Lahor, Lacknau und anderer Hauptstädte des nördlichen Indien noch viele erhalten, die meisten verwildert und verwachsen mit gewaltigen alten Bäumen, tropisch wucherndem Gestrüpp, verfallenden Bauten und geborstenen Wasserbecken. Viele sind auch landwirtschaftlichen Zwecken nutzbar gemacht und zeigen kaum noch Spuren von dem, was sie einst waren. Nur wenige hat die Pietät der Nachfahren einigermaßen instand gehalten. Das sind vor allem die, in deren Mitte sich die Mausoleen der Mogulkaiser und ihrer Großen erheben, wie der Garten des Tadsch Mahal in Agra, des vielbesungenen Wunderwerks der Baukunst der Mogulzeit, die Gartenanlagen, die Akbars Grab in Agra und das seines Vaters Humajun in Delhi umschließen, und andere mehr. Sie unterscheiden sich in nichts von den Palastgärten, denn die Gräber der Zeit sind als Gartenschlösser gebaut, in denen sich der Bauherr mit seinen Freunden frei vom Ceremoniell des Hofes seines Lebens freute — das Memento mori vor Augen. Die englische Denkmalpflege hat diese wie auch andere Gärten, so einen Teil von Schah Dschehans Schalimar Bagh — »Zufluchtsort der Liebe« — und den Hasuri Bagh in Lahor, den Hajat Baksch — den »lebenspendenden Garten« — in der Kaiserburg zu Delhi zu neuem Leben erweckt, freilich ohne dabei die ursprüngliche, vom Gartenkünstler beabsichtigte Stimmung zu treffen. Was vom alten Bestand erhalten ist, sind ja stets nur die baulichen Anlagen, die Gartenhäuser, die Wasserbecken und Kanalbetten mit ihren Springbrunnen, die Kaskaden und die plattengepflasterten Wege. Sie spielen allerdings in dem rein architektonischen Mogulgarten eine so große Rolle, daß auch eine gänzlich unbepflanzte Anlage wie der ganz in weißem Marmor ausgeführte Anguri Bagh — der »Traubengarten« — im Senana des Kaiserpalastes in Agra mit den erhaltenen steinernen Einfassungen der Beete noch ihre starke Wirkung hat und eine bessere Vorstellung von dieser Gartenkunst zu geben vermag als mancher unrichtig bepflanzte Garten. Auch als das Mogulreich um die Mitte des 18. Jahrhunderts zum Sinken kam, Dschats und Mahratten dem Hindutum zum Sieg über den Islam verhalfen, änderte sich im Gartenstil wenig. Die großartigen Gärten, die der Dschatradscha Suradsch Mall in Dig bei Bharatpur sich um die Mitte des 18. Jahrhunderts anlegte und die er mit Raubgut aus den Kaiserschlössern in Delhi und Agra schmückte, sind nach den Grundsätzen der Mogulzeit gestaltet.

Nahezu alle diese Gärten, auch die kleinen und kleinsten in den Senanas der Paläste, zum Teil wie im Bari Mahal zu Udaipur hoch oben auf dem Dach gelegen, zeigen als Grundlage des Planbildes das Schema des Tschehar Bagh. Ein Kreuzachsensystem von Wegen viertelt das Quadrat oder Rechteck, dessen Quadrate bei größeren Abmessungen wieder geviertelt werden. Das Hauptachsenkreuz besteht dann in der Regel aus Kanälen mit Springbrunnenreihen, und die hochgelegten, mit Platten gepflasterten Wege begleiten diese zu beiden Seiten, gelegentlich ihrerseits durch in den Plattenbelag eingelassene Rabattenreihen gefaßt oder durch eine solche in der Länge geteilt. Die Kreuzungspunkte sind stets betont. Sie erweitern sich zu viereckigen, polygonalen oder sternförmigen Wasserbecken, in denen sich, von den Wegen über Brückchen und kleine Treppen erreichbar, vielfach Plattformen erheben, kleine Inseln, auf die man sich niederlassen konnte, um abgeschlossen von der Umwelt und umgeben von der Wasserfläche mit ihren kühlenden Springbrunnen bei Gelage und Unterhaltung die Abendstunden zu genießen. Daraus läßt sich schon ersehen, daß ein solcher Garten nicht dazu da ist, um sich in ihm zu ergehen, wie etwa der Barockgarten. Er ist zum beschaulichen Genießen für den ruhenden Menschen bestimmt, ist Wohnraum in orientalischem Sinne. Die Wege dienen — als Verkehrsmittel gedacht — nur dazu, die einzelnen Ruheplätze zu verbinden, wie Korridore und Türen die Räume des Hauses verbinden. Diese Plattformen, Tschabutra genannt, bilden auch die Erweiterungen der einfachen Wegekreuze. Sie wurden tagsüber wohl auch mit Zelten überdeckt oder sie tragen einen festgebauten Pavillon — Tschhatri —, aus dem bei großen Anlagen ein villenartiges Gartenhaus oder ein Palast — Bhawan oder Baradari — werden kann. Steht dieser in der Mitte des Gartens auf einem entsprechend vergrößerten Tschabutra, so ist er stets ein Zentralbau, dessen vier Seiten sich in Gegengleichheit die Fronten von vier Achsenbauten am Rande des Gartenvierecks zukehren. Einer ist das Hauptportal, während die übrigen drei, zuweilen als Scheintore ausgebildet, ihrerseits kleinere Gartenhäuser mit Wohnräumen sind. Solcherart sind die Anlagen der Grabpaläste Humajuns in Delhi und Akbars in Agra. Bildet der Garten sozusagen den Binnenhof der Palastanlage — sei sie groß oder klein —, so stehen die Bauten, wie beispielsweise bei der Anlage des Tadsch Mahal und des Anguri Bagh in Agra oder der oben erwähnten Gärten in Dig, auf Plattformen am Gartenrande, aber ausnahmslos in fester Achsenbeziehung. Für dieses Einanderentsprechen der Einzelbauten hat der Inder vom Perser einen ursprünglich arabischen Ausdruck übernommen: ein Teil ist »dschewab«, das ist »Antwort« auf den anderen.

(Ein Schlußartikel folgt)

Ein Gartentheater

BEI einem größern Villengarten blieb, von einem kreisrunden Gartenteil abgeschnitten, ein schmaler dreieckiger Winkel, in den vom höher gelegenen Haus hineingesehen werden kann.
Da reger gesellschaftlicher Verkehr gepflegt wird, wurde die Anlage eines bescheidenen Gartentheaters gewünscht.
Die verschieden hoch abgestuften Heckenkörper bestehen aus immergrünen Heckenpflanzen. Als Gegensatz zu diesen und seitlich und als Abschluß der Bühne wurden bizarr wachsende immergrüne Pflanzen vorgesehen.
Die Bühne ist leicht in Vor- und Hauptbühne getrennt. Den Zuschauerraum bildet ein muldenförmiges Rasenstück, auf das nach Belieben Stühle gestellt oder Kissen gelegt werden können.

Hermann Koch

Der englische Park

Goethe hat in seinem „Triumph der Empfindsamkeit" neben den anderen Auswüchsen der Empfindsamkeitsepoche auch die Übertreibungen des englischen Landschaftsgartens verspottet und damit das treffendste Bild dieser Mode gegeben. Er läßt den höllischen „Hofgärtner" Askalaphus schildern, wie er den englischen Park in Plutos Reich geschaffen. Die Szene spielt in einer „rauhen und felsigen Gegend, Höhle im Grunde". Askalaphus tritt auf, spricht:

Herrn und Frauen allzugleich,
Merkt wohl, das hier ist Plutons Reich,
Und ich, wie ich mich vor euch stelle,
Das ich zuerst bedeuten muß,
Ich nenne mich Askalaphus
Und bin Hofgärtner in der Hölle.

Die Charge ist hier unten neu:
Denn ehemals war Elysium dadrüben,
Die rauhen Wohnungen dahüben,
Man ließ es eben so dabei.

Nun aber kam ein Lord herunter,
Der fand die Hölle gar nicht munter,
Und eine Lady fand Elysium zu schön.
Man sprach so lang', bis daß der seltne Gusto [siegte
Und Pluto selbst den hohen Einfall kriegte,
Sein altes Reich als einen Park zu sehn.

Da schleppen nun Titanen ohne Zahl,
Den alten Sisyphus mit eingeschlossen,
Rastlos geschunden und verdrossen,
Gar manches schöne Berg und Tal
Zusammen.
Aus den flutenden Flammen
Des Acherons herauf
Müssen die ewigen Felsen jetzt!
Und gält's tausend Hände,
Sie werden an irgend einem Ende
Als Point de vue zurecht gesetzt.

Um eins nur ist es jammerschade,
Ums schöne Erdreich in Elysium!
Aber es ist keine Gnade,
Wir gehn damit ganz sündlich um.
Sonst dankt man Gott, wenn man die Steine
Vom Acker hat;
Aber hier! sechs Meilen herum sind keine
Zu finden mehr, und wir haben es noch nicht
Damit verschütten wir den Boden, [satt;
Wo das weichste Gras,
Die liebsten Blümen blühen, und warum
Alles um des Mannigfaltigen willen. [das?
Ein frischer Wald, eine feine Wiese,
Das ist uns alles alt und klein;
Es müssen in unserm Paradiese
Dorn und Disteln sein.

Dafür aber auch graben wir in den Hainen
Elysiums die schönsten Bäume aus
Und setzen sie, wo wir es eben meinen,
An manche leere Stelle
Herüber in die Hölle,
Um des Cerberus Hundehaus,
Und formieren das zu einer Kapelle.

Denn, notabene! in einem Park
Muß alles Ideal sein,
Und salva venia jeden Quark
Wickeln wir in eine schöne Schal' ein.
So verstecken wir zum Exempel
Einen Schweinstall hinter einen Tempel;
Und wieder ein Stall, versteht mich schon,
Wird geradeswegs ein Pantheon.
Die Sach' ist, wenn ein Fremder drin spaziert,
Daß alles wohl sich präsentiert;
Wenn's dem denn hyperbolisch dünkt,
Posaunt er's weiter aus.
Freilich der Herr vom Haus
Weiß meistens, wo es stinkt.

Wie ich also sagte: unsre elysischen Bäume
Schwinden wie elysische Träume,
Wenn man sie verpflanzen will.
Ich bin zu allen Sachen still:
Denn in einem Park ist alles Prunk;
Verdorrt ein Baum und wird ein Strunk,
Ha, sagen sie, da seht die Spur,
Wie die Kunst auch hinterdrein der Natur
Im Dürren ist. — Ja leider stark!
Was ich sagen wollte: zum vollkommnen [Park
Wird uns wenig mehr abgehn.
Wir haben Tiefen und Höhn,
Eine Musterkarte von allem Gesträuche,
Krumme Gänge, Wasserfälle, Teiche,
Pagoden, Höhlen, Wieschen, Felsen und [Klüfte,
Eine Menge Reseda und andres Gedüfte,
Weimutsfichten, babylonische Weiden, [Ruinen,
Einsiedler in Löchern, Schäfer im Grünen,
Moscheen und Türme mit Kabinetten,
Von Moos sehr unbequeme Betten,
Obelisken, Labyrinthe, Triumphbogen, [Arkaden,
Fischerhütten, Pavillons zum Baden,
Chinesisch-gotische Grotten, Kiosken, Tings,
Maurische Tempel und Monumente,
Gräber, ob wir gleich niemand begraben —
Man muß es alles zum Ganzen haben.

Ein einziges ist noch zurücke,
Und darauf ist jeder Lord so stolz:
Das ist eine ungeheure Brücke
Von Holz
Und einem Bogen von Hängewerk,
Das ist unser ganzes Augenmerk.
Denn erstlich kann kein Park bestehn
Ohne sie, wie wir auf jedem Kupfer sehn.
Auch in unsern toleranten Tagen
Wird immer mehr drauf angetragen,
Auf Kommunikation, wie bekannt,
Dem man sich auch gleich stellen muß;
Elysium und Erebus
Werden vice versa tolerant.

Wir freuten uns der Brücke schon;
Doch, leider, Acheron und Pyriphlegethon
Speien ewige Flammen,
Da fehlt's uns an gescheiten Leuten;
Und bringen wir die Brücke nicht zusammen
So will der ganze Park nichts bedeuten;
Das Kostüme leidet weder Erz noch Stein,
Von Holz muß so eine Brücke sein.
Aber warum ich komme! ohne Zeit zu verlieren:
Plutons schönes junges Weib
Geht gewöhnlich hierher spazieren,
Denn drin ist nicht viel Zeitvertreib.
Da sucht sie bei den armen Toten
So schöne Gegenden wie auf Siziliens [Boden;
Wir haben's aber nur in Gedichten.
Dann fragt sie täglich nach herrlichen [Früchten;
Wir haben aber keine zu reichen:
Pfirschen, Trauben, darnach liefen wir weit;
Holzbirn, Schlehen, rote Beerchen und der- [gleichen.
Ist alles, was bei uns gedeiht.
(Zwei höllische Geister bringen einen Granatenbaum in einem Kübel.)
Drum hab' ich zu einem Treibhaus geraten
Und brüte, zum Exempel, diese Granaten
In einem frostbedeckten Haus
Mit unterirdischem Feuer aus;
Den will ich in die Erde kleben,
(er macht alles zurechte, wie er's sagt)
Mit Felsen, Rasen, Moos umgeben,
Daß meine Königin vermeine,
Es wüchse alles aus dem Steine,
Und, wenn sie den Betrug verspürt,
Den Künstler lobe, wie sich's gebührt.
(ab).

Gartenarbeit und Blumenpflege

LEBERECHT MIGGE / NEUE GARTEN-TECHNIK II

Gerätewirtschaft

WIR sahen, welch' mächtigen Förderer für unsere Kulturen Wärme, Humus und Wasser darstellen. Wie Wärmesteigerung im Grunde Naturbeobachtung und Anpassung bedeutet, wie Humus eigentlich den Träger des Kreislaufs aller, also auch der Pflanzensubstanz darstellt, wie Wasser und Wassertechnik an Stadtleben und Stadtwirtschaft gebunden ist. Alles dieses nun schließt die Bodenbearbeitung, die Gegenstand der Gerätetechnik ist, in sich ein.
Die Primitivität der Bodenarbeit der Alten ist längst wissenschaftlicher Exaktheit gewichen, die ihrerseits auf klarer Erkenntnis der Bodenvorgänge aufbaut. Sie unterscheidet den Wasser- und den Energiehaushalt, sowie das Leben im Boden. Der Boden-Wasserhaushalt erstrebt (durch Hacken) verringerte Verdunstung sowie (durch Tiefenbearbeitung) erhöhte Wasserbewegung und Lüftung.
Der Boden-Energiehaushalt umfaßt alle chemisch-physikalischen Vorgänge und Spannungen (Kolloide), wie sie besonders im Humus vor sich gehen. Seine Erhaltung und Vermehrung steigert die Bodenaktivität. Am wichtigsten ist aber wohl die Förderung der kleinen Lebewesen (Algen, Bakterien, Pilze), die die sogenannte Bodengare bewirken.
Diesen neuen Erkenntnissen der Bodenfunktion entsprechen neue Behandlungsmethoden und Gerätesysteme. Sie umfassen die eigentliche Bodenbearbeitung sowie die Säe- und Erntegeräte.
Von diesen haben bisher eigentlich nur die beiden ersten Kategorien höhere, dann aber entscheidende Bedeutung für die Gartenkultur. Eine grundsätzliche Forderung der modernen Gerätetechnik ist neben Arbeitsersparnis vor allem leichte Handhabung: so sehr richtige und persönliche Gartenarbeit eine Grundlage der zukünftigen Gartenethik sein wird, so sicher muß sie leicht und interessant — also geistig sein.
Das Bild zeigt den grundsätzlichen Unterschied der alten und neuen Handgeräte auf: Heute hebelt der menschliche Arm nicht mehr krafträuberisch die Hacke, die den sommerlich garen Mutterboden umwirft und (seine Spannungen und Bindungen) zerreißt, sondern er zieht Hackmesser verschiedenster Form kraftsparend durch den Boden hindurch, seine Krume in der Ebene lockernd.
Das Prinzip der Konservierung des Bodenlebens verfolgen auch die *Radhacken*, deren neuere Formen auch für Kleingarten-Beete benutzt werden können. Sie stellen mit ihren auswechselbaren, vielseitigen Messern, Hacken und Schaufeln die auf ein Rad gesetzte moderne Handhackenform dar.
Der Krümelung, hauptsächlich in der vegetationslosen Zeit dient die sogenannte *Fräse*, ein modernes Wundergerät, das mit arbeitssparendem maschinellen Antrieb eine noch wichtigere Veredlung in der Zubereitung des Bodens verbindet. Die Bodenfräse hat auf einer Welle rotierende federnde Krallen, die den Boden in bisher nicht erreichter Weise zerkrümeln und seine Struktur verfeinern. Hierdurch wird die durch alle Bodenarbeit erstrebte Gare in vollständigster Weise gefördert, der Wasserhaushalt wird gewaltig erhöht, das Durchgefrieren im Winter verstärkt, die Bakterienbildung des Bodens gefördert. So kommt es, daß gefräster Boden gegenüber anders bearbeitetem Boden höhere Erträge abwirft, sehr oft, daß man förmlich von »Fräskultur« als einer neuen Bodenbestellungsform überhaupt spricht. Die Hauptwirkung der Fräserei liegt im Herbst und im zeitigen Frühjahr, im schweren Boden aber auch während des Sommers. Auf leichteren Böden wirkt Walzen hinter dem Fräsen wohltuend. Ein weiterer Vorteil liegt in der Kombination von mehreren Arbeitsgängen.
Die Arbeit einer 4 PS Gartenfräse ersetzt die Arbeitskraft von 10 Männern. Der Preis dieser Fräse beträgt heute etwa RM. 2 400.—. Der Betriebsverbrauch stellt sich auf etwa $1^1/_2$ Liter Benzin $^1/_4$ Liter Öl pro Stunde. Die Betriebskosten sind also sehr niedrig, sie stellen sich gewöhnlich niedriger als Pferdearbeit oder halten sich mit dieser auf gleicher Höhe (gegenüber einer mehrfachen und vielseitigen Leistung).
Demnach stellt sich die einmalige Fräsbearbeitung eines 1000 qm großen Gartens einschließlich Bedienung auf etwa 5 bis 6 RM. und, wenn man Abschreibung und etwa besonders ungünstige Raumverhältnisse in Betracht zieht, nicht höher als auf 10 RM. Danach ist also die Wirkung der Fräskultur wirtschaftlich durchaus rentabel, wenngleich man auf die Verbilligung dieses zukunftreichen Gartengerätes mit allen Mitteln dringen sollte.
Eine weitere und wichtige Ergänzung dürfte die Fräskultur durch die geplante Herausgabe der Miniatur-Gartenfräse (der grüne Zahnstocher), wie sie der Erfinder der Gartenfräse Ingenieur K. v. Meyenburg-Basel plant, erfahren.
Von großer Bedeutung ist auch die neuere Übertragung der bekannten intensiven landwirtschaftlichen Säemethode auf den Garten. Die Regelung von Saatbett, Saattiefe und Säeweise — Drillen und Dibbeln — durch die moderne *Kleinboden-Säemaschine* bedeutet nichts weniger als die Überwindung von Chaos und Willkür bei einer der wichtigsten vegetativen Maßnahme, also auch im Garten. Der Ersparnis an Saatgut, der besseren Keimung und der mechanischen Arbeit, wie sie die moderne Kleinboden-Säemaschine mit sich bringt, schließt sich die Erleichterung aller

GRUNDWASSER · HAARROHRCHEN · SCHEMATISIERT · KRISTALLE · KOLLOIDE (HUMUS / LEHM / KALK) · KLEINLEBEWESEN · AUFSAUGENDES WURZELHAAR · WURZEL · WASSERKANÄLEN

Wasser- und Energie-Haushalt-Schema

SCHNEIDENDE GERÄTE

UNKRAUT-SCHNEIDER · MESSER-HACKE · HAND-PFLUG · SAAT- u. PIKIER-RECHEN · FURCHEN-SCHNEIDER

KRÜMELNDE GERÄTE

KRAULE · UNKRAUT-KAMM · HAND-GRUBBER · SAAT-RECHEN · ZEILEN-HACKE

Senior-Gartenkultivator

Darstellung des Fräsprinzips: elastische Krallen auf einer Welle

ſommerlichen Pflegearbeit durch Reihenkulturen gleichwertig an.
Schließlich könnte in dieſem Zuſammenhange noch der modernen Bodenbagger und Bodentransportmaſchinen (Transportbänder und dergleichen) gedacht werden, die mit den neuen (amerikaniſchen) Wegebaumaſchinen unſeren Kleinboden- und Gartenbau weſentlich beeinfluſſen dürften.
Wie in jeder Werkſtatt ſo ſind auch in der Gartenwerkſtatt gute, beſte Geräte die Vorbedingung beſter Produkte. Üppige Vegetation als Grundlage ſchöner Gärten ohne zeitgemäße Kulturmethoden und verfeinerte Geräte iſt undenkbar.

Fräſen mit einer 4 PS Gartenfräſe, Walzen und Säen in einem Arbeitsgang auf dem Verſuchsgut Grieshof der Siemens-Schuckert-Werke

„Senior", Kleinſäemaſchine

Schutzwirtſchaft

Schutz vor Feinden, Schutz vor Krankheiten! Das iſt das Loſungswort, das alle Erdweſen ſeit altersher bewegt. Warum nicht auch die Pflanzen? Jedenfalls, was die Kulturpflanzen anbetrifft und ihre Hüter und Nutznießer, die Menſchen, ſo hat für dieſe jener Schlachtruf von jeher lebenswichtige Bedeutung gehabt. Noch heute erſtarrt ja beiſpielsweiſe in Afrika und Südamerika das Blut in den Adern vor dem Schrekkensruf: Die Heuſchrecken kommen! Aber auch im ziviliſierten Mitteleuropa konnte man vor nicht langer Zeit noch Bauernrottungen erleben, wenn im April und Mai die Raupen des Froſtſpanners die Obſtbäume kahl fraßen. Und die ganze Hilfloſigkeit in der Bekämpfung der Pflanzenſeuchen drückt ſich in den verſchiedenen Formen »geiſtlicher Beſprechung« aus, wie ſie allerorts im Schwange waren und in ihrer Bedeutung für das Seelenheil des Pflanzenbauers gleich nach der Regenbeſchwörung (die ja heute auch unnötig iſt) rangierten.
Seither ſind wir aber auch hier immerhin etwas weiter gekommen. Die moderne Wiſſenſchaft iſt den Urſachen und Lebensbedingungen der Pflanzenkrankheiten ſyſtematiſch zu Leibe gegangen und hat förmliche Syſteme für ihre Bekämpfung aufgeſtellt. Deren Anwendung iſt heute mehr oder weniger bereits Gemeingut und teilweiſe behördlicher Führung und geſetzlichem Schutz unterſtellt. Insbeſondere die moderne Chemie hat mit ihren Teerabfallprodukten eine Reihe von ſpezifiſchen Salzen, Säuren und Gaſen bereitgeſtellt, die den drei größten Kategorien der Pflanzenfeinde, den *Fliegen, Läuſen* und *Maden,* den *Pilzen* und den *Bakterien* mit ſteigendem Erfolg entgegentritt. Für die Anwendung dieſer Mittel ſind eine Reihe neuer Präziſionsgeräte wie Spritzen und Zerſtäuber konſtruiert, ja, für die Großbekämpfung (z.B. von Forſtkrankheiten) treten ſelbſt Flugzeuge in Tätigkeit. Bei genügender Umſicht und Vorſorge ſind wir alſo heute tatſächlich in der Lage, wenigſtens das epidemiſche Auftreten der Pflanzenfeinde in unſeren Gärten zu bannen.

Man hat der verfeinerten Pflanzenpflegetechnik Schuld an dem Überhandnehmen der Pflanzenkrankheiten vorgeworfen. Mit Unrecht, wie die uralte Pflanzenkrankheitsgeſchichte beweiſt. Immerhin, ebenſo wichtig oder noch wichtiger als Bekämpfen iſt natürlich Vorbeugen. Das tut aber grundſätzlich jede Technik, die auf Erhaltung und Stärkung des Pflanzenleibes ausgeht. Veredlung und Verfeinerung der Pflanzenkultur hat nichts mit Überfeinerung und Verweichlichung zu tun, wie das ja auch die moderne Sportentwicklung beim Menſchen beweiſt. Im Gegenteil: Unſere Pflanzen widerſtehen nur dann ihren Feinden leicht, wenn wir ſie gut pflegen, vor allem kräftig düngen. Schwach genährte und daher kümmerlich wachſende Pflanzen dagegen erliegen dem Windſtoß. Beſonderes Gewicht bei jeder Vorbeugung iſt auf organiſche Düngung zu legen. Deren Humusſäuren wirken im Boden desinfizierend. Außerdem enthält der Humus alle Nährſtoffe und trägt ſo zu einer kräftigen Ernährung und ſomit zur Widerſtandsfähigkeit bei. Von großem Wert wäre auch die Einſtellung der Pflanzenzüchtung auf konſtruktive Feſtigkeit und Blutauffriſchung. Hier in der Richtung: Regeneration des Individuums liegen noch große Gebiete für den Pflanzenſchutz offen.
Insgeſamt ſtellt die neuzeitliche Schutztechnik gegen die Pflanzenfeinde ein würdiges Glied der Intenſivierung unſeres Pflanzenbaues dar, die ihrerſeits ja die Vorausſetzung für eine zeitgemäße Erſcheinung unſeres Gartens iſt.

Ergebniſſe

Es erübrigt ſich vielleicht noch darauf hinzuweiſen, wie alle vorſtehend geſchilderten Diſziplinen im Grunde eine *Einheit* bilden, dergeſtalt, daß kaum eine ihrer Handlungen zur vollen Wirkung kommt, ohne ihre nachbarlichen, ja, im Übermaß allein oder gruppiert angewandt, zu Schädigungen führen kann. Auch hier innerhalb der modernen Kleinboden-Technik wirkt das Geſetz vom Mininum ſich aus.
Geſchloſſen und individuell angeſetzt, ſtellt die moderne Kleinboden-Technik eine völlig neue Art der Bodenbeſtellung dar. Eine Art, die, auf neue ſoziale Gartenformen angewandt, ſchon heute einen neuen Weg kennzeichnet. Einen Weg, der, um den Berufsgärtner alter Schulung gewiſſermaßen herum, eine neue Wirkung unzweifelhaft erkennbar macht, diejenige, die wir mit dem Begriff: *Kleinboden-Intenſivkultur* umſchreiben.
Die nach Zeichnungen angefertigten Bilder ſind dem Lehrmaterial der Siedlerſchule Worpswede entnommen.

Aus der Werkſtatt der Pflanzenzüchter

Die Gartenbohne

DIE Gartenbohne oder Fiſole iſt ein beſonders wertvolles Anſchauungsobjekt, ſofern wir uns ein Bild machen wollen des Züchtungsmodus, der die organiſche Kraft in ihrem geſetzmäßigen Auswirken als Grundlage zu nehmen hat.
Der däniſche Vererbungsforſcher Johannſen begründete bekanntlich ſeine Lehre von der reinen Linie auf Erfahrungen, die er aus Verſuchen mit einer Buſchbohne, der Prinzeßbohne, gewann. Dieſe Lehre iſt in der letzten Zeit häufig angegriffen worden, wenn auch in dem Maße der Zurückhaltung, wie es bei ſo verdienſtvollen Arbeiten zu erwarten war. Es wird in dieſen Arbeiten der Widerlegung behauptet, die Fiſole ſei gar kein obligater Selbſtbefruchter, und es werden ſehr viele Fälle angeführt, in denen die, wie ich ſagen muß, *vermeintlichen* Bohnenbaſtarde beobachtet wurden. Eine reine Linie als Inbegriff aller Individuen, die aus einem ſelbſtbefruchtenden Individuum ſtammen, gibt es ganz gewiß. Es gibt aber im Reiche des organiſchen Geſchehens keine für immer reinbleibende Linie. Jede reine Linie iſt zu erſchüttern, auch ohne daß eine Fremdbeſtäubung den Anlaß dazu gibt, und deshalb iſt ihr praktiſcher Wert bedingt, weil zeitlich begrenzt. Wie lange ſie gleichbleibend denſelben Typus zeigt, hängt in hohem Maße von uns ab, inſofern wir es in der Hand haben, ſie unter gleichbleibenden Verhältniſſen zu bauen.
Die Fiſole ſtammt aus Oſtaſien und iſt wie viele unſerer Kulturpflanzen auf zwei Wegen zu uns gekommen. Wir halten an der Überlieferung feſt, daß ſie aus Peru ſtammt und von dort zu uns kam. Indeſſen iſt ſie ſchon lange vorher auf dem alten phöniziſchen Seewege nach Südeuropa gekommen und als Helmbohne gebaut worden. Wie dem auch ſei, alle Fiſolen ſtammen aus einer Quelle, ja alle Fiſolen der Welt entſtammen einem Elter. Meine Abbauverſuche liefen bis zu dem Zeitpunkte, wo ich ſie nur gelegentlich fortführen konnte, 18 Jahre, und ich glaube wohl annehmen zu können, daß dieſer Zeitraum genügt, ein Bild des Formengefüges zu gewinnen. Wir müſſen uns zunächſt mit dem Gedanken vertraut machen, daß alles, was aus einem pflanz-

Die Halbstammbohne La Brune als Beispiel einer dolichoïden Fisole

lichen Organismus herauszuholen ist, der Möglichkeit nach von jeher und für immer festgelegt ist. Nehmen wir einmal an, einem Meister der Goldschmiedekunst würde eine sehr große Anzahl Perlen vorgelegt, die alle in Form und Farbe zwar ähnlich, doch im übrigen ganz verschieden voneinander seien. Nehmen wir nun weiter an, es bestehe eine Gesetzmäßigkeit als Ordnung, in der diese Perlen zueinander gehören und es würde dem Meister im Beschauen und im einsetzenden Gedankenprozeß gelingen, diese Gesetzmäßigkeit zu erkennen. Er würde also die Ordnung der Perlen nach der erkannten Gesetzmäßigkeit vornehmen und sich nun sagen, so ist das Gefüge in der Ordnung, eine andere Möglichkeit des Fügens besteht nicht.

Weiterhin wollen wir annehmen, eines Tages zerbreche das Gefüge, alle Perlen rollten durcheinander und würden so dem Meister zurückgegeben. Er würde das Bild des Gefüges vor Augen haben und beginnen, die Kernpunkte desselben an ihren Platz zu fügen. So würde er weiterarbeiten, Kernpunkte erster, zweiter, dritter Ordnung einzufügen, weil es ihm so leichter würde, die Zwischenstufen hinzustellen. Er würde zugleich sehen, was er vielleicht das erstemal nicht so empfand, daß das Gefüge einzelne festumrissene Abschnitte hat und würde Perlenhäufchen zurechtlegen, wie sie eben einzelnen Ausschnitten angehören.

Dies ist ganz schematisch hingeworfen das Bild dessen, was ich auch in meinen Anschauungen über Züchtung das Bild des Gefüges nenne. Wir können uns jedoch kaum eine Vorstellung davon machen, wie umfangreich ein Gefüge sein kann oder wohl für gewöhnlich ist. Nehmen wir beispielsweise an, ich arbeite in einem gutgeleiteten Fisoleabbau im 5. Jahre, angefangen mit einer einzigen Bohne und nehme in die Masse von jeder Pflanze eine Hülse, so bin ich in nächtlicher stundenlanger Arbeit durch Wochen beschäftigt, den betreffenden Teil des Gefüges auszuarbeiten. Unübersehbar fast ist die Fülle der hervorsprudelnden Formen. Indessen komme ich auf diese Weise zu einer Erkenntnis: es besteht eine gesetzmäßige Ordnung, und wenn ich nur, wie früher so überaus häufig, sogenannte Bohnenbastarde oder aus der Art geschlagene Bohnen erhalte, so kann ich wissen, sie entstammen aus diesem bestimmten Ausschnitt des Gefüges und werden im weiteren Verfolg diese oder jene, aber immer ganz bestimmte Formen herausgeben.

Wir sehen, die Sache hat mit Fremdbestäubung oder dem Einflusse einer Bastardierung garnichts zu tun; dringen wir aber tiefer in die Materie ein, so finden wir doch etwas Merkwürdiges: auch die Organismenkraft benutzt das Hilfsmittel der Fremdbestäubung, um rascher auf dem Wege der Entfaltung voranzukommen. Im rasch voranschreitenden Abbau werden in der Blüte die Schiffchen gelockert, damit die Pistille austreten können. Für die Praxis übrigens ein ausgezeichnetes Hilfsmittel, zu ersehen, ob ein Fisolenstamm in seiner ganzen Kraft gefestigt ist. Fisolen nämlich, die ihr Schiffchen lockern, gehen sehr bald dazu über, zu variieren.

Sehen wir uns nun als Folge des erkannten Gefüges der Fisole nach einer brauchbaren Gliederung der Bohnensorten um, so würden wir zunächst zwei Kerngruppen finden: *dolichoïde Bohnen* und *mungoïde Bohnen*. Die Bohne ist eine heterozygote Pflanze; sie entstand in ihrem zur Artfestigkeit gewordenen Gefüge aus zwei Eltern: einen mit kleinen gelblichwachsartigen Hülsen und fast kreisrunden Böhnchen und einem zweiten Elter mit sehr langen, lappigen, beuligen dunkelblau gefärbten Hülsen und gebuchteten Bohnen. Dies letztere sind die mungoïden Bohnen, gleich, ob sie blaue, grüne oder gelbe Hülsen aufweisen, die Bohne muß flachgedrückt, gebuchtet, die Hülse breit, lang und beulig sein. Dolichoïde Bohnen sind in Deutschland wenig verbreitet. Wer sie kennengelernt hat, wird sie schätzen und nicht verstehen wollen, wie man mungoïde Bohnen an ihre Stelle treten lassen kann. England, Flandern und ein Teil von Frankreich bauen fast nur dolichoïde Bohnen. Die neuerdings bei uns in den Handel gebrachten sogenannten Erbsenreisbohnen sind die ersten rein dolichoïden Bohnen, die wir bauen. Dolichoïd nenne ich sie, weil sie in ihren Früchten Dolichos am nächsten stehen. Mungoïd, gebuchtet, ist der Ursprache von Rayatea entlehnt. Munga heißt die Bucht und eine gebuchtete Bohne Mungo. *Phaseolus Mungo* aus Afrika erinnert noch in ihrem Namen an ihre ursprüngliche Heimat. *Phaseolus vulgaris* als Art ist entstanden aus zwei Kulturformen des *Dolichos Lablab*. Sie standen sich so nahe im Gleichklang der Materie, daß sie gewiß sehr bald das Stadium des Einklangs durchliefen, in welchem die Bastardnatur und zugleich die Spaltung nach Mendel ihr Ende erreichten und die Artfestigkeit eintrat.

Wie ich schon oft sagte, über das Stadium des Einklangs ist ein Abbau niemals hinauszuführen. In diesem Stadium wird aus der Bastardnatur die Art geboren, die beiden nebeneinanderlaufenden Gesetzmäßigkeiten werden auf eine geeint. Deshalb ist auch ein Rücklauf, ein Abbau niemals weiter zurückzuführen als zum Stadium des Einklanges. Beim Mais beispielsweise ist die chilenische Varietät Dr. Körnickes der Maispflanze das Stadium des Einklanges. Er sagt selbst von dieser, sie sei die einzige glatte Kornverschmelzung der beiden Eltern, die er sah, aber die Lehren des Neovitalismus waren ihm noch fremd, obwohl wir wirkliche Vitalisten schon vor dreihundert Jahren hatten. Der Weltkrieg hat eine ganz merkwürdige Verschiebung der Lokalisierung von Bohnen-

Die Herriot Metis, ähnlich unserer Phaenomen, als mungoïde Fisole

ſorten und uns auch mehr dolichoïde Bohnen oder fließende Übergänge zwiſchen den zwei Gruppen gebracht. Die flandriſche Bohne »La Brune« ſcheint ſich am raſcheſten bei uns einführen zu wollen. Ganz grob geſprochen, könnten wir beide Gruppen ſo kennenlernen: mungoïde Bohnen ſind Bauernbohnen, dolichoïde Bohnen ſind wirkliche Feinbohnen. Vielleicht mit Ausnahme einer beſtimmten Wachsbohnengruppe, aber mit dieſen Wachsbohnengruppen hat es ja überhaupt eine beſondere Bewandtnis. Sie ſtehen den blauhülſigen Eltern der Fiſole ganz nahe und erſcheinen im Rücklauf mit vielen blauhülſigen Sorten faſt zuletzt. Wir ſehen eben bei Bohnen mehr auf Zartheit als auf Geſchmack und in der Zartheit ſtehen die blauhülſigen Sorten obenan. Die blauſchotige Schlachtſchwertbohne iſt gewiß eine der zarteſten Bohnen, die wir bauen, aber auch ſie reicht im Geſchmack nicht ganz an die dolichoïden Bohnen heran. Es iſt ganz eigenartig, wie ſich ſeit dem Kriege bei uns die namenloſen Bohnenſorten vermehrt haben, ſie ſind mitgebracht, verſchickt, dann aber haben ſich durch weniger ſorgſame Kultur die Rückläufe häufiger gezeigt. Ein Umſtand indeſſen, der noch viel zu wenig beachtet wird, iſt der Import japaniſcher Sorten. Alle japaniſchen Sorten gehen bei uns, meiſt nur ein Jahr, in der Güte zurück, dann aber erreichen ſie eine Fruchtbarkeit und Größe der Samen, wie ſie ihr Urſprungsland ſelbſt nicht kennt. Die bekannte Hinrichs Rieſen, von der bei uns gute Stämme ſo ſelten ſind, heißt in Japan Naga Ugura; die Stämme, die ich aus dieſer Naga zog, ſind ſo hart und fruchtbar, daß ich ſie feldmäßig bauen konnte. Die Naru Ugura Japans iſt unſere Schnickbohne, auch Vogelei genannt. Außerdem lieferte Japan die einzige wirklich ſchneeweiße Bohne, die ich ſah, die Omaru, eine Stangenbohne. Legen wir eine deutſche weiße Bohne auf ein Blatt Papier, ſo halten wir ſie für weiß, legen wir dann eine Omaru daneben, ſo ſehen wir, daß die deutſche Bohne gelb iſt.

Vor etwa dreißig Jahren war der angeſehenſte deutſche Bohnenzüchter der Zollbeamte Schirmer in Caſſel. Ich habe ihn oft in ſeinen Kulturen beſucht, die muſtergültigen Anzuchten waren einzigartig ſchön. Da faßte ich mir einmal ein Herz und fragte ihn, wie eigentlich neue Bohnen gezüchtet werden? Er ſchwieg eine Weile, dann ſagte er, neue Bohnen werden gefunden. Ein ſehr ehrlicher Mann und viele Züchter ſollten ſich ſein Wort zu Herzen nehmen. *Wilhelm Mütze*

Vom Werkſtoff des Gartens

Für Moorbeete

SHORTIA galacifolia und Galax aphylla gehören einer Familie an: Diapenſiaceae, obwohl man dies beim erſten Blick kaum annehmen möchte, denn im Blütenaufbau ſind ſie beide gänzlich verſchieden, wie ein Vergleich zeigt. Shortia galacifolia wird man eher für ein Primulaceae halten, was auch nicht ganz falſch iſt, da die verwandtſchaftlichen Beziehungen der Diapenſiaceen zu den Primulaceen ſicherlich ſehr nahe ſein werden. Bei Galax iſt man anfangs ganz und gar ratlos, beſonders wenn die Blütenähren der Pflanze noch im Knospenzuſtande ſind.

Shortia galacifolia ähnelt im Blatt ſehr unſeren Pirola, nur iſt es bedeutend größer, die ganze Pflanze viel üppiger und auch leichter in der Kultur. Dieſe muß bei ihr in moorigem, humoſem Boden, ähnlich dem der Rhododendron und anderer Ericaceen, in halbſchattiger Lage ſein. Vielleicht am beſten zuſammen mit etwas feinblättrigem, kleinem Rhododendron oder Enkianthus; die Pflanzen werden denn auch gleich bei dieſem den nötigen Schutz finden. Oder aber man macht den Pflanzen eine beſondere Stelle in geeigneter Lage; auch für's Alpinum eignet ſich Shortia galacifolia ſehr. Sie wird ungefähr 10 bis 20 Centimeter hoch. Der blattloſe Blütenſtengel trägt von April bis Mai ein Büſchel weißer glockenähnlicher, ſehr an Soldanella erinnernder Blüten, deren Ränder geſägt bis zerſchliſſen ſind. Die Blätter ſind immergrün, rundlich bis herzförmig. Der Wurzelſtock treibt Ausläufer, die nach und nach die ganze Pflanzfläche durchziehen und den Boden mit ihrem Blattwerk vollſtändig bedecken. Die Heimat dieſer Art iſt die Hochgebirgsregion von Nordkarolina. Als nur noch zweite Art von Shortia haben wir *S. uniflora* aus den oberen Gebirgswäldern von Nippon (Japan). Dieſe Art hat bedeutend größere Blüten als galacifolia, die einzeln an ihren Stielen hängen, ſie iſt jedoch ſchwächer wüchſig. Die Kulturbedingungen ſind die gleichen.

Galax aphylla trägt den treffenden deutſchen Namen Bronzeblatt. Jedes einzelne Blatt ſcheint ein Kunſtwerk zu ſein, wenn im Herbſt und Winter die Bronzefarben in allen Abſtufungen erſcheinen. Die ſtark netzartige Nervatur und die gefällige Form der Blätter erhöht noch die Schönheit der Pflanze. Es iſt nur immer bedauerlich, wenn man in irgend einer Aufſtellung immergrüner Stauden dieſe ſchöne typiſche Immergrüne, ebenſo die Shortia, nicht mit aufgeführt findet. Auch Galax aphylla hat unterirdiſche braungelbe, bindfadenartige Wurzelausläufer. Die Blätter werden ungefähr zwanzig Centimeter hoch, ſind feſt, glänzend lederattig, herzförmig und gekerbt. Die ſchlanken Blütenähren mit dicht ſitzenden, weißen Blüten werden bis dreißig Centimeter hoch und erinnern im Knoſpenzuſtand an Plantago lanceolata. Die Blütezeit iſt Mai. Galax aphylla iſt in den bewaldeten Gebirgen von Virginien bis Georgia (Nord-Amerika) beheimatet, wo ſie als Unterwuchs in dem humoſen Waldboden vorkommt. Dementſprechend wird auch ihr Standort und Boden ſein müſſen; genau wie bei Shortia. Galax iſt für jeden Pflanzenliebhaber eine empfehlenswerte Staude, die ihm bei ihrer Wüchſigkeit ſicherlich ohne große Sorgen viel Freude bereitet.

Beide Gattungen ſind vollkommen winterhart, man braucht nur den Boden leicht mit trockenen Kiefernadeln oder Laub zu bedecken (die Blätter der Pflanzen aber bleiben frei), um die Temperaturſchwankungen des Bodens ein klein wenig zu mildern. Als leichteſte und ſchnellſte Vermehrungsart kommt bei beiden nur die Teilung in Frage. Samen ſetzen ſie ja auch willig und genügend an, doch bis man blühfähige Pflanzen hat, vergeht eine geraume Zeit.

C. R. Jelitto

Gruppenbegonien

SEIT Jahren haben ſich die Begonia ſemperflorens als Gruppen- und Beetpflanzen eingeführt und werden auf alle nur denkbare Weiſe verwendet. Sie ſind auch ſehr dankbare, anſpruchsloſe, den ganzen Som-

Shortia uniflora.
Bilder Jelitto

Shortia galacifolia

merhindurch unermüdlich blühende Pflanzen. Manchmal jedoch hat man das Gefühl, und mancher Gartenbeſitzer und Blumenliebhaber wird mir beipflichten, daß etwas Abwechſlung angenehm empfunden würde. Hier könnten durch die gefüllten, knollenbildenden, ſogenannten Gruppenbegonien oft etwas andere Bilder geſchaffen werden. Sie ſind unaufhörliche Blüher, vom Anfang des Sommers bis zum Froſt überladen mit ihren mittelgroßen Blumen in reinen, leuchtenden Farben und vertragen im Gegenſatz zu den großblumigen Knollenbegonien ſehr gut ſonnige Plätze, es laſſen ſich mit ihnen ſehr vornehme, aparte Wirkungen erzielen. Ihre Anzucht kann nur durch Stecklinge erfolgen. Die Knollen werden im zeitigen Frühjahr, etwa Anfang Februar in Kiſtchen in leichte Erde flach eingelegt und in der Vermehrung oder im Warmhaus aufgeſtellt. Die Knollen treiben in kurzer Zeit aus, die Triebe werden, ſobald ſie fingerlang ſind, unter dem Blattknoten abgeſchnitten und in Torfmull und Sand geſtopft; ſie machen leicht Wurzeln und werden ſpäter in Töpfe und etwa im April bis Mai auf Käſten oder auch, wenn genügend abgehärtet, auf Beete gepflanzt.

Der Liebhaber, der nicht über die nötigen Räume zur Vermehrung verfügt, läßt ſich am beſten die Knollen kommen. In jedem Frühbeet laſſen ſie ſich mit etwas Bodenwärme oder auch in Ermanglung dieſer in Töpfen oder Kiſtchen am Zimmerfenſter leicht antreiben, doch gebe man leichte und doch nahrhafte Erde, ſei zu Anfang vorſichtig mit dem Gießen und gewöhne die Pflanzen zeitig an Luft und Sonne. Bis Ende Mai werden ſie ſich bereits gut entwickelt haben und können nun vorſichtig mit den Erdballen auf die Beete geflanzt werden, wo ſie unermüdlich bis zum Herbſt blühen.

Nach den erſten Fröſten werden die Knollen herausgenommen und die Stiele abgeſchnitten; die Erde wird zum größten Teil abgeſchüttelt. Dann bewahrt man die Knollen in einem luftigen Keller oder froſtfreien Souterrain. Nach vier bis ſechs Wochen ſind die Stiele und Wurzeln vollends abgeſtorben; nun können die Knollen geputzt und in trockenem Torfmull in irgend einem froſtfreien Raume überwintert werden. In Töpfen gezogene Begonien beläßt man am beſten über Winter in den Töpfen und reinigt ſie im Frühjahr um ſie hierauf wieder in friſche Erde einzulegen. Eine leichte, gut durchläſſige, aber doch nahrhafte Erde iſt Vorbedingung für ein gutes Gedeihen, wie auch reichliches Gießen bei trockenem Wetter und Belegen der Beete mit verrottetem Miſt ſehr zum guten Gedeihen beiträgt.

Eine kurze Beſchreibung der ſchönſten und wirkungsvollſten Sorten möge zur Orientierung folgen. *Helene Harms* iſt wohl die am meiſten verbreitete; ſie iſt auch infolge ihrer Widerſtandsfähigkeit gegen die Unbilden der Witterung und ihrer aufrechtſtehenden goldgelben Blüten eine der beſten. *Graf Zeppelin* iſt ein Gegenſtück zur vorher genannten, mit ſcharlachroten Blüten, eignet ſich ebenfalls trefflich für Gruppen. *Bavaria* iſt eine wahre Perle unter den Gruppenbegonien. Sie wird etwa 12 bis 15 Centimeter hoch; die einfachen, zahlreich erſcheinenden Blüten zeigen ein reines, ſehr liebliches Roſakarmin, eine äußerſt feine Färbung. Sie iſt ebenſo gut für Gruppen wie als Topfpflanze zu verwenden. Die Vermehrung dieſer ſchönen Sorte iſt etwas ſchwieriger, auch die Überwinterung der Knollen muß etwas vorſichtiger geſchehen, doch lohnt ſie die Mühe durch ihren Liebreiz. *Bertini* wird etwas höher und wächſt ſtärker als die vorhergehenden, iſt deshalb auch für größere Gruppen oder als Vorpflanzung vor andern Pflanzen wie etwa Koniferen gut zu verwenden. Sie wird etwa 30 Centimeter hoch und iſt mit ihren großen ſcharlach-zinnoberroten Blüten von weitleuchtender Wirkung. *Lafayette* iſt eine ältere, jedoch vorzügliche Sorte von etwa 15 Centimeter Höhe mit prächtig gefüllten dunkelroten Blumen. *Unermüdliche* hat ihren Namen mit vollem Recht, denn ſie bringt wirklich unermüdlich ihre ſchön über dem dunklen Laub ſtehenden, leicht gefüllten, ziegelroten Blumen. *Rouget de L'Isle* iſt eine neue, ganz hervorragende Sorte, mittelhoch, von kräftigem robuſtem Wuchs, mit großen, dicht gefüllten, leuchtend ſcharlachroten Blüten, die in reicher Folge frei über dem dunkelgrünen, glänzenden Blattwerk erſcheinen; als Topf- und Gruppenſorte gleich wertvoll. *Feuerflamme*, bildet niedrige, prächtige, runde Büſche und trägt mit ihren zahlreichen, feuerroten Blüten in der Größe der Helene Harms ihren Namen ganz zu recht. Alle dieſe Sorten ſind weiteſter Verbreitung wert und werden gewiß jedem Liebhaber viel Freude bereiten.

Gehringer

Handwerkliches

Wegebau

SAUBERE, trockne und ſtets ordentliche Wege ſchmücken jeden Garten. In dem Forſtgarten von Tharandt, deſſen Wege durch ſeine großen Höhenunterſchiede (faſt 100 Meter) ſehr hängig ſind, verhindern wir das Abſchwemmen von Wegematerial (nach Sturzregen) durch eine ſehr einfache und zweckmäßige Maßnahme. Wir geben den Wegen nach der Außenkante eine Neigung von ungefähr 10 bis 15 Centimeter, je nach Stärke des Gefälles, legen dieſe alſo ſoviel tiefer als die Innenkante. Wir verhindern dadurch, wie es früher bei gleichliegendem Niveau der Wege der Fall war, Anſammlungen von Waſſer auf lange Strecken, das ſich dann durch ſeine Eigenkraft auf ſolchen hängigen Wegen bei paſſendem Widerſtand, abgeſehen davon, daß es auf ſeiner Laufbahn ſchon viel Material mitgenommen hat, plötzlichen Ab-

fluß und Durchbruch verſchafft. Es iſt vorgekommen, daß wir nach ſtarken Gewitterregen mit ſämtlichen Arbeitsleuten dann tagelang am Ausbeſſern dieſer Schäden zu tun hatten, nicht nur der Schäden am Wege ſelbſt, vielmehr noch der in den Quartieren durch Erd- und Steinanſchwemmungen. Durch die obengeſchilderte Maßnahme, wodurch ſelbſt bei ſehr ſtarken Regengüſſen, wie ſie hier bei uns im Gebirge gang und gäbe ſind, das Waſſer ſofort durch ſeinen Eigendruck nach der hängigen, tieferliegenden Seite abgeleitet wird und ſomit keine Anſammlungen ſtattfinden können, haben wir eine merkliche Verbeſſerung der Wege erreicht. Durch dieſe Maßnahme wird aber auch noch dadurch geſpart, daß die bei wagerecht liegenden Wegen in gewiſſen Entfernungen notwendigen, ſogenannten Abſchläge, die durch Holzbohlen herzuſtellen waren, nicht mehr nötig ſind. Man ſpart alſo dieſe merkliche Ausgabe für Holz. Auch die dazu nötig geweſene Arbeit verbilligt ſich, indem jetzt nur noch ab und zu kleine Erhöhungen auf der Innenſeite der Wege mit Wegematerial nötig ſind, um das Waſſer ſofort nach außen abzuleiten.

Schließlich wird auch erreicht, daß die Wege ein gefälligeres Ausſehen bekommen. Eine Zierde waren dieſe Abſchläge, beſonders wenn ſie nicht regelmäßig in Ordnung gehalten werden konnten, durchaus nicht. Einfachheit der praktiſchen Arbeiten in jeder Form, durch die geſpart werden kann (ein Zehntel der Arbeitslöhne wurde früher bei uns für dieſe Wegeausbeſſerung benötigt, während wir jetzt viel billiger wegkommen), erhöhen aber das Intereſſe des Beſitzers an ſeinem Garten. Dadurch werden Mittel frei zu wirkſamer Betätigung des Beſitzers, Anſchaffung von Pflanzen, des notwendigſten Gegenſtandes im Garten.

B. Voigtländer

Vergießen und Vergiftung

GEWÖHNLICH wird bei einer Topfpflanze, die durch eine allzu große Waſſergabe gelitten, ihr übles Ausſehen auf die ſchädigende Wirkung des zu viel verabreichten Waſſers geſchoben. Wir ſtoßen aber, wenn wir der Erſcheinung auf den Grund gehen, auf zwei Möglichkeiten: einmal auf eine vorübergehende, nur im Falle dauernden Nichtbeachtens zum Tode führende Schädigung, zweitens auf eine Vergiftung durch die in ſtagnierendem Schlamm ſich bildenden Schwefelverbindungen, die den Tod verurſacht. Die erſten Merkmale an der Pflanze ſind dieſelben: die Blätter hängen ſchlapp herab. Halten wir nun die Pflanze trockener, ſo wird ſie ſich im erſten Falle erholen, im zweiten aber nicht mehr. Ich habe verſucht, eine auf dieſe Art vergiftete Pflanze durch Zurückſchneiden der Wurzeln, ſauberes Auswaſchen der übriggebliebenen und Neueintopfen der Pflanze zu retten, es war umſonſt. Selbſt bei nicht durchwurzelten Töpfen, wo die Faſerwurzeln kaum bis auf den Grund reichen, iſt eine Rettung ausgeſchloſſen. Das beſte Merkmal dafür, daß Stagnation vorliegt, iſt der Geruch, der ſich beim Austopfen bemerkbar macht. Um die Schnelligkeit der Wirkung der Vergiftung zu zeigen, erwähne ich, daß, wenn man nur einen Tag das ſtehende Waſſer im Topf nicht durch Einſtoßen von untenher abrinnen läßt, dies ſchon, beſonders bei ſchweren Erdmiſchungen, den Tod herbeiführt. Die Urſache davon iſt unzulängliche Drainage oder Verſchlemmen des zwiſchen Topfloch und Scherbe befindlichen Raumes. Die einzige Verhütungs-Vorſicht bei allzu ſtarkem Gießen und nach größeren Regengüſſen iſt ſofortiges Suchen nach Waſſer, welches im Topfe ſtehen geblieben ſein könnte.

Wilhelm Seidl

JOHANNES KÖSTER / BLÜTENNOTIZEN

Juniblüher II

	1922				1923				1924				1925			
	Erblüht	Vollblüte	Noch anſehnlich bis	Verblüht	Erblüht	Vollblüte	Noch anſehnlich bis	Verblüht	Erblüht	Vollblüte	Noch anſehnlich bis	Verblüht	Erblüht	Vollblüte	Noch anſehnlich bis	Verblüht
Delphinium »Lamartine«	10.6.	27.6.-15.7.	20.7.	26.7.	18.6.	25.6.-18.7.	25.7.	28.7.	21.6.	30.6.-12.7.	21.7.	26.7.	8.6.	10.6.- 6.7.	11.7.	15.7.
— — 2. Blüte	10.8.	26.8.-21.10.	Frost		31.8.	3.9.-26.9.	29.9.	10.10.		—			15.8.	21.8.-10.10.	14.10.	—
— »Moerheimii«		—			2.7.	11.7.-16.7.	18.7.	23.8.	23.6.	2.7.-14.7.	19.7.	26.7.	10.6.	22.6.-15.7.	22.7.	25.7.
— »Persimmon«	6.6.	10.6.- 4.7.	15.7.	20.7.	6.6.	25.6.- 6.7.	14.7.	21.7.	16.6.	25.6.- 7.7.	12.7.	23.7.	30.5.	8.6.-24.6.	29.6.	6.7.
— — 2. Blüte	30.7.	16.8.-26.8.	30.8.	13.9.	15.8.	27.8.-16.9.	20.9.	8.10.	11.8.	— —	—	7.9.	20.7.	5.8.- 7.9.	12.9.	14.10.
— »Königin Wilhelmina«	24.6.	1.7.-19.7.	26.7.	—	7.7.	11.7.-21.7.	28.7.	4.8.	2.7.	7.7.-19.7.	23.7.	26.7.	22.6.	29.6.-13.7.	18.7.	27.7.
— »Schlangenbad«	24.6.	1.7.-26.7.	2.8.	—	11.7.	21.7.- 6.8.	11.8.	20.8.	5.7.	14.7.-21.7.	28.7.	9.8.	20.6.	4.7.-22.7.	25.7.	27.7.
— »Wilkie Collins«	1.7.	8.7.-19.7.	—	—	23.6.	2.7.-14.7.	18.7.	28.7.	25.6.	30.6.-12.7.	21.7.	23.7.	10.6.	24.6.- 8.7.	23.7.	27.7.
— »William Storr«		—			27.6.	2.7.-18.7.	23.7.	28.7.	25.6.	5.7.-19.7.	23.7.	26.7.	13.6.	27.6.-15.7.	22.7.	27.7.
— — 2. Blüte		—			8.9.	12.9.-17.9.	25.9.	29.9.		—				—		
— »Zuster Lugten«		—				—			2.7.	7.7.-16.7.	21.7.	26.7.	20.6.	24.6.-15.7.	20.7.	27.7.
Dianthus plumarius Diamant	16.6.	20.6.- 1.7.	—	—	9.7.	14.7.-18.7.	—	21.7.	23.6.	28.6.- 5.7.	21.7.	26.7.	10.6.	15.6.-24.6.	29.6.	7.7
— — Excelsior		—				—			25.6.	30.6.- 7.7.	19.7.	23.7.	10.6.	15.6.-27.6.	1.7.	6.7.
— — Roter Vorbote		—				—			14.6.	16.6.-20.6.	30.6.	5.7.	27.5.	30.5.-15.6.	17.6.	20.6.
Erigeron hybr. »Asa Gray«		—				—			16.6.	21.6.-14.7.	21.7.	26.7.	20.5.	6.6.-24.6.	29.6.	1.7.
— mesagrande speciosus	15.6.	1.7.-19.7.	26.7.	—	2.7.	9.7.-28.7.	1.8.	15.8.	25.6.	7.7.-23.7.	28.7.	30.7.	10.6.	17.6.- 8.7.	13.7.	22.7.
— — »Quakeress«	20.6.	27.6.-19.7.	20.7.	—	30.6.	7.7.-25.7.	28.7.	11.8.	18.6.	5.7.-21.7.	26.7.	30.7.	6.6.	20.6.-11.7.	15.7.	22.7.
Eryngium alpinum	20.6.	26.6.-20.7.	30.7.	5.8.	27.6.	7.7.-23.7.	28.7.	1.8.	7.7.	12.7.-28.7.	4.8.	9.8.	24.6.	29.6.-11.7.	18.7.	27.7.
Geranium armenum	6.6.	9.6.-27.6.	9.7.	9.7.	9.6.	16.6.- 5.7.	28.7.	25.8.	12.6.	16.6.-16.7.	26.7.	6.8.	27.5.	6.6.-15.6.	20.6.	8.7.
— platypetalum		—				—			3.6.	14.6.-28.6.	2.7.	5.7.	27.5.	2.6.-13.6.	15.6.	20.6.
— pratense Mrs. Bradshaw	7.6.	16.6.-20.6.	27.6.	1.7.	6.6.	13.6.-30.6.	5.7.	11.7.	9.6.	24.6.-28.6.	2.7.	5.7.	10.6.	17.6.-29.6.	1.7.	4.7.
Geum coccineum fl. pl.		—			16.6.	23.6.- 9.7.	14.7.	18.7.	11.6.	16.6.- 9.7.	25.8.	6.9.	20.7.	27.7.-10.8.	17.8.	24.8.
Gypsophila repens		—				—			14.6.	16.6.- 9.7.	14.7.	27.8.	23.5.	27.5.- 2.6.	—	6.6.
— — monstrosa		—				—			18.6.	21.6.-12.7.	16.7.	18.10.	23.5.	26.5.-10.6.	15.6.	17.6.
— — rosea		—				—			16.6.	18.6.- 2.7.	9.7.	14.7.	20.5.	28.5.-10.6.	17.6.	20.6.
Helianthemum carminrosa		—				—			4.6.	7.6.-16.6.	25.6.	30.6.	23.5.	27.5.-15.6.	29.6.	4.7.
— terracotta		—				—			4.6.	7.6.-14.6.	23.6.	28.6.	30.5.	2.6.- 8.6.	—	10.6.
— gefüllt gelb		—				—			7.6.	11.6.-28.6.	5.7.	11.7.	30.5.	2.6.-10.6.	—	20.6.
— gefüllt rot		—				—			7.6.	11.6.-28.6.	5.7.	21.7.	23.5.	27.5.- 8.6.	—	13.6.
Hemerocallis flava		—				—			26.5.	4.6.-16.6.	25.6.	28.6.	27.5.	2.6.-13.6.	15.6.	20.6.
— fulva	20.6.	27.6.- 8.7.	13.7.	30.7.	11.7.	14.7.-25.7.	28.7.	6.8.	23.6.	28.6.- 9.7.	19.7.	30.7.	27.5.	2.6.-17.6.	23.6.	15.7.
— Kwanso fl. pl.	25.7.	5.8.-30.8.	21.9.	27.9.	11.7.	14.7.- 6.8.	11.8.	5.9.	5.7.	17.7.-25.8.	3.9.	13.9.	18.5.	20.5.-17.6.	24.6.	6.7.
— Middendorffii		—				—			25.5.	4.6.- 9.6.	11.6.	17.6.	20.5.	2.6.- 5.7.	18.7.	29.7.
— »Apricot«		—			6.6.	11.6.-27.6.	30.6.	16.7.	26.5.	7.6.-18.6.	25.6.	30.6.	20.5.	27.5.-20.6.	27.6.	8.7.
— »Sovereign«		—			9.6.	13.6.- 2.7.	7.7.	18.7.	7.6.	11.6.-18.6.	23.6.	28.6.	20.5.	25.5.-12.6.	17.6.	24.6.
Heuchera »Plui de Feu«	31.5.	6.6.-16.6.	1.7.	—	9.6.	15.6.- 7.7.	11.7.	25.7.	4.6.	11.6.- 5.7.	21.7.	9.8.	26.5.	30.5.-17.6.	20.6.	27.6.
Iris orientalis		—			27.6.	3.7.- 7.7.	11.7.	16.7.	14.6.	16.6.-21.6.	23.6.	27.6.	20.5.	2.6.- 1.7.	8.7.	13.7.
— — Snow Queen	6.6.	9.6.-20.6.	24.6.	27.6.	27.6.	2.7.-13.7.	16.7.	21.7.	14.6.	16.6.-28.6.	30.6.	9.7.	23.5.	2.6.- 1.7.	8.7.	17.10.
— sibirica grandiflora	24.5.	3.6.- 4.6.	16.6.	16.6.	4.6.	16.6.-27.6.	2.7.	7.7.	2.6.	7.6.-16.6.	18.6.	21.6.	25.5.	27.5.- 8.6.	15.6	17.6.

Gartenrundschau

NEUES AUS ALLER WELT

Amerikanische Rosengärten im Jahre 1926

SEIT vielen Jahren pflegen die unter uns, die die Rose lieben, sich wegen ihrer Gärten zu entschuldigen, wenn man sie mit dem verglecht, was wir tun können und was man ständig in England oder an der nordwestlichen pacifischen Küste tut. Der rosenliebende Teil der mittleren Vereinigten Staaten liegt abseits des Einflusses großer Wasserflächen, mit alleiniger Ausnahme der Küste von Massachusetts: wir haben wirklich tropisches Wetter im Sommer mit heißen Nächten und dem sich daraus ergebenden Mangel am Wohlergehen der Rose.

Der diesjährige Sommer zeigte bis zum 10. Juli ganz eigenartige Wetterbedingungen bei uns. Bei virtuell normalem Regenfall hatten wir viele Grad weniger, als die normale Temperatur beträgt; während einer Rosenwachstumzeit von sechs bis acht Wochen war es jede Nacht um drei bis zehn Grad (Fahrenheit) kühler, als der normale Durchschnitt der Jahreszeit ist.

Aus diesem Grunde oder aus einer anderen, mir unbekannten Ursache hat die Rose in diesem Jahr eine bisher uns unbekannte Schönheitshöhe erreicht. Wir haben nicht nur eine übermäßige Fülle von Blumen, sie sind auch größer, von feinerer Beschaffenheit, reicher gefärbt und stärker duftend als je zuvor. Außerdem zeigen sich jetzt viele Sorten von edlerer Farbenkomposition, die wir bisher immer in Weiß verbleichen sahen, ehe wir sie recht abschätzen oder kritisieren konnten; wir sehen so nach den Beschreibungen, mit denen sie zu uns kamen, ihre wahren Farbenzusammenklänge.

So erfreuten sich denn diesmal die amerikanischen Rosengärten eines bemerkenswerten Rosenwohlseins, was zweifellos in öffentlichen wie in privaten Anlagen zu einer schnellen Verbreitung dieser Gärten führen wird. Es macht sich eine Bewegung bemerkbar für die Einrichtung städtischer Rosengärten. So strebt beispielsweise die Stadt Charleston in Westvirginien danach, die Rosenstadt des Ostens zu werden. Sie wird jedoch in dieser Hinsicht von der Nachbarstadt Huntington im selben Staate herausgefordert, die nach der gleichen Würde strebt. Ein Besuch in der Provinz Ontario des benachbarten Dominium von Canada zeigte wirklich treffliche städtische Rosengärten, und die Berichte über solche Anlagen in den Vereinigten Staaten lassen deutlich die steigende Popularität für diese besondere Form des Rosenfortschrittes erkennen. Dieser Zustand ist so, wie er sein sollte. Lehrt doch beispielsweise die Erfahrung in Hartford, Connecticut, daß der Rosengarten im Elizabeth Park in dieser Stadt durchschnittlich jährlich mehr als siebzigtausend Besucher (auf den Acker berechnet) anlockt. Man kann dies als einen großen Vorteil für die Parkverwaltung ansehen.

Der Kreis der amerikanischen Rosengesellschaft, die jetzt über 5000 Mitglieder zählt, scheint Liebhaber aus allen Teilen des nordamerikanischen Kontinentes einzuschließen, die sich auf eigenem Grund an der Rose erfreuen und ständig danach trachten, ausgedehntere Rosengärten zu schaffen. Man kann annehmen, daß diese Gärten bis zu einhundert Pflanzen enthalten für jedes Mitglied, das berichtet. Aus einer kürzlich erschienenen Übersicht geht hervor, daß man sich bemüht, sorgfältig in der Form zu berichten, daß die Auswahl der besten Rosen für die verschiedenen klimatischen Bedingungen in unseren ausgedehnten Gebieten richtig geleitet wird.

An einigen Orten werden formale Rosengärten ganz erfolgreich unterhalten. Das gilt besonders von der Umgebung von Boston; doch habe ich auch unlängst einen prächtigen formalen Rosengarten auf der Besitzung von Fleischmann in Cincinnati, Ohio, besucht. Dieser Garten wurde in der Absicht geschaffen, ihn später eventuell der Stadt Cincinnati zu übergeben.

Sicherlich hat diese günstige Rosensaison die Rose in Amerika noch beliebter gemacht, und man kann deshalb große Fortschritte auf diesem Gebiete erwarten. *I. Horace McFarland*

Die Erikenzucht in Gefahr.

IN diesen Tagen beginnen in den Gartenbaubetrieben der Leipziger Umgebung die Gärtner mit dem Abtransport ihrer Eriken. So harren in einer Eythraer Gärtnerei gegen 50000 Pflanzen des Versandes, der sich vor allen Dingen nach dem Rheinland, Mitteldeutschland (Berlin) Süddeutschland, der Schweiz und den nordischen Staaten erstreckt. Neben Eythra werden auch von Hartmannsdorf, Holzhausen, Liebertwolkwitz, Markkleeberg, Dölitz und Cröbern die Erikapflanzen versandt. Die Pflanzen sind in diesem Jahre kräftig entwickelt und nur durch die kalte Witterung in ihrer Blüte um 14 Tage zuzückgehalten worden. Fährt man in diesen Tagen von Leipzig mit der Bahn nach Zeitz, so erblickt man an der linken Seite der Fahrtrichtung, sobald man das Weichbild der Stadt verlassen hat, das charakteristische Rot der Erika, die in weiten Flächen die Gärtnereien bedeckt, ein herrlicher Anblick. Dazwischen eilen geschäftig die Gehilfen mit langen Brettern auf den Schultern, um die Pflanzen in den bereitstehenden Wagen zu verladen, nachdem sie sorgfältig in Körben verpackt sind.

Leider ist in einigen Betrieben die Erikapest auch in diesem Jahre wieder aufgetreten, deren Ursache, trotz aller wissenschaftlichen Untersuchungen, bisher noch nicht festgestellt werden konnte. Es sind von den staatlichen Untersuchungsanstalten, die hierfür in Frage kommen, sowohl die Heideerde als auch das Wasser sowie die Pflanzen, die davon befallen wurden, einer eingehenden wissenschaftlichen Untersuchung unterzogen worden, ohne ein Ergebnis zu bringen. Auch Bodenproben sind den landwirtschaftlichen Versuchsstationen zur Begutachtung übersandt worden; nichts Verdächtiges hat man gefunden. Das Merkwürdige bei der Krankheit besteht darin, daß Betriebe von ihr heimgesucht werden, die vordem gesunde Erikenzucht hatten, und Nachbarbetriebe, die unter denselben Verhältnissen arbeiten, verschont bleiben. Es ensteht dadurch dem Besitzer ein erheblicher Schaden, die Pflanzen fallen krank zusammen, während sie am Tage zuvor gesund aussahen. Hoffentlich gelingt es den Instituten für Pflanzenforschung und Pflanzenkrankheiten, die Ursache doch noch festzustellen. Es würden dadurch der Volkswirtschaft große Werte erhalten und dem Gärtner die Unsicherheit seines Arbeitserfolges genommen.

Der Absatz gestaltet sich in diesem Jahre für gesundes und kräftiges Material nicht ungünstig. Freilich beeinträchtigen die schlechten wirtschaftlichen Verhältnisse und die Geldknappheit einen noch umfangreicheren Verkauf. Aus dem statistischen Material, welches über die Pflanzen auch in Dresden zur Ausstellung den Besuchern in anschaulicher Weise vorgeführt wurde, konnte man sehen, daß der Friedensstand und somit auch die Aufzuchtsmenge noch nicht erreicht wurde. Die Erica gracilis wird hauptsächlich für Gräberschmuck sowie als Balkon- und Fensterschmuck als fleißiger Herbstblüher verwendet. Sie wird hier zu einer kräftigen, widerstandsfähigen Pflanze herangezogen, deren rote Blüten sich in großer Zahl als Heideglöckchen im Winde wiegen. Ihre dekorative Wirkung ist bei entsprechender Gruppierung und unter besonderer Verwendung einer wirksamen Umgebung eine recht gute. Wir haben hier in unsrer Gegend einige Anpflanzungen erster Gartenkünstler, welche die Erika ins rechte Licht gerückt haben. Die Oktoberschau in Dresden wird große Sortimente dieser Pflanzen zeigen unter besonderer Verwendung ihrer Farbenmischung für den Hausgarten. Eine besondere Art von Eriken sind die niedrigen Pflanzenarten, die für Doppelfenster Verwendung finden. Bei diesen Sorten kommt es auf ein lang anhaltendes Blühen und große Winterfestigkeit an, denn die Temperatur ist bei strengem Winter so nahe dem Fenster besonders gegen Morgen recht niedrig. Ihre Wirkung ist bei geschickter Aufstellung in der ganzen Fensterfront unter Verwendung von farbenfrohen Topfeinhüllungen sehr anheimelnd; von außen wie von innen. Wir haben in Leipzig im Konzertviertel einige Villen, die sehr viel für einen wirkungsvollen Erikenschmuck ihrer Fenster ausgeben. Unwillkürlich wird das Auge des Passanten zum Verweilen, zum Beschauen angehalten, selbst in einer Stadt, die nur auf Handel, auf Hasten und Eilen eingestellt ist.

Die Nachzucht der ein- und zweijährigen Pflanzen läßt bei günstiger Entwicklung der Wetterverhältnisse gute Erfolge erwarten. Hoffentlich gelingt es den Betrieben, in den kommenden Jahren den Anbau von Eriken zu vergrößern und durch Neuzüchtungen das Interesse noch mehr auf diese schönen Pflanzen zu lenken. *Gründer*

Neue Bücher

KLEINE UND GROSSE GARTEN. Unter diesem Titel mit dem Untertitel »Aus der Werkstatt eines Gartengestalters« hat *Harry Maasz*, der bekannte Lübecker Gartenarchitekt, bei Trowitzsch

& Sohn, Frankfurt a. O., eine mit zahlreichen Bildern hübſch ausgeſtattete Schrift herausgegeben, die den Gartenfreund von heute an der Hand von Darſtellungen aus vom Verfaſſer ausgeführten Anlagen mit dem Weſen der Gartengeſtaltung vertraut machen ſoll. Der Autor hat ſich durch ſeine bisherigen Schriften und Arbeiten als einer der führenden heute tätigen Gartengeſtalter bewährt. Auch die vorliegende Schrift zeigt ihn als eine auf ſich ſelbſt geſtellte Perſönlichkeit, die mit vielen Gartenproblemen erfolgreich gerungen hat. Er betont mit Recht im Text, daß es im Garten vor allem darauf ankommt, Räume zu ſchaffen, die man dann mit Pflanzenleben füllt. Er iſt beſorgt, daß wir heute zu viel Pflanzen in ungaſtliche Stätten ſtopfen, die arm an Raum und Rhythmus ſind. Wenn er indes durch ſeine eigenen, nach Photographien hergeſtellten Bilder beweiſen will, daß er in der Raumſchöpfung eine glückliche Hand hat, ſo iſt ihm das nur in ſehr ſeltenen Fällen gelungen. Da muß man ſchon ſeine Skizzen und Pläne ſtudieren. Die Aufnahmen ſind der ſchwächſte Teil des Buches, wobei man ſich freilich der Tatſache bewußt bleiben muß, daß es kaum etwas Schwierigeres gibt, als mit der Linſe Gartenbilder wiederzugeben, die das Vorhandene richtig veranſchaulichen. Das Buch iſt indes ſehr geeignet, den Leſer, der ſich ernſtlich um das Studium der Gartenprobleme bemüht, mit vielen wichtigen Gartenfragen vertraut zu machen. Es iſt voller Anregungen und zeigt, wie ein ſtark perſönlich eingeſtellter Gartengeſtalter wirkt. Zur kritiſchen Betrachtung von Einzelheiten fehlt hier der Raum. Der Verlag hat ſich bemüht, dem 260 Seiten in Großoktav umfaſſenden Buche ein modernes Antlitz zu geben, leider mit dem Erfolge, daß es für die meiſten, denen wir ſeine Anſchaffung anraten möchten, vielleicht zu teuer ausgefallen iſt.

GÄRTEN, SPORT- UND SPIELPLÄTZE. Die Firma *L. Späth*, Baumſchulenweg-Berlin, hat unter dieſem Titel im Selbſtverlage ein mit 12 farbigen und 81 ſchwarzweißen Bildern ſchön ausgeſtattetes Buch herausgegeben, das nicht nur einen guten Überblick über die Tätigkeit der Abteilung Gartengeſtaltung dieſer rührigen Firma gibt, ſondern auch den aufmerkſamen Leſer in das mannigfaltige Gebiet der Gartengeſtaltung einzuführen geeignet iſt. Der begleitende Text ſtammt von Walter Baedeker.

SANSSOUCI. Allen denen, die Sansſouci lieben, ſei eine kleine, im Verlage von K. F. Köhler, Berlin, erſchienene Schrift von *Guſtav Berthold Volz, „Das Sans Souci Friedrichs des Großen"*, mit dem Anhang: Das Sansſouci von heute, empfohlen. Sie enthält 21 Bilder im Text und 76 Tafeln in Oktav, und führt uns ein in das Weſen dieſer klaſſiſchen Schöpfung und ihres genialen Schöpfers.

DIE ROSE IN AMERIKA. Der Herausgeber von The American Roſe Annual *J. Horace McFarland* hat ein auch äußerlich anſprechendes Buch *The Rose in America* im Verlage von The Mac Millan Company, New York, erſcheinen laſſen, das für jeden Roſenzüchter und Roſenfreund von hohem Intereſſe iſt. Gerade in Nordamerika hat ja in den letzten Jahrzehnten die Roſenzucht wie die Roſenliebhaberei einen ungeahnten Aufſchwung genommen, der ſich auch in dieſem Buche eines ſo erfahrenen Roſenkenners wiederſpiegelt. Es enthält 14 ſchwarzweiße und farbige Tafeln und gibt auch eine Überſicht über neuere amerikaniſche und engliſche Roſenbücher. Die techniſchen Abſchnitte erſcheinen mir von beſonderem Intereſſe, da ja die Amerikaner großen Wert auf das Praktiſche zu legen pflegen. Die klimatiſchen Bedingungen eines ſo rieſigen Landkomplexes ſind auch gar mannigfaltig und laſſen reiche Erfahrungen ſammeln.

BAU UND LEBEN DER PFLANZE. Auf dem Gebiete der gärtneriſchen Bodenkunde, Düngerlehre und Pflanzenphyſiologie hat ſich Prof. Dr. *Arno Naumann* ſeit langem einen Namen gemacht. Wer ihn wie ich vor nunmehr über drei Jahrzehnten als Lehrer kennen lernen durfte, weiß, in wie hohem Maße er die Gabe beſitzt, ſein reiches Wiſſen kurz und klar zu vermitteln. So iſt es denn mit großer Freude zu begrüßen, daß er uns in ſeinem bei Eugen Ulmer in Stuttgart erſchienenen Büchlein *Bau und Leben der Pflanze, eine Botanik des Praktikers* eine wirklich populäre Schrift geſchenkt hat, die das Thema für den Gärtner, Pflanzenfreund, wie auch für den Forſtmann und Landwirt erſchöpfend genug behandelt. Das Buch ſcheint mir ganz beſonders auch für den Unterricht an Gärtnerlehranſtalten ungemein wichtig, iſt es doch nicht zuletzt auf den eigenen vieljährigen Lehrerfahrungen des Verfaſſers aufgebaut. Es kann in der klaren und bei aller Kürze erſchöpfenden Behandlung des Stoffes geradezu als vorbildlich gelten.

DER GEMÜSEGARTEN. Wer ein handliches billiges Büchlein über Gemüſebau ſucht, der ſei auf die Schrift von *Lambert Müller, Der Gemüſegarten,* verwieſen, die als Band I der 3. Auflage von dem »Gartenunterricht« des Verfaſſers im Volksverein-Verlag, M.-Gladbach, erſchienen iſt. Sie enthält 130 einfache Skizzen im Text und könnte auf etwas beſſerem Papier gedruckt ſein. Die Angaben ſind klar und durchweg genügend und zuverläſſig.

NÜTZLINGE IM GARTENBAU. Es iſt ſehr zu begrüßen, daß unter die im Verlage von Paul Parey, Berlin, von A. Janſon herausgegebenen »Gärtneriſchen Lehrhefte« auch ein ſolches (No. 22) über *Nützlinge im Gartenbau unter Berückſichtigung von Vogelſchutz und Bienenzucht* aufgenommen worden iſt, das von Prof. *Otto Janſon* bearbeitet wurde. Es bietet auf 82 Oktavſeiten mit 75 einfachen, aber zweckentſprechenden Textbildern eine hübſche Überſicht über »die Tätigkeit vieler dieſer kleinen Helfershelfer«, die bisher »entweder völlig überſehen oder doch vielfach zu gering eingeſchätzt wird«. Jeder Gartenfreund und Gärtner ſollte ſich mit den Vögeln und Inſekten vertraut machen, die ihm im Kampfe gegen die zahlreichen Schädlinge helfen. *C. S.*

Zeitſchriften

BELGIEN

No. 509 und 510 von *La Tribune Horticole* behandeln meiſt Ausſtellungsthemen. Dies gilt auch für die folgenden Nummern. In no. 513 iſt eine intereſſante Betrachtung abgedruckt über die Nachteile, die der Gebrauch von Vulgärnamen bei Pflanzen haben kann. Nur zu oft verſteht man unter ſolchen Namen ganz verſchiedene Dinge. Dieſe müßten alſo genau wie die wiſſenſchaftlichen für beſtimmte Pflanzen feſtgelegt werden.

DÄNEMARK

No. 6 der *Havekunſt* behandelt alte Rundgärten, oder beſſer kreisförmige Gartenſtücke aus Anlagen aus dem 10. Jahrhundert und einige moderne Vorſchläge.

ENGLAND

In no. 2070 von *The Gardeners' Chronicle* wird unter anderem die ſeltene Erdorchidee Bartholina pectinata beſprochen und abgebildet. F. Kingdon Ward ſetzt die Reiſeſchilderungen über ſeine 9. Expedition nach Aſien fort. Die Farbentafel in no. 2071 zeigt Ceſtrum Newellii. A. Grove beſpricht Lilium philippinenſe var. formosanum. Wie ſchön die noch wenig bekannte, aber anſcheinend auch bei uns harte Gaultheria Veitchiana fruchtet, beweiſt ein Bild in no. 2072. Hier wird auch die wundervolle neue Orchideenhybride Potinara La Paz abgebildet. H. Friend beginnt eine eingehende und auch berechtigte Kritik von Marie Luiſe Gotheins Buch Geſchichte der Gartenkunſt, deſſen neue Auflage leider keine ſo dringend nötige Neubarbeitung darſtellt. N. E. Brown ſetzt ſeine ausführliche Beſprechung der Gattung Meſembryanthemum fort und behandelt weitere neue davon abgetrennte Gattungen. Auch no. 2073 zeigt eine prächtige neue Orchideenhybride Braſſo-Laelio-Cattleya Irma. Die Tafel ſtellt Ranunculus aſiaticus dar, und ein ſehr intereſſanter Artikel behandelt Viola gracilis. — In no. 2850 von *The Garden* wird das Ergebnis eines Duftwickenwettbewerbes bekannt gegeben. Die ſechs beſten Sorten waren: Conſtance Hinton, Picture, Powerſcourt, Mrs. Tom Jones, Royal Scot und Warrior. Weitere Beiträge behandeln verſchiedene Narciſſentypen, und Blumenzwiebeln für den Frühlingsgarten. Wie ungemein reich Pentſtemon blühen, zeigt ein Bild im nächſten Heft, das auch eine wundervolle Pflanze von Phyteuma comosum darſtellt. Als gute neue Roſen finden ſich in no 2859 Dame Edith Helen, die als beſte Duftroſe des Jahres gilt, und Patience. — Im Septemberheft der *Orchid Review* finden ſich unter anderem Bilder der Odontoglosſumhybriden Ianthe und Dora. Die Gattung Aerides und ihre Kultur wird beſprochen. Von Schomburgkia tibicinis iſt ein 15 Fuß langer Blütentrieb dargeſtellt.

FRANKREICH

Aus dem Septemberheft von *La Revue Horticole* wird ein ſehr typiſch franzöſiſcher Park zu Vert-Mont bei Malmaiſon-Rueil geſchildert. Die Farbentafel zeigt Iris Alliés, eine Vilmorinſche Züchtung.

HOLLAND

In no. 9 von *Onze Tuinen* wird das Thema Tafelſchmuck behandelt. Im nächſten Hefte iſt Melittis Meliſſophyllum abgebildet. — No. 34 der *Floralia* iſt ein Narziſſenheft und bringt farbig die Sorten Narciſſus incomparabilis Red Croſs und Invincible, ſowie N. Barrii Firetail. In no. 35 iſt eine Bildbeilage von Hypericum patulum Henryi. In den weiteren Heften ſetzt Ch. de Boſschère ſeine Reiſeerinnerungen fort.

NORDAMERIKA

In no. 16 von *Horticulture* beſpricht unter anderem E. H. Wilſon Schizophragmahydrangeoides, und im erſten Septemberheft wird eine Gladiolen-Auswahl gegeben. — Vom *Bulletin of popular information of the Arnold Arboretum* bringen no. 17 und 18 wieder viele Einzelheiten, ſo über die Ailanthus und die ſüdweſteuropäiſche Ulmus procera.

OESTERREICH

Im Juliheft der *Gartenzeitung* beſpricht Rimann das Verpflanzen großer Bäume. *C. S.*

VERLAG DER GARTENSCHÖNHEIT G. m. b. H. in Berlin-Weſtend / Verantwortlich für die Schriftleitung OSKAR KÜHL in Berlin-Weſtend, für den Anzeigenteil DOROTHEA KLETT, Berlin-Lichterfelde / Druck von W. SOMMER, Buch- und Kunſtdruckerei in Berlin-Schöneberg.

Sammelmappe

WIE DIE PFLANZE ARBEITET

DAS biblische Gleichnis von den Lilien im Felde, die nicht arbeiten, ist falsch. Die Pflanze arbeitet Tag und Nacht und kämpft vom ersten Schritt ihrer Entwicklung um ihr Leben mit den Mächten der Umwelt. In dem schönen Gleichnis steckt mehr naive Poesie als Erkenntnis der Wirklichkeit. Es gibt keine Lebenserhaltung ohne rastlose Arbeit, ohne unausgesetzte Betätigung. Diesem allgemeinen Naturgesetz der Arbeit ist auch die stille und bescheidene Pflanze unterworfen. Es ist ihr nicht vergönnt, von ihrem Wirken viel Aufhebens zu machen, und der naive Beobachter mag sich versucht fühlen, ihr Dasein als ein müheloses und arbeitsloses einzuschätzen. Es ist dies nur eine mehr unter den Ungerechtigkeiten, welche sich die Pflanze gefallen lassen muß. Wenn sie nicht einem Erstarrungszustande verfällt, gibt es für sie keine Ruhe; das lebenstätige Plasma in ihr feiert niemals. Schon ihr nie vollendetes, die ganze Lebenszeit hindurch währendes Wachstum bezeugt diese Ruhelosigkeit. Denn auch das Wachsen ist Lebensbetätigung, ist Arbeit. Wo Plasma »wächst«, damit neue, für die Lebensfunktionen notwendige Organe entstehen, da gilt es, auch die Stoffe heranzuziehen, die für das Neuwerden von Protoplasma notwendig sind: die Wurzeln

und Blätter müssen arbeiten, daß sie die Rohstoffe beschaffen. Die von ihnen der Umwelt abgekämpften Stoffe müssen zu den entsprechenden organischen Verbindungen umgewandelt werden, müssen hingeschafft werden, wo der Organismus ihrer bedarf, an die Stätten der Neubildung; sie müssen dort neuerdings umgewandelt werden, daß sie in die Struktur des Plasmas und in dessen technische Erzeugnisse eingehen können. Das alles ist *Arbeit*. Der Lebenswille, der alle diese Vorgänge zielstrebig leitet und überwacht, ist auch zugleich der Schöpfer dieser Arbeit.
Nur wenig ist es, was die Pflanze im Samen an Bau- und Betriebsstoffen miterhält. Kaum, daß es bei manchen zarten Gewächsen für das erste Würzelchen, für die ersten grünen Blättchen ausreicht. Dann ist der kleine Organismus schon auf sich selbst gestellt: Arbeite, arbeite, oder geh' zugrunde! Und was für Arbeit ist das wiederum! Rastloses Suchen der Wurzeln im Boden nach Wasser und den darin gelösten mineralischen Stoffen, wobei in trockenen oder schlecht wasserhaltigen Böden den Erdpartikelchen die letzten, für unser Gefühl längst nicht mehr wahrnehmbaren anhaftenden Wasserhüllen durch die Wurzelhaare unter Ueberwindung der physikalischen Kräfte des Erdbodens entrissen werden müssen. Wie sicher wissen die Wurzeln ihr Wachstum dorthin

zu lenken, wo sie mehr Wasser und bessere Ernährung spüren, und wie wissen sie sich von Stellen wegzuwenden, wo schädliche Stoffe ihre Lebensfähigkeit bedrohen! Wie ist es zu deuten, daß im trockenen Sand- und Wüstenboden, in Schutt und Gerölle die kleinsten Pflänzchen meterfief gehende Wurzeln erzeugen, weil sie erst in größerer Tiefe entsprechende Wassermengen finden, während selbst starke Pflanzen im ständig durchfeuchteten Boden sich mit viel oberflächlicherer Wurzelbildung begnügen? Wie ist es zu deuten, daß die Wurzelhaare, jene feinen schlauchförmigen Gebilde der Oberflächenzellen (die nur an den fortwachsenden, also in neue, noch unausgenützte Bodenregionen gelangenden Wurzelspitzen entstehen!) schwächer und in geringerer Zahl bei wasserreicher, länger und dichter stehend in trockener Umgebung ausgebildet werden, weil wenig Feuchtigkeit eine größere aufsaugende Oberfläche erfordert, damit die Pflanze rechtzeitig das Notwendigste an Wasser erhält?! Ist es mechanisch (also ohne mitwirkende Zweckbeziehung) denkbar, daß etwas Nichtvorhandenes (Mangel an Wasser) eine positive Wirkung auslöse? Nur das Gefühl des Mangels und das Bedürfnis nach seiner Beseitigung kann hier als auslösend angesehen werden. Der Lebenswille der Pflanze, der zuerst diese Organe schafft, drängt auch zu jenem Grade der Ausbildung, der gerade bei Not und Mangel erforderlich wird. Weil der Lebenswille in der Pflanze das Wasser zu seiner Betätigung braucht, hat die Pflanze das Gefühl für das Vorhandensein oder für den Mangel dieses Lebenselementes; und weil sie dieses Gefühl hat und leben will, so handelt sie danach, soweit sie dies im Einzelfalle vermag. Vernunft der Pflanze.

Um einem scheinbar gänzlich trockenen Boden die letzten Wassermoleküle entreißen zu können, müssen die Wurzelzellen in ihrem Inneren einen osmotischen Druck erzeugen können, der bei Wüstenpflanzen bis zu 50 und

gestaltende und regulierende, die einzelnen Lebenstätigkeiten vereinheitlichende Kraft! Arme Mechanik! Die Pflanze will leben, und so tut sie ihr Möglichstes, das heißt das in ihrer Organisation jeweils Gegebene, um diesen Willen durchzusetzen. Empfindung und Lebenswille, gebunden an ein gegebenes, bestimmt beschaffenes materielles Gebilde, bestimmen und dirigieren nach Vernunftgesetz. Da jedes »Gesetz« im Einzelfalle Schranken an dem jeweils Gegebenen findet, so auch hier. Weil nicht aller Pflanzen Wurzeln solche extreme lebenerhaltende Technik entfalten können, weil die Wurzeln an stets durchfeuchteten Oertlichkeiten wachsender Pflanzen ein jähes Hereinbrechen von Trockenheit nicht vertragen, — ist das ein Gegenbeweis gegen das Vernunftgesetz des Lebenswillens? Diese, stets in einem Ueberfluß an Wasser schwelgenden Pflanzen haben es nie gelernt, sich nach dieser Richtung hin um die Erhaltung ihres Lebens bemühen zu müssen. Sprechen wir einem Menschen, der im sorgenlosen Ueberfluß aufgewachsen ist, deswegen Seele und Vernunft ab, weil er, einem plötzlichen Mangel hilflos gegenüber gestellt, zusammenbricht?

*

Bei dem kleinsten Wurme, der sich in den Erdboden einwühlt, zweifeln wir keinen Augenblick, daß er dabei »arbeitet«, und zwar in einem, für seine Körpergröße sicherlich oft ganz gewaltigen Ausmaße. Wir zweifeln deshalb nicht daran, weil wir seine Anstrengungen, seine Bewegungen sehen und uns gleichsam an seine Stelle denken können. Wie viele aber denken wohl daran, welche Arbeit eine Pflanze mit all ihren Wurzeln vollzieht, wenn sie diese nach allen Richtungen in den Erdboden hinabtreibt? Welche Widerstände müssen da oft im Boden von den zarten Wurzelspitzen (nur diese sind der fortwachsende Teil der Wurzel) überwunden werden! Man hat die Arbeit, die da geleistet wird, auch gemessen. Stellt man einer wachsenden Wurzelspitze eine Quecksilberschicht entgegen, so dringt sie bis zu einem gewissen Grade aktiv in das Quecksilber ein und überwindet solchermaßen dessen Widerstand, was nichts Geringeres bedeutet, als die Verdrängung einer Masse von dreizehnmal größerem Gewicht. An eingegipsten wachsenden Wurzeln hat man den Druck, der von diesen Organen zur Entfernung der hemmenden Widerlage aufgewendet wird, bis zu zwölf Atmosphären gemessen.«

Aus „Adolf Wagner, Die Vernunft der Pflanze" Verlag Carl Reissner, Dresden.

Gartenschönheit

eine Zeitschrift mit Bildern

für Garten- und Blumenfreund · für Liebhaber und Fachmann

November 1926

in Gemeinschaft mit Karl Foerster und Camillo Schneider
herausgegeben von · Oskar Kühl
Verlag der Gartenschönheit G.m.b.H. Berlin-Westend

7. JAHR / HEFT 11 NOVEMBER 1926

GARTENSCHÖNHEIT

eine Zeitschrift mit Bildern
für Garten- und Blumenfreund
für Liebhaber und Fachmann
in Gemeinschaft mit Karl Foerster
und Camillo Schneider
herausgegeben von Oskar Kühl

Inhalt des Novemberheftes:

Seite

Peter Behrens und Berthold Körting / Körtings Garten / Mit 8 Bildern und 1 Plan . 281
Karl Foerster / Winterharte Gartenchrysanthemum / Mit 4 Bildern 286
Karl Wagner / Vogelschutz und Winterfütterung 289
Camillo Schneider: Dresdens Gartenschau: Ein Rückblick / Mit 5 Bildern 290
Abutilon / Hibiscus / 3 Bilder 294
Oscar Reuther / Indische Gartenkunst II / Mit 7 Bildern 295
Franz Söhns / Fremdes in unseren Pflanzennamen 298

Gartenaufgaben

Rudolf Bergfeld / Ein vielgestaltiger Hausgarten / Mit Bild und Zeichnung 299

Aus dem Blumengarten der Literatur

Rousseaus Grab von E. E. L. Hirschfeld / Mit Bild 300

GARTENARBEIT UND BLUMENPFLEGE

Kurt Pöthig / Steine im Garten II / Mit 6 Bildern 301
Karl Micksch / Blumenzucht an Bord eines großen Ozeandampfers 303
Wilhelm Mütze / Pflanze und Licht 303

Unter Glas

Gurney Wilson: Populäre Orchideen / III Herbstblühende Cattleyen 304
Eine Ampelpflanze des Warmhauses / Mit Bild 304
Buntblättrige Schraubenbäume / Mit Bild 305

Handwerkliches

Karl Foerster: Verpflanzung des Staudenrittersporns / M. Geier: Stecklingsvermehrung bei Einjahrspflanzen / Karl Foerster: Haltbarkeitsbeobachtung an abgeschnittenen Dahlien 305
J. Köster / Blütennotizen 306

GARTENRUNDSCHAU

Neues aus aller Welt

Schönes Dahliengarten / Gentiana Farreri / Gegen Meltau bei Rittersporn / Regenwiderstandsfähige Edelrosen / Der Glockenblumen-Scheinmohn 307

Neue Bücher

Handbuch des Kunstmarktes / Deutsche Dendrologische Gesellschaft / Schädlingsbekämpfung / Deutsche Kakteen-Gesellschaft 308

Zeitschriften 308

BILDBEILAGE

Auf dem Ehrenfriedhof in Duisburg

FARBIGE BILDBEILAGEN

Aus Körtings Garten

Nelken

Monatlich ein Heft

Bezugspreis für das Vierteljahr

in *Deutschland* 4 G.-M. und 0.75 G.-M. Versandkosten (Postscheckkonto Berlin 76290),

im *Ausland* einschließlich Versandkosten: 5.25 Goldmark = 1,25 U.S.A.-$ oder entsprechend in der Landeswährung.

Preis des Einzelheftes

1.50 Goldmark zuzüglich Versandkosten

Verlag der Gartenschönheit G.m.b.H.
Berlin-Westend / Akazien-Allee 14.

Die feinen Stimmungsreize, an denen der Garten Körting so reich ist, treten in der farbigen Wiedergabe stärker hervor als es auf schwarzweißen Bildern möglich ist. Das Blau des Strandhafers klingt zusammen mit dem der Ceder und der blauen Tanne. Die Heide trägt ihre eigene Stimmung in den Garten und steht zu den Tönen der Omorikafichte und der Nutka-Scheincypresse. – Bilder Andreas Bister.

Im November

PETER BEHRENS / KÖRTINGS GARTEN

WENN man ſich an die Gartenbau=Ausſtellung in Düſſeldorf erinnert, die vor vielen Jahren ſtattfand, wie dort zum erſten Male eigentlich verſucht wurde, den geometriſch geordneten Garten einzuführen, ſo weiß man auch noch, daß dieſe Verſuche nicht nur keinen Beifall fanden, ſondern als ſteif und als eine Gewalttätigkeit der Natur gegenüber abgelehnt wurden. Man war noch zu ſehr an die geſchlängelten Wege, nierenförmigen Beete, irregulären Raſenflächen, willkürlich beſetzt mit Bosketts aus verſchiedenartigſten Sträuchern, gewöhnt und fand dieſe Art der Gartengeſtaltung das Natürliche. Man nannte ſie engliſche Art, wohl in Anlehnung an die großen engliſchen Parks, die in weiter Ausdehnung die engliſchen Herrenſitze umgeben, ſo wie auch das Parkgelände Münchens den Namen Engliſcher Garten trägt. In England jedoch bezeichnete auch um dieſe Zeit und ſchon viel früher der Begriff Garten die nähere Umgebung des Wohnhauſes, die man, wie dieſes, gewiſſermaßen als ſeine Fortſetzung und Erweiterung, in der Natur wohl geordnet und architektoniſch gegliedert auffaßte. Wie alles Neue zunächſt Widerſtand erfährt, dann zur Geltung kommt und bald zur Mode wird, ſo wurde auch der geometriſche Garten in Deutſchland das Prinzip aller fortſchrittlichen Gartengeſtaltung und womöglich übertrieben durch axiale Wege, Pergolen und quadratiſche Raſenflächen. Solche papiernen Figuren waren die Hauptſache. Mit welchen Pflanzen ſie beſetzt waren, war nicht ſo ſehr von Belang. Da man immer etwas Blühendes vor ſich haben wollte, ſo begann man mit dem »Ausbeeten« vorgezogener Blütengewächſe, und die rechteckigen Beete und Streifen waren beſtellt mit Pelargonien, Petunien und den Trivialitäten, die in jeder Gärtnerei käuflich ſind. Eigentlich iſt es noch heute ſo. Man kann ſich davon überzeugen, wenn man Villenvororte beſucht und Vor= und Rückgärten beſieht. Einiges iſt beſſer. Eine Vorliebe für ausdauernde Blütenſtauden iſt anzutreffen, die man auch in engliſchen Hausgärten findet und die in Deutſchland durch die unermüdliche Arbeit Karl Foerſters Boden gewonnen hat.

Betrachten wir aber einen ſolchen Garten, in dem vielleicht ſogar das ganze Foerſterſche Material Anwendung gefunden hat, ſo iſt dennoch trotz der Ordnung, der Gliederung durch Mäuerchen und

Einschnitt im Sandgarten. Am Sonnenhang viele Formen winterharter Opuntien, die seltene Yucca angustifolia, Caragana jubata. Hinten rechts Cedrus deodara und Libani. Japanische Steinlaterne architektonischer Stimmpunkt.

Steinanlagen, trotz des Wasserbeckens, mit Seerosen und Irisumrandung, im Prinzip nicht viel geändert. Immer ist ein solcher Garten entstanden aus der Neigung, zu dekorieren, einen äußerlichen Eindruck für das Auge zu schaffen. Man hofft, eine überraschende Wirkung zu erreichen durch die Vielzahl der Pflanzenarten in ihrer bunt zusammengewürfelten Fülle. Ein Garten, ob groß oder klein, ist aber keine Tafeldekoration, sondern sollte *gewachsen* sein. Es sind Unterschiede fundamentalster Bedeutung, Wachsenlassen und Dekorieren. Es sind Unterschiede der Gesinnung. Gegensätze von adeliger Vornehmheit zu parvenühaftem Renommieren. Um einen Garten wachsen lassen zu können und die Ewigkeitswerte und Schönheit, die in dem selbständigen Werden der Natur liegen, zu unterstützen und liebevoll zu leiten, bedarf es freilich botanischer und biologischer Erfahrung.

Gärten dieser Art sind selten. Einen gibt es, der ein mustergiltiges Beispiel ist – Körtings Garten in Neubabelsberg. Ich weise gerne auf ihn hin und zitiere ihn oft. Was an ihm ist, ist nicht mit ein paar Worten gesagt. Es ist keine reguläre Anlage, zeigt nicht die Treppenstufen und bewachsenen Trockenmauern, die jetzt im Schwunge sind und einem nachgerade langweilig werden. Er ist biologisch gepflanzt, aber nicht wegen der Biologie ein wissenschaftliches Ergebnis, das ja ebensowenig mit dem Künstlerischen und der Freude des Lebens zu tun hätte, wie das »Ausbeeten«. Der Architekt Körting hat hier gemalt und von der Palette mit seinem reichen botanischen Vorrat eine Idylle gedichtet.

Dieser Ausdruck ist nicht übertrieben, denn alles botanische Wissen, die Kenntnis der oft so unergründlichen und nur noch zum Teil erforschten Wachstumsbedingungen ungebräuchlicher Pflanzen, die Bodenbewegungen, die Abschlüsse durch auffällige Baum- und Strauch-Silhouetten sind nicht raffinierte Berufstätigkeit und Fachkenntnis, sondern dienen, anstatt hiervon Zeugnis abzulegen, einem anderen Ziele: seelische Erlebnisse zu vermitteln.

Als ich den Garten zuerst sah, beherrschte ein großer Teil der weißsandigen

Seerosenteich, umstanden von japanischen Zwergahornen, Primeln, Trollius, sibirischen Schwertlilien, und niedrigen Polsterstauden. Die Umgebung des Wassers zeigt hier ganz ausgesprochenen Sumpfcharakter.

Blick in den Sandgarten. Zur Rechten iſt der Weg von Elymus glaucus, dem blauen Dünengras, überhangen, zur Linken von dem Ausklang einer blühenden Yuccagruppe überſchnitten.

Hügellehnen blauer Strandhafer und dieſe in Gärten ungewohnte Farbenpracht wurde noch erhöht durch ein großes hineingeſtelltes Terrakottagefäß in reinem Kobaltblau. Und Kontraſte ergaben ſich durch die dunkeln, gegen das duftige Blau faſt ſchwarz wirkenden Juniperus-Säulen. Später wurde das wuchernde Gras zurückgehalten, erſetzt durch verſchiedene Heideformen, und an anderen Seiten dieſes Gartenteils entwickelte ſich oft zwiſchen Findlingen die reiche Flora des Sandbodens, wobei nicht nur Gartenformen, ſondern ebenſo einheimiſche, oft ortsgewachſene, Pflanzen angewendet wurden. Maßgebend war nicht die Seltenheit des Pflanzenmaterials, ſondern der Charakter, wie es zum Garten paßte und die Koloriſtik des Geſamtbildes vervollſtändigte. In hohem Maße reizvolle Flächen treten hervor, wie ganz niedrige Dinge, die den Boden und das Geſtein überwuchern und Farbakkorde anſchlagen in Harmonie miteinander oder im Kontraſt zu ihrer Nachbarſchaft. Niemals ſind es Pflanzen, die ausſehen, als ob ſie hineingeſtellt ſeien, ſondern ſie treten in großer Anzahl in maſſigen Gruppen und breiten Flächen auf. Es entſtand das Bild eines Malers, der ſeine monumentale Wand beherrſcht und mit großem Pinſel in breitgeſtrichenen Zügen malt. Es iſt ja doch gerade der immer wieder beobachtete Fehler aller Dilettanten, von allem etwas, wenn auch nur wenig, haben zu wollen und bei größerer Hingabe derjenigen, die ſich in die Vielſeitigkeit aller unendlichen Möglichkeiten an Material vertiefen, daß ſie ohne Rückſicht auf die Wirkung aus ihrem Gärtchen einen botaniſchen Garten machen wollen. In Körtings Garten könnte man viele Tage verbringen, nur um ſich botaniſch zu belehren, aber die Pflanzen, die wir dort oft ſtaunend wegen ihrer Beſonderheit, Seltenheit und überraſchenden Wirkung bewundern, ſind nicht aus wiſſenſchaftlichem Intereſſe geſammelt oder von weither beſchafft, ſondern ſtehen an ihrem Orte, als ob ſie dort von Ewigkeit eingebürgert ſeien. Sie präſentieren ſich nicht als etwas Sonderliches, ſondern erſcheinen, als ob ſie im Verwildern begriffen ſeien.

Und auch darin erſcheint mir Körtings Garten als ein wertvolles Beiſpiel, wie man trotz aller Liebe,

Sempervivum tectorum im dichten Moos eines abſonnigen Hanges inmitten des Sandgartens zuſammen mit Juniperus prostrata und squamata

Umfaſſung des Wohnraſens, alte Aufnahme; inzwiſchen wuchern Cotoneaſter adpreſſa una Polſterſtauden weit über die Mauer hinab. Unten Meerſchweinchenſtall, darüber Volière.

Sorgfalt, beruflichem Verſtändnis und unermüdlichem Fleiß, indem man von früh bis ſpät in ihm tätig iſt, ihn, freilich mit Geſchmack und biologiſchem Sinn, verwildern laſſen ſoll. Darin liegt vielleicht das Prinzip und die Richtſchnur für die wirkliche und höhere Gartenbehandlung, nämlich der Natur ſelbſt ihren Willen zu laſſen. Der Menſch ſollte nur den Grund legen, indem er den Boden vorbereitet für die plaſtiſche Ergänzung, die ſein Haus wünſchen läßt und ihn geeignet macht für das Wachstum der erträumten zu ſchaffenden Welt. Und wenn er alles beſchafft hat an Bäumen, Sträuchern, Stauden, Gräſern und die Saat für die einjährigen Blüher, die durch die eigene Ausſaat immer wieder von ſelbſt neu erſtehen, dann iſt es nur noch Aufgabe, ihr Wachstum zu begünſtigen durch Waſſer und Beigabe der erforderlichen Nährkraft, und alle unerbetenen Zudringlinge, das Unkraut, das wie unter den Menſchen aufdringlicher, lauter und vorwitziger iſt als die ſtets beſcheidene Größe, fernzuhalten. Man wird Überraſchungen erleben an maleriſch wilder Pracht und ſtaunen, daß ſich unverhofft eigentlich von ſelbſt neue Gäſte anſiedeln, die man garnicht gerufen hatte. Nicht nur Pflanzen aller Art werden gelockt, ſondern auch Tiere. In dem Garten Körtings huſchten ſchillernde Eidechſen durch die Fugen der in der Sonne glühenden Steine.
So iſt der Körtingſche Garten ein anregendes Beiſpiel neuer Gartenformung und Vertiefung. Da ich in Wien dieſe Zeilen aus der Erinnerung ſchreibe, alſo nicht in ſeiner Nähe bin, kann ich leider nicht auf den Pflanzenbeſtand, durch den hier alle Schönheit erreicht wurde, eingehen; dies wird der Schöpfer ſelbſt tun. Aber mir lag daran, auf das äſthetiſche Prinzip dieſes Gartens hinzuweiſen.

Mein eigener Garten

WIRKLICH kennen gelernt habe ich meinen Garten eigentlich erſt heute. Dieſer »Körting-Garten« und der »Garten-Körting« ſind nämlich gleich alt. Inzwiſchen ſtapeln ſich die Akten der verſchiedenartigſten Gärten, die ich angelegt habe — aber dieſen Garten: den habe ich nicht gebaut, er iſt geworden und gewachſen — und ich mit ihm, und ſo ſind wir beide in einer gewiſſen Art miteinander verwachſen. Und als ich nun der Aufforderung nachkommen wollte, über meinen eigenen Garten zu ſchreiben, ergab ſich die Notwendigkeit, ihn nun endlich einmal planmäßig feſtzulegen — das war gewiſſermaßen eine Auto-Vivisektion. Das heißt: ein allgemeiner grundlegender Plan beſtand natürlich, aber — nun, ab initio incipitur: Und der Anfang war der, daß wir in dem Nachbarhaus zur Rechten wohnten und dieſes große Stück Kiefern-Forſt, das es war, eines Tages kauften, als ich auf Urlaub aus dem großen Kriege in der Heimat war. Wir

Steine mit Eidechſenſkulptur. Blauſchillernde Keramik, modelliert von Heiner Körting, dem Landſchaftscharakter verwandt, oft umgeben von lebendig ſpielenden Artgenoſſen.

Auf dem Ehrenfriedhof in Duisburg

ergingen uns die Tage, die uns gegönnt waren, auf unſerm neuen Beſitz, wir »nahmen ihm Maaß«, und ich nahm ihn in mir auf, und fern, im ruſſiſchen Winterquartier, entſtand der grundlegende Plan: Im Norden die Straße, hohe Kaſtanien, alſo eine hohe Hecke, die die Stämme verdeckt und die Einſicht — ſo gehörten die Kaſtanien mir. Im Süden die vertiefte Bahn, verſteckt hinter fiskaliſchem Flieder — dort kann niemand bauen, dort iſt freier Luftraum und dahinter die Liſière des Waldes, alſo frei den Blick nach Süden, und mein iſt drüben der Wald. In Oſt und Weſt bebaute kieferbeſtandene Grundſtücke, die geben mir Windſchutz und Rahmen. Daraufhin ſchlugen wir kahl und ließen die Sonne hinein und nur in Oſt und Weſt und Nord einzelne Kiefern ſtehen, die die Grenze zum Nachbar verwiſchen halfen.
Das Haus muß in die Nord-Oſtecke kommen, den Rücken, die Wirtſchaftsräume, zur Ecke und das Geſicht, alle Wohnfenſter, der Sonne entgegen und in die ganze Tiefe des Grundſtückes ſchauend, aber weit genug von der Grenze, um Platz zu haben für den Wirtſchaftshof, für den Leutegarten, den Wirtſchaftseingang, Kohleneinwurf, Kompoſt und Geflügel. Von der Wirtſchaft aus muß der Zugang zum Gemüſegarten ſein und der muß Licht haben, alſo bleibt nur die Süd-Oſtecke dafür, und von dort aus längs der Bahn, in deren Nähe niemand ſitzen will, erſtreckt ſich langhin der Obſtgarten. Damit iſt der geſamte Wirtſchaftsbetrieb geſchloſſen zuſammengebracht, ohne den eigentlichen Garten zu tangieren.
Der hohe und dichte Rankroſenzaun, der den Hof umſchließt und die darüber hinausragenden Laubbäume und Kiefern im eigenen Hof und jenſeits der Nachbargrenze bilden den Rahmen im Oſten. Aber vom Hauſe aus nach Weſten und Süden will ich weit in die Landſchaft blicken und keine markierte Grenze ſehen. Nach Süden war das einfach. Locker beginnende Strauch- und Baumgruppen überſchneiden die Obſtpflanzung und weit dahinter erſcheint der Waldrand jenſeits des Bahneinſchnittes. Im Weſten aber ſteht das Nachbarhaus und ſagt dem Auge halt: Hier iſt dein Reich zu Ende. Da müſſen ſchnellwüchſige Koniferen-Kuliſſen helfen. Jenſeits der Grenze ſtehen hohe Kiefern, alſo kommen nur Kiefernarten in Betracht, um mit dieſen einen einheitlichen ungeendigten Blick zu ſchaffen und das Nachbarhaus zum Verſchwinden zu bringen. Schwarzkiefern, Weymuthskiefern und die wundervollen Tränenkiefern ſind inzwiſchen prächtig herangewachſen und erfüllen ihren Zweck. Weiter vorgeſchoben ſtehen einzelne beſonders ſchöne andere Koniferen und löſen die dunkelgrüne Wand nach vorne hin zu lockerer Wirkung auf. Um die Tiefenwirkung zu ſteigern war eine nochmalige lockere Blickunterbrechung nötig durch Laubhölzer. Damit aber die Koniferen bis zum Boden grün blieben, mußte die Laubholzgruppe ſo weit von dieſen abgerückt ſein, daß genügend Luft und Licht dazwiſchen blieb. Dieſe Fläche verlangte eine Bodenbedekkung — was gab es Schöneres als unſre deutſche Heide mit ihren typiſchen ſchmalen geraden und zielſtrebigen Sandpfaden als Vordergrund vor den dunkelgrünen und bläulichen Nadelhölzern. Weiter im Süden geht die Heide in ein wachholderdurchſetztes Birkenwäldchen über, deſſen Boden ein buntes, dichtes Durcheinander all unſerer Waldblumen bildet, und da dieſe größere Üppigkeit größere Bodenfeuchtigkeit erwarten läßt, war es logiſch, durch dieſes Wäldchen hindurch auf einen kleinen Teich zu ſtoßen, an deſſen Ufer ſich alles Blühen zur größten Wachstumsfreudigkeit ſteigert: alles, was den Sumpf und das Waſſer liebt an Primeln, Schilf und Irisarten, Bambus, Seeroſen und Pfeilkraut, fand ſich dort zuſammen. Und über den Waſſerſpiegel geneigt zeigen die entzückenden japaniſchen Fächerahorne ihre zierlichen Silhouetten. Die Laubholz-Gruppe, von der ich ſchon ſprach und die ſich, vom Haus aus geſehen, an den Birkenhain anſchließt, iſt aus den ſchönſten blühenden und herbſtfärbenden Bäumen und Sträuchern ſehr wechſelnder Höhen und Dichtigkeit zuſammengeſetzt. Wenn ſie doch den Eindruck des natürlich Gewachſenen machen ſollte, war folgendes ausgeſchloſſen: einmal Hochſtämme mit gerade gezogenem Stamm, ferner alle gartenmäßig abgedroſchenen Dinge wie Flieder und Jasmin, drittens aller Schnitt mit der Scheere, der die natürliche Wuchsform mordet. Und der Untergrund: Azaleen, Primeln und Narziſſen, Maiglöckchen, Walderdbeeren und Veilchen, Farne, Crocus und kleine Schattenſträucher gedeihen üppig in all dem Laub, das liegen bleibt und Humus bildet. Verſteckt mitten darin ein rundes gemauertes Brunnenbecken axial dem Hauſe gegenüber — meiner Frau Lieblingsplatz.

Ein kleiner Quellſtümpel am Birkenwäldchen, techniſch mit Dachpappe gedichtet, über der bis zum Grunde Steinſchüttung aufgebaut iſt. Plaſtik vom Verfaſſer, von Anemonen, Saxifragen, Gundermann, Sumpfdotterblumen umfaßt.

Und nun die große freie Mittelfläche des Gartens. Sie lag vor uns als friſchrigolte ſchneeweiße Sandfläche in der heißen Sommerſonne: daraus den üblichen Raſen machen, und dann all das mähen ſollen und ſprengen und Unkrautausſtechen — ausgeſchloſſen. Das Haus, ein frieſiſcher Backſteinbau, davor ein breiter Klinkerweg wie in den Dünen und nun der weiße Sand: Dünen, das war das Wort. Und blaues Dünengras und ſilbriger Sandboden gegen das rote Haus. Und dann allmählich zu dem Grün des Birkenwäldchens und der Laubhölzer überleiten durch immer dichtere Staudenpolſter und Teppiche, beginnend mit ſilbergrauen und filzigen Antennarien, Immortellen, Hieracien und Cerastium, und dann Thymian und Sedum, übergehend zu Teppichphloxen und Aubrietien, zu Wildnelken und Armerien in immer bunterem Spiel bis an den breiten vertieften Weg hin und drüben noch farbiger wieder hinauf in den Birkenwald hinein — aber zuerſt das Gelände. Wenn es ſo werden ſollte, eine freie Landſchaft, dann mußte Bewegung in die Fläche kommen. Das habe ich eigenhändig gemacht in aller freien Zeit eines ganzen Sommers — und unendlich viel dabei gelernt. Es war überraſchend, wie ſtreng und unerbittlich die Geſetze natürlicher Bodenbewegung ſind, wie weit her und wie unmerklich der erſte Beginn eines Höhepunktes einſetzen muß, wie der Anfang einer Geländefalte zu fortlaufend immer tieferer Talbildung führt, wie eine Überſchneidung die nächſte bedingt. Alles was an Steinen einſt die Gletſcher der Eis-

zeit gebracht hatten und nun beim Rigolen wieder zum Vorſchein gekommen war, von großen Findlingen bis zu kleinem Granitgeröll, legte es nahe, von dem windgeformten Dünencharakter allmählich in die Moränenlandſchaft unſerer Heide überzugehen — wieder zeigte ſich dieſelbe zwingende Geſetzmäßigkeit der Formation, bis es gelang, die Steine ſo anzuordnen, daß ſie dort lagen wie ſeit Urzeiten. Ja ſelbſt die Wege in der Landſchaft haben ihre Geſetze, ſie wollen auf der kürzeſten Linie zu ihrem Ziele führen, aber auch auf dem bequemſten: wo es einem Hügel, einem Dickicht auszuweichen gilt, oder den Abſtieg in ein Tal vermeiden, dort biegen ſie aus; aber ſobald das Hindernis überwunden, lenken ſie auch wieder zurück in ihre gewollte Richtung; wo ſie auf freier Fläche ziehen, gehen ſie in die Breite, und werden eng, wo ſie behindert ſind oder wenig begangen.

Ich liebe die Natur, wo ſie im Kampfe ſteht, wo aus der Kärglichkeit des Dolomitengerölls die einzelne Blume doppelt freudig blüht und jeder Baum und Strauch in zähem Lebenswillen ſeine Perſönlichkeit umſo intenſiver ausprägt, wo die ſilbernen Steppen Afrikas in Dornen ſtarren und die Krüppeleiche in der Heide dem Sturme trotzt.

Auch in dieſe Landſchaft, ſo ſtark im Stil und Ausdruck, konnte ich nur ſolche Bäume ſtellen, nur ſolche Sträucher pflanzen, die in Wuchs und Tracht jeder eine betonte Perſönlichkeit waren. Nicht Säulenwacholder, die ſich gleichen wie ein Soldat dem anderen, ſondern unſeren deutſchen Wacholder, jeden einzeln ausgeſucht, nach ſeinem Sonderwillen. Blautannen in das blaue Dünengras und neben den grauen Sanddorn, die nicht dazu neigen, regelmäßige Pyramiden zu bilden, ſondern zackig im Wuchs jede ihr eigenes Gepräge hatten. Die bizarrſten Formen der großen Familie Juniperus. Vieles konnte ich aus der Menge der Berberis- und Cotoneaster-Arten finden, Cryptomeria elegantissima aus Japan, bronzebraun im Herbſt, Caragana jubata mit den pelzbemähnten Äſten. Die Libanonzeder in ihrer Kraft, die Kaskaden vom Himalaja und die Sperrigkeit der Ceder vom Atlas. Amygdalus nana im nackten Sand blühend und das Filigrangeäſt der Nothofagus antarcticus aus Feuerland. Als ich die Klage Ovids las aus der Verbannung im »grauen pontiſchen Wermut«, habe ich nicht geruht, bis ich ihn hatte als Übergang von Dünengras zu Ginſtern, Aſtern und bronzenen und violetten Chryſanthemenmaſſen unter dem knorrigen Geäſt von Gymnoclados. In dieſem Garten fanden Opuntien Plätze, die ihnen Heimatrecht gaben. Yucca angustifolia ſtarrt ſilbergrau, und die Yucca filamentosa bildet ganze Dickichte unter überreichem Blühen.

Eines Tages ſah ich nach langer Regenzeit an den Schattenhängen einen leichten grünen Schein: den Anfang von Moosbildung. Da durfte kein Fuß mehr dieſe Flächen betreten, und heute ſind alle abſonnigen Seiten wundervolle Moosraſen, durchſetzt mit dichten Sempervivum-Polſtern. In der ſchrägen Frühlingsſonne glühen die Moosflächen auf wie blankes Kupfer.

Und nirgends eine grüne Raſenfläche? O doch, aber am Haus. Ans Haus gehört ein architektoniſcher Garten, hier beſonders, denn erſt, nachdem das Haus ſeinen »Garten« hat, iſt das andere wirklich freie Landſchaft, in die das menſchliche Anweſen eingebettet liegt. Nach Süden tritt man aus dem Hauſe in ein großes Raſenrechteck ein. Unſern Wohn-Raſen nennen wir ihn. Er iſt umfaßt von einer niedrigen Mauer, die nach Süd und Oſt oben mit dem dort höher liegenden Terrain abſchneidet. Dort blühen vor einer hohen Roſenwand dem Auge nahe alle die ſchönſten und reizvollſten Dinge, die uns die Kunſt der Züchter beſchert hat.

Regelmäßig angelegt mit Roſenkanten und Tulpenrabatten iſt auch der Zugang von der Straße zum Haupteingang, dahinter Lilien, Stauden und Zwerggehölze und außen beiderſeits wieder begrenzt von hohen Rankroſenſpalieren. Übrigens noch ein Wort über den Raſen: Er wird nie gemäht; das beſorgt ein Dutzend bunter Meerſchweinchen, deren Stall in der Stützmauer eingelaſſen iſt, mit unerhörter Präziſion — wir haben etzliche Junge davon abzugeben. *Berthold Körting*

KARL FOERSTER / WINTERHARTE GARTENCHRYSANTHEMUM

AUF allen möglichen großen Staudengebieten liegen ſchnellere Fortſchritte vor, als in dieſem ſo wichtigen Reich der ſpäten froſtüberdauernden Blumen. Dennoch bleibt uns dieſe Staudenart trotz der wenigen weſentlichen Fortſchritte neu und überraſchend genug, denn man erlebt doch im Laufe der Jahre erſtens eine Fülle neuer, bisher unbekannter Eigenſchaften an den einzelnen Sorten, ihrem Wachtum zu großen, hohen und breiten Büſchen, oder zu gedrungenen kleinen Geſtalten, ihren wahren normalen Blütezeiten bei dauerndem gleichen Standort an ſonniger Stelle und ſchließlich an der Verſchiedenheit ihrer Widerſtandskraft in voller Blumenentfaltung gegenüber Fröſten. Ferner werden ſie uns dadurch von immer neuer Seite intereſſant, daß wir ſie in überraſchender Benachbarung mit neuen, anderen Blütengewächſen, Felſenmiſpel, Schneebeere, neuen herbſtfärbenden Kleingehölzen und neuen immergrünen Gewächſen blühen ſehen.

Je länger man mit Pflanzen im Garten lebt, deſto mehr hat man das Gefühl, daß das Gewahren ganz neuer Eigenſchaften, Wirkungsarten und auch Entfaltungsmöglichkeiten ſo ſcheinbar vollbekannter Blumenarten und -Sorten ein Leben lang währt, und eigentlich nie zum Abſchluß kommen kann. So ſcheint uns die Pflanze immer mehr als ein oszillierendes Etwas, das in einer Unendlichkeit von Umwelt-Beziehungen und von Frage- und Antwortſpielen ſchwebt.

Ganz allmählich wird das Gartenchryſanthemum im Laufe der künftigen Jahrzente durch Sammlung und Neuzüchtung zu einer führenden Rolle in den Oktober- und Spätherbſtwochen des deutſchen Gartens aufrücken; hiervon kann man in den Schweizer Gärten ſchon einen bunten und farbenſtarken Vorbegriff gewinnen. Allerdings ſind gerade die Schweizer Gärten hauptſächlich mit ganz ſpäten, Oktober-November blühenden Sorten erfüllt, von denen man immer nur einen beſtimmten Teil auch mitteldeutſchen und norddeutſchen Gärten zuweiſen können wird, da viele nicht rechtzeitig aufblühen. Immerhin ſollte man auch auf manche ſchönen allzu ſpäten Sorten aufmerkſam werden und ſie ihrer Weſenheit gemäß bezeichnen und unterſcheiden, als für ſüdlichere Gärten geeignet, in nördlicheren aber als vorzüglich zum Eintopfen in ſpäter voller Knoſpe, um ſie dann in Glasveranden und in Wintergärten wochenlang

Marktbeherrſcher

Princess Juliana

blühen zu haben. Nach dem Abblühen können solche Sorten dann zurückgeschnitten, mit Erdballen ohne Topf gleich wieder in den Garten zurückgesetzt werden, wo sie mit ein paar leichten Fichtenzweigen bedeckt gut durch den Winter kommen.

Da immer noch mancherlei halbharte Sorten, die wohl Freilandchrysanthemum, aber doch keine winterharten Gartenchrysanthemum sind, verbreitet werden, so kann nicht genug darauf hingewiesen werden, daß die Erprobung der vollen Winterhärte auch für das klimatisch weniger bevorzugte Deutschland mindestens sechs bis zehn Winter nötig hat. Hierbei ergibt sich dann wieder, daß die nachhaltige, erst in langen Jahren vergleichbare Bestockungskraft der einzelnen Sorten ungeheuer verschieden ist. Auch hier führt die Betrachtung von Vergleichsbeeten langjährig unberührter Einzelpflanzen aller möglichen Sorten zum Ausbau erstaunlichster Unterschiede, deren Ursachen vom Laien immer wieder irrtümlich auf äußere Umstände gedeutet werden. Es wird manchmal schon langweilig, immer wieder auf diese Erscheinung der unterschiedlichsten Dauerbegabungen von Sorte zu Sorte hinzuweisen; aber man hofft doch schließlich, daß steter Tropfen den Stein höhlt, und weiß, daß hier steinharte Vorurteile und ein unglaublich zäher Wille zum Mißverstehen der Natur zu besiegen sind.

Büsche von 90 Centimeter Höhe und noch größerer Breite der Sorte Novembersonne stehen ein Meter entfernt von kleinen Pflanzenruinen, die vor fünf Jahren genau im gleichen Zeitpunkt und in gleicher Größe und in gleiches Erdreich gepflanzt wurden, wie Novembersonne.

Eine Beurteilung der Dauerenergien aller einzelnen Sorten wird sehr oft durch Beobachtungsfehler gefährdet. Wenn man Chrysanthemum als junge Stecklingspflanze mit Topfballen erst im Sommer in festes Erdreich setzt, so kommt die Pflanze trotz reicher Entfaltung oft schwer durch den ersten Winter, wenn er hart ist; doch gilt dies selbstverständlich nur von etwas empfindlicheren Sorten. Man soll sie also spätestens im Mai pflanzen. Wer Chrysanthemum im Herbst bezieht, verlangt am besten Pflanzen mit festen Topfballen. Die Gärtnereien können auf keine Weise die Verbreitung des Gartenchrysanthemums nachhaltiger steigern, als durch Versand von festen Topfballenpflanzen, denn das Anwachsen mit loser Wurzel ist die besonders schwache Seite des Chrysanthemums. Eine weitere Schwäche ist Winter-Empfindlichkeit besonders gegen jede Deckung mit Laub, wodurch ein ganz bestimmter Wurm in die Pflanze kommt. Chrysanthemum hat sich eben bestimmte Capricen vorbehalten, hinter deren Ursachen nicht leicht zu kommen ist. So

White Croutts

Schwarzrot

habe ich öfter Verſuche gemacht, alte ſtarke Exemplare von ganz alten harten Sorten, wie etwa Garonne oder Melanie im Herbſt mit umſtochenen Erdballen zu verſetzen; im Frühling waren ſie ausgeſtockt. Topfballen iſt ganz etwas anderes als Gartenerdballen. Es ſcheint ſich da um merkwürdige Zirkulationsſtörungen zu handeln, während der Topfballen das Wurzelſyſtem zu ungeſtörtem Betrieb weitergibt. Die Töpfe wählt man am beſten etwas länglich. Eine weitere Laune iſt die Empfindlichkeit gegen ſtehende Näſſe, die aber auch bei den verſchiedenen Sorten ſehr verſchieden iſt und um ſo weniger ins Gewicht fällt, je ſtärkerwüchſig die Sorte iſt. Das Höherlegen mancher Beete, oder die Unterſchotterung mit etwas Geröll führt hier leicht zum gewünſchten Ziel. In bayriſchen Hochgebirgsgärten findet man die Beete oft 25 Centimeter höher als die Wege und ihre Ränder mit kräftigen grün geſtrichenen Holzbohlen abgeſtützt; die ſind dann meiſt halb mit Polſtern von Steingartengewächſen überhangen.
Sehr erwünſcht ſcheinen den Chryſanthemum prallſonnige Plätze an Mauern und Hauswänden. Hier kann man auch ſehr ſpät erblühende Sorten acht bis zwölf Tage eher und länger in Blüte haben und gegen etwaige Fröſte durch ſchräg angelehnte Rohrdecken ſchützen. Manche ſonſt erfreuliche Sorten, wie etwa Nebelroſe und Schwarzrot, fallen als alte Pflanzen, beſonders bei nicht ganz freiem Stand, ein wenig um. In Italien, woſelbſt man in Gärten viel ſchöne Chryſanthemum pflegt, ſieht man oft lange wegbegleitende Reihen von Chryſanthemum an kleine naive Bambusſtabgerüſte angebunden, d. h. nicht an Gerüſte, ſondern an ganz einfache Geländer, eine Gepflogenheit, die aus Japan übernommen worden iſt.
Chryſanthemum überſteht italieniſche, trockene Sommer mit ganz ſeltener Waſſernachhilfe ausgezeichnet. In ſüdlichen Himmelsſtrichen, in denen 6 Wochen lang kein Regen gefallen war, ſahen wir im September Gartenchryſanthemum in üppigſter Entwicklung und zwar in Sorten, die dort erſt im Oktober-November ihre Blütezeit haben.
Das Verhalten der Chryſanthemum im Nordoſten Deutſchlands und im nördlichen Skandinavien iſt natürlich ſortenweiſe noch mit einigen Fragezeichen zu verſehen. Man wählt dort am beſten die frühblühenden Sorten meiner Liſte und die derbſten Sorten der erſten Oktoberhälfte.
Ein großer Reiz der Chryſanthemum iſt bekanntlich die Entſtehung von ſogenannten Sports. Einer Pflanze wird plötzlich ihre eigene Farbe langweilig, ſie bringt mit einem Male einige Blumen von ganz neuer Farbe in alter Form hervor. Aus ſolchen Sproſſen erzogene Pflanzen haben und behalten auch alle übrigen Eigenſchaften der Ausgangspflanze. Die alte Triomphante, die Ende Oktober, Anfang November roſa blüht, an Winterhärte gar nicht zu übertreffen iſt (was nicht hindert, daß ſie vor zwanzig Jahren noch als Gewächshauschryſanthemum durch den Winter gehätſchelt wurde) hat wohl die meiſten Sportvarianten entfaltet.
Zum gelben, »Gruſon« genannten Sport und zu der cremefarbenen »Herbſtkönigin« iſt neuerlich noch ein ſchneeweißer und ſchließlich der ſchönſte aller, ein braunroter Sport getreten. Die engliſche Sorte Burchfell hat ſich gleichfalls neuerlich einen braunen Sport geleiſtet. Zu den braunen Sports der unübertroffenen Züchtung Normandie ſind blaßgoldene unter dem Namen Princess Juliana getreten.
Unter allen kleinblumigen Chryſanthemum iſt wohl der von hier verbreitete Sport der alten Anaſtaſia, Herbſtbrokat getauft, einer der beſten. Einige 80 Centimeter hohe, voll ausgebaute Pflanzen in größerer Menge überraſchen täglich. Es iſt ſchwer zu ſchildern, was man immer wieder im Vorbeigehen an neuen, bisher kaum beachteten Farbenreizen, gerade bei dieſer Sorte beobachtet. Das Erlöſchen der Farben verblühter Blumen, die eigentümliche Farbenglut der im erſten Hochflor ſtehenden, das Durchflimmern blauroter Erinnerungen an die Urſprungsſorte beſchäftigen das Auge wochenlang.
Seitdem ich das letzte Mal hier über Chryſanthemum ſchrieb, ſind viele Einzelpflanzen neuerer Sorten, die damals erſt zwei, drei Jahre lang unberührt ſtanden, alt und groß geworden und haben ſich zu erſtaunlichen Büſchen ausgebaut, die man denn doch früher jenen Sorten kaum zutraute. Welch ein mächtiger Wachſer iſt Market White, die ſchöne weiße Oktoberſorte. Die Büſche ſind 1 Meter hoch und 1 Meter breit und wären mit etwas reichlicherer Bodenkraft oder alle paar Jahre nachhelfender Düngung leicht zu noch mächtigerem Wuchs zu bewegen geweſen. Auch die terrakottafarbene Garonne iſt jetzt nach fünf Jahren ein Prachtbuſch geworden. Es ſtellt ſich heraus, daß gerade die großen, ſpätblühenden Chryſanthemum die ſtärkſte Wachstumsenergie auch als alte Pflanzen entfalten. Die kleinblumigen Chryſanthemum verlangen auf die Dauer ſtärkere Nährkraft im Boden und freieren Stand. Auf beengtem Stand und etwas hungrigem Boden antworten manche kleinblumige Sorten mit zum Teil verkümmerten und kahlſtielig werdenden Trieben; ſolche Untugenden legen aber dieſelben Pflanzen bei etwas freundlicherer Plazierung und Behandlung im nächſten Jahre ab. Es ſcheint da noch eine Krankheit mitzuwirken, die gegen geſundes Wachstum nicht aufkommt. Manche kleinblumige Sorten gehen aber wieder ganz beſondere Wege und verhalten ſich durchaus immer nur gartenfreundlich. Fünf Jahre alte, unberührte Einzelpflanzen des Chryſanthemum Sonne waren 70 Centimeter hoch und 90 Centimeter breit. Schneidet man die verblühten Blumen mit ein paar Griffen ſämtlich weg, ſo folgt bei dieſer Sorte ein Nachflor durch lange Oktoberzeiten.
Vor Jahren fand ich in der Schweiz in Hunderten von Gärten das gleiche leuchtendrotbraune, meterhohe Chryſanthemum in Vollflor, das nirgends ſonſt verbreitet und keinem Chryſanthemumzüchter bekannt iſt. Es erweiſt ſich nun, daß die Knoſpenbildung dieſer Sorte auch hier in Norddeutſchland rechtzeitig genug einſetzt, um ſie noch gerade vor Toresſchluß in Blüte zu haben. Rufname iſt Spätherbſtfeuer.
Unter den tiefdunkelrotbraunen Chryſanthemum der Oktober-Novemberwende hatten ſich bisher als wirklich hart nur Ruby King und

Von den großen Nelkenkulturen, die der Deutſche C. Engelmann in Saffron Walden, England, geſchaffen hat und über die wir bereits im letzten Februarheft berichteten, zeigen wir im oberen Bild die roten Sorten Spectrum (links) und Gipsy (rechts). Das andere Bild veranſchaulicht einige moderne Züchtungen von Moll in Borgsdorf bei Berlin, die ſehr anſprechend ſind. – Bilder C. S.

Herbstrubin erwiesen, Herbstrubin jedoch kam in vielen Jahren zu spät und Ruby King zu früh im Oktober. Es fehlte für das Ende des Monats noch an einer brauchbaren Sorte dieser Farbe. Seit acht Beobachtungs-Jahren hat sich hier ein absolut hartes Gartenchrysanthemum bewährt, das die Vermehrungsmarke Schwarzrot trägt und sich in jeder Richtung als zuverlässig erwies. Es ist eine alte Lokalsorte, mit der die Werderschen Obstzüchter ihre Beete unter den Bäumen unterpflanzten. Die Züchter in Werder und in Vierlanden legen größten Wert auf die spätesten Gartenchrysanthemumsorten, die in Knospe durch viele Frostperioden gut hindurchkommen, um schließlich doch noch rechtzeitig gerade eben aufzublühen und manchmal auch lange Zeit ungestört tief in den November hinein zu blühen, nachdem die Knospenhülle sie sicher durch erhebliche Oktoberfröste getragen hatte. Jene Obstzüchter schneiden dann beim Eintritt ernsterer blumengefährdender Nachtfröste noch bei Laternenschein die halben Nächte durch Blumen, die sich in großen Wasserzobern im Schutz von Schuppen, Torwegen oder kleinen Kalthäusern 14 Tage lang entfalten und ihnen ebensoviel einbringen, wie im Frühling die hohen Straußprimeln.

An japanischen Maßstäben gemessen, stehen wir erst im Anfang der künstlerischen Verwendung des Gartenchrysanthemums in Gärten und in Gefäßen. Wenn man einmal versucht hat, japanischen Anregungen folgend, Chrysanthemum in lang geschnittenen, großen und linienreichen Zweigen so in rechten Gefäßen anzuordnen, daß die Zweige ihre volle Schönheit entfalten, so wird man diese Ausdrucksmöglichkeiten bei der Verwendung der großen Glashauschrysanthemum recht vermissen. Man wird dann auch gerade den Garten-Chrysanthemumsorten, die etwas fallenden, weichen und windungsreichen Wuchs haben, nicht böse sein können, sondern sie besonders gerne benutzen oder doch mitbenutzen.

Die Japaner pflanzen Chrysanthemum, zumal auch in einfachblumigen Sorten, in hunderterlei Gefäße, schienen die Zweige zu besonderen Liniengedichten, die im feinsten Einklang mit dem jeweiligen Gefäß stehen, und bringen damit Wirkungen hervor, vor denen wir uns eben so sehr als Chrysanthemumbarbaren vorkommen, wie vor ihren unregelmäßig gewölbten und umrissenen, flachem Wegboden aufgelagerten Chrysanthemumbeeten, in welchen die Pflanzen unregelmäßig vereinzelt und truppweise aus grünem Teppich hervorwachsen.

Es ist kein Zweifel, daß wir allmählich in ähnlich leidenschaftliche Tiefen der Beziehung zu dieser wunderbaren Blume hinaufwachsen werden, wie sie sich im Osten in Jahrhunderten und Jahrtausenden herausgebildet hat. Man möchte nun nachgerade allen auf sie gerichteten Bestrebungen etwas von dem Feuer und Eifer wünschen, mit dem die Rosen-, Dahlien- und Gladiolenzüchter am Werke sind.

Zur züchterischen weiteren Entfaltung der Gartenchrysanthemum-Welt wird es zweckmäßig sein, italienischen Gärtnereien, wie denen um Florenz, einmal unsere sämtlichen norderprobten Sorten zu schicken und dort Samen ernten zu lassen, der bei uns auch im Gewächshausschutz wohl selten zu gewinnen ist. Gleichzeitig müßte viel mehr Fühlung mit japanischen Gärtnereien genommen werden, was ja auch den Gewächshauschrysanthemum-Züchtern nicht schaden könnte; denn deren Zuchtarbeit hat sich in Europa auf einige wenige, ziemlich eintönige Linien festgelegt, die sich großenteils an den Geschmack der Neureichen zu wenden scheinen. Wie mag das eigentlich gekommen sein, daß die Vielartigkeit ostasiatischer Zuchtlinien allmählich so verlassen worden ist, nachdem wir ihre Fülle doch schon als Kinder in den achtziger Jahren des vorigen Jahrhunderts in den ersten großen Deutschen Chrysanthemum-Ausstellungen bewunderten!

Übersicht

Frühe, Hauptflor September

Braun, gelb, rotbraun

Chrysanthemum Altgold, 50 cm, goldbronce
— Champ d'or, 60 cm, gelb
— Sonne, 70 cm, gelb
— Zwergsonne, 40 cm, gelb
— Anastasia, 70 cm, lilarot
— Herbstbrokat, 70 cm, braun

Rosa und weiß

Chrysanthemum Lesquier, 80 cm, rosa
— Roseum, 50 cm, rosa
— September White, 60 cm, weiß
— Verbesserte Selby G., 40 cm, silberrosa
— White Croutts, 70 cm, weiß

Mittelspäte, Hauptflor Oktober

Braun, rot, rotbraun

Chr. Crimson Diana, 70 cm, rotbraungold
— Garonne, 80 cm, terrakotta
— Goldperle, 70 cm, goldbraun
— Mägdeblick, 50 cm, rotbraun
— Purpur, 60 cm, purpurrot
— Ruby King, 80 cm, rotbraun
— Spätgold, 80 cm, sumpfgoldbraun
— Kanaria, 70 cm, gelb
— Burchfell-Braun, 80 cm, braun
— Braune Normandie, 80 cm, goldbraun

Rosa und weiß

Chrysanthemum Burchfell, 90 cm, rosa
— Market White, 100 cm, weiß
— Normandie, 80 cm, rosa
— Prinzess Juliana, 80 cm, gelb

Späte, Ende Oktober–November

Braun, gelb, rotbraun

Chrysanthemum Rehauge, 100 cm, rehbraun
— Sonnenelfe, 80 cm, hellgelb
— Goldschopf, 100 cm, Goldbronceton
— Herbstkönigin, 100 cm, zart broncegelb
— Herbstrubin, 80 cm, rotbraun
— Novembersonne, 80 cm, gelb
— Gruson, 100 cm, gelb
— Triomphante-Braun, 100 cm, braun

Rosa, rot, weiß

Chrysanthemum Nebelrose, 90 cm, silberrosa
— Triomphante, 100 cm, Silberrosa
— — Weiß, 100 cm, weiß
— Weiße Nebelrose, 80 cm, weiß
— Schnee-Elfe, 80 cm, weiß

KARL WAGNER / VOGELSCHUTZ UND WINTERFÜTTERUNG

WER heute die Zahlen der Schädlingsbekämpfungsindustrie liest, ist wohl auf den ersten Blick hin geneigt, sich durch die Entwicklung, die dieser heute so notwendige Erwerbszweig gemacht hat, täuschen zu lassen. Denn hinter diesem Fortschritt der Bekämpfung des Schädlings durch chemische Mittel steht die Tatsache, daß die gegebenen Ausgleichsfaktoren im Haushalt der Natur, die Vögel, hier versagen; versagen, nicht durch eigene Schuld, sondern infolge der Kurzsichtigkeit des Menschen. Die Schäden, die die immer mehr fortschreitende Industrialisierung unseres Landes der Vogelwelt zufügt, sind noch gar nicht abzusehen, denn wir stehen erst vor den ersten Auswirkungen einer Landnutznießung, die unbekümmert um ethische Werte, nur materiellen Nutzen ziehen wollte. Unzählige Brutgelegenheiten fielen der rücksichtslosen Verkoppelung des Landes und der Bereinigung der Feldfluren zum Opfer. Ungezählte Vögel stürzen am Starkstromnetz unserer Überlandzentralen tagtäglich ab. Wer die Knicks in Holstein kennt, kennt auch ihre Bedeutung als Brutstätten für die Vogelwelt und weiß, wie gern diese niedrigen Gehölze von den Vögeln angenommen werden. Gerade dieses Unterholz ist so außerordentlich wichtig für die Vögel, da es einen leichten An- und Abflug gewährt und bei genügendem Schutz doch Luft und Sonne heranläßt. Auch der Forstwirtschaft kann der Vorwurf nicht erspart werden, daß sie lange Zeit den Aufgaben des Vogelschutzes verständnislos gegenübergestanden hat. Wenn heute in Forstkreisen dem rücksichtslosen Kahlschlag die Berechtigung abgesprochen wird, so ist zu hoffen, daß damit auch der Bedeutung der Vogelwelt mehr Rechnung getragen wird.

Wie bedeutend tatsächlich die Vogelwelt im Kampf gegen die Schädlinge ist, haben die exakten Versuche erwiesen, die Freiherr von Berlepsch auf Burg Seebach, Kreis Langensalza, in seinem Wald angestellt hat. Wir wissen heute, daß ein mit Vögeln durchsetzter Forst dem Eichenwickler, Kiefernspanner, Buchenspinner und andern nicht erliegt — 1921 blieb der Besitz des Freiherrn von Berlepsch verschont, während der umliegende, nicht mit Vögeln durchsetzte Wald durch den Buchenspinner verwüstet wurde. Wir wissen sogar, daß der Aktionsradius eines Vogels ungefähr 50 Meter beträgt. Diese Bedeutung des Vogelschutzes erkennen, heißt aber, die Vogelwelt mit allen Mitteln zu schützen, ihnen Brut- und Futtergelegenheiten zu geben. Und zwar nur solche, die erfahrungsgemäß von den Vögeln auch genommen werden; denn was man meist im Gebrauch sieht, richtet mehr Schaden als Nutzen an. Man wird kaum sehen, daß einer der vielen anzutreffenden rechteckigen Kästen angenommen ist. Die Vögel sind da im

allgemeinen, wenigstens soweit Höhlenbrüter in Betracht kommen, sehr scheu und werden in keine Höhle gehen, die ihnen nicht ihre Bedingungen gibt. Zu fordern ist, daß eine gute Höhle eine genügende Dicke hat, um Temperaturunterschiede abzuhalten, daß sie fest hängt und zwar so, daß das Flugloch in einem Winkel von 4 Grad nach oben verläuft (die Stellung des Loches an natürlichen Höhlen). Da das nicht immer leicht zu erreichen ist, nehme man lieber Höhlen mit seitlichem Flugloch. Man hat es hier auch meist mehr in der Hand, die Kästen so aufzuhängen, daß die Öffnung nach der der Wetterseite entgegengesetzten Seite zeigt.

Aber diese Nistfrage ist trotz aller Schwierigkeiten noch eher zu lösen in der Natur, als die Frage der Winterfütterung. Solange der Boden noch offen ist, solange unter dem Laube noch Futter geholt und die Rinde der Bäume auf Raupen, Eier untersucht werden kann, ist die Not nicht so groß. Wenn aber die Nächte länger und kühler werden, wenn Schnee und Eis den Boden bedecken, dann beginnt ein stiller Kampf der Vögel um ihre Existenz. Dann muß die Fürsorge des Menschen einsetzen und den Vögeln helfen, über diese nahrungsarme Zeit hinwegzukommen. Meist muß man aber feststellen, daß wohl im Sommer gefüttert, aber im Winter die Reichung von Fütter unterlassen wird. Die Sommerfütterung ist durchaus gut, da sie die Vögel sich an den Platz gewöhnen läßt, aber sie nützt nichts, wenn ihr nicht die Sorge während des Winters folgt. Denn die kalte Jahreszeit bringt die enormen Verluste der Vogelwelt mit sich, eine Erscheinung, die wohl im Haushalt der Natur durch die große Fruchtbarkeit der Vögel wieder ausgeglichen wird, die aber gemildert werden kann, wenn wir den Vögeln die Nahrungsbeschaffung erleichtern.

Die wichtigste Forderung der Winterfütterung ist die, das Futter so zu reichen, daß es gegen Regen und Zersetzung geschützt ist. Darum verbieten sich die beliebten Futterhölzer, die man so oft an den Fenstern angebracht sieht, ganz von selbst, wenn sie nicht im Winter mehrmals am Tage nachgesehen und eventuell erneuert werden. Am besten sind solche Futterstätten, die durch ein Dach geschützt sind. Vorzüglich bewährt hat sich die Futterglocke, bei der die Körner in einem großen Glasbehälter sich befinden, der unten in einen Teller mit aufgeklapptem Rand mündet. Die Vögel können vom Rand des Tellers aus das Futter fressen und von oben rutschen soviel Körner mit nach, bis der Teller wieder bedeckt ist. Die Glocke arbeitet also selbsttätig und braucht daher nicht so oft nachgesehen zu werden. Als Futter empfiehlt es sich, Hanfsamen zu nehmen.

Im Walde wird man meist mit dem Futterhaus arbeiten, einer durch ein Dach geschützten, von allen Seiten offenen Futterstelle, die gern und ohne Mißtrauen von den Vögeln besucht wird. Man bringe aber trotzdem noch ein kleines Brettchen an, auf dem trockener Hanfsamen für die Anlockung der Vögel sorgt.

Auch der sogenannte Futterbaum ist im Wald durchaus zu gebrauchen, soweit er so aufgestellt wird, daß Schnee nicht auf dem Futter liegen bleibt. Man übergießt hier einen Nadelbaum mit einer Futtermischung, die von insekten- und körnerfressenden Vögeln angenommen wird. Freiherr von Berlepsch gibt auf Grund seiner praktischen Erfahrung folgende Mischung an: 150 Gramm getrocknetes gemahlenes Weißbrot, 100 Gramm getrocknetes gemahlenes Fleisch, 200 Gramm Hanf, 100 Gramm gebrochenen Hanf, 100 Gramm Mohn, 50 Gramm Mohnmehl, 100 Gramm weiße Hirse, 50 Gramm Hafer, 50 Gramm getrocknete Holunderbeeren, 50 Gramm Ameisenpuppen. Diese 1000 Gramm Trockenfutter gibt man zusammen mit etwa 1400 Gramm Rinder- oder Hammeltalg und schüttet das Ganze heißflüssig über den Baum. Man braucht sich durchaus nicht genau an dies Rezept zu halten, nur muß beachtet werden, daß der Hanf einen Hauptbestandteil des Futters bildet.

Von den Körnern werden besonders die ölhaltigen gern genommen, vor allem Hanf, ganz oder gebrochen, Sonnenblumenkerne, Nußstückchen, Kürbis- und Gurkenkerne, Mohn, den man auch in gemahlenem Zustande reichen kann, Hafer, weiße Hirse. Die Fütterung mit Rübsamen unterlasse man lieber, da der Same nicht gern von allen Vögeln gefressen wird. Fetthaltige Stoffe gebe man möglichst in kleinen Stücken, so Talg, Speck, Fett, Überreste von gebratenem und gekochtem Fleisch, Ameisenpuppen, Mehlwürmer, selbst ganze Kadaver von Tieren sind gut zu verwenden. Man häute die Tiere vorher ab und schneide sie der Länge nach auf. Die Körper müssen aber so aufgehängt sein, daß sie gegen Regen und Schnee geschützt sind.

Brot allein gereicht, ist auf jeden Fall zu vermeiden, da es durch die Feuchtigkeit zu leicht säuert und von großem Schaden für die Vögel sein kann.

Es bleibt noch die wichtige Frage offen, wann gefüttert werden soll. Bekanntlich haben die Vögel einen raschen Stoffwechsel, der den Magen sehr schnell entleert. Während der Nacht nehmen die Tiere aber naturgemäß keine Nahrung auf. Finden sie nun am Morgen durch Schnee und Eis nicht gleich genügend Nahrung, so widersteht der durch die Nacht geschwächte Körper der Kälte nicht und die Tiere gehen ein. Gerade nach Nächten mit starkem Schneefall findet man so oft aufgepumpte Tiere, die kaum noch Flugversuche machen und meist eingehen durch die Schwächung des Hungers. Kommt der Vogel aber über die ersten Wintermorgenstunden hinweg, so ist er für den Tag gerettet. Darum hat eine erfolgreiche Winterfütterung unbedingt am frühen Morgen einzusetzen und zwar mit Futter, das jeden Tag frisch gestreut wird.

Wie rasch der Stoffwechsel der Vögel ist, das heißt, welche Mengen von Nahrung ein Vogel zu sich nehmen kann, lehren Fütterungsversuche, die Professor Röhrig angestellt hat. Danach beträgt die tägliche Nahrungsmenge bei den kleinsten Vögeln (Zaunkönig, Goldhähnchen, Schwanzmeise) 30 Prozent ihres Lebendgewichtes, bei Blaumeisen, Rotschwänzchen 20 bis 24 Prozent, bei Drosseln 10 bis 12 Prozent.

Bei einem Versuch, der mit 3 Sumpf-, 1 Tannen-, 1 Schwanzmeise und 2 Goldhähnchen mit einem Gesamtgewicht von nur 65 Gramm durchgeführt wurde, ergab sich ein täglicher Verbrauch von durchschnittlich 1876 Raupen des Kiefernspanners im Gesamtgewicht von 97,55 Gramm. Diese Zahlen gestatten einen interessanten Einblick in die Biologie des Waldes, sie sind aber auch eine ernste Mahnung für uns, die Gefahren für die Vogelwelt zu erkennen und durch genügende Fürsorge das Massensterben der Vögel im Winter zu verhindern.

C. SCHNEIDER / DRESDENS GARTENSCHAU: EIN RÜCKBLICK

VERSCHWUNDEN ist das Farbenpanorama des riesengroßen Rosengartens, verrauscht sind die Farbenwogen der Einjahrsblumenfelder und der Dahlienflächen. Der Garten zum blauen Rittersporn, der im Herbst noch einmal im Golde der Rudbeckien geschwelgt hatte, das vom letzten Blau der Delpinien durchzittert war, ist nicht mehr zu finden. Der grüne Dom, von dessen Höhe so manches durstige Auge sich an der Blumen lebendiger Farbe satt getrunken hatte, er steht nicht mehr. Das Farbenfeuer, das geschickte Hände auf grüne Parkwiesen gezaubert, ist ausgelöscht. Wenn der Große Garten aus seiner Winterruhe erwacht, wird der junge saftige Rasen nicht mehr ahnen lassen, daß hier monatelang Hundertausende sich an einem Blumenleben erfreuten, wie es in dieser Form bisher noch kaum auf einer Gartenschau gezeigt worden ist. Die eifrigen Bestrebungen ihrer Gestalter haben in den Herzen der Blumenfreunde stärksten Widerhall gefunden. Trotz des Wetters reichlicher Ungunst konnte die Schau finanziell befriedigend abschließen. Das ist ein Ergebnis, das wir mit Freude begrüßen müssen. Es ist beredtes Zeichen dafür, wie blumenhungrig die Massen heute sind, aber auch dafür, welch günstiger Platz gerade Dresden für eine solche große Blumenschau ist. Ihr Erfolg ist in erster Linie der sächsischen Gärtnerschaft zu danken. Das weitere Deutschland konnte nur einige, zum Teil wohl wichtige Ergänzungen bieten, der eigentliche Ausbau fiel aber den Gärtnereien zu, die in Dresden und in dessen Nähe liegen. Kaum noch eine andere Stadt Deutschlands, mit Ausnahme etwa von Hamburg und vielleicht von Frankfurt am Main, kann solch ein Unternehmen mit gleichem Erfolg durchführen. Somit reiht sich diese Schau den früheren Dresdener Gartenbau-Ausstellungen würdig an.

Wir haben bereits in unserer ersten Betrachtung hervorgehoben, daß das Kennzeichen dieser letzten Gartenschau darin bestand, daß hier zum ersten Male einem Gartengestalter Gelegenheit gegeben war, in großzügiger Weise sich zu betätigen und der Ausstellung den Stempel seiner künstlerischen Persönlichkeit aufzudrücken. Dies ist durch *Gustav Allinger* geschehen. Er hat es verstanden, sich trotz so mancher Hemmungen, die naturgemäß jede Ausstellung bietet, durchzusetzen und zu zeigen, was ein zielbewußter Wille vermag. Neben Allinger treten die anderen Gestalter, die sich subjektiv betätigt haben, zurück. Als Künstler von Rang haben sich neben ihm nur *Josef Wentzler*, der Erbauer des Grünen Domes, *Heinrich Tessenow*, und *Heinz Wichmann* bewiesen, wenn wir von *Poelzigs* Brunnen und den Werken verschiedener Bildhauer absehen. Es liegt uns jedoch heute fern, alle Einzelheiten kritisch zu beleuchten. Wir wollen in unserem Rückblick

vor allem auf das hinweisen, was auf dieser langen umfassenden Gartenschau unserer Meinung nach noch fehlte. Wir wollen ferner andeuten, inwieweit gewiße Tatsachen künftigen Gestaltern solcher Ausstellungen als Lehre oder Warnung dienen mögen. Es sei nochmals betont, daß schon der Umstand, daß ein Gartenkünstler sich einmal in dieser Weise ausleben konnte, für die Geschichte nicht nur der deutschen, sondern aller Gartenbau-Ausstellungen sehr wichtig ist. In Allinger ist die Wahl auf einen noch jungen Gestalter gefallen, der auf dem Gebiete des Ausstellungswesens keine wesentlichen Erfahrungen besaß und daher mit einer gewißen Keckheit an viele Probleme heranging, wie es ein mit der Materie stark Vertrauter kaum gewagt hätte. Diese Kühnheit Allingers hatte ihre Vorzüge, hatte aber auch ihre Nachteile im Gefolge. Wir dürfen aber bei einer Kritik des Gesamtorganismus der Dresdener Schau nicht vergessen, daß sich einer großzügigen Gestaltung von vornherein im Gelände schwere, unüberwindbare Hindernisse in den Weg legten. Darauf haben wir bereits hingewiesen (Seite 113). Können wir doch nur dann dem, was trotzdem geleistet wurde, gerecht werden, wenn wir uns dieser Schwierigkeiten bewußt bleiben.

Auf diesem Ausschnitt aus dem Kommenden Garten zeigt sich deutlich der wohltuende Einfluß plastischen Schmuckes im kleinen Garten. Die Bronze steht gut zu den schönen gelben Tönen des Travertingesteins.

Das Dresdener Gelände erscheint uns keineswegs geeignet, indem der Große Garten, so günstig für Einzelheiten seine Baumgruppen auch wirken mochten, doch die ganze Schau zerriß; unter anderen Verhältnissen wird es also möglich sein, einen wenn auch kleineren, doch viel organischer aufgebauten Gesamtausstellungskörper zu schaffen. Vor allem fehlt in Dresden eine moderne Ausstellungshalle, die das Ausstellungsgelände in der richtige Weise beherrscht. So mußte im Grünen Dom ein künstlicher Mittelpunkt für die Hauptschau im Freien geschaffen werden.

An und für sich halten wir das Turmmotiv — der Ausdruck Dom ist zwar klangvoller, aber etwas irreführend — für sehr gut. Es allein ermöglichte die Schaffung von Farbenflächen, die ja nur von oben gesehen recht in Erscheinung treten können. Und auf Farbenflächen waren die Hauptsichten, der Riesengroße Rosengarten, der Garten zum Blauen Rittersporn mit den anschließenden Dahlienfeldern und Einjahrsblumenflächen eingestellt.

Man kann nun mit Recht fragen: ist es gelungen, diese Farbenflächen in der Weise und für die Dauer hervorzurufen, die dem Gestalter doch vorgeschwebt haben muß? Er hatte sozusagen hierbei alles auf eine Karte gesetzt. Haben seine Trümpfe, die Rosen, Rittersporne, Dahlien und Einjahrblumen, ihn das Spiel mit Erfolg gewinnen laßen? Man muß wohl sagen, daß hier die unberechenbare Macht der Witterung, der der Mensch noch machtlos gegenübersteht, zum großen Teil sein Wollen vereitelt hat. Es gab wohl kurze Zeiten, in denen man ahnen konnte, was dem Gestalter vorschwebte. Der berauschende *Dauerklang* aber trat nicht ein.

Da muß man sich fragen: darf ein Gestalter ein so gewagtes Spiel spielen? Muß er sich nicht in stärkerer Weise gegen Witterungseinflüsse und andere Mächte sichern, die so leicht die erstrebte und notwendige Wirkung beeinträchtigen, wenn nicht vereiteln können? Wir möchten künftigen Gestaltern raten, dies zu tun. Denn wird der gewollte Gesamteindruck nicht erreicht, so versteht der Beschauer nicht, warum alles so komponiert war. Er sieht zuviel Leere und Flachheit und empfindet die Gesamtlösung deshalb als ungenügend.

Der riesengroße Rosengarten mußte eben seiner Größe halber versagen, so lange nicht die Farbenflächen ihn mit dem unbedingt nötigen Leben erfüllten. Ein teilweises Auf- und Abwogen farbiger Rosenwellen genügte hier nicht. Und selbst wenn bei dem Hauptflor im Juni-Juli der ganze Garten durch Wochen in Rosenflammen gestanden hätte und wenn ein guter Spätflor einen vollen Nachklang im September gebracht hätte, zuviele Wochen mußte ein solcher rein auf die Rose gestellter Garten doch klanglos daliegen. Hier hätte also eine belebtere Gliederung Platz greifen müssen. Andere Blumen mußten eingeschaltet werden, Immergrüne und Steinplastik mußten hinzutreten, das allzukahle und niedrige, zu nüchterne Rahmenwerk der Fassung mußte verstärkt und belebt werden. So wie es war, wirkte das Ganze am besten des Nachts, wenn nur die Lichtlinien ihre einfachen Formen ins Dunkel zeichneten.

Wie schon ein wenig Terrassierung und Plastik solche Anlage ungemein fördert, zeigte der Teil vor dem Eichenhofe. Das Stück von hier bis zum Grünen Dom war ohne die Rosenfarben zu eintönig. Vor dem Rosenhofe half die Fontäne aus der Verlegenheit. Selbstverständlich hätte eine reichere Gliederung des Riesengroßen Rosengartens die Kosten erhöht, doch er bildete ja das entscheidende Schmuckstück der Ausstellung. Auch die Behandlung des Gartens zum Blauen Rittersporn, der in seiner Grundlösung so ansprechend war, hätte pflanzlich und in der Plastik anders sein können. Der Versuch mit den Delphinien war jedenfalls gewagt. Die beste Wirkung kam erst mit den Rudbeckien zustande. Die Behandlung der mittleren Fläche hätte man sich auch wirksamer denken können. Zu große Einfachheit verflacht leicht. Die Rahmung dieses Teils durch die Stauden war auch nicht ausreichend. Die Angliederung der Einjahrblumenflächen und Dahlienfelder war zusehr durch die sich ergebenden Raumverhältniße zwischen den Baumgruppen und dem Rosengarten und Rittersporngarten bedingt. Es kam keine Einheit zustande. Daß die Einjahrsblumen zum mindestens der ersten Pflanzung versagten, war ja leider zumeist dem Wetter zuzuschreiben. Aber hier, wie noch mehr bei der Dahlienwahl und Pflanzung, hätten bewährte Fachleute den Gestalter ganz anders unterstützen müssen. Lehrt doch überhaupt die Dresdener Schau, daß ein mit dem Pflanzstoff sehr erfahrener, das Kulturelle beherrschender Fachmann dem künstlerischen Leiter zur Seite treten muß. Unter Umständen müssen es mehrere Fachleute sein. So etwas fehlte in Dresden anscheinend. Natürlich muß ein solcher Praktiker von vornherein mit dem für die Gesamtgestaltnng verantwortlichen Künstler eng zusammen arbeiten. Er muß sich in dessen Gedankengänge einzufühlen verstehen und ihm im einzelnen bei der Auswahl des Werkstoffes genau beraten. Durch eine andere Wahl vieler Dahliensorten hätten ganz andere Wirkungen erreicht werden können. Erwiesen sich doch gewiße, wie etwa Skagerak oder Andreas Hofer, als ungeeignet für *diesen* Zweck. Hier durften nur Sorten gewählt werden, die gut gefärbte Blumen frei über dem Laube zur Schau bringen, wie es beispielsweise von den verwendeten

Zu kurz nur erklang die Farbensymphonie im Garten zum Blauen Rittersporn. Grundriß und die Art der Pflanzung boten gleicherweise Anregung zu ähnlichen Versuchen in großen Gärten und öffentlichen Anlagen der Städte. Bild Walther.

Gartengestalter von Dresden und Umgebung auf dieser Schau ihr Können zeigen wollten. Dadurch entstand aber ein Sonderglied der Ausstellung, daß diese noch uneinheitlicher machte. Man hätte sich hier besser noch bestimmte Aufgaben stellen sollen, nicht ebenfalls das Motiv Rosengarten in neuen Abwandlungen bringen dürfen. Es ist ja versucht worden, hier Stauden und Obst mit zu verwerten. Aber zur Darstellung eines guten und vielseitigen Hausgartens ist es ebenso wenig gekommen, wie zur Darbietung guter Steingartenstücke und vor allem vorbildlicher Staudenpflanzungen. Außerdem fehlte ein immergrüner Garten ganz und gar. Wir denken dabei an immergrüne Laubgehölze, die selbst in den Rhododendren nur ungenügend vertreten waren. Auch die für den kleinen und mittleren Garten wichtigen Nadelhölzer waren nicht in rechter Weise zur Schau gestellt. Einjahrsblumen wurden in ihrer Wirkung im Garten so gut wie nicht gezeigt, und auch die Gruppenpflanzen, wie Begonien, Pelargonien, Heliotrop, Salvien kamen gartenmäßig nur in untergeordneter Weise in Verwendung.

Dagegen bildete die große und in gewisser Weise auch die kleine Schmuckanlage beim Haupteingang von der Lennéstraße vom Früh-

Dahlien die gelbe Pirol und die roten Mutterliebe oder Glut tun. Kann man mithin die so großzügig geplanten Schaugärten, die axial zum Turme lagen, nicht als völlig befriedigend bezeichnen, so hat Allinger doch in den kleinen Rosengärten und im Kommenden Garten sehr Beachtenswertes geschaffen. Ebenso im Eichenhofe. Den Kommenden Garten muß man sich freilich in engster Verbindung mit dem Hause eines liebevollen, verständigen Pflanzenfreundes denken. Er ist schon seines kostspieligen Pflanzenreichtums halber kein Gartentyp für viele; insofern kann die Bezeichnung Kommender Garten als unzutreffend erscheinen, wenn sie auch für eine Ausstellung als Schlagwort sehr gut und einprägsam klingt. Ausstellungen können ja auch nichts Vollendetes zeigen, sollen aber Anregungen in Hülle und Fülle geben! Und das hätte die Dresdener Schau in den Freianlagen — von den Sonderdarbietungen in den Hallen soll hier nicht die Rede sein — in noch höherem Maße tun können. Dazu wäre aber wohl nötig gewesen, daß auch der Teil zwischen der Herkulesallee und der Hauptallee (Plan Seite 114), in dem von verschiedener Seite geschaffenen Sondergärten sich etwas unharmonisch aneinander reihten, von Allinger mit bestimmten Zielen durchgestaltet worden wäre. Allerdings kann man verstehen, daß neben Allinger auch die

Pölzigs Mosaikbrunnen ist gleich wirkungsvoll in seiner Form wie in der wundervollen Färbung. Er bot von verschiedenen Seiten einen ganz prachtvollen Blickpunkt. - Bild C. S.

Die geſchickte Gliederung des Waſſerbeckens im Kommenden Garten tritt hier gut in Erſcheinung. Die Putte im Vordergrund trägt ſehr zur Belebung der Szenerie bei, deren Mannigfaltigkeit ohnedies erſtaunlich iſt.

jahr bis zum letzten Ausſtellungstage ein ſehr erfreuliches und farbenprächtiges Glied der Gartenſchau. Hier konnte man ſehen, wie keck man bei Farbenpaarungen ſein darf. Ein augenblendendes glühendes Leuchten ging oft darüber hin. Es war ein treffliches und in vieler Hinſicht vorbildliches Studienobjekt für die Leiter ſtädtiſcher Anlagen und größerer Privatgärten. Wer in die Ausſtellung trat und ſie verließ, ſein erſtes und letztes war ein Blick auf eine Symphonie von Farben, die immer erregte, mochte man ihre Melodien mitfühlend oder ablehnend empfinden.

Sehr wichtig wäre es unſeres Erachtens auf einer ſo groß angelegten Gartenſchau geweſen, ein gutes Haus mit dem dazu paſſenden Garten zu zeigen. Solche Anlagen, wie der ſogenannte Hausgarten am Ingolſtädter Haus, können nicht mitgezählt werden. Es hätte ein Haus zum Kommenden Garten gehört, um den Organismus Haus und Garten voll zu verſinnbildlichen.

Ferner hätte der moderne Gewächshausbau ganz anders in Erſcheinung treten müſſen. Es genügt nicht, wenn im äußerſten Winkel einer ſolchen Ausſtellung ein paar Glashaustypen verſtreut liegen. Konnte man nicht eine große moderne Glashausgärtnerei aufbauen, ſo hätte mindeſtens ein zeitgemäßer Wintergarten gezeigt werden können. Möge unſern Gewächshausfirmen der Wintergartentyp von Peter Behrens ⟨Band V, Seite 21⟩ einige Anregung geben. Etwas ähnliches hätte zu einem Zugſtück der Dresdener Schau werden können, und hätte Gelegenheit geboten, beſonders ſchöne Glashauspflanzen in reichem Wechſel im Laufe der Monate vorzuführen.

Die heute volkswirtſchaftlich ſo wichtigen Siedlungs- und Schrebergartenprobleme müſſen für ſich auf Ausſtellungen behandelt werden. Dresden gab darin noch einige hübſche Anregungen, wie auch im Schulgarten. Das gleiche gilt vom Friedhofsproblem.

Faſſen wir aber alles in allem zuſammen, ſo kann der deutſche Gartenbau auf die Dresdener Bekundung ſeines heutigen Standes mit Befriedigung zurückblicken. Freilich nicht in dem Sinne, daß kulturell ein Höhepunkt erreicht wurde oder daß künſtleriſch ſchon das letzte Wort geſprochen ſei. Die Bedeutung dieſer Ausſtellung liegt darin, daß ſie trotz der wirtſchaftlich kataſtrophalen Zeiten im Gartenbau Lebensmut und Arbeitsfreudigkeit zeigte; daß ſie ferner lehrte, wie künftig keine ſolche Ausſtellung mehr ohne Gartenkünſtler ſein darf, dem aber ein Fachbeirat zur Seite ſteht.

Möge Dresden den Anfang einer neuen Entwicklung des Ausſtellungsweſens beim Wiederaufſtieg des Gartenbaus bedeuten.

Im Garten der Roſenfreundin hat die Linienführung etwas Ueberraſchendes. Bilder C. S.

Abutilon

DIE Samtpappeln, Abutilon, unserer Kalthäuser und Wohnzimmer stammen wohl von dem brasilianischen A. striatum und von A. pictum aus Guatemala ab. Die oben gezeigten Formen aus den Kulturen von E. Benary in Erfurt gehen als A. hybridum maximum und treten in weißen, roten und gelben Farbentönen auf. Sie lassen sich leicht aus Samen heranziehen und blühen dann schon sechs bis sieben Monate nach der Aussaat. Man kann besonders schöne Sorten auch im Frühling durch Stecklinge aus Zweigspitzen vermehren. Im Winter hält man die Pflanzen im Kalthause oder im kühlen hellen, möglichst sonnigen Zimmer. Auch hier blühen sie oft noch lange, zumal zwischen 10 und 12 Grad Celsius. Im Sommer kann man sie im Garten auspflanzen. — Bilder Bissinger.

Hibiscus

ANDERS verhält es sich mit dem unten dargestellten Eibisch aus China, Hibiscus Rosa-sinensis, der warme Räume liebt. Auch er ist ein Malvengewächs, wie seine wundervollen großen Blüten anzeigen, die vom zartesten Rosa zum sattesten Feuerrot wechseln können. Er ist für tropische Gärten eine sehr bezeichnende Pflanze, wir aber können ihn nur im warmen Wintergarten oder warmen Zimmer halten. Hier bleibt er allerdings im Wuchs und im Blütenreichtum recht zurück. Im großen Warmhause jedoch kommt er gut zur Geltung und überrascht durch seine so intensiv gefärbten Blumen. In der Kultur haben sich allerlei schöne Formen herausgebildet, gefüllte und auch solche in gelben oder orange Tönen. Der Wuchs ist etwas sparrig, die Pflanze braucht daher Raum. — Bild C. S.

OSCAR REUTHER / INDISCHE GARTENKUNST II

NUR wenige erhaltene Gärten beruhen nicht auf dem Vierungsſchema und ſind nach *einer* Hauptachſe angelegt. Dazu gehören insbeſondere die ſchönen Anlagen der Kaiſer Dſchehangir und Schah Dſchehan in Kaſchmir, deſſen kühles Klima der Hof während der unerträglichen Hitze des indiſchen Frühſommers aufzuſuchen pflegte. Am Ufer des Dalſees liegen in der Nachbarſchaft von Srinagar der Schalimar Bagh und nicht weit davon der Niſchat Bagh, beide dem Gelände entſprechend Terraſſengärten, bei deren Anlage die herrliche Berglandſchaft des Dſchhelumtales mit ſeinen Seen und Bergrieſen in Rechnung geſtellt wurde, während die Gärten der Ebenen Hindoſtans, von hohen Mauern umſchloſſen, außer Zuſammenhang der umgebenden Landſchaft ſtehen. Verwandt in ſeiner Anlage iſt der ebenfalls aus Dſchehangirs Zeit ſtammende Atſchibal Bagh, der wie die beiden anderen von den Maharadſchas von Kaſchmir gut inſtand gehalten wird. Dem abfallenden Gelände entſprechend liegen die Gartenterraſſen in der Längsachſe aneinandergereiht, verbunden durch die Folge von Kanälen und Becken, die das Waſſer eines Gebirgsbaches über Kaskaden längs durch die Mitte des ganzen Gartens leiten. Das Tſchehar Bogh=Schema kommt durch die Betonen einer Hauptachſe nicht zum Ausdruck, wenn es auch wieder für Teile des Gartens die Grundlage gibt. Aber das Planbild iſt ſtets aus dem rechten Winkel geſtaltet. Auch in dieſen Gärten gibt es nie Diagonalen und ebenſowenig im Rund geführte Linien. Dieſe ſtrenge Gebundenheit iſt wohl einer der weſentlichen neuen Züge, die mit Baber in die Gartenkunſt Indiens gekommen ſind, und es iſt ohne Zweifel das, was er meint, wenn er verächtlich ſchreibt, die Inder verſtänden nichts von Gartenplanung. Fremd war dem Inder der Grundſatz der Gegengleichheit in ſeiner Architektur nicht, aber erſt das perſiſche Ideal, wie es ſeit dem Auftreten der Moguln die Oberhand gewinnt, macht Symmetrie und Achſe zu den Herrſcherinnen des Planbildes in Bau- und Gartenkunſt. So ſteht die Architektur mit dem Garten in engſter Verbindung und bildet mit ihm ein Ganzes. Die Kreuzwege machen das beſonders augenfällig und erſt recht die glitzernden Waſſerbahnen der Kanäle, die als verknüpfende Bänder oft durch die Mitten der Gartenhallen hindurchgelegt ſind. Waſſer, kühles klares Waſſer, nach dem die Sinne im unerträglichen Glaſt eines indiſchen Frühſommertags lechzen, macht auch den Garten der Mogulzeit erſt zu dem, was er ſein ſoll. Aber nur in Kaſchmir konnte der Gartenkünſtler ganze Gebirgsbäche durch ſeine Terraſſengärten leiten. In Indien ſelbſt war er auf Brunnen und Stauwaſſer angewieſen, das mit primitiven Hebewerken bis zur Höhe des Gartens gehoben werden mußte. So war er gezwungen, mit dem Waſſer haushälteriſch umzugehen. Es ſollte im Garten nicht nur die Sinne erfreuen, Auge und Ohr den Eindruck des Kühlen und Friſchen geben, es ſollte auch durch die Verdunſtung wirklich die Luft kühlen. Es mußte aber außerdem während der Trockenzeit die Pflanzen des Gartens am Leben halten. Zu letzterem Zweck liegen deſſen Pflanzflächen tief, unter den Wegen und Kanälen, da der Orientale ſeine Beete nicht begießt, ſondern das Waſſer darüberleitet. Um das Waſſer zur Wirkung für das Auge zu bringen und eine möglichſt große Verdunſtungsfläche zu erzielen, wird es zwiſchen den Wegen in breiten, meiſt ganz flachen Kanalbetten geführt, deren, von glatten Steinwänden gefaßte plattenbelegte Sohle oft wellenartig gerippt iſt, um eine leiſe bewegte Oberfläche zu erzeugen. Es liegt auch gar nicht im Weſen dieſer Kunſt, mit rauſchenden Waſſermaſſen zu wirken wie etwa das Barock. In dünnen Strahlen ſteigt das Waſſer in vielen Springbrunnen hoch, fällt über die Waſſertreppen herab, die den Höhenunterſchied zwiſchen den Tſchabutras, Kanälen und einzelnen Waſſerbecken nutzbar machen und in deren zierliche Niſchen hinter dem dünnen Waſſerſchleier man abends Lämpchen aufſtellte. Leiſes Rieſeln und Plätſchern, klingender Tropfenfall iſt die Muſik des Waſſers in den Gärten, deren Bauwerke ebenfalls zierlicher koſtbarer Schmuck ſind. Alles Streben nach dem Großen und Machtvollen liegt dem Architekten fern, auch wenn er ſeinem Herrſcher im Palaſtgarten einen Thronſaal oder ihm ein gartenumſchloſſenes Mauſoleum baut.

Die Einführung bewegten Waſſers ſcheint eine weitere Neuheit geweſen zu ſein, die mit den Großmoguln in die indiſche Gartenkunſt kam. Der Hauptfehler der Gärten Hindoſtans, ſo ſchreibt Baber, ſei, daß ſie keine künſtlichen Waſſerläufe hätten. Der alte indiſche Garten hatte offenbar nur ſtehende Waſſerflächen, und auch in der neueren Gartenkunſt ſcheint es, daß die Freude am ruhigen Spiegel des Teiches oder Sees, an deſſen Ufer die Gärten liegen oder auf denen ſie zu ſchwimmen ſcheinen wie die Inſelgärten im Pitſcholaſee bei Udaipur, recht eigentlich indiſch iſt. Das klare Waſſer, das murmelnd und plätſchernd ſeine Bahn durch die flachen Kanäle zieht, die Waſſertreppen hinabrieſelt und in Springbrunnen aufſteigt, gehört zum perſiſch-türkiſchen Ideal der Gartenſtimmung. Den aus den Bergen Afghaniſtans kommenden neuen Herren Indiens ſollte es die Sehnſucht nach ihren Gebirgsbächen ſtillen, die im Frühling in ſteinigem Bett durch blumige Talmatten fließen.

Niſchat Bagh in Kaſchmir

Niſchenkaskade und Becken vor dem Rang Mahal zu Delhi

Garten des 18. Jahrhunderts (rechts), und Dachgarten (links) Miniaturen

Damit hängt nun das Dritte zuſammen, was die Türken dem Garten in Indien gaben: ihre Blumen. Die indiſchen Blütenbäume und Sträucher waren ihnen fremd, ſo ſehr ſie dieſelben auch anſtaunten. Sie wollten die Blumen ihrer Heimat im Garten ſehen und das waren außer Roſen, Anemonen, Mohn und anderen vor allem Liliengewächſe, wie ſie in den Berg- und Steppenländern Inneraſiens und Perſiens wachſen, Narziſſen, Kaiſerkronen, Affodill, Hyazinthen, Schwertlilien und vor allem Tulpen. Die Tulpenmode, die in Europa im ausgehenden 16. Jahrhundert die Gartenfreunde in ihren Bann zog, kam ja aus der Türkei. Blumennarren aber waren als echte Türken auch die Großmoguln und ihr Stammherr Baber, der, wie er in ſeinen köſtlichen Erinnerungen erzählt, auf ermüdendem Marſch durch feindliches Land aus dem Sattel ſteigt, um die Zwiebel einer ſchönen wilden Tulpenart auszugraben, die er in ſeinen Gärten in Kabul kultivieren will. So hält das Blumenbeet ſeinen Einzug in den Garten, zu geometriſchen Muſtern aufgeteilt, die ſich wie große Teppiche zwiſchen die oft einen Meter höheren Rahmen der Wege und Kanäle einbetten. Man ſah von den Wegen und den noch höheren Plattformen von oben auf die Blumenflächen. Es iſt alſo, und das iſt bemerkenswert, der Garten auf Raumwirkung angelegt, auf ein Hineinſehen in eingetiefte Räume, nicht auf ein Darüberhinwegſehen. Wir erkennen heute dieſen Grundſatz, den ja auch der antike Gartenkünſtler befolgte, wieder als richtig an. Bei der Verteilung der Blumen legte man Wert darauf, daß gleiche Farben und Sorten einander genau entſprachen, alſo — im Unterſchied zum Garten der Renaiſſance in Deutſchland etwa — ein Streben auf Geſamtwirkung, wenn auch die Liebe zur Einzelpflanze ſich in Wort und Bild genügſam äußert. Es waren auch wohl ganze Gärten einer einzigen Blume gewidmet. So gab es in Lahor einen Gulabi Bagh, einen Roſengarten, und in Kabul hatte Baber einen Veilchengarten. Auch der Baumbeſtand des Gartens ändert und bereichert ſich. Zwar behalten die einheimiſchen Bäume und Sträucher ihr Recht, und Baber, der ſich rühmt, die neue Gartenkunſt in Indien eingeführt zu haben, begeiſtert ſich an der Schönheit des blühenden Asoka und des Arghwanbaumes (Bauhinia variegata), am majeſtätiſchen Wuchs des Mango, an der Blütenpracht des indiſchen Oleanders und Jasmin, deſſen Duft den des perſiſchen übertreffe. Neu iſt aber der Charakterbaum des perſiſchen Gartens, die Cypreſſe, und in den Gärten Kaſchmirs pflanzen die kaiſerlichen Gärtner die Platane, die im türkiſchen Dorf die Stelle unſerer Linde vertritt. Neu ſind der Flieder und verſchiedene Obſtbäume, Granatapfel, Pfirſich, Blumenſorten, Mandel und andere, die ſich größtenteils wohl ſchon früher im nördlichen Indien eingebürgert hatten, nun aber im Garten nicht nur ihrer Früchte, ſondern auch ihrer Schönheit wegen Platz finden. Der Gedanke des Nutzgartens ſpricht aber ſtets ſtark mit. Ein Garten ſoll Früchte tragen, und ſelbſt die Sultane kümmern ſich im einzelnen um die Anpflanzung der Obſtbäume. Baber freut ſich an ſeinen Granatäpfeln, die in roter Fülle im goldgelben Herbſtlaub hängen, und beſtimmt, daß der Ertrag der Apfelſinenbäume ſeines Bagh-i-Wafa bei Kabul für ſeinen eigenen Gebrauch zurückgelegt werde. Man ſetzte die Bäume in Reihen um die Quadrate des Gartens um die Waſſerbecken, ließ Cypreſſen im Wechſel mit Fruchtbäumen die Kanäle und Wege begleiten als Sinnbilder von Tod und Leben und beobachtete dabei eine peinliche Symmetrie. Einzelne Cypreſſen oder ſchlanke Palmen oder auch eine Banane pflanzte

Sockelfeld mit Darſtellung eines Blumenfeldes aus dem Diwan-i-Chas in Agra

Die Garteninſel Dſchag Mandir mit dem Gul Mahal im Pitſcholaſee zu Udaipur

Garten des Tadſch Mahal in Agra

man in die Mitten der Blumenvierecke, ein Cypreſſenpaar oder ein Paar von Boraſſuspalmen oder Mangos an die Anfänge des Achſenkreuzes. Starkwüchſige Bäume wurden an die Ränder des Gartens verwieſen, damit der innere Raum überſichtlich und in ſeiner Wirkung erhalten bleibe. Die Wege wurden auch unter Pergolen von Wein und Roſen geführt, wie ſie Kaiſer Dſchehangir beſchreibt. Bei der Anordnung der Bäume im Garten ſpielt aber auch der alte indiſche Glaube eine Rolle, daß die verſchiedenen Arten an ganz beſtimmten Stellen ſtehen müſſen, um glückbringend zu wirken. Man glaubte auch, daß beſtimmte Bäume ſich gut vertragen und auch nebeneinander ſtehen wollen, um gut zu gedeihen. So verheiratete man ſie und ließ ſie als Gleichnis eines Liebespaars gelten. Ähnliche Vorſtellungen hatten übrigens auch die alten Gärtner in Europa, die der Meinung waren, daß gewiſſe Kräuter und Bäume eine natürliche eingepflanzte Liebe und Widerwärtigkeit zueinander trügen, die man beim Pflanzen im Garten wohl beachten müſſe.

Der alte Pflanzenbeſtand hat ſich ſelbſtverſtändlich in keinem der noch beſtehenden Gärten in ſeiner Urſprünglichkeit erhalten. Soweit ſie nicht neu bepflanzt worden ſind, hat der Baumwuchs die Herrſchaft an ſich geriſſen, und die mächtigen Kronen alter Mangos und Pipals quellen in dicken Maſſen über die zerfallenden Umfaſſungsmauern. Aber auch ſtändig gepflegte Gärten haben ihr altes Geſicht verloren wie der des Tadſch Mahal. Auch da drängt ſich der Baumwuchs vor. Die Stimmung iſt etwa der unſerer maleriſch verwachſenen Barockgärten zu vergleichen, geſteigert durch die tropiſche Üppigkeit des Pflanzenwuchſes, der den architektoniſchen Rahmen zu ſprengen ſucht. Der Gartenkünſtler der Mogulzeit wollte etwas ganz anderes. Er faßte den Garten durchaus als ſtreng formales Gebilde auf. Die ſäuberlich in zierlichen geometriſchen Muſtern ausgelegten Blumenteppiche ſollten ſich der Architektur, die ſtets die Hauptſache blieb, unterordnen, den Umfaſſungsmauern mit ihren Achſentoren, den mit Steinplatten belegten Wandelbahnen, welche ſich als niedrige und breitkronige Mauern

aus der Fläche erheben, den Wassertreppen, den Pavillons und Gartenhäusern, die in den üppigen Zeiten Schah Dschehans aus weißem Marmor gebaut und an ihren Wänden und Säulen mit kostbarem Einlegewerk aus Halbedelsteinen oder zarten Reliefs geschmückt waren, und zwar der nämlichen Tulpen, Narzissen und Schwertlilien, die in den von steinernen Rahmen umfaßten Rabatten wuchsen. Wie diese eingelegten und gemeißelten Blumen waren die wirklichen und auch die in Reihen gepflanzten Bäume nicht viel mehr als der Schmuck des gebauten Gerippes, das, wie eben der Anguri Bagh zeigt, auch ohne diesen seine Daseinsberechtigung hat. Einen Eindruck vermag heute der wiederhergestellte Teil des Schalimar Bagh in Lahor zu geben, dessen Blumenbeete mit der Farbenpracht der bunt verkachelten Tore, mit weißmarmornen Gartenhäusern, goldnen Dächern und rotsandsteinernem Wegebelag zusammenklingen, gefaßt im strengen architektonischen Rahmen, der in feiner Berechnung die wenig verschiedenen Niveaus zur Wirkung heranzieht.

Ebenso wird auch der Namensvetter dieses »Zufluchtsortes der Liebe«, der Schalimar Bagh am Dalsee bei Srinagar, heute noch nach Möglichkeit im alten Stil gehalten. Die beste Vorstellung davon, wie man sich einen Garten der Mogulzeit bepflanzt zu denken hat, geben außer den Schilderungen der zeitgenössischen Schriftsteller vor allem die zahlreichen Miniaturen, die bestimmte Gärten aus der Vogelschau darstellen, vielleicht auch als Studien oder Entwürfe für Gartenanlagen aufzufassen sind oder die im Garten spielende Szenen zum Gegenstand haben und so gleichzeitig einen Einblick geben, wie man in diesem lebte (Bild Seite 296). Marie Luise Gothein hat ihrer eine ganze Anzahl, die das Berliner Völkerkundemuseum besitzt, in ihrem Buch veröffentlicht, und der Gartenarchitekt unserer Tage wird überrascht sein, wie manches davon an das anklingt, was heute bei uns Geltung hat. Zahlreiche Miniaturen mit Gartendarstellungen bringt auch C. M. Villiers Stuart, Gardens of the Great Mughals, London 1913, dem die beiden oberen Bilder auf Seite 296 entnommen sind.

FRANZ SÖHNS / FREMDES IN UNSEREN PFLANZENNAMEN

MAN kann nicht stets das Fremde meiden«, man hat es auch in unseren Pflanzennamen nicht gekonnt. Man übernahm die Fremdlinge und mußte sie schon deshalb mit ihren fremden Namen übernehmen, weil man heimische für sie nicht immer hatte, aber man kleidete sie meist in deutsches Gewand und bisweilen so trefflich, daß man sie kaum noch als Ausländer erkannte. Wer will in unserem *Veilchen* noch die Griechin ion erkennen, die im Römischen verkleinert als viola erscheint und von da aus, erst mit nochmaliger Verkleinerung, über vîol (Violen!) zu unserem Veilchen geworden ist? Weniger deutsch eingekleidet ist die allbeliebte *Primel*, deren bekannteste Art das Himmelschlüsselchen ist und die in ihrer Herkunft vom latein. primula den kleinen Blumenerstling bedeutet. Daß die prächtige *Aklei* vom latein. aquam legere (=Wasser sammeln, die noch nicht ausgebreiteten Blätter halten das Regenwasser) ihren Namen hat, sieht man ihr nicht auf den ersten Blick an, und daß des Himmelschlüsselchens Schwester *Aurikel* lediglich einer Verkleinerung des latein. auris (=Ohr) den Namen dankt und deshalb auch in älterer Zeit wegen der Ähnlichkeit ihrer Blätter mit den Ohren des Meisters Petz Bärenöhrlein genannt wurde, tritt auch nicht allzudeutlich in Erscheinung. Wer soll die allbekannte *Zerenchen* (Zirenchen, Sirenchen) gleich auf die griechisch-latein. Syringa und ihren anderen Namen Lilak gar auf das persische lilac zurückführen, dem auch unsere Lilafarbe ihr Dasein schuldet? »Flechtet auch blaue *Cyanen* hinein«, d. h Kornblumen, die, wie Cyan und Cyankali, nach dem griechisch Kyanos (=blau) benannt sind. Beim *Huflattich* ist der erste Bestandteil deutsch, der zweite latein. Ursprungs und aus lactuca (lac-Milch, daher Lattich über lattuca entstanden. Der weiße Milchsaft der Pflanze hat ihr den Namen erzeugt. »Lavendel, Myrt' und Thymian« — alles Fremdlinge, die römische lavendula (lavare=baden) wurde zum Badewasser getan, die ursprünglich orientalische Myrte hat bereits seit dem 16. Jahrh. den älteren Rosmarin (vor allem bei der Braut!) verdrängt, ein Fremdling den andern, denn auch der Rosmarin ist als ros marinus (d. h. Meertau, er wächst an den Küsten des Mittelmeers) fremder Sprache angehörig, und die Räucherpflanze Thymian, die in alter Zeit besonders bei Opfern (griechisch thyein=opfern) verwandt wurde, ist als thymiama schon Ulfilas bekannt. Und die schmucke *Levkoje?* Nun ja, man sieht es ihr ja wohl an, daß sie keine Germanin ist, ohne daß man deshalb gleich zu wissen braucht, daß sie ihren griechischen Grundworten leukos (=weiß) und ion (=Veilchen) entsprechend eigentlich weißes Veilchen bedeutet. Wie man so manches Blümchen, nur weil es schön wie eine Rose aussah, mit ihren Namen benannte, Windröschen, Weidenröschen und Adonisröschen, gab man auch einzelnen Pflanzen den Namen Veilchen, wenn sie auch nicht zu ihnen gehörten. Nennen wir doch auch das Cyclamen (Erdscheibe) Alpenveilchen und heißt nicht der Goldlack in unseren Volksliedern Gilbveiglein, das heißt gelbes Veilchen?

Wüchse ein kreutlein vor den todt,
Es wär fürwar die *salb* ohn spot —

singt ein altes Lied von der *Salbei*. Heilbringend, das muß sie ja wohl sein, wie sollte sie sonst von latein salvus (=heil) den Namen erhalten haben! Und die *Minze*, die man früher wenig richtig Münze schrieb, ist sie nicht die griech. mintha, die lat. mentha? Ist unser schmackhafter *Spargel* nicht als asparagos griechischer Abkunft? War doch auch die unentbehrliche *Petersilie* von Haus aus nichts anderes als das griechische petroselinon, der Steineppich. Eppich selbst aber heißt in seiner Herkunft von latein apium (apis=Biene) einfach die Bienenpflanze. Wenn ferner der Grieche von seinem selinon (das auch in unserem Sellerie steckt) ein Tätigkeitswort bildete, das bekränzen hieß, geht daraus nicht hervor, daß unser heutiges bescheidenes Pflänzchen ehemals zur Bekränzung, zum Schmucke diente? Daß der *Rettich* wie das *Radieschen* auf das latein radix (=Wurzel) zurückgeht, sieht man ihnen beinahe heute noch an. Schwieriger ist es schon mit der *Zwiebel*, (aus latein, caepula), dem rheinischen *Kappes* (latein, caput=Kopf), unserem Kopfsalat, dessen Salat natürlich auch nicht deutsch ist, sondern dem spätlatein. salare (=einsalzen) entstammt, und der bekannten *Schalotte*, oder *Scharlotte*, die als ascalonica gar der Stadt des »Schwarzen Walfisches« zugehört und dem französischen échalotte ihren Mädchennamen dankt. Ist doch selbst unser Wort *Kohl* nicht germanisch, sondern mit der Pflanze aus dem Süden (griechisch kaulos) zu uns gekommen, seine ital. Benenung cavola hat dann in Verbindung mit dem latein rapa (=Rübe) unsere *Kohlrübe* ins Leben gerufen. Auf diese rapa aber und auf ihren Samen, den Rapsamen, ist als Verkürzung auch unser *Raps* und die Verkleinerung *Rapunzel* zurückzuführen. *Hyazinthe* und *Narzisse* sind, wie das Veilchen, Griechinnen, die Hyazinthe dunkler Herkunft und im alten Hellas wahrscheinlich auch nicht unsere heutige Blume, die Narzisse auf das griechische narke (=Erstarrung) zurückgehend, dem auch unser Narkose entstammt. Da eine ihrer Arten, die weiße und wohl ursprüngliche, Ähnlichkeit mit einem Täßchen hat, nannte sie der Italiener tazzetta — unser *Tazette*. Mit Anlehnung an lieb und Stöckel (Stöckchen) schuf man sich bereits im Mittelalter aus dem für ligusticum (=ligurisch) eingesetzten levisticum ein *Liebstöckel* und nannte nun die Dame seines Herzens nicht nur seinen »Herzenstrost und Rosenbüschel, sein Tausendschön und Augenlust«, sondern auch sein Liebstöckel, und in der Rhön behauptet man noch heute, daß dem Träger der Pflanze kein weibliches Wesen widerstehen kann, wie sie dann natürlich auch bei Bereitung von wirkungskräftigen Liebestränken unentbehrlich war.

Wieder sehr anmutig, wenn auch nicht minder willkürlich, verfuhr man, wenn man aus calamus (=Rohr) ein *Kalmus*, aus seinem anderen Namen acorus eine Ackerwurzel, aus der Aristolochia ein Osterluzei, aus Sabina (=Juniperus, Genever, Wacholder) den übel berufenen *Sadebaum* oder Segenbaum (Siebenbürgen) und Siebenbaum (Eifel), aus der Agrimonia ein Acker- und Odermännchen, aus der Ficaria eine Feigwurz (Wurz=Kraut), aus ihrer zweiten Benennung Skorbutskraut ein Scharbockskraut, aus der Portulaca ein besonders gegen Cholera für wirksam gehaltenes *Purzelkraut* und endlich aus dem italienischen, ursprünglich die Trüffel bedeutenden tartuffolo unsere *Kartoffel* sich schuf.

Wenden wir uns nun den Pflanzen zu, die ihr fremdes Kleid bei uns noch völlig unverändert oder doch nur sehr wenig verändert tragen, tritt uns zunächst die *Anemone* entgegen. Da ihr griechisches Grundwort anemos, der Wind, ist, hat man sie sehr hübsch zum Windröschen gemacht. Die nymphaia des Hellenen ist noch heute unsere Nymphäe, die Wasserjungfer, des Römers geranium (griechischen geranion=Storchschnabel) noch heute unser Geranium, der griechisch-römische crocus noch heute unser Krokus und als Safran noch immer das arabische zafarân, die griechische Paionia noch heute unsere Päonie, das griechische, allgemein eine stachliche Pflanze bezeichnende Wort kaktos ist unser Kaktus, die giftige Tollkirsche, deren Saft die Frauen Italiens ehedem

Ein vielgestaltiger Hausgarten

RECHT vielseitigen Wünschen hatte ich bei der Planung eines kleinen, im Weichbilde der Stadt gelegenen Hausgärtchens zu entsprechen. Auf einem Raum von 38 Meter Länge und 18 Meter Breite wurden ein Rosengärtchen, ein Blumengärtchen mit Banklaube, ein Staudengärtchen, ein Wandelgang von geschnittenen Kastanien, ferner ein Heckenlabyrinth und eine Bleichwiese mit freier Umrahmung von schönblühenden Halbbäumen und Sträuchern fordert. Man sollte meinen, daß schon jedes einzelne dieser Teile den ganzen Raum hätte in Anspruch nehmen müssen. Eine sorgfältige Abwägung der Raumwirkungen, Übersichtlichkeit in der Disposition und vorsichtige Beurteilung der verwendbaren Gestaltungsmittel überwanden die Schwierigkeiten beschränkter Ausdehnung und führten zu einer Lösung, welche das Gärtchen viel geräumiger erscheinen läßt, als es tatsächlich ist. Die Nachbarschaft alter, baumbestandener Gärten trug hierzu viel bei. Wer die Beziehungen der Gartenarchitektur zur Musik beobachtet, kann an diesem Beispiel in Rhythmus, Harmonie und Kontrapunktik gegeneinanderspielender Teile eine musikalische Absicht leicht erkennen.

Rudolf Bergfeld

zum Schminken benutzten, um mit seiner Hilfe eine bella donna, eine schöne Frau, zu werden, nennen wir noch heute *Belladonna*, und die duftende *Reseda* ist gar eine alte lateinische Befehlsform, die auf resedare (=stillen, heilen) zurückgeht und das erste Wort einer römischen Zauberformel »reseda morbos, reseda« (=heile die Krankheiten) bildete. Völlig unverändert ist endlich auch unsere *Aster* aus dem griechisch-lateinischem aster (=Stern) übernommen, ja sie hieß ihrem ursprünglichen Geschlechte entsprechend auch bei uns früher *Der* Aster und erst der Gedanke an *die* Blume hat die Geschlechtswandlung hervorgerufen.

So haben wir denn eine stattliche Reihe von Ausländern in unseren Pflanzennamen, aber verhältnismäßig doch nur wenige, die ihr fremdes Gewand noch unangetastet zur Schau tragen; weitaus den meisten hat der deutsche Sprachgeist, oft in Anlehnung an ähnlichklingende eigene Worte, ein heimisches Kleid übergeworfen, gewiß nicht selten irrtümlich, aber doch auch in einer Beziehung vorbildlich: Wenn man den Fremdling einmal nicht entbehren kann, so soll man wenigstens bestrebt sein, ihn zu einem deutschen umzuwandeln — auch das wird eine nationale Tat sein.

Aus dem Blumengarten der Literatur

Rousseaus Grab

Mit innigster Rührung erblicke ich Rousseaus Grab, das Grab des Mannes, der so viel für die Menschheit empfand, und so viel von ihr litt. Sein Geist ist über diese Szene erhaben und wandert in bessern Gefilden; nur das, was er der Erde lassen konnte, ruhet hier im Angesicht der Natur, die er so wahr beschrieb, als er sie fühlte. Ihm, dem Frankreich das erste Licht verdankt, das über seine Gärten aufging, ihm war nicht bloß ein Denkmal, sondern selbst seine Ruhestelle in einem Park vorbehalten, den sein Freund, der Marquis von Girardin, mit eben dem Geschmack, womit er von der Kunst schrieb, zu Ermenonville, zehn Stunden von Paris, angelegt hat. Hier hatte er unter dem Schutz der edelmütigsten Gastfreundschaft die Ruhe des Weisen, der selbst sich alles ist, wiedergefunden; und hier verlebte er seine letzten Tage in einem kleinen Hause unweit des Schlosses, aber doch von diesem durch Bäume abgesondert, an der Seite eines Wäldchens, worin er täglich spazierte und Pflanzen sammelte. Nun schlummert er hier die lange Nacht, das Gesicht gegen den Aufgang der Sonne gerichtet, auf einer kleinen, mit Pappeln bepflanzten Insel, die man seitdem Elysium nennt. Das Wasser, das sie umgibt, fließt ohne Geräusch, und die Lüfte scheinen sich zu fürchten, die Stille der Szene durch die geringste Bewegung zu unterbrechen. Der kleine See ist mit Hügeln umschlossen, die ihn von der übrigen Welt absondern, und die ganze Gegend zu einem geheimnisvollen Heiligtum machen, das nichts Finsteres oder Trauriges hat, aber zu einer sanften Melancholie hinreißt. Sie sind mit Wäldern bedeckt, und endigen sich am Ufer des Wassers mit einsamen Gängen, worin es nicht an empfindsamen Fremden fehlt, die nach dem Elysium hinsehen und zuweilen hinüberfahren. In der Mitte steht über den heiligen Reliquien das Monument in der Höhe von sechs Schuhen, von sehr einfacher, aber schöner Verzierung. Die hohen Pappeln, die von einem Boden emporsteigen, der mit Rasen bedeckt und einigen Rosen geschmückt ist, bilden einen ehrwürdigen Schatten, der sich durch seinen Widerschein in dem ruhigen Wasser verlängert. Und der Gedanke: hier ruhet Rousseau! enthält alles, was rührende Feierlichkeit dieses Auftrittes vollenden kann. Auch ein bloßes Trauerdenkmal kann oft ein Mittel sehr interessanter Erinnerungen sein. Welcher weise Freund des einsamen Spaziergangs muß nicht lebhaft gerührt werden, wenn er in einem waldigen Revier auf ein Monument stößt, das dem Andenken eines Mannes, den er schätzen kann, geheiligt ist! Er wird überrascht, tritt näher und erkennt ihn, dessen Verdienst hier gehuldigt wird. Er sieht das äußere Denkmal, daß der Seele die Wiedererinnerung erleichtert, sich zwischen schattenreichen Bäumen bescheiden verbergen: ein Bild des Mannes, der alles in sich war und sich in sich selbst zu verhüllen suchen konnte. Ein dichter Vorhang von Waldung begrenzt umher das eingeschlossene Revier. In der Mitte ruhet ein stilles Gewässer, woraus mit leisem Gemurmel ein kleiner Bach abfällt und am Fuß des Monuments wegschleicht. Der Mond steigt über die Gebüsche mit seinem feierlichen Licht herauf und scheint am Himmel zu verweilen, um diese heilige Gegend zu beschauen. Sein blasses Antlitz glänzt im Wasser wider; zwischen den Bäumen und Gebüschen schleicht sein Silberschein und verbreitet über das Ganze eine liebliche Beleuchtung. Selbst das Monument scheint sich seiner sanften Erheiterung zu freuen; das Bild der Unsterblichkeit, der Schmetterling, wird sichtbar, und der Gedanke des Todes gemildert. Kein Laut wird gehört, ringsumher tiefe Stille und Feier. Von dem Eindruck dieser Szene beherrscht, in seine Betrachtungen und in seine Wehmut versenkt, lehnt sich der empfindende Beobachter an eine gegenüberstehende Eiche, sieht hin, wo das Mondlicht den Namen seines Sulzers erhellet, sieht wieder weg, und eine Träne fällt.

Aus: „C. C. L. Hirschfeld, Theorie der Gartenkunst", 1779

Gartenarbeit und Blumenpflege

KURT PÖTHIG / STEINE IM GARTEN II

Der Sandstein

IM Gegensatz zu den Findlingen, die immer als Einzelstücke zu mehr oder weniger großen Anhäufungen vereinigt in oder auf dem Erdboden lagern, kommen alle anderen Gesteinsarten als große zusammenhängende Massen vor, die aus der Erde gewissermaßen herauswachsen. Zu diesem »gewachsenen Gestein« gehört auch der Sandstein. Er ist entstanden aus der Verkittung von Sand mit einem Bindemittel, und nach der Art dieses Bindemittels unterscheidet man tonigen, kalkigen, mergeligen, kieseligen und anderen Sandstein. Am meisten verbreitet ist der kieselige und tonige Quarzsandstein. Er ist in der Regel von körniger Struktur und deutlich wagerecht geschichtet. Im Gegensatz zu dieser horizontalen Schichtung werden durch Verwitterung und Auswaschungen vertikale Zerklüftungen gebildet, durch die würfelförmigen Felsmassen mit stark abgerundeten Verwitterungskanten — die sogenannten Quadern — entstehen. Daher führt diese Formation auch den Namen Quadersandstein. Dem Wanderer fallen beim Besuche eines Sandsteingebirges wohl am meisten die engen Schluchten und Täler auf, deren Wände zu beiden Seiten senkrecht in die Höhe

ftreben und eigentümliche pfeilerförmige und mauerartige Bekrönungen zeigen. Große Quader hängen drohend in den gewagtesten Gleichgewichtslagen über dem Kopfe des Beschauers. Nur langsam und in vielen Serpentinen klimmt der Weg empor; an vielen Punkten ist es nur durch den Einbau von hölzernen oder eisernen Treppen in die Klüfte möglich, den Gipfel zu erreichen. Oft sind bei bedeutender Höhe derartige Felsspalten so schmal, daß ein Mensch gerade hindurchkriechen kann. In der gleichmäßig kühlen Temperatur entwickelt sich an den feuchten Felsen eine reiche Flora von Flechten, Moosen und Farnen. So kommt zum Beispiel im Uttewalder Grunde in der Sächsischen Schweiz der einzige Hautfarn Deutschlands, Hymenophyllum tunbridgense vor, und zwar nur an diesem Fundorte. Des öfteren wird die Sohle der Schluchten durch einen Wasserlauf gebildet. Derartige Täler, die auch den Namen »Klamm« führen und nur durch einen Kahn passierbar sind, gehören zu den schönsten und beliebtesten Ausflugspunkten des Gebirges. Der Eindruck der senkrechten Felswände wird durch die wagerechte, fast ebene Oberfläche der Berge noch besonders gesteigert. Massive, wenig zerklüftete Sandsteinberge bilden mit ihrer wagerechten, ebenen Oberfläche die für diese Formation charakteristischen Tafelberge.

Die beigefügten Bilder stammen aus dem durch seine wilde Romantik bekannten Lausitzer Sandsteingebirge aus der Gegend von Oybin in Sachsen. Hier haben Verwitterung und Erosion wunderlich zerklüftete Felsengebilde geschaffen, die der Phantasie des Beschauers freiesten Spielraum gewähren, wie die Namen »Nonnenfelsen«, »Brütende Henne«, »Katzenstein« und andere beweisen. Beim Studium der Felsengebilde drängt sich zunächst eine so große Zahl von Bildern auf, daß man der Fülle ziemlich ratlos gegenübersteht. Es will scheinen, als ob überhaupt jede Lagerung und Umrißform möglich wäre, und erst nach und nach schärft sich der Blick für charakteristische, als Vorbilder brauchbare Formationen. Die äußeren Umstände für solche Studien und photographischen Aufnahmen waren insofern günstig, als ein großer Teil der Wälder durch Nonnenfraß abgeholzt war. Dadurch traten charakteristische und interessante Felsengebilde zu Tage, die sonst im Waldesdunkel verborgen geblieben wären.

Im Garten wird man den Sandstein in den seltensten Fällen und dann nur dort, wo er zu Hause ist, verwenden. Und auch dabei wird noch größte Vorsicht geboten sein, denn bei einem im Gebirge liegenden Garten dürfte es sehr schwer sein, durch von Menschenhand geschaffene Gesteinsanlagen nach natürlichen Vorbildern mit der Natur wetteifern zu wollen. Gegen die gewaltigen Bodenerhebungen und umfangreichen Felsenmassen ist mit schwachen Menschenkräften nicht anzukommen; gar zu leicht kann ein dahingehender Versuch lächerlich wirken. Wenn nicht auf dem Grundstück von Hause aus anstehendes Gestein in kleinerem oder größerem Umfange zu Tage tritt oder durch Sprengung leicht freigelegt werden kann, ist es besser, auf die Darstellung natürlicher Gesteinsbildungen zu verzichten und Terrassen, Hohlwege und anderes mehr durch Mauerwerk aus dem Gesteinsmaterial des Gebirges zu bauen. Höchstens können an passenden Stellen abgewitterte Trümmerstücke, wie sie im Gebirge massenhaft vorkommen, niedergelegt werden.

Trotzdem sollen hier Bilder von Sandsteinformationen gezeigt werden, um einmal ein vollständiges Bild der verschiedenen Gesteinsarten zu geben und zum anderen dem Liebhaber und Fachmann immer wieder vor Augen zu führen, wie schlicht und bescheiden die Natur baut. Für die photographischen Aufnahmen sind nur solche Felsenmassen ausgewählt worden, die in ihrer Verteilung und ihren Größenverhältnissen im Grund- und Aufriß Vorbilder für Gesteinsanlagen im Garten auch bei Verwendung anderen Materials geben können. Damit soll natürlich nicht gesagt sein, daß das Gestein nicht materialgerecht eingebaut werden soll; nur für die Verteilung der Massen, die Umrißform und anderes sollen die Abbildungen als Anregung dienen.

Ich denke mir, daß die Abbildungen 1 und 2 beim Bau eines Alpinums wertvolle Anregungen für die Verteilung der Gesteinsmassen und den Aufbau geben können. Bei dem ersten Bilde ist durch Zusammenfügen von zwei entsprechend aufgenommenen Photographien der Umfang und Aufbau des ganzen Felsens dargestellt. Beim zweiten Bilde ist nur ein Teil desselben Felsengebildes wiedergegeben, weil mir hier die Verteilung kleiner Gesteinsmassen im Verhältnis zu den mit Vegetation besiedelten Flächen vorbildlich und nachahmenswert erschien. Besonders hingewiesen sei auch vor allem auf die ruhige, glockenförmige Silhouette des ganzen Felsens im Gegensatz zu den zackigen und unruhigen Gesteinsanlagen, die man oft in Gärten sieht.

Das Bild unten links zeigt eine etwa zweieinhalb Meter hohe, senkrechte Felsenwand, die in ihren abwechslungsreichen und dennoch ruhig wirkenden Vor- und Einsprüngen im Grundriß und in der Verteilung und Steigerung von Steinen geringeren Umfangs bis zu dem großen zusammenhängenden Felsmassiv auf der rechten Hälfte des Bildes vorbildlich ist. Ein kleines Tal oder ein Pfad auf der linken Seite des Bildes führt von unten auf die Höhe.

Das Bild unten rechts soll darstellen, wie schlicht und bescheiden, tief in Grün eingebettet draußen in der Natur die Steine oft zu Tage treten. Nach diesem Vorbilde können Gesteinstrümmer auch in im Gebirge liegenden Gärten verwendet werden. Derartig einfache Motive können garnicht oft genug vor Augen geführt werden, um zu zeigen, wie man es im Garten auch machen soll.

Das linke Bild auf dieser Seite stellt die typische Sandsteinformation großen Ausmaßes dar; eine senkrecht aufstrebende Felsenwand mit charakteristischen vertikalen und horizontalen tiefen Furchen und der dadurch hervorgerufenen, deutlichen Quaderbildung. Die Kanten sind stark abgerundet.

Das rechte Bild zeigt einen großen Quader, der sich mit der flachen Seite auf einen anderen Stein aufgelagert hat und mit der im tiefen Schatten liegenden Untersicht ein interessantes Motiv ergibt. Derartige Aufeinanderlagerungen in oft gewagtesten Gleichgewichtslagen kommen an Abhängen ziemlich häufig vor. Im Garten braucht der Pflanzenliebhaber solche tiefschattigen, kühlen, bodenfrischen Stellen unter weit vorspringenden Steinen, um geeignete Plätze für besonders empfindliche Farne, Ramondien und vieles andere zu erhalten.

Wir sind beim Einbauen von Felsen nach landschaftlichen Motiven trotz der jeder Gesteinsart eigentümlichen Lagerungsverhältnisse an bestimmten Formen nicht gebunden; am wenigsten beim Sandstein. Aber um so mehr ist notwendig der klare Blick und das feine Empfinden für das Zusammenwirken der örtlichen Verhältnisse mit den statischen und dynamischen Naturgesetzen. In einem folgenden Aufsatze soll die Gesteinsart besprochen werden, die das dankbarste Material für die Anlage von Gefelse im Garten abgibt: der Rüdersdorfer Kalkstein.

KARL MICKSCH / BLUMENZUCHT AN BORD EINES GROSSEN OZEANDAMPFERS

EINE Ozeanfahrt bietet den Naturfreunden bei ruhigem Wetter vielerlei Abwechslung. Himmel und Wasserflächen wechseln ihre Mienen öfter als anderswo und bieten dem Beobachter in jeder Stunde neue Aufgaben und neue Anregungen. Aber bei dieser Fahrt über das unendliche, große Meer erlangen Dinge, die man hier entbehren muß, ganz besonderen Reiz.
Blumen bilden von jeher den Inbegriff des Schönen, und man hat schon in den Kindheitstagen der Schiffahrt darüber nachgedacht, wie es möglich sein könnte, die zarten und farbenprächtigen Kindes Floras auf diesen Fahrten mitzuführen. Für die Ozeanreisenden muß es ein ganz besonderer Genuß sein, blühende, farbenprächtige Blumen um sich zu sehen.
Fahrzeuge, die nur Flüsse und Seen von begrenztem Umfange befahren, hat man schon im Altertum mit Blumen geschmückt. Als Tutanchamons Mutter mit ihren Frauen den Nil hinunter reiste, um ihren Sohn zu besuchen, hatte man Blumen an Bord. Die Galeeren der Römer waren mit Blumen geschmückt, wenn ihre Würdenträger über das Mittelländische Meer von Antium nach Bajae fuhren. Ohne Blumenschmuck wäre ein Triumphzug des Dogen Dandalo über die Adria, die Einfahrt in dem in Sonnenglanz erstrahlenden Canale grande nicht denkbar gewesen. Derartige Dekorationen waren natürlich immer nur für eine kurze Dauer bestimmt. Die Blumen welkten dahin, und die Erneuerung der Guirlanden, Sträuße und sonstiger Dekorationen mußten verhältnismäßig oft erfolgen. Mitunter blieben Überreste als welkes Sträußlein am Schiffsmast oder über dem Lager des Seemanns wochen-, ja monatelang befestigt, bis er die fern ersehnte Küste erreichte.
Seit einiger Zeit hat man eingehende Versuche unternommen, Pflanzen in Erde und Töpfen lebend über den Ozean zu bringen. Die großen Ozeandampfer waren für derartige Versuche geeignet. Kleine, weniger anspruchsvolle Topfpflanzen, wie die sich reckende Araukarie oder auch Blattgewächse wurden in Kajüten, in den Speise- und Gesellschaftssälen der Ozeanriesen untergebracht. Selbst Fächerpalmen plazierte man in den Ecken der größeren Aufenthaltsräume. Der Seegang der schnellen überschlanken Ozeandampfer erschwert die Mitnahme dieser zarten blühenden Gewächse in mannigfacher Hinsicht. Die Einrichtung von Gärtnereien an Bord ist erst heute, wenn auch in begrenztem Umfange ermöglicht. Schlingertanks und kunstvoll gestaltete Anbauten schützen die Blumenstengel und Kelche vor Erschütterungen. Durch den einheitlichen Bau, der einem großen Hotel auf See gleicht, können die Gewächse im geschlossenen Raume vom Treibhaus durch das ganze Schiff getragen werden, ohne Zugluft zu bekommen. Bei gutem Wetter ist die Seeluft den Pflanzen keineswegs nachteilig.
Die Sättigung der Luft durch Wasserdünste, die der Wind vom Meere herantreibt oder die aus den Wasserflächen aufsteigen, legen über alle Dinge Duft und Ton. In der Seeluft finden auch Blumen Kraft zur Üppigkeit. Im Gegensatz zu dem Blumenschmuck der Wasserfahrzeuge der vergangenen Jahrhunderte werden heute die Blumen fachlich und künstlerisch gepflegt. Die bewußte Freude an der ästhetischen Schönheit der Blumen bildet einen der wichtigsten Ausgangsprodukte der künstlerischen Erziehung des Menschen.
Gegenwärtig zählt die Einrichtung einer Gärtnerei an Bord noch zu den Seltenheiten. Auf der Cap Polonio, dem Luxusdampfer der Hamburg-Südamerikanischen Dampfschiffahrtsgesellschaft, ist das Blumenhaus besonders merkwürdig. Es bereitet auf dem Dampfer keine Schwierigkeiten, das auf dem obersten Deck gelegene Warmhaus selbst während der kälteren Jahreszeit auf der erforderlichen Temperatur zu erhalten. Im Februar war dieses mit duftenden Veilchen, Maiblumen, Primeln, Fresien, Narzissen, Tulpen und Hyazinthen in Töpfen gefüllt. Auch größere blühende Pflanzen seltener Art, sowie Araukarien und selbst Palmen sind in diesem Blumenhause untergebracht. Einen harmonischen Abschluß erlangten die einzelnen Anlagen durch die in Reihen gruppierten roten Pelargonien und sattgelben Blüten des Cytisus. Was man zu dieser Jahreszeit von einem Treibhaus erwarten kann, war hier vertreten. Die wenigen Tage, die der Dampfer im Hamburger Hafen lag, waren von den Pflanzen gut überdauert worden.
Die Gärtnerei an Bord untersteht einem tüchtigen Gärtner, aber von den blühenden Blumen kommen nur wenige an den Endhafen, denn nachdem der Schiffs-Tafelschmuck aus dem Treibhause befriedigt ist, bildet diese eine Handelsgärtnerei. Sie versorgt besonders die reizenden, gedeckten runden Tische des Speisesaales und des mächtigen Wintergartens mit Schnittblumen, sie liefert die Dekoration für die Damensalons. Dem Gärtner liegt es ferner ob, die großen Palmen aller Arten zu pflegen, die unauffällig mit Tauen an den Marmorsäulen befestigt sind. Zu bestimmten Tageszeiten aber kommen die Bordgäste und kaufen Blumen, denn auf denn Ozeandampfer werden nicht nur Geburtstage, sondern mitunter sogar Hochzeiten gefeiert, und das Abschiedsfest mit der unvermeidlichen Bowle erfordert ebenfalls etwas Blumenschmuck. Es gilt als eine der angenehmsten Zerstreuungen, zum Bordgärtner zu gehen und bei diesem Einkäufe zu machen. Ruhig, als wenn er an Land wäre, verrichtet er seine Arbeit, putzt, düngt und überbraust seine blühenden Kinder, topft sie um, bindet Sträuße und setzt sie in Vasen ein.
Die Passagiere sehen dieser interessanten Arbeit zu, genau wie an Land, bis er durch ein höfliches, aber bestimmtes Türezumachen zu verstehen gibt, daß er von der Gesellschaft genug hat und in seiner Arbeit nicht gestört werden will.

WILHELM MÜTZE / PFLANZE UND LICHT

KÜRZLICH berichtete ein englischer Blumenkenner, für ihn sei es das Schönste gewesen, in einem langen Erleben jeder Pflanze im Garten zu dem richtigen Standort verholfen zu haben. Darin liegt eine fast unübersehbare Fülle jenes Erlebens, das eine wirkliche Schönheit des Gartens ausmacht. Wenn wir indessen vom richtigen Standort sprechen, so denken wir wohl auch an Licht und Schatten, indessen weniger an die Art des Lichtes bezüglich seiner Mischung der Strahlen.
Die ersten Versuche in dieser Hinsicht stellte ich vor vielen Jahren mit Kappflanzen an, die sich ganz besonders hierfür eignen. Zonalpelargonien beispielsweise sind überhaupt nur zu ihrer höchsten Entfaltung im reinen diffusen Lichte zu bringen, etwa auf der Rückseite in einem niederen Glashause, das von Nord-Ost nach Süd-West gerichtet ist. Und es ist gewiß nicht zuviel gesagt, wenn ich behaupte, die meisten Gärtner kennen Zonalpelargonien in ihrer wirklichen Vollkommenheit nicht. Ein deutscher Gärtner berichtete, er habe in Belgien einmal Zonalpelargonien gesehen und habe im ersten Augenblick nicht gewußt, welche Pflanzen er vor sich habe. Dasselbe ist mir begegnet, als ein Gelehrter von Ruf mich zu vollentwickelten Pelargoniensämlingen bat und fragte, was das für Pflanzen seien. Er wollte es nicht glauben, daß es Pelargonien seien.
Wie weit wir im Tieflande in der Kultur von Alpenpflanzen kommen können, zeigt erst eine umfassende Kenntnis der Belichtungsverhältnisse. Mit etwa fünfzig Sämlingen prüfe ich diese Verhältnisse und finde dann in meinen Terrassen oder Steinbeeten das Rechte. Ein Garten wird überhaupt erst zur Welt, wenn wir ihn nach Standorten richtig kennen.
Gehen wir einmal einen Weg entlang, der rechts und links breite Randbeete hat, von Nord nach Süd gerichtet ist und hinter den Randbeeten hohe Hecken aufweist. Diese Randbeete seien rechts und links ganz gleichmäßig besetzt. Und nun gehen wir einmal mit sehenden Augen an den Pflanzen entlang und beobachten jeden Standort. Stauden und Sommerblumen erschließen uns hier eine neue Welt in dieser Hinsicht.
Bei einer sehr großen Anzahl von Pflanzen kommt es garnicht darauf an, wieviel direktes Licht sie bestrahlt, sondern nur darauf, wie lange sie am Tage in einem starken rückstrahlenden Lichte stehen. Dieses Licht war im August bei bedecktem Himmel so stark, daß unter einer gut gedeckten photographischen Platte nachmittags um 3 Uhr von vier kartonstarken Gaslichtpapieren, die untereinander unter der Platte lagen bei 25 Sekunden Belichtungsdauer das oberste Papier überlichtet war, die drei darunter liegenden aber einwandfreie Bilder ergaben.
Die interessantesten Resultate werden sich ergeben bei Versuchen mit Zonalpelargonien und mit sehr heikelen Gletscherpflanzen, bei denen sie sehr leicht durchzuführen sind, indem sich durch die umgebenden Steine die verschiedensten Standorte erzielen lassen. Es wäre dabei sehr zu empfehlen, solche Versuche ganz systematisch durchzuführen, wie es etwa von Dr. Lemperg (S. 190) in Bezug auf Temperaturbeobachtungen geschehen ist. Nur durch sorgfältiges Verfahren erzielt man brauchbare Ergebnisse.

Unter Glas

Populäre Orchideen

III. Herbſtblühende Cattleyen

ZUR Zeit unſerer Voreltern war Cattleya labiata die Hauptpflanze, um während der Herbſtmonate Cattleyen-Blüten zu gewinnen. Die ungeheuren Importe, die jedes Jahr aus Braſilien kamen, erzielten gute Preiſe, da immer eine ſtarke Nachfrage herrſchte. Obſchon die importierten Pflanzen während einiger Jahre ſehr kräftig wuchſen und eine Anzahl Blumen gaben, ſo wurden ſie doch allmählich ſchwächer und ſtarben ſchließlich. Es war leicht, dieſe erſchöpften Pflanzen durch neueingeführte zu erſetzen, und die Koſten dafür waren im allgemeinen geringer als die durch die Blumen der letzten Saiſon erzielte Einnahme. Heute jedoch iſt es kein gewinnbringendes Unternehmen Cattleya labiata zu kultivieren, daher hat auch die Nachfrage nach importierten Pflanzen aufgehört.

Kultivateure wenden jetzt ihre Aufmerkſamkeit verſchiedenen Cattleyen-Hybriden zu, denn dieſe Pflanzen ſind viel kräftiger und geben daher einen größeren Ertrag an Blumen, ohne irgend welche ungünſtige Wirkungen. Ein anderer wichtiger Punkt iſt, daß in faſt jeder gewünſchten Menge die Hybriden aus Samen gezogen werden können, und mit geringeren Koſten, als es bei Importen jetzt der Fall ſein würde. Importierte Pflanzen ſind immer mit einer Anzahl ſchädlicher Inſekten behaftet, und es bedarf vieler Mühe, ſie rein zu halten. Bei den jetzigen Methoden der Samenzucht geht alles unter ſauberen Bedingungen vor ſich, mit dem Ergebnis, daß die Sämlinge ſchnell wachſen und wenig Aufmerkſamkeit beanſpruchen. Gelegentlich iſt ein Räuchern ratſam, wenn Thrips auftreten ſollte.

Vor gut dreißig Jahren, 1894, erzog Veitch Cattleya Fabia (labiata × aurea), deren Blüten viel reizvoller ſind, als die von C. labiata, und daher höhere Preiſe erzielen. Gleich den meiſten Hybriden iſt C. Fabia ſehr kräftig und fährt fort üppig zu wachſen von Jahr zu Jahr. Die Blüten ſind roſa-mauve-farben oder ins Purpurne fallend. Sie folgen ſomit der Färbung der C. labiata, aber der Einfluß der C. aurea macht die purpurne Tönung viel lebhafter, als man es bei typiſcher C. labiata ſieht. Das Kreuzen von C. labiata alba mit C. aurea ergibt Hybriden, deren Blumen weiße Sepalen und Petalen haben, ſowie eine mehr oder weniger gefärbte Lippe. Dieſe Pflanzen gehen als C. Fabia alba.

Im Herbſt 1912 wurde in C. Dionyſius eine ſehr ſchöne Hybride zum erſten Male gezeigt. Sie entſtammte einer Kreuzung zwiſchen C. Fabia alba und C. Warſcewiczii (gigas) var. Frau Melanie Beyrodt, welch letzte eine gute Varietät mit reinweißen Sepalen und Petalen iſt. Nicht nur die Albino-Natur der Sepalen und Petalen hat ſich auf C. Dionyſius vererbt, ſondern auch die kräftige Beſchaffenheit der C. Warſcewiczii.

Wenn wir die Herkunft der herbſtblühenden Cattleyen prüfen, ſo wird es auffallen, wie oft C. labiata und C. aurea benutzt worden ſind. Dieſe beiden Arten bilden die Grundlage, auf der die Mehrheit der herbſtblühenden Hybriden ſich aufbaut. Während einige Liebhaber und Handelszüchter die großen Blumen ſchätzen, die zu zwei bis drei am Blütenſtand ſtehen, ziehen Andere Büſchel kleinerer Blüten vor, ſo, wie ſie C. Portia (labiata × Bowringiana) trägt, welche Hybride gewöhnlich zehn- bis fünfzehnblütige Ähren bringt. Die einzelnen Blüten ſind notwendigerweiſe kleiner, aber die ganze Ähre iſt ſehr ſchmuckvoll.

Bisher wurde nur auf ins Purpurne fallende Blumen und ihre weißen Formen Bezug genommen. Es gibt noch eine andere Gruppe herbſtblühender Cattleyen, die ſehr populär geworden iſt. Sie entſtand durch die Benutzung von C. bicolor, die zur langbulbigen Gruppe gehört und ein Paar von Blättern an der Spitze trägt. Die beſondere Anziehungskraft der Art liegt in der gelblichen Farbe der Blüten, ſodaß bei einer Kreuzung mit C. aurea eine ſehr hübſche Kombination ſich ergibt, denn es entſtehen Hybriden mit gelben Blüten. Eines der erſten Beiſpiele war C. Iris (bicolor × aurea), bei der die Sepalen und Petalen von Gelb nach Bronze variieren. Eine weitere erſchien in C. Adula (bicolor × Hardyana), von etwas reicherer Färbung, wobei die gelblichen Segmente pflaumrot oder faſt purpurn überlaufen waren. C. bicolor beſitzt eine ſehr bezeichnende flach geſtellte Lippe von ſatt purpurner Färbung, ein Merkmal, daß ſich ſehr gut kreuzt mit der reich gefärbten Lippe von aurea und auch Hardyana. Jeder, der Cattleyen aus der langbulbigen Gruppe kultiviert, iſt gut vertraut mit der Schwierigkeit, die Pflanzen in üppiger Beſchaffenheit zu erhalten; ſie ſind viel ſchwerer zu behandeln als Pflanzen vom C. labiata-Typ. Unglücklicherweiſe vererbt ſich dieſer ſchwächliche Wuchs auf die Sämlinge, ſodaß faſt alle Hybriden der C. bicolor ſich bald erſchöpfen. Sie wachſen in der erſten Jugend gut, ja eigentlich bis die erſten Blüten gebracht ſind, danach benötigen ſie aber alle Geſchicklichkeit und Fürſorge des Pflegers. Viele Tauſende von C. Iris und C. Adula ſind gezogen worden, doch nur ein kleiner Teil davon iſt jetzt noch am Leben. Dies ſind zwei Hybriden, die immer populär ſein werden, und daher müſſen immer neue Mengen von Sämlingen jedes Jahr gezogen werden. Es gibt Handelszüchter, die der Meinung ſind, daß künftig nur ganz neue Hybriden gezogen werden müſſen, doch das iſt keineswegs der Fall, denn einige unſerer ſchönſten Hybriden befinden ſich unter den primären Kreuzungen, von denen einige wenige oben erwähnt wurden.

Aus unſeren Bemerkungen kann man erſehen, daß der Handelszüchter die Erzeugung von populären Hybriden immer lohnend finden wird, denn während die feinſten Formen eifrig von den führenden Amateuren gekauft werden, ergibt die Mehrheit der Pflanzen eine Blütenmenge, die auf dem Schnittblumenmarkt und für andere Schmuckzwecke befriedigende Preiſe erzielt.

Gurney Wilſon

Eine Ampelpflanze des Warmhauſes

UNTER den zahlreichen Warmhauspflanzen, die ſich als Ampelgewächſe verwenden laſſen, ſpielen die Arten der Gesneraceen-Gattung Columnea deshalb eine große Rolle, weil ihre Blüten ſchön geformt und prächtig gefärbt ſind. Von dieſer letzten, ſo wichtigen Eigenſchaft giebt das Bild keine Kunde. Bei C. ſplendens iſt es ein warmes Purpurrot mit Scharlach. Wenn mit dieſem Farbenzauber die ſo anſprechenden Ranken beſtickt ſind, ſo wirkt das grüne, eigentümlich weich behaarte Laub als ſchöner Hintergrund. Die in den bekannten Glashäuſern zu Sansſouci aufgenommene Pflanze zeigt, was ſie bei ſachverſtändiger Pflege werden kann. Auch andere Typen dieſer arten-

reichen Gattung ſind dort vertreten und bringen ihre teils orangeroten, teils rot und gelben Farben gut zur Geltung. Dieſe epiphytiſchen Pflanzen lieben ein grobes Pflanzmaterial aus Lauberde oder Osmundafaſern mit Torfmoos. und auf den Topfgrund am beſten Holzkohle. Nach der Blüte ſchneidet man ſie ſtark zurück, doch kann man ſie zwei Jahre hintereinander blühen laſſen. C. ſplendens blüht meiſt vom Sommer bis in den Winter hinein. Die Vermehrung erfolgt durch Stecklinge aus diesjährigen Trieben. Während der Triebperiode iſt reichliche Bewäſſerung geboten. Üppige Pflanzen wirken wie epiphytiſche Orchideen.

C. S.

Buntblättrige Schraubenbäume

DIE Schraubenbäume, Pandanus, die eine ſelbſtändige Familie bilden, tragen ihren Namen von der ſchraubigen Anordnung der Blätter am Stamm. Dieſe kommt aber erſt bei Pflanzen mit höheren Stämmen gut zur Geltung. Unſer Bild zeigt eine bekannte Zierform dieſer Gattung mit weiß oder gelb gerandeten Blättern, P. Veitchii, die 1868 aus Polyneſien durch die Firma Veitch in London, der wir ſo viele wichtige Neueinführungen verdanken, nach Europa gebracht wurde. Sie hat ſich ſehr ſchnell die Gunſt der Gärtner und Pflanzenfreunde errungen, zumal ſie ſich auch als Zimmerpflanze bewährte. Freilich iſt es hier nicht ſo leicht, ſie ſo geſund und üppig zu erhalten, wie in den Gewächshäuſern zu Sanſouci, wo unſere Gruppe aufgenommen wurde. Bei einiger Achtſamkeit wird aber der verſtändige Pfleger von Zimmerpflanzen auch dieſen Schraubenbaum durch Jahre erhalten können. Er nimmt im Winter mit einem etwas dunkleren Platze vorlieb, wenn es ſein muß, doch darf man ihn in dieſer Zeit nicht durch ungeſchicktes Gießen und Spritzen ſchädigen. Die Blätter werden nur von Zeit zu Zeit mit einem Schwamm und lauem Waſſer abgewaſchen, denn beim Spritzen käme Waſſer in die Blattachſeln und hätte Stammfäule zur Folge. Der Trieb ſetzt meiſt Ende Januar wieder ein. Dann ſteigert man die Waſſergaben, muß aber für ſehr guten Waſſerablauf im Topf ſorgen, es darf auch kein Waſſer im Unterſatz ſtehen bleiben. Mit Beginn des Triebes kommt auch die rechte Zeit für die Vermehrung und ſpäter für eine etwaige Verpflanzung. Zur Vermehrung dienen die ſeitlichen Wurzelaustriebe. Beim Verpflanzen nehme man je einen Teil lehmige Raſenerde, Lauberde und groben Sand: verrotteter Dungzuſatz iſt vorteilhaft, da die Pflanzen reichlicher Nahrung benötigen, um gut ausgebildete Blätter von ſchöner Färbung zu bringen. Sie ſtellen dann eine beſondere Zierde im Wohnraum, Wintergarten und Glashaus dar. *C. S.*

Handwerkliches

Verpflanzung des Staudenritterſporns

WANN liebt oder verträgt Ritterſporn Verpflanzung?

1. Kräftige Pflanzen können von Mitte September ab bis Ende April gepflanzt werden.
2. Bei Frühjahrspflanzung nach 10. April iſt Rückſchnitt empfehlenswert, falls die Pflanzen nicht durch Einſchlag zurückgehalten waren. Bei Herbſtpflanzung im erſten Winter etwas Schutzdecke.
3. Junge Sämlinge bleiben den Winter durch draußen ſtehen; minimaler Schutz, etwa durch Spargelkraut, iſt völlig ausreichend. Verpflanzzeit von Ende März bis Mitte Mai.
4. Gleich nach dem erſten Hauptflor kann man die ganzen zurückgeſchnittenen, von Erde befreiten Pflanzen verſetzen. Ein Verſand in dieſer Zeit muß kurz und ſchnell ſein, um keine Fäulnisgefahr aufkommen zu laſſen.
5. Innerhalb des gleichen Gartens kann man Ritterſporn auch in vollem Flor verſetzen. Am beſten iſt es, die Pflanzen mit Erdballen herauszunehmen und die Erde bis auf einen kleinen innerſten Kernklumpen abzuſchütteln.
6. Manchmal verpflanzt man auch aus mancherlei Gründen mit großen Erdballen, zumal ältere ſtarke Pflanzen im vollſten beginnenden Flor. Dann iſt es aber gut, nach dem vollen Abblühen die Pflanzen herauszuholen und den Erdballen nachträglich bis auf den obigen Kernballen abzuſchütteln, auch wohl mit ſehr ſcharfem Meſſer die Wurzel etwas nachzuſchneiden und die Pflanze gleich wieder zu pflanzen.
7. Läßt man mit ſtarkem Erdballen verpflanzte Exemplare über den Flor hinaus weiter ſtehen, ſo gehen ſolche Exemplare nach Ablauf eines Jahres langſam zurück, anſtatt vorwärts. Nimmt man ſie dann erſt nach einem Jahre heraus, um die geratene Hantierung mit dem Erdballen vorzunehmen, ſo iſt bei der Wiederpflanzung an die genau gleiche Stelle zu bedenken, daß dieſe dann ſchon ſtark von Ritterſpornwurzeln ausgebraucht iſt, alſo verändere man in ſolchem Falle den Platz oder Erdboden ein wenig.
8. Trifft ein heißer trockener Sommer auf ſolche mit zu ſtarkem Erdklumpen in irgend einer Jahreszeit verſetzten Ritterſporne, ſo beſteht ſogar Lebensgefahr, während ballenlos verpflanzte Nachbarexemplare jede Dürre bequem überſtehen.
9. Erſtaunlich iſt die Gutmütigkeit des Ritterſporns in jüngeren Exemplaren, wenn man dieſe im erſten Flor herausgräbt. Sie vertragen dann ſogar im heißen Sommermittag per Fahrrad und Ruckſack, aus dieſem ein halbes Meter herausſtehend, von Gartenfreunden mitgenommen zu werden; in den Garten gepflanzt, blühen ſie reich weiter und ſetzen ſogar Saat an.
10. Der Rückſchnitt nach dem Flor ſollte auf alle Fälle ſo dicht über dem Boden erfolgen, daß die hohlen Stummel ſich nicht voll Waſſer ſetzen können. *K. F.*

Stecklingsvermehrung bei Einjahrspflanzen

MANCHE der bei uns als Einjahrsgewächse behandelten Pflanzen sind in Wirklichkeit mehrjährig. Da sie aber bei uns im Jahre der Aussaat ihre volle Entwicklung erreichen und unsern Wintern nicht gewachsen sind, behandelt man sie als Einjahrsblumen, indem man sie jährlich durch Aussaat neu heranzieht. Bei solchen nun, die darin etwas Schwierigkeiten machen, sei es indem die Samen schwer aufgehen oder im ersten Stadium als Sämlinge etwas empfindlich sind, ferner bei solchen, die aus Samen nicht immer echt fallen, bedient man sich mit Vorteil der Vermehrung durch Stecklinge. Zu dem Zwecke macht man von solchen Pflanzen vom August bis in den September hinein eine Anzahl Stecklinge, die zur kommenden Vermehrung, beginnend im Januar-Februar, die Vermehrungspflanzen abgeben, und die man darauf vorbereitet, indem man sie durch fleißiges Stutzen kurz hält und zur Bildung vieler junger Triebe anregt.

Ebenso gut kann man zu dem Zweck, bevor die Fröste Schaden anrichten können, sich eine Anzahl Vermehrungsflanzen aus dem Beet eintopfen. Mit Schonung des Ballens ausgehoben und vorsichtig behandelt, schattig gestellt und feucht gehalten durch öfteres Überspritzen, wachsen sie bald ruhig weiter. Man härtet sie nun durch luftigen, hellen Standort ab, um sie kühl und hell zu überwintern. Sie geben dann besonders ergiebige Vermehrungspflanzen.

Wo man sich gefüllte Petunien, Ageratum, großblumige Pentstemon, besonders schöne Farben von Mimulus und andere sortenecht erhalten will, greift man zu dieser Methode. Ferner kommt man damit bei Browallia, Alonsoa, Cuphea, Lophospermum und andern gut zum Ziel.

M. Geier.

Haltbarkeitsbeobachtung an abgeschnittenen Dahlien

MEINE Beobachtung an abgeschnittenen Blumen während der verschiedenen Herbstmonate und Witterungen ergaben eine eigentümliche Zahlenüberraschung. Bei einer sehr großen Zahl von Sorten kam man immer so ziemlich auf dieselbe Zahl von Tagen des Frischbleibens abgeschnittener Blumen, während bei andern Sorten die Versuchswiederholungen erheblich schwankende Zahlen brachten. Um diese Schwankungen und diese Nichtschwankungen nun klar zu erfassen und festzulegen, wird es noch langjähriger Beobachtungen bedürfen. Die Sache ist mal wieder nicht so einfach wie sie aussieht. Interessant dürfte es einmal werden, ausnahmsweise haltbare Sorten gesondert zusammenzupflanzen und zu versuchen, ob rein züchterisch auf das Ziel größerer Blumenhaltbarkeit mit Erfolg hingestrebt werden kann.

K. F.

JOHANNES KÖSTER / BLÜTENNOTIZEN

Juniblüher III

	1925				1924				1923				1922			
	Erblüht	Vollblüte	Noch ansehnlich bis	Verblüht	Erblüht	Vollblüte	Noch ansehnlich bis	Verblüht	Erblüht	Vollblüte	Noch ansehnlich bis	Verblüht	Erblüht	Vollblüte	Noch ansehnlich bis	Verblüht
Lilium umbellat. incomparabile	10.6.	20.6.-27.6.	1.7.	1.7.	18.6.	23.6.- 2.7.	7.7.	11.7.	18.6.	23.6.-30.6.	7.7.	9.7.	2.6.	6.6.-17.6.	20.6.	24.6.
Lupinus polyphyllus	25.5.	3.6.-13.6.	24.6.	30.6.	30.5.	9.6.-25.6.	30.6.	9.7.	31.5.	4.6.-23.6.	28.6.	7.7.	18.5.	23.5.- 2.6.	8.6.	10.6.
— — Moerheimii	27.5.	3.6.- 9.6.	16.6.	8.7.	4.6.	10.6.-27.6.	2.7.	11.7.	31.5.	2.6.-21.6.	23.6.	28.6.	18.5.	23.5.- 2.6.	6.6.	10.6.
Oenothera Eldorado	24.6.	1.7.-20.7.	20.7.	—	2.7.	7.7.-28.7.	8.8.	20.8.	21.6.	28.6.-26.7.	7.8.	23.8.	10.6.	20.6.-15.7.	18.7.	25.7.
Paeonia officinalis fl. pl. . .		—			4.6.	11.6.-20.6.	23.6.	27.6.	4.6.	9.6.-14.6.	—	18.6.	18.5.	20.5.-30.5.	—	2.6.
Papaver nudicaule		—			4.6.	18.6.- 7.7.	14.7.	25.7.	9.6.	14.6.- 7.7.	19.7.	30.7.		—		
— orientale »Goliath« . . .	31.5.	6.6.-15.6.	24.6.	24.6.	16.6.	23.6.-30.6.	2.7.	14.7.	11.6.	14.6.-21.6.	21.6.	28.6.	28.5.	2.6.-10.6.	—	13.6.
Polemonium coeruleum . . .	22.5.	29.5.-20.6.	27.6.	15.7.	11.5.	28.5.- 6.6.	2.7.	11.7.		—			13.5.	16.5.-25.5.	—	2.6.
— — 2. Blüte		—				—				—			3.6.	10.6.-27.6.	4.7.	11.7.
Potentilla hybrida coccinea .	3.6.	6.6.-20.6.	1.7.	4.7.	9.6.	16.6.-25.6.	2.7.	11.7.	31.5.	4.6.-14.6.	7.7.	9.7.	25.5.	6.6.-20.6.	29.6.	4.7.
Prunella Webbiana	15.6.	27.6.- 4.7.	19.7.	—	5.7.	11.7.-21.7.	25.7.	1.8.	28.6.	7.7.-28.7.	2.8.	13.8.	15.6.	1.7.-18.7.	27.7.	29.7.
Pyrethrum roseum fl. pl.																
Alfred Kelway	31.5.	17.6.-24.6.	1.7.	8.7.	9.6.	20.6.- 5.7.	11.7.	16.7.	11.6.	14.6.-28.6.	2.7.	9.7.	25.5.	5.6.-20.6.	27.6.	1.7.
— — 2. Blüte	Bis zum Frost Blüten					—			18.8.	20.9.-23.10.	Frost		14.9.	—	—	10.10.
— — Dr. Bosch	4.6.	11.6.			18.6.	23.6.-27.6.	30.6.	4.7.	12.6.	16.6.-23.6.	30.6.	2.7.	2.6.	6.6.-13.6.	15.6.	20.6.
— — Hamlet	29.5.	3.6.-24.6.	1.7.	3.7.	4.6.	11.6.- 2.7.	7.7.	14.7.	2.6.	7.6.-21.6.	25.6.	30.6.	20.5.	25.5.-13.6.	17.6.	20.6.
— — 2. Blüte	Bis zum Frost Blüten					—			23.8.	20.9.-23.10.	Frost		5.8.	—	—	28.9.
— — James Kelway	31.5.	4.6.-16.6.	27.6.	1.7.	4.6.	13.6.- 2.7.	9.7.	14.7.	2.6.	7.6.-25.6.	28.6.	5.7.	23.5.	27.5.-15.6.	17.6.	20.6.
— — 2. Blüte		—				—				—			12.8.	—	—	30.9.
— — fl. pl. La Vestale . . .	24.5.	6.6.-16.6.	24.6.	1.7.	6.6.	16.6.-30.6.	9.7.	16.7.	31.5.	9.6.-23.6.	25.6.	30.6.	20.5.	27.5.-20.6.	24.6.	27.6.
— — 2. Blüte	Bis zum Frost Blüten									—			18.7.	27.7.-15.8.	19.8.	28.9.
— — fl. pl. Lord Roseberry .		—				—			12.6.	14.6.-28.6.	5.7.	9.7.	27.5.	30.5.-15.6.	20.6.	24.6.
— — Orlando		—				—			4.6.	9.6.-21.6.	25.6.	28.6.	23.5.	27.5.-13.6.	17.6.	22.6.
— — nanum »Perkeo« . . .		—				—			11.6.	14.6.-23.6.	25.6.	28.6.	30.5.	2.6.-10.6.	13.6.	28.6.
— — fl. pl. »Queen Mary« . .		—				—			7.6.	11.6.-25.6.	30.6.	5.7.	20.5.	27.5.-13.6.	17.6.	20.6.
— — 2. Blüte		—				—			20.9.	4.10.-23.10.	Frost			—		
— — Vivid		—			9.6.	16.6.-30.6.	2.7.	11.7.	7.6.	11.6.-21.6.	25.6.	30.6.	23.5.	27.5.-10.6.	13.6.	15.6.
— — fl. pl. Yvonne Cayeux		—							11.6.	14.6.-25.6.	28.6.	2.7.	28.5.	25.5.-15.6.	20.6.	24.6.
— — 2. Blüte									27.8.	8.10.-23.10.	Frost					
Rudbeckia flava		—				—			18.6.	25.6.-23.7.	28.7.	9.8.	10.6.	20.6.- 6.7.	11.7.	18.7.
Ranunculus acer fl. pl. . . .	24.5.	31.5.-20.6.	1.7.	—	25.6.	9.6.- 2.7.	11.7.	18.7.	28.5.	2.6.-21.6.	28.6.	5.7.	18.5.	23.5.-17.6.	20.6.	4.7.
— — 2. Blüte		—			15.8.	22.8.-27.10.	9.11.	Frost		—				—		
Salvia virgata nemorosa . .	13.6.	20.6.-25.7.	16.8.	21.8.	4.7.	11.7.-25.7.	28.7.	8.8.	25.6.	30.6.-16.7.	26.7.	30.7.	8.6.	12.6.-11.7.	15.7.	18.7.
Sedum kamtschaticum . . .		—				—			23.6.	28.6.-12.7.	16.7.	10.9.	8.6.	13.6.- 1.7.	4.7.	8.7.
— spathulifolium		—							4.6.	11.6.-18.6.	21.6.	25.6.	20.5.	25.6.- 8.6.	10.6.	13.6.
Tradescantia virginica . . .	9.6.	15.6.-17.7.	20.7.	26.7.		—			23.6.	28.6.- 9.7.	14.7.	—	25.5.	2.6.-25.7.	27.7.	1.8.
Tritoma Express	1.7.	10.7.-15.7.	19.7.	19.7.	13.6.	18.6.-25.6.	28.6.	11.7.	2.6.	7.6.-18.6.	28.6.	23.7.	2.6.	8.6.- 1.7.	4.7.	6.7.
Verbascum pannosum . . .	6.6.	13.6.-16.6.	1.7.	19.7.	4.6.	13.6.-30.6.	4.7.	11.7.	9.6.	14.6.-23.6.	5.7.	24.7.	25.5.	30.5.-10.6.	17.6.	27.6.
Veronica amethystina . . .		—							4.6.	7.6.-16.6.	18.6.	25.6.	1.6.	6.6.-13.6.	17.6.	22.6.
— incana	16.6.	26.6.-19.7.	25.7.	5.8.	2.7.	5.7.-14.7.	18.7.	25.8.	25.6.	30.6.-16.7.	21.7.	28.7.	10.6.	13.6.- 8.7.	15.7.	18.7.
— rupestris		—				—			31.5.	7.6.-18.6.	21.6.	25.6.	18.5.	23.5.-10.6.	15.6.	20.6.
— prostrata	31.5.	6.6.-24.6.	1.7.	4.7.	4.6.	16.6.- 2.7.	7.7.	11.7.	9.6.	14.6.- 2.7.	9.7.	14.7.	25.5.	30.5.-17.6.	22.6.	29.6.

Gartenrundschau

NEUES AUS ALLER WELT

Karl Schönes Dahliengarten

WENN man an einem sonnigen Herbsttage im Osten Leipzigs die Wurzener Straße hinauswandert, erblickt man hinter dem Friedhof von Sellerhausen ein herrliches Dahlienfeld, das in allen Farben, die Natur und Zucht dieser Blume verliehen haben, uns entgegenleuchtet. Es ist der Garten des Dahlienzüchter Karl Schöne, der seit etwa dreißig Jahren sich mit immer steigendem Erfolge der Zucht dieser Pflanze gewidmet hat. Schöne ist kein Geschäftsmann im Sinne des erwerbtreibenden Gärtners, und es soll durchaus nicht versäumt werden festzustellen, daß im Norden Leipzigs, in Eutritzsch, noch größere Dahlienfelder bekannter Gartenbaubetriebe sich befinden.

Karl Schöne betreibt die Neuheitenzucht von Dahlien aus Liebhaberei, und auf seine Erfolge sollen diese Zeilen erneut hinweisen. Das Areal, auf dem sich die Anlage befindet, ist 7 500 Quadratmeter groß, und es stehen hier 25 000 Dahlien in den verschiedensten Farben und Sorten. In diesem Jahre hat der Besitzer wiederum 8 Neuzüchtungen in den Handel gebracht, und zwar sind es Goldina, Frau Ninie Biagosch, Frau Ida Mansfeld, Rosa Weltfrieden, Goldrose und Küsse mich. An Pompondahlien Karl und Pompon I.

Goldrose ist eine Seerosendahlie, eine farbenprächtige Neuheit ersten Ranges zur Gruppenbeflanzung und für feine Binderei. Die in großer Menge erscheinenden, mittelgroßen Blumen sind zart karminrosa, nach innen goldgelb verlaufend, und stellen eine Farbeneinheit von besonderem Schmelz dar, wie sie bisher noch bei keiner Dahlie vertreten ist. Ihre Schwester ist Goldina. Sie zeigt ein helleres Rot, im Spiegel mit goldgelbem Schein, und ist sehr reichblühend. Auch sie gehört in die Gruppe der Seerosendahlien.

Frau Ninie Biagosch ist eine lange und starkstielige Riesen-Schmuckdahlie. Die Farbe der in reicher Fülle erscheinenden Riesenblumen ist ein dunkles Terrakotta. Sie ist äußerst haltbar und für Vasenschmuck sehr geeignet. Frau Ida Mansfeld ist eine Kaktushybrid-Dahlie. Das satte reine Gelb der frei über dem Laube stehenden Blumen wirkt besonders harmonisch im Einklang mit der hellgrünen Belaubung.

Rosa Weltfrieden ist eine Kaktus-Dahlie und Schwester der alten weißen Sorte Weltfrieden. Ein Massenblüher, der sich besonders für Gruppenpflanzungen außerordentlich eignet.

Küsse mich ist ebenfalls eine Kaktus-Dahlie. Die in großen Mengen erscheinenden, auf langen Stielen stehenden schmuckvollen Blumen sind gut gefüllt, am Grunde hellrot, nach der Spitze zu weiß auslaufend.

Die beiden Pompondahlien zeigen ein dunkles klares Violett und ein stechendes, weithin leuchtendes Rot. Sie haben in geschickten Farbenarrangements eine ausgezeichnete Wirkung, natürlich ganz anderer Art, als es bei den Schmuck-Dahlien der Fall ist.

Schöne arbeitet mit nur wenigen Helfern unermüdlich an der Weiterentwicklung der Dahlie. Er hat mit den anderen führenden Leipziger Gartenbaubetrieben, die für Dahlienzucht in Frage kommen, dazu beigetragen, daß die Ausfuhr an Dahlienknollen ständig im Wachsen begriffen ist. Als Ausfuhrländer kommen in Frage die nordischen Staaten, Deutsch-Oesterreich, Tschechoslowakei, der Balkan, in geringerem Umfange England, Holland und Amerika. Den amerikanischen Dahliensorten sind die deutschen Neuzüchtungen noch vielfach durch ihre Reichblütigkeit und vor allem ihre Frühblütigkeit überlegen. Anfang Mai setzt dann der Versand der Stecklingsflanzen ein, der sich meist auf Neuzüchtungen erstreckt und nicht den Umfang des Herbstgeschäftes erreicht.

Auch die Blumengeschäfte und Blumenbindereien erhalten durch die Fülle der Dahliensorten eine Vielseitigkeit in der Farbenauswahl, sodaß fast jedem Geschmack Rechnung getragen werden kann. Die langstieligen Schmuckdahlien eignen sich besonders für Vasenschmuck und Festbinderei, die Pompondahlien für den gleichen Schmuck und als Tafeldekoration. Beide Typen sind für Trauerbinderei, wo sie fast nur kurz verwendet werden, ein gesuchter Artikel.

Zur Zeit ist man bestrebt, die Haltbarkeit der Dahlie als Schnittblume zu erhöhen, und durch Bodenzusätze und Düngungsversuche erhofft man auch hier Fortschritte zu erzielen.

Schöne richtet sein Hauptaugenmerk auf Kaktusdahlien und Seerosendahlien. Er legt großen Wert auf die Vereinigung leuchtender Farbtöne in langgestielten mittelgroßen Blumen und auf reiche Blütenentwicklung. Hoffentlich ist es ihm vergönnt, noch recht viele Jahre in seinem Blumengarten zu wirken. *Rudolf Gründer*

Gentiana Farreri

UEBER diese schöne neue sommerblühende Art, die bisher in Mitteleuropa noch kaum erprobt worden ist, aber sicherlich größte Beachtung verdient, berichtet A. Harley in *The Garden*. Sie wurde 1914 von dem verstorbenen Reginald Farrer in Westchina in über 3000 Meter Seehöhe in den Ardjeri-Alpen gesammelt und kam nach dem botanischen Garten in Edinburgh, wo sie 1916 zuerst blühte. Das schimmernde Cambridge-Blau der Blüten mit ihrem reinweißen Schlunde macht sie sehr auffällig. Die Blütentriebe werden gut 20 Centimeter lang und tragen bis zu sechs Blüten, deren oberste sich zuerst öffnet. Die Art bildet nicht, wie G. sino-ornata, wurzelnde Stolonen und auch keine axillären Rosetten an den Stengelknoten, sie vermehrt sich mithin nicht so schnell wie die eben genannte, die in der Gruppe der sehr spät blühenden als die wertvollste gilt. G. Farreri bringt aber zumeist reichlich Samen. Da dieser sehr schnell nach dem Welken der Blüten reift, so muß man am besten die verwelkten Blüten öffnen und die Kapseln abschneiden, sowie sie zu bräunen beginnen. Läßt man sie dann einen Tag oder zwei an der Sonne liegen, so reifen und trocknen die Samen, die man dann bis Ende Februar aufhebt. Sät man sie an diesem Zeitpunkte, so keimen sie in zehn bis vierzehn Tagen. Sobald man die Pflänzchen fassen kann, pikiert man sie ins geschlossene Mistbeet und setzt sie Ende April in einen offenen kalten Kasten. Ende Juli kann man sie dann an Ort und Stelle auspflanzen. Eine leichte Reisigdecke dürfte bei uns angebracht sein. Die Art blüht dann im folgenden Sommer als erste der spätblühenden Gruppe.

Gegen Meltau bei Rittersporn

IN dem amerikanischen Gartenfachblatt *Horticulture* wird die für jeden Delphinium-Freund so brennende Frage besprochen, wie verhüte ich den Meltau. Wenn auch dazu die Züchtung meltaufreier Sorten erste Aufgabe ist, so sind doch viele Sorten, die an bestimmten Orten sich als meltaufrei erweisen, dies nicht überall. Das Bestreuen der Pflanzen mit trockener Bordeaux-Mischung in der ersten Triebperiode ist nützlich, aber kein Allheilmittel. Es gibt nun in Amerika allerlei Mittel, doch von einer erfahrenen Gartenfreundin, Mrs. Francis King, wird folgendes Vorgehen empfohlen: Man nehme zwei Kilo ungelöschten Stückkalk, ein halbes Kilo Tabakstaub und etwa drei und ein halbes Liter Wasser, um den Kalk zu löschen. Wenn der Kalk gelöscht ist und das Kochen aufgehört hat, so vermehre man das Wasser bis auf etwa 19 Liter (fünf Gallonen), und fügt dann den Tabak zu. Ein Liter dieser Mischung verdünne man mit sieben Litern Wasser und gieße davon einen Becher voll um die Wurzeln jeder Pflanze. Dies wiederhole man, wenn nötig, alle zehn Tage. Frischen Dünger brauche man nie. Der beste ist Knochenmehl.

Regenwiderstandsfähige Edelrosen

DIE Frage, welche Rosen widerstehen am besten dem Regen, beantwortet Ch. Grosdemange in »Jardinage« für die Edelrosen wie folgt. Es sind meist nur halbgefüllte Sorten und von den gefüllten auch wiederum die, deren Petalen nach außen und nicht nach einwärts gebogen sind. Unter den englischen Sorten nennt er folgende: Lady Ashtown, zart rosa, George Dickson, tief samtrot, Hugh Dickson, leuchtend karmoisin, Margaret Dickson Hamill, gelb, General McArthur, leuchtend scharlachrot, Red Star, karmoisin, und George C. Waud, orangescharlach. Von französischen Sorten hebt er besonders hervor: Mme. Abel Chatenay, zart rosa, Mme. Jules Grolez, chinarosa, und Mrs. A.-R. Waddel, kupfrig gelb. Außerdem werden noch nachstehende Sorten angeführt: Mme. Ravary, orangegelb, Georg Arends (Fortunée Besson), rein rosa, Marie van Houtte, gelb mit rosa, François Coppée, leuchtend karmoisin, Général Supérieur Arnold Janssen, tief karmin, Mrs. Henry Morse, rosa mit roten Adern, Louis van Houtte, feurig amanthrot, Mrs. John Laing, zart satinrosa, Mme. Léon Paine, lachsrosa, Baron Girod de l'Ain, und Mrs. Farmer, aprikosenrot.

Der Glockenblumen-Scheinmohn

DIE Scheinmohne, Meconopsis, gehören zu den prächtigsten Gebirgspflanzen aus dem Himalaya und den westchinesischen Gebirgen. Sie sind bei uns noch viel zu wenig erprobt. Deshalb seien folgende Angaben von F. Brooker in The Gardeners' Chronicle über Meconopsis quintuplinervia wiedergegeben, für die der Sammler, Reginald Farrer, den Namen Harebell Poppy vorgeschlagen hatte. Die Art kam aus einer Höhe zwischen 3000 bis 4000 Metern vom Da Tung Shan. Sie ist gut ausdauernd und bildet breite Büsche mit graugrünen, rauh behaarten Blättern. Die Blüten stehen einzeln an bis fünfunddreißig Centimeter langen Stielen, sind nickend und glockig, öffnen sich bei Sonne und zeigen die weißen Staubbeutel. Die Farbe der Petalen ist ein eigenartiges zartes Graublau. Die Blätter sterben anfangs Winter ab, und die neuen Triebknospen überdauern Schnee und Regen. Die Art liebt Kalk in keiner Form. Sie gedeiht am besten in Lauberde mit sandigem Lehm in gegen Sommerhitze und austrocknende Winde geschützter, etwas feuchter Westlage. Man muß während längerer Trockenzeiten gut wässern. In günstigen Lagen, wie in Schottland, kann man sie in einen Sumpf pflanzen. Diese Meconopsis verbreitet sich durch kurze unterirdische Ausläufer, die man leicht mit Wurzeln abtrennen kann. Werden die Pflanzen zu stark, so hebt man sie im Herbst heraus, teilt sie und hält sie bis zum Wiederaussetzen im Frühling im kalten Kasten. In England hat man auch aus dort gereiften Samen bereits Nachzucht erhalten. Hoffentlich kommen solche wertvollen Pflanzen bald für ernste Gartenfreunde in den Handel. *C. S.*

Neue Bücher

HANDBUCH DES KUNSTMARKTES. Unter diesem Titel erschien vor kurzem im Verlage der Antiqua Verlagsgesellschaft Hermann Kalkhoff, Berlin, ein »Kunstadreßbuch für das Deutsche Reich, Danzig und Deutsch-Österreich. Der über 800 Seiten umfassende schmucke Band ist mit einem Geleitworte von Max Osborn versehen, das uns Aufschluß gibt über Entstehung und Inhalt dieses in seiner Art einzigen Handbuches. Bemerkenswert ist, daß im Anschluß an die Architekten auch die meisten Gartenarchitekten verzeichnet sind. Zwar fehlen unter Groß-Berlin noch einige Namen, auch andere Orte sind nicht vollzählig vertreten, doch überrascht uns oft schon die Zahl derer, die unter dieser Rubrik genannt werden. Der Inhalt ist sehr viel reicher, als der Titel vermuten läßt. Außer den Architekten, Bildhauern, Gartenarchitekten, Graphikern, Malern und Kunstgewerblern findet man auch Kunstschriftsteller, Sammler aller Art, Kunstverleger, Kunsthändler, Auktionshäuser und vor allem Behörden und Vereine. So wird das Buch sehr vielen Kreisen ein hochwillkommenes Nachschlagewerk sein.

DEUTSCHE DENDROLOGISCHE GESELLSCHAFT. In diesem Jahre schenkt die D. D. G. ihren Mitgliedern das Jahrbuch in zwei Teilen. Band 36 wurde als »Finnland-Buch« herausgegeben. Veranstaltete doch die D. D. G. vom 11. bis 24. Juli dieses Jahres eine Studienreise nach Finnland, an der sich 69 Personen beteiligten. Über diese Reise berichtet das Buch durch Schilderungen von Graf Schwerin und Paul Böhme. Dann haben aber noch eine ganze Reihe bekannter finnischer Forstleute und Gelehrter sehr lesenswerte Beiträge beigesteuert. So spricht beispielsweise Lauri Ilvessalo über die Anbaumöglichkeit ausländischer Holzarten; A. F. Tigerstedt schildert sein Arboretum Mustila, und S. Olsson gibt eine Darstellung der Gärten in Finnland. Das Mitgliedsverzeichnis der D. D. G. am Schluß ist mit Freude zu begrüßen.

SCHÄDLINGSBEKÄMPFUNG. Die kleine Schrift von Prof. Dr. *F. Stellwaag, Neuzeitliche Schädlingsbekämpfung im Obst- und Gemüsebau* ist bei Rud. Bechtold & Co., Wiesbaden, in 2. Auflage erschienen. Sie bildet ein preiswertes Büchlein, das im allgemeinen kurze und klare Auskunft gibt.

SCHÄDLINGSBEKÄMPFUNG. Von der bereits auf Seite 140 angezeigten neuen Zeitschrift »Nachrichten über Schädlingsbekämpfung« erschien im Mai No. 2, deren mannigfaltiger Inhalt wieder wertvolle Hinweise bringt. Einige sind allerdings anderen Zeitschriften entnommen. Wichtig sind stets die Referate.

DEUTSCHE KAKTEEN-GESELLSCHAFT. In der Zeitschrift für Sukkulentenkunde wird im Heft 14 ein Bericht über die Jahreshauptversammlung in Leipzig gegeben. F. Bödeker beschreibt Mammillaria Baumii und G. Schwantes Glottiphyllum Marlothii. W. v. Roeder stellt eine nachdenkliche Betrachtung an über Kakteen als Modepflanzen. *C. S.*

Zeitschriften

BELGIEN

Im Augustheft von *Le Jardin d'agrément* schreibt E. Michel über die Sorbus-Arten Aucuparia, terminalis und Aria. – In no. 514 von *La Tribune Horticole* werden Pilzvergiftungen besprochen. Im folgenden Heft werden Rosenfragen behandelt. No. 516 enthält einige Rosenbilder. In no. 517 wird die Frage der Beziehungen zwischen Gärtner und Arbeitgeber angeschnitten. In no. 518 schließen die Betrachtungen von Jules Havaux über Wiesenblumen.

DÄNEMARK

In den no. 7 und 8 der *Havekunst* sind als leitende Artikel: »Den Storre Landhave« von J. P. Andersen und »Eventyrpa k« von Charles I. Schou.

ENGLAND

In *The Orchid Review* vom Oktober werden unter anderen besprochen: Coelia macrostachya mit dem Bild eines Blütenstandes, Sophrocattleya Thwaitesii und einige Oncidien mit Blütenbildern von O. crispum, O. Forbesii, O. Marshallianum und O. Mantinii, ferner Phalaenopsis Stuartiana und Angraecum citratum. – In no. 2860 von *The Garden* gibt Gertrude Jekyll interessante Anweisungen, wie man einen kleinen Vorstadtgarten, eine Randpflanzung um eine Rasenfläche, behandeln kann. Auch eine Betrachtung über Antirrhinum sei hervorgehoben. In no. 2861 beendet Miß Jekyll ihre Darlegungen. W. L. Lee spricht über Steingärten in der Vorstadt. Die große Herbstschau (Holland Show) der Gartenbaugesellschaft wird geschildert. Auch in no. 2862 spricht Miß Jekyll über die Freude, einen neuen Garten anzulegen. Ein anderer Kenner behandelt das Thema Staudenrabatte. Einige Bilder zeigen im Herbst fruchtende Gehölze, wie Berberis subcaulialata, Malus Eleyi und Stranvaesia salicifolia. Das Farbenbild von Tulipa Kaufmanniana in no. 2863 spricht für diese »schönste« Tulpenart. Hier und im folgenden Heft kommt auch wieder Miß Jekyll zum Wort. Eine Anzahl Habitusbilder zeigen, was man in England für Strauchauswahl im Garten hat. – Die folgenden seltenen Enziane werden abgebildet in no. 2074 von *The Gardeners' Chronicle*: Gentiana pyrolata, G. Froelichii, G. sikkimensis, G. stragulata. Ein Leitartikel behandelt die Tätigkeit des berühmten Sammlers David Douglas (1799–1834). In no. 2075 finden wir unter anderem eine Besprechung der jetzt so seltenen Cantua-Arten mit Bild von C. buxifolia und eine Neubeschreibung von der bulgarischen Anthemis Sancti-Johannis. Kingdon Ward setzt seine Reiseschilderungen in no. 2076 fort. Das nächste Heft zeigt die neue Canna Ensign, und eine neue Rasse von Primula pulverulenta. G. Brochner spricht über Akklimatisationserfahrungen in Neuseeland. No. 2078 enthält unter anderen Bilder von Fritillaria nobilis, und von der wichtigen Rosenkreuzung R. rubrosa (R. rubiginosa mit rugosa).

FRANKREICH

Im Oktoberheft von *Le Jardinage* beginnt Ch. Grosdemange eine Artikelreihe über die Kunst, neue Rosen zu züchten. – S. Mottet bespricht im Oktoberheft der *Revue Horticole* Chironia linoides, eine neue Gentianacee vom Kap. Die Farbentafel zeigt Clematis Souvenir du Capitaine Thuilleaux.

HOLLAND

In no. 13 von *Onze Tuinen* wird von L. A. Springer eine Brockentour geschildert. Im folgenden Heft ist Elisena longipetala besprochen, eine mit Ismene verwandte Amaryllidacee. In no. 15 beschreibt H. Veendorp einen Besuch in Pillnitz und in no. 18 Van Laren den Garten in La Mortola. Betrachtungen über Bodenbakterien beginnen und werden in no. 17 fortgesetzt. – Heft 38 der *Floralia* ist eine spezielle »Buitenplaatsennummer«, die in no. 39 fortgesetzt wird. Im folgenden Hefte widmet Van Laren dem 400. Geburtstage von Clusius eine Betrachtung und Ch. de Bosschère beschließt seine Reiseerinnerungen. G. Bleeker setzt in no. 41 seine Gehölzschnitt-Artikel fort. Der einleitende Aufsatz in no. 42 behandelt späte Tulpen.

NORDAMERIKA

Mit dem Oktoberheft beginnt das ausgezeichnete Organ der amerikanischen Gartengestalter *Landscape Architecture* den 17. Jahrgang mit einer Betrachtung über die »Mount Everest Reservation in the Berkshires«. K. B. Lohmann behandelt die Anlage von Golfplätzen. S. L. Pattee schließt eine Darstellung über amerikanische Parks vor hundert Jahren an. G. F. Ingalls und J. F. Whitney zeigen Bilder und Werkzeichnungen von englischen Ballustraden. Eine Liste von Florida-Pflanzen wird fortgesetzt. A. T. Taylor fährt fort in seinen Landscape Construction Notes und bespricht die Anlage von Grasplätzen für verschiedene Zwecke. – Im Septemberheft der *Horticulture* schreibt E. H. Wilson über Cedrela sinensis. Ein Bericht über die Dahlienschau in Boston im Oktoberheft zeigt, wie wenige der erwähnten Sorten davon schon in Europa bekannt sind. – Aus dem Septemberheft von *Gardener's Chronicle of America* sei der einleitende Aufsatz über Perioden und Moden in der englischen Gartengestaltung hervorgehoben.

OESTERREICH

Im Septemberheft der *Gartenzeitung* schreibt H. Wolf-Pollak über Stauden und M. Geier über Buddleia. *C. S.*

VERLAG DER GARTENSCHÖNHEIT G. m. b. H. in Berlin-Westend / Verantwortlich für die Schriftleitung OSKAR KÜHL in Berlin-Westend, für den Anzeigenteil DOROTHEA KLETT, Berlin-Lichterfelde / Druck von W. SOMMER, Buch- und Kunstdruckerei in Berlin-Schöneberg.

Sammelmappe

PFLANZEN ALS GRÄBERSCHMUCK

SOWIE sich grüne Reiser und farbenprächtige Blumen zu unseren Freudenfesten Eingang verschafften, ebenso sind sie auch unsere treuen Begleiter auf der letzten Fahrt geworden, die wir alle früher oder später antreten müssen. Und noch darüber hinaus bilden sie den vornehmsten Schmuck der Erdscholle, die unsere Schlummerstätte deckt.
Kein Volk, das diese freundliche Sitte pflegt, pflanzt aber Bäume und Blumen wahllos auf die Gräber seiner Lieben, sondern trifft hierzu eine gewisse Auswahl, bei der Bodenbeschaffenheit, Klima usw. natürlich gewichtiges Bestimmungsrecht besitzen. Bei den zum Gräberschmucke verwendeten Bäumen begegnen wir der Cypresse (Cypressus sempervirens) und ihre Abarten am häufigsten. Das ernste Dunkel ihrer immergrünen Aeste, verbunden mit der himmelanstrebenden Gestalt, haben den aus dem Orient stammenden Baum schon bei vielen Kulturvölkern des Altertums zum Herold des Sensenmannes gemacht. Die Römer nannten ihn Trauerbaum und benützten sein Holz auch bei der Leichenverbrennung. Die Friedhöfe des Südens, gleichgültig für welche Konfession sie bestimmt sind, gleichen fast ausnahmslos düsteren Cypressenhainen. Bei uns, wo die Cypresse im Freien nicht mehr

recht gedeihen will, ist ihr in dem in Nordamerika beheimateten Lebensbaume (Thuja occidentalis) und der Eibe (Taxus baccata) ein ähnlicher Ersatz entstanden. Neben der Trauerweide und einigen anderen mit herabhängenden Zweigen ausgestatteten Bäumen steht ferner den Nadelholzgattungen, nicht nur in Deutschland, sondern beinahe auf der ganzen Welt, eine erste Rolle unter den zur Gräberzier bestimmten Bäumen zu. In Steiermark ist es sogar Brauch, daß man die Wände der Gräber mit Tannenzweigen verkleidet, bevor der Sarg in die Erde gesenkt wird. In sehr heißen Gegenden hat der Eucalyptus die Stelle des Nadelbaumes erobert. So ist zum Beispiel der Friedhof der Herrnhutergemeinde zu Gnaden-

thal im Kaplande seiner mächtigen Eucalyptusbäume wegen zu Berühmtheit gelangt. Die alten Griechen pflanzten mit Vorliebe Oliven und Myrthen auf die Schlummerstätten ihrer Toten.

Gehen wir nun von den Bäumen zu den Blumen über, so tritt uns abermals ein hauptsächlich von Boden und Klima bedingter Unterschied in der Gräberflora vor Augen. Im Orient und im Süden, wo die Erde meist trocken und steinig ist, sieht es mit dem Blumenschmucke der Gräber im allgemeinen spärlich aus, desto prächtiger wird dieser aber in Gegenden, wo kühleres und feuchteres Klima eine reichliche Blütenentfaltung gestatten. Die Schwertlilie (Iris sepulchlorum), aus welcher die Römer ein berühmtes Parfüm zu bereiten wußten, ist die bevorzugte Gräberpflanze des europäischen Südens, von Kleinasien und der mittelländischen Inselwelt. Die mit dem trockensten Boden fürlieb nehmende Aloe (Aloe perfoliata) hilft ihr getreulich die Ruhestätten der Südländer zu schmücken. Fast ausschließlich versieht diese fleischige Pflanze aber dieses Amt in Aegypten und Arabien, wo sie eigentlich zu Hause ist. Eine viel allgemeinere Verbreitung als Grabesblume kommt der Rose, dem Wermut, Rosmarin, Weinraute und der Ringelblume zu. Die wilde Rose (Rosa canina) galt schon bei den alten Griechen und Römern als Symbol der Verschwiegenheit und somit auch als Blume des Todes. Auch unsere Vorfahren benützten mit Vorliebe ungefüllte Rosen zum

Flechten von Totenkränzen. Wermut (Artemisia Absynthium) wurde schon von den heidnischen Germanen auf die Holzstöße gelegt, auf denen sie ihre Verstorbenen den Flammen weihten. Rosmarin (Rosmarinus offizinalis) ist zwar nicht hart genug, um dem deutschen Winter im Freien Trotz bieten zu können, ist aber doch häufig auf den Grabhügeln zu finden. Das Weinkraut (Ruta graveolens) wird in manchen Gegenden zu den Toten, angeblich wegen

den fäulnishemmenden Eigenschaften in den Sarg gelegt. Die sattgelben Blüten der Ringelblume (Calendula offizinalis) endlich sind wohl Geschöpfe des Südens, haben aber doch auf allen heimatlichen Kirchhöfen längst das Bürgerrecht erworben.
Nun bleiben uns noch einige immergrüne Gewächse zu erwähnen übrig. Die Sellerie oder Petersilie (Apium graveolens) gehört zwar nicht zu dieser Pflanzengattung, da sie aber auch bloß wegen ihres Blätterschmuckes in Betracht kommt, so wollen wir sie doch an dieser Stelle behandeln. Die Sellerie war bei den alten Griechen als Gräberschmuck ungemein beliebt, wozu ihr jedenfalls eine Sage verholfen hat. Es wird

HERRENHAUS
HEMMELMARK
ECKERNFÖRDE
den 19 Oktober 1926.

An die Rosenfirma
Gebrüder Schultheis

Steinfurth
Kreis Friedberg (Hessen)

Es ist mir ein Bedürfnis, Ihnen meine vollste Anerkennung auszusprechen für die prachtvollen gesunden Rosenpflanzen, die Sie mir wiederholt lieferten. Es ist eine Auswahl der schönsten Sorten, die vom frühen Frühjahr bis spät in den Herbst hinein unausgesetzt die herrlichsten Blüten haben, und uns auch durch ihre prachtvollen Farben und Formen die größte Freude bereiten.

Irene, Prinzessin Heinrich v. Preußen
Prinzessin von Hessen

Die vorstehend wiedergegebene *freiwillige* Anerkennung beweist am besten die

hervorragende Güte

der von uns gelieferten Rosenpflanzen.

Bestellungen für Herbstlieferung erbitten wir ungesäumt.

Unser beschreibendes Sortenverzeichnis mit 10 ausgezeichneten Farbentafeln der besten Rosensorten wird kostenlos versandt bei Bezugnahme auf die »Gartenschönheit«.

Beigefügt wird unsere Schrift »Winke für Pflanzung und Behandlung der Rosen«, die alles über die Rosenzucht Wissenswerte in leicht faßlicher Form enthält.

Rosenfirma Gebr. Schultheis

in Steinfurth bei Bad Nauheim * Gegr. 1868.

Beachten Sie unsere Garantie: **„Jede nicht gefallende Sendung nehmen wir ohne weiteres auf unsere Kosten zurück".**

gemeldet, daß man einst das Söhnchen des Königs Lykurg in ein dichtes Selleriebeet legte, weil man glaubte, daß dies mutig und tapfer mache. Allein unter den zierlichen Blättern befand sich eine Schlange, und das Kind war tot, als man es herausnahm. Seitdem dienten die Sellerieblätter dem Gräberschmucke. Auch bei den Leichenschmäusen der Griechen durften die saftigen Wurzelknollen nicht fehlen. Auch die Gräber unserer Vorfahren waren oft mit Eppich, wie man in vergangener Zeit die Sellerie hieß, geschmückt. Heute ist dieser Brauch nirgends mehr zu treffen. Das gewöhnlichste Friehofsgewächs ist der Buchs (Buxus sempervirens). Sein unveränderliches Grün galt seit jeher als Siegeszeichen über den Tod.

Wie ein schützender Teppich webt sich das Singrün (Vinca minor) über viele Grabhügel und bis zum Ende des 18. Jahrhunderts war es in ganz Deutschland üblich, daß keine Jungfrau und kein Jüngling begraben wurde, deren Leiche nicht mit einem Kränzchen aus Immer- oder Sinngrün geschmückt war. Von ähnlicher Verbreitung ist auch der Epheu (Hedera helix). Daß diese Pflanze, mit der sich die fröhlich zechenden Griechen und Römer einst nach Bacchantenart die Stirnen umflochten, zu dieser traurigen Verwendung kam, ist eigentlich merkwürdig. Da aber Freude und Schmerz oft enge Nachbarn im menschlichen Leben sind, so können wir den scheinbaren Widerspruch damit erklärt sehen.

Hans Winter.

Gartenschönheit

eine Zeitschrift mit Bildern

für Garten- und Blumenfreund · für Liebhaber und Fachmann

Dezember 1926

in Gemeinschaft mit Karl Foerster und Camillo Schneider

herausgegeben von · Oskar Kühl

Verlag der Gartenschönheit G.m.b.H. Berlin-Westend

7. JAHR / HEFT 12 DEZEMBER 1926

GARTENSCHÖNHEIT

eine Zeitschrift mit Bildern
für Garten- und Blumenfreund
für Liebhaber und Fachmann
in Gemeinschaft mit Karl Foerster
und Camillo Schneider
herausgegeben von Oskar Kühl

Inhalt des Dezemberheftes:

Seite

Aus dem englischen Garten in München / Bild 309
Heinz Wichmann / Ein Rosensondergarten / Mit 3 Bildern und 2 Plänen 309
F. von Oheimb / Cosmeen 312
Camillo Schneider / Borkeschönheit im Winter / Mit 9 Bildern 313
Paul Landau / Neue Wege der Blumenmalerei / Mit 5 Bildern 316
W. v. Roeder / Weiße Kakteen / Mit 3 Bildern 318
Arpád Mühle / Bougainvilleen-Erinnerungen / Mit Bild 320
Karl Foerster / Reise nach Korsika / Mit 3 Bildern 321

Gartenaufgaben

H. Fr. Pohlenz / Ein umgestalteter Hausgarten / Mit 2 Bildern und Zeichnung . . . 325

Aus dem Blumengarten der Literatur

Lycas oder die Erfindung der Gärten von Salomon Geßner 326

GARTENARBEIT UND BLUMENPFLEGE

Alexander Steffen / Die Hacke und ihr Gebrauch / Mit Zeichnung 327
Paul Kache / Immergrüne Topf- und Kübelpflanzen im Winter 328

Unter Glas

J. Scherer / Oncidium sphacelatum / Mit Bild 329

Auf dem Balkon

H. Gehringer / Balkonschmuck im Winter 330

Handwerkliches

M. Geier: Harnstoffdüngung bei Dahlien / Dahlien unter Glas 330

GARTENRUNDSCHAU

Neues aus aller Welt

Eine Gefahr für den Weltgarten / Der Ursprung der Rose Gruß an Teplitz / Gute neue Rosen 331

Chronik

Tote des Jahres 331

Neue Bücher

Grünanlagen der Stadt Köln / Pflanzenzüchtungsinstitut zu Eisgrub / Ein alter Friedhof / Deutscher Gartenkalender / Wachsende Häuser / Amerikanische Dahlien-Gesellschaft / Amerikanische Iris-Gesellschaft / Massachusetts Horticultural Society 332

Zeitschriften 332

BILDBEILAGE

Aus einem kalifornischen Gartenparadies

FARBIGE BILDBEILAGEN

Begonien, Gloxinien und Achimenes longiflora im Glashause zu Eisgrub / Naegelia zebrina
Blumenbilder von Wilhelm Schmid

Monatlich ein Heft

Bezugspreis für das Vierteljahr

in *Deutschland* 4 G.-M. und 0.75 G.-M. Versandkosten (Postscheckkonto Berlin 76290),

im *Ausland* einschließlich Versandkosten: 5.25 Goldmark = 1,25 U.S. A.-$ oder entsprechend in der Landeswährung.

Preis des Einzelheftes

1.50 Goldmark zuzüglich Versandkosten

Verlag der Gartenschönheit G.m.b.H.
Berlin-Westend / Akazien-Allee 14.

In den durch ihre Pflanzenſammlungen einſt weltberühmten Glashäuſern der fürſtlich Liechtenſtein-ſchen Gärten zu Eisgrub in Mähren findet man auch heute noch ſehr viel Schönes. Unſer Bild zeigt eine Zuſammenſtellung von prächtigen Begonien und Gloxinien mit den jetzt nicht mehr ſo häufigen Achimenes longiflora, deren eigenartige dunkel violettblaue Blüten ſich wohltuend abheben. – Bild C. S.

Unter den Gesneraceen, die als dankbare Zimmergewächſe gelten können und die ſich im Winter zur Blüte bringen laſſen, ſtehen die Naegelien vielleicht an erſter Stelle. Die Formen der N. zebrina, die unſer Bild aus den Kulturen von E. Benary in Erfurt zeigt, zeichnen ſich durch reiche Blüte und ſehr lebhafte Farben aus. Für Winterblüte pflanzt man die Rhizome im Juli. – Bild Biſſinger.

Aus dem engliſchen Garten in München. – Bild Mercker

Im Dezember

HEINZ WICHMANN / EIN ROSENSONDERGARTEN

WENN ich meinen Garten auf der Dresdener Gartenbauausſtellung beſprechen ſoll oder überhaupt davon berichte, welche rein geiſtigen Überlegungen mich gerade zu dieſer Planung führten, muß ich kurz einiges aus der Vergangenheit, aus der Geſchichte der Gartenkunſt und meine Auffaſſung darüber klarſtellen.

Bis zur Renaiſſance kann man in der Gartenkunſt kaum von bewußter *Geſtaltung* ſprechen; einige Ausnahmen ſind allerdings zu verzeichnen, aber im Ganzen war der Park und Garten nur eine *Planung* und zwar eine möglichſt zweckmäßige und klare, den damaligen beſonderen Forderungen angepaßte. Die Gärten waren geometriſche Gebilde, zu denen der Wohnkörper keine Beziehung hatte. Reine *Flächenlöſungen* für Bäume, Sträucher und Kleinpflanzen.

Erſt in der Renaiſſance verſpüren wir ein höheres Wollen. Der Garten ſteht in Achsbeziehung zum Hauſe. Das Haus herrſchte, und aus ihm entwickelt ſich erſt der Garten. Ebenſo iſt es im Barockgarten. Weiter, es wird nicht nur die Horizontale bei der Geſtaltung berückſichtigt, die Vertikale tritt hinzu. Es entſtehen Gartenmauern, aus Stein, aus Baum und Strauch, und dadurch Gartenräume, bewußt geſtaltete Gartenräume. Natürlich entſprachen dieſe dem damaligen Lebensgefühl: es wurden Repräſentationsräume geſchaffen, Räume, die Macht und Reichtum nachweiſen. Erſt im Barock entſtehen Gartenboudoirs, die aber durch Umfang und Pracht ſich unſerem Verſtäadnis entziehen, ſie laſſen uns kalt, trotz des Zaubers, der über ihnen ſchwebt! Die ſymmetriſche Aufteilung und Geſtaltung von Haus und Garten war direkteſter Lebensausdruck der beiden Kunſtepochen. Bewußt wurden ſie geplant und alles, was die Symmetrie ſtören oder nur hemmen konnte, mit brutaler Geſte beiſeite geſchoben. Der Grundriß wurde der Faſſade unterordnet.

Dem Barock folgt der engliſche Garten, vorerſt eine mißverſtandene Kopie des chineſiſchen Gartens, ſpäter bekommt er durch einige große Menſchen eine gewiſſe europäiſche Selbſtändigkeit, um dann aber in falſcher Romantik und Sentimentalität vollſtändig unterzugehen, ſodaß ſelbſt Ausdrucksmenſchen dieſer Zeit, wie Goethe, die Richtung im »Triumph der Empfindſamkeit« (Seite 272), beſpötteln.

Im Ende des 19. Jahrhunderts beginnt man ſich ſo langſam wieder auf ſich ſelbſt zu beſinnen. Die Malerei gibt den Anſtoß, die anderen darſtellenden Kunſtgebiete folgen. Das dem Laien ſo unbequeme Zeitalter der »Ismen« iſt da! Eine Revolution folgt der anderen, in *ſcheinbar* wüſteſtem Chaos folgt Ismus auf Ismus. Iſt aber wirklich ein Chaos eingetreten? Ich möchte dieſe Frage verneinen, indem ich die jüngſte Vergangenheit mit »Analytiſcher Zeit« bezeichne.

Was heißt das nun? Es heißt: daß die Künſtler ſich wieder zur *reinen*, zur elementaren Linie, Form, Körper, Farbe, Ton, Wort und was ſonſt noch an Ausdrucksmitteln zur Verfügung ſtand, durchſuchten. Es heißt: daß ſie mit aller Macht um letzten, um reinſten Ausdruck rangen. Daß dabei oft die Reſultate brutal oder wirr oder einſeitig oder überſpannt erſchienen, ſollte nicht verwundern, es ſind Probleme, Analyſen; man vergeſſe das nicht und vergeſſe nicht, daß bei analytiſcher Arbeit durch die Begrenztheit des Menſchen Irrtümer ſehr nahe liegen.

In der Gartenkunſt ſtießen die beiden Pole Jung und Alt nicht ſo hart aufeinander, wie in jedem anderen Kunſtgebiete. Einmal iſt der ganze Beruf zu konſervativ, außerdem iſt der Werkſtoff des Gärtners weit ſpröder und ſchwieriger als der der anderen darſtellenden Künſte. Man beginnt langſam den Garten wieder zu bauen, man begreift, daß die »Bretzelwege« auf 500 Quadratmeter Fläche mit einem geometriſch gelöſten Hausgrundriß unmöglich ſind. Man begreift, daß eine Auelandſchaft oder ein wildes Gebirgsbild auf ſolchem Raume ein Witz ſind. Die Gärten werden ruhiger in den Linien und Flächenaufteilungen, bis ſie ganz ruhig waren, um zum Schluß *tot* zu ſein. Erſtarrt ſind Formen und Körper, und dieſe toten, aneinander gereihten geometriſchen Gebilde wurden überhäuft mit möglichem und unmöglichem Pflanzenmaterial, ſodaß der kleine Hausgarten bald als ein botaniſcher Garten angeſprochen werden konnte. Langſam ging dann das edlere Material zugrunde, und über blieb ein zuſammenhangloſer verwildeter Garten.

Mit dem Vorſtehenden mußte ich erſt meine Stellung zu der Gartenkunſt klarlegen, mußte zeigen, wo ich meine Fäden in der Vergangenheit zu knüpfen ſuche. Es iſt der Barockgartentyp, beſſer der *bewußt gebaute* Garten. Der Garten, der ſich dem Hauskörper eingliedert, der die Spannung der Baumaße aufnimmt, ſie weiterleitet und ſo gewiſſer-

maßen die Hausplaſtik trägt, ſie verankert auf der dafür vorgeſehenen Fläche Erde. Nur ein Unterſchied beſteht zwiſchen den Vorbildern der Barockzeit und den geſtellten neuen Geſtaltungsaufgaben. Die vorherrſchende Symmetrie des Barocks, die Symmetrie als Bauidee iſt nicht mehr der hohe Wunſch, ſondern die Harmonie, ob auf dem Wege der Symmetrie oder Asymmetrie erreicht, iſt dabei Nebenſache. Ich möchte an dieſer Stelle einmal Goethes Forderungen über einen guten Bau wiedergeben. Schiller ſchreibt an W. von Humboldt am 9. November 1795 und ſagt: »Goethe verlangt von einem ſchönen Gebäude, daß es nicht bloß auf das Auge berechnet ſei, ſondern auch auf einen Menſchen, der mit verbundenen Augen hindurchgeführt würde, noch empfindbar ſein und ihm gefallen müſſe.« Eine Klarheit, die ſich Goethe als Vorbereitung für die italieniſche Reiſe verſchafft. Dasſelbe gilt natürlich auch für den Garten, als Glied des Hauſes. Mit wenigen Worten ſagt Goethe hier alles, was heute in Bücherbergen beſprochen wird. Er faßt mit dieſen in kriſtalliniſcher Klarheit die geſamten Wünſche der modernen Architekten zuſammen und wird dadurch Modernſter unter den Modernen.

Ich ſagte vorhin, daß der Garten mit dem Hauſe eine Einheit bilden ſoll; das war das erſte Problem, das ich mir bei der Planung des Roſengartens ſtellte. Haus und Garten eine Einheit, und ſo wurde das Teehaus »Teekanne« der Kernpunkt des Ausſtellungsgartens, aus dem die Aufteilungslinien hervorſtoßen und wieder zurücklaufen zu feſter Bindung. »Warum gerade ein Teehaus?« ſo wurde ich oft während der Ausſtellungszeit von Fachleuten und Laien gefragt. Der Tee ſchwebte mir als leichteſtes, flüchtigſtes Genußmittel vor und aus dieſem Grunde am beſten geeignet, ihn mit dem Garten zu verbinden, beſonders aber mit der Königin der Blumen, der Roſe. Nach dieſen Geſichtspunkten wurde nun auch das Teehaus »Teekanne« entworfen und geſtaltet. Ein Teekulthaus ſollte es ſein, auf europäiſche Bedürfniſſe zugeſchnitten, dabei wurde jede Anlehnung an orientaliſche Stile ſtrengſtens vermieden, denn der Tee iſt ſelbſtverſtändlichſtes Getränk auch des Europäers geworden. Das Teehaus iſt nach dem Garten zu geöffnet, die Fenſter laſſen ſich herausnehmen, ſodaß man im Hauſe ſelbſt das Gefühl haben kann, im Freien unter den Roſen zu ſitzen, ohne dabei die ruhige Abgeſchloſſenheit des Raumes zu entbehren.

Beim Entwurf der Tiſche wurden dieſe niedriger vorgeſehen, als ſonſt üblich. Die Kreisform ſollte die einzelnen Gruppen der Beſucher zuſammenfaſſen. Die Farben ſind zart gehalten, die lichtgelben Töne des Vorraumes ſtufen ſich langſam über Roſa nach dem Gebäudeinneren bis ins tiefe Blau ab. Die Tiſche und Stühle ſind lila geſtrichen, Tiſchplatten und Stuhlſitze ſchwefelgelb.

Der Roſenſondergarten von Münch und Hauſe iſt nun unmittelbar in ſeinen Maßen und Proportionen aus dem Teehaus abgeleitet. An und für ſich iſt das ganze Gärtchen ſchon durch den vorhandenen alten Baumbeſtand räumlich gefaßt. In dieſem vorhandenen Raum iſt das Teehaus ſo eingefügt, daß es als ruhiger Punkt, als feſter Pol, um den ſich die anderen Formen fügen, wirkt. Ein zweiter, aber untergeordneter Ausgangsgunkt iſt der Senkgarten. Von dieſem Punkt aus fangen die niedrigen Roſenformen in ihrer Linienführung an zu wandern.

Wie aus dem Bepflanzungsplan erſichtlich iſt, iſt in der Mitte des Senk-

gartens auf dem Feld 1 eine blutrote Roſe, Miss E. C. van Rossem, geflanzt. Die Bewegung in Rot läuft nun weiter durch die Felder 4, 5, 6, 11 und endet auf dem langen Felde 12. Eine andere Farbbewegung in Rot und dem Rot angenähertem Roſa kommt wieder von 1, läuft über 4, 5, 6 und nun über 10, 17, 18, 19 und verankert ſich in Feld 20. Eine dritte Wanderung in Gelb wird auf den Feldern von 2, über 3, 7 nach 21 geführt. Aber nicht nur die geſamten Quartiere ſind ſo durch geſpannte Farbenfelder verbunden, ſondern auch die einzelnen Quartiere ſind in ſich geſchloſſen, ſo Quartier 18, 19, 20, 21, 22. Die erſten 3 Farben entwickeln die Bewegung in Rot. Nr. 21, »Golden Emblem«, ſpannt die rote Führung durch Zitronengelb, während 22 als Drehpunkt, Mrs. Henry Morse mit einem flachen Roſa, neutral gehalten iſt und die ſcharfe Farbenſpannung wieder ausgleicht. Natürlich ſind auch die einzelnen Felder je nach ihrem Farbintenſitätswert in ihren Größenverhältniſſen abgewogen; ſo iſt erreicht, daß in der ſtarken Bewegung Entſpannung eintrat.

Oben ſagte ich einmal, daß die moderne Kunſtanſchauung auf die Elemente der Geſtaltung zurückgreiſt. Ich glaube durch das Angeführte gezeigt zu haben, was ich darunter bei der Behandlung der Farbe in der Gartenkunſt verſtehe, möchte aber jetzt noch einen Schritt weiter gehen und zeigen, wie ich die Pflanze ſelbſt und ihren eigenſten inneren Ausdruck ſprechen laſſen möchte oder ſogar durch Ordnung, alſo durch klare Geſtaltung, ſie auch für den Beſchauer, der der Schönheit »Pflanze« fernſteht, zur Sprache zwingen.

Jede Pflanze hat in ſich einen geſchloſſenen beſtimmten Ausdruck und Habitus. Nur die Pflanzen einer in ſich abgeſchloſſenen Sorte ähneln ſich ſehr, ſodaß ſie im Auge des Laien als etwas im ganzen Einheitliches in Erſcheinung treten. Unter den Roſen gibt es nun etwa folgende Wachstumsformen: 1. vertikal wachſende (Roſen mit einigen ſchönen langen Trieben und 1 bis 2 Blüten) 2. pyramidal wachſende Sorten (Roſen mit breit verzweigtem Wachstum über der Veredlung, dann aber nur mit einigen Trieben durchwachſend und jeder Trieb mit 1 bis 2 Blüten) 3. buſchig wachſende Roſen (ſolche mit breiter Baſis über der Veredlung und dann ſtark und gleichmäßig durchtreibend mit vielen Blüten.) 4. wild und unregelmäßig wachſende Sorten (ſie ſind eigentlich ohne Form, wirken als Einzelpflanze ſperrig und ungegliedert, auch die Blüten ſtehen unregelmäßig und beſetzen je nach Sorte ſtark oder gering die Triebe).

Wie aus dem Hauptgrundriß hervorgeht, iſt auch dieſes bei der Bepflanzung berückſichtigt, indem die vertikal wachſenden Sorten in langen Reihen gepflanzt ſind, dicht in den Reihen mit weitem Reihenabſtand, ſodaß dadurch Farbenlinen entſtehen; die pyramidal wachſenden Roſen ſind ſchräg zu den Flächen geſtellt, ſie wirken wie Bänder, breiter, als die Roſen zu 1. Die buſchigen Roſen wurden auf den langen Feldern quer gepflanzt, es entſtanden dadurch feſte kurze gedrungene Bänder, während die in ihrem Habitus wilden Formen durch quadratiſche Pflanzung flächig zuſammengezogen ſind.

Die hochſtämmigen Roſen ſind in dieſem Garten als körperbildende Elemente verwertet. Sie umklammern die Quartiere der Buſchroſen und verlaufen in einem Falle in ihren Linien im Teehauskörper, im anderen Falle in der Pergola, die die umfaſſende Gebärde weiter führt und das Geſamtgelände nach zwei Seiten gegen die amorphen Laubmaſſen des Baumbeſtandes abſchließt. Die einzelnen Reihen der Hochſtammroſen ſteigen nach außen, alſo nach den Gartengrenzen zu um 10 Centimeter an und bilden ſo, da jede Reihe nur mit einer

Sorte bepflanzt iſt, eine Farbenſkala. Die einzelnen Reihen ſind ſehr weit von einander gepflanzt, etwa einen Meter; in den Reihen ſtehen dagegen die Roſen ſo dicht, daß ſich die Kronen berühren. So entſtehen im Körper wieder farbige Linien, zwiſchen denen man gut gehen kann, um auch die Einzelroſe bewundern zu können. Der Boden zwiſchen den Reihen iſt mit Gras beſät, nur um die Roſenreihen ſteht beiderſeitig 10 Centimeter Boden an. Auf dieſe Weiſe wurde die ſonſt unter hochſtämmigen Roſen tote Bodenfarbe mit dem friſchen Grün des Raſens belebt. Die Pergolen ſind als Architekturſtücke und Zweckkörper einfach gelöſt, ſie ſollen die Kletterroſen an ſich heraufklimmen laſſen, zugleich mit raumbildendes Element ſein und die Menſchenhand durch klare Ordnung und Sachlichkeit in der Form vor den bizarren Formen der Bäume zeigen. Bewußt iſt hier Härte in die Form getragen, um die Kontraſte zwiſchen Menſchenhand und Natur wirken zu laſſen.
Nun ſei noch einiges zu dem unterirdiſch beleuchteten Waſſerbecken geſagt. Es entſtand aus dem Wunſch, die empfundenen Bewegungen der Roſenfarben hier ſinnlich ſichtbar zur Syntheſe zu zwingen. Außerdem wollte ich das lebendige Waſſer mit reinen Farbentönen miſchen. Die im Waſſerbecken von unten beleuchteten Glaszüge ſpringen nacheinander in 10 Zeiten an. Springſtrahlen ſind rhythmiſch in der Fläche verteilt und halten die Oberfläche des Waſſers dauernd in Bewegung. Dadurch miſchen ſich die von unten durch das Waſſer geblendeten Farben und geben ein recht luſtiges Farbenſpiel.
Eine Ausſtellung ſoll dem Beſucher Anregung geben, ſoll ihm Probleme zeigen, ſoll die Kritiker reizen zur Stellungnahme zu den Problemen, die aufgerollt wurden. Dies auf der einen Seite. Der Schaffende aber ſelbſt wird nicht oft Gelegenheit haben, ſo frei und ungebunden zu arbeiten, ſeine eigenſten Ideen ohne Rückſicht auf Wünſche der Auftraggeber in Wirklichkeit umzuſetzen wie auf Ausſtellungen.
Deshalb wird eine Ausſtellungsarbeit für den Schaffenden ſelbſt ein Born neuer Ideen und ein Antrieb, die beſchrittene Bahn weiter und beſſer auszubauen.

Bepflanzungsplan

1 Miss E. C. van Rossem
2 Mrs. David M'Kee,
3 Mrs. Wemyss Quin
4 Mad Edouard Herriot
5 Padre
6 Hortulanus Budde
7 Willowmere
8 Freiburg II
9 Marie Adélaïde
10 Aspirant Marcel Rouyer
11 Hadley Rose
12 General Mac Arthur
13 Wilhelm Kordes
14 Mad. Jules Bouché
15 Souvenir de Claudius Pernet
16 Mad. Ravary
17 Red Star
18 Ophelia
19 George C. Waud
20 Etoile de Hollande
21 Golden Emblem
22 Mrs. Henry Morse
23 Kaiſerin Auguſta Viktoria
24 Margaret Dickson Hamill
25 Yvonne Rabier
26 Eblouissant
27 Orléans-Rose
28 Rödhätte
29 Miss Edith Cavell
30 Eva Teſchendorff
31 Frau Eliſabeth Münch

Hochſtämme

32 Général Sup. Arn. Janssen
33 Laurent Carle
34 Veluwezoom
35 Kaiſerin Auguſta Viktoria
36 Ophelia
37 Golden Emblem
38 Suzanne Turbat (niedrig)
39 Golden Ophelia
40 Adolf Koſchel
41 Mrs. Charles Russel
42 Gorgeous
43 Frau Karl Druſchki
44 Hortulanus Fiet
45 Mrs. Charles Russel (Hochſt.)
46 Golden Emblem
47 Gloire de Hollande

F. VON OHEIMB / COSMEEN

SEIT der Breslauer Jahrhundertausſtellung 1913 kam die Vorliebe für ſchön blühende Stauden erſt ſo richtig zur Aufnahme bei den Damen der größeren Güter Schleſiens, ja ſie ſcheinen vielen erſt von ihnen entdeckt, nachdem ſie das Eliſabethgärtlein und andere altväteriſche Staudengärten und G. Arends reizvolle Blütenſtauden bewundert hatten. Plötzlich ſollten überall Staudengärten hergeſtellt und angelegt werden. Da mußten überall großblumige Phloxe, Ritterſporn, Sternaſtern und Goldrauten gleich in größeren Mengen und Sorten wirkungsvoll angebracht werden, und etliche Stufen mußten hinunterführen in das durch Koniferen oder Steinblöcke an tiefſter Stelle des Parkes angelegte lauſchig weltabgeſchiedene Staudengärtlein.
Aber man ſollte doch über dieſer oder jener neuen Vorliebe auch nicht Altehrwürdiges ganz vergeſſen. Die alte gute Rabatte mit den Einjahrsblumen in allererſter Reihe nicht, mag ſie nun zum nützlich trockenen Gemüſegarten führen oder in der Nähe des Hauſes ſtehen. Ja ſie eignet ſich auch ſehr gut als Blumengrund, aus dem ſchöne Stammroſen aufſteigen, ſchon deshalb, weil dieſe Blumen zum Winter das Feld räumen für das Umlegen dieſer Roſen.
Unter dieſen Einjahrsblumen, die im Frühbeet ausgeſät, dann ausgepflanzt werden, iſt *Kosmos* oder, wie der Gärtner ſagt, *Cosmea hybrida grandiflora* noch wenig bekannt, und doch verdient ſie aus vielen Gründen die größte Verbreitung. Vor mir auf meinem Schreibtiſch ſteht ein großer Strauß davon jetzt Anfang November, wo faſt alle anderen Blüten ſchlafen gingen bis auf wenige Herbſtſternaſtern, Ringelblumen und ganz vereinzelte Nachblüten von Salpiglossen. Und dieſer Strauß hält ſich bereits zehn Tage friſch und duftet nicht, was außerordentlich wertvoll fürs Zimmer iſt, und jede Knoſpe blüht noch reicher auf. Die Cosmea alſo reicht tief in den blumenarmen Winter hinein der allerletzten Winterblume, der Chriſtroſe, Helleborus niger, die Hand und ſchließt ſomit den Jahresreigen, denn jene blüht unterm Schnee ſogar weiter und zeigt ſich ſomit wieder als allererſter Vertreter Floras im neuen Jahresreigen.
Dieſe Cosmeen werden unter günſtigen Bedingungen weit über mannshoch. Aus ihrem wolkenweich zierlichen Laube, das mit dem des hübſchen Meum und des Gurkendill einige Ähnlichkeit hat, entſprießen lange dünne, elaſtiſche Zweige, auf denen ſich die großen kreisrunden Sternblüten bei leiſeſtem Winde ſchaukeln und wiegen wie keine andere große Blume. Man ſieht ihr förmlich das prachtvolle Gefühl an, von jedem Lufthauch auf und ab zu wippen, zu fliegen: ein Gefühl, wie wir es im Traum erleben, wenn wir plötzlich fliegen können und über unſeren Lieben und Bekannten vielbewundert von ihnen an der Zimmerdecke fliegend ſchweben.

Aus einem kalifornischen Gartenparadies

Von der eigenartig rauhen Oberfläche der einzelnen Blütenblätter oder von deren eigenartiger Rinnenfaltung und dem ausgebissenen Rande mag es kommen, daß sich jeder Regentropfen lange an den untersten Blättchen des Sternes sowie auch den tausend und abertausend Stengelchen ihres blattlosen Laubwerkes hält und im Sonnenschein weithin strahlt. Das gibt ein Funkeln und Blitzen von Millionen schönster Edelsteine, man meint im Märchenlande zu sein und nur zuzugreifen brauchen nach dem köstlichen Geschmeide für seiner Liebsten Hals. Und solcher Schmuckreichtum hält sich recht lange, sodaß selbst ein leidenschaftlicher Spätaufsteher noch zurecht kommt nach dem Nachtregen und bei schon höher stehender Sonne.
Dazu nehmen diese Edelsteine durch den Abglanz der verschiedenen Farbentöne der Blüten allerlei herrliche Farben an; Rubin und Granat sind vorherrschend, dann wieder glitzert ein Edelopal von einer helleren Blüte in seiner Nähe; denn die Blüten der Cosmeen wechseln vom schneeigsten Weiß und mattweißesten Rosa bis ins tiefste Weinrot und stumpfste Carmin; es ist einfach eine Lust, all diesen Wechsel mit der Sonne, also von Süden her zu sehen.
In ihrer weißen Blüte erinnert sie sehr an schöne Anemonen, freilich ohne deren Atlasglanz, oder an kleine Margeriten, doppelt so groß wie die Feldwucherblume, die die heimlich Liebenden so gern zupfen und die ihnen immer wahrsagt, wenn das Sprüchlein nur richtig begonnen wird.
Die Blüten aber wölben sich zum Unterschied von diesen leise nach vorn über, besonders die hochstehenden übergebeugten, sodaß sie aussehen, als ob sie sich zum Beschauer herabbückten und recht vertraulich mit ihm sprächen, was sehr behaglich macht.
Einen großen Vorteil sehe ich in einer größeren dichten Anlage von Cosmea, daß keinerlei Unkraut unter ihr aufkommt; man könnte also diese hübschen Pflanzen fast zur Bodenreinigung benutzen, allerdings nur in Sonnenlage; denn selbst Disteln kommen nicht auf, wo sie bisher in überwältigender Menge hausten.
Dabei ist die Cosmea lächerlich anspruchslos; wenn sie auch auf dürftigem Boden etwas kleiner und dürrer wird als in recht gutem, so bleibt sie sich im ganzen Charakter doch völlig treu, ja sie wirkt dort zierlicher, durchsichtiger, also fast noch schöner. Kaum eine andere Einjahrsblume hat solchen langen Flor, und das ist zumal in so trockenen, ja dürren Jahren wie 1921 recht wertvoll; sie lacht über alle anderen Blüten, die über der schrecklichen Dürre ihre Blätter zu Krallen verkrümmen, so recht das Bild der Verzweiflung, und sich schrecklich anstellen, als schmachteten sie schon in den letzten Zügen.
Hübsch hell goldgrün ist auch ihr nur aus Stäbchen und Fäden bestehendes Laub, bei Kälte fast etwas gar zu oliv flaschengrün, also fast unvermittelt in der Umgebung.
Kurz, die Cosmea ist mir mit allen ihren Lichtseiten lieb geworden.

CAMILLO SCHNEIDER / BORKESCHÖNHEIT IM WINTER

KAUM haben die Herbststürme im Verein mit den ersten Frösten die laubabwerfenden Bäume ihres Laubkleides beraubt, so treten diese uns in ihrer Wintertracht als ganz verwandelte Wesen entgegen. Sie zeigen Formen und Farben, die wir früher nicht sahen, die uns im Schatten des Laubdaches ja entgehen mußten. Die Kronenbildung offenbart Schönheiten, von denen uns das grüne Sommerkleid nichts ahnen ließ. Diese Schönheit des kahlen Baumes, auf die wir schon früher in Wort und Bild hinwiesen, ist für sehr viele Gehölze außerordentlich bedeutsam und bezeichnend. Das gilt aber auch von den so mannigfachen Merkmalen der Rindenbildung, der Zweige und der Knospen. Das Studium der Zweige und Knospen im Winter (Band IV, Seite 8) ist nicht nur sehr reizvoll, sondern für jeden Gehölzfreund und Gartengestalter notwendig, will er seine Bäume und Sträucher auch im Winter sicher erkennen. Da die Pflanzung im entlaubten Zustande der laubabwerfenden Gehölze erfolgt, so bildet die Kenntnis der Wintermerkmale eine notwendige Vorbedingung für die richtige Durchführung der Arbeiten. Die Art der Ausbildung der Rinde und vor allem der Borke der Baumstämme tritt erst an älteren Pflanzen recht in Erscheinung. Sie ist im Sommer und Winter die gleiche, doch fallen uns auch diese Merkmale im Winter stärker auf, wenn der Stamm unbeschattet und hell beleuchtet vor uns steht. Gegen Ende des Winters, wenn der Saft zu steigen beginnt, erscheinen uns die feinen Farben der Borke ganz besonders lebhaft und ausgeprägt.
Fast jede Baumart hat ihre ganz bestimmten Reize, kennzeichnet sich durch einen in bestimmter Weise ziselierten Borkepanzer, dessen Eigenart sich in Worten nur schwer deutlich machen läßt. Wir wollen daher heute frühere Hinweise (Band II, Seite 34) in Wort und Bild ergänzen.
Das erste Bild zeigt eine südosteuropäische Weißdorn-Art, *Crataegus nigra*. Sie bildet steif verästelte baumartige Sträucher. Die Stämme und stärkeren Äste zeigen eine ziemlich auffallende längsrissige Borkebildung. Im Sommer wird man diese nicht gewahr, da ja bei der reichen Verästelung der eigentliche Stamm ganz im Laubwerk verborgen ist. So bieten gerade die Sträucher im Winter wohl die meisten Überraschungen. Sie fallen nicht so in die Augen, wie die Bäume, wenn man aber näher zusieht, so ist ihre Borke von überraschender Mannigfaltigkeit.
Die Nebeneinanderstellung von Stämmen der amerikanischen Weißesche, *Fraxinus americana*, der amerikanischen Korkulme, *Ulmus racemosa*

Crataegus nigra

oder Thomasii, und der virginischen Hopfenbuche, *Ostrya virginiana,* zeigt charakteristische Formen der Borkebildung. Der Stamm der Hopfenbuche ist am glattesten und feinschuppigsten. Die Färbung der Borke ist ein helles Graubraun, die Schuppung ist dünn. Die Korkulme zeigt, wie schon der Name sagt, an den Zweigen eine auffällige Korkflügelbildung, wie wir sie auch von unserer heimischen Korkrüster kennen, die meist als Ulmus suberosa geht und eine Form der Feldulme ist, die jetzt den Namen U. foliacea (ehemals U. campestris) trägt. Auch die Stammborke ist hier recht dick, tief gefurcht und löst sich zuletzt etwas in Schuppen auf. Die Färbung ist fast nur grau. Die Esche hinwiederum zeigt eine dicke längsrissige Borkestruktur von graubrauner Färbung, deren Ausbildung für viele Eschen typisch ist. Auch die Amerikanerin bildet, gleich unserer heimischen Esche, mächtig aufstrebende sehnige Stämme, deren Gewalt sich erst im Winter so recht offenbart. Die Wurzelanläufe sind auf dem Bilde noch nicht so ausgeprägt, wie wir es bei alten F. excelsior so oft beobachten können. Sind dann die alten Stämme am Fuß mit Moospolstern stark bekleidet, so bildet jeder im Winter ein Schaustück für sich.

Andere Borkepanzer tragen wieder die japanische Linde, *Tilia japonica,* der nordamerikanische Judasbaum, *Cercis canadensis,* und die amerikanische Weißlinde, *Tilia heterophylla.* Wenn wir die beiden Linden vergleichen, so sehen wir sofort, wie verschiedenartig die Borke bei Arten der gleichen Gattung, die doch sonst nicht allzugroße Unterschiede in dieser Hinsicht zeigen, doch sein kann. Wir kennen ja andere Gattungen, wo gerade in der Rindenstruktur sehr auffällige Kennzeichen sich ergeben, wie etwa bei den Birken (Band II, Seite 35.) Die Borke der amerikanischen Weißlinde ähnelt etwas der ihrer europäischen Schwester, der Silberlinde, T. tomentosa. Die Struktur ist gröber, unregelmäßiger, deutlicher gefurcht, als bei der Japanerin. Diese gleicht sonst in allen ihren Merkmalen stark unserer Winterlinde, Tilia cordata, wird aber im allgemeinen nicht so groß wie diese.

Ganz abweichend von den Linden ist aber die Borke des Judasbaumes. Hier löst sich die Borke

Oben links: Fraxinus americana
Oben Mitte: Ulmus racemosa
Oben rechts: Ostrya virginiana
Unten: Liquidambar styraciflua

zuletzt in dünnen rötlichbraunen, flockigen Schuppen los. Leider sind im Mitteleuropa starke Pflanzen kaum anzutreffen. Alle Bilder, die heute gezeigt werden, wurden im Arnold Arboretum von mir aufgenommen.

Hier gehörte zu den auffallendsten heimischen Bäumen der Rotahorn, *Acer rubrum*, der zwar schon lange in Europa sich eingebürgert hat, von dessen Schönheit und Mächtigkeit sich aber nur der eine richtige Vorstellung machen kann, der ihn in der Heimat gesehen hat. Er gilt mit Recht als einer der schönsten amerikanischen Bäume. Wir kennen hier bei uns meist nur den verwandten Silberahorn, A. saccharinum oder dasycarpum, als alten Baum. Ein Rotahorn aber wie der, dessen Doppelstamm unser Bild zeigt, ist von größerer Schönheit sowohl im Frühjahr, wenn die roten Blüten die Zweige scharlachfarben säumen, wie auch im Herbst, wenn das Laub sich so wundervoll rot tönt. Und dann nicht zuletzt im Winter, wenn die mächtige und doch feine Krone sich gegen den Himmel abzeichnet. Die dunkle Borke bildet sich sehr unregelmäßig aus.

Oben links: Tilia heterophylla
Oben Mitte: Cercis canadensis
Oben rechts: Tilia japonica
Unten: Acer rubrum

Zum Schluß unserer heutigen Hinweise sei noch ein anderer interessanter amerikanischer Baum gezeigt, der storaxliefernde Amberbaum, *Liquidambar styraciflua.* Man sieht ihn leider viel zu selten bei uns. Ich erinnere mich eines schönen Stückes in dem ehemaligen Hofgarten zu Karlsruhe, der sich durch so manche seltene Bäume auszeichnete. Die Stämme tragen eine ziemlich tief gefurchte graubraune Borke, die sich auch an den stärkeren Ästen schon deutlich kenntlich macht. Selbst die feineren Zweige zeigen schon Korkansatz. Je älter die Bäume werden, desto schärfer prägt die Borke sich aus; deshalb heißt der Baum in der Heimat in den südlichen Vereinigten Staaten auch Alligator-Baum. Die Bäume, namentlich die altweltliche Art, liefern das sogenannte Storaxharz, daher auch der englische Name Sweet Gum. In der karminroten Herbstfärbung des Laubes wird dieser Storaxbaum kaum von einem anderen amerikanischen übertroffen, obwohl doch gerade Nordamerika an Gehölzen so reich ist, die im Herbst in bunten Farben prangen. Er wächst in der Heimat in feuchten Flußniederungen, will jedenfalls keinen armen und zu trockenen Boden haben, um gut fortzukommen.

PAUL LANDAU / NEUE WEGE DER BLUMENMALEREI

GOETHE hat in dem Auffatz über Blumenmalerei, (in »Über Kunft und Altertum« 1817), mit feinem groß-fchauenden Blick die Entwicklung diefer Kunftgattung rafch gezeichnet: den Alten waren die Blumen Nebenfache, fchmückendes Beiwerk, der Renaiffance waren fie Begleiterinnen menfchlicher Geftalten — »bis nach und nach diefe untergeordneten Gegenftände durch die Machtgewalt des Künftlers felbftändig erfchienen und das Hauptintereffe eines Bildes zu bewirken fich anmaßten«. Dies gefchah in den Niederlanden, als die Blumenmalerei »auf die eigentliche Blumifterei« gegründet werden konnte, »welche mit unendlicher Neigung ausgefuchte Floren durch Kultur zu vervielfältigen und zu verherrlichen trachtete«. Goethe, der felbft mit fo außerordentlicher Sorgfalt und hingebender Eindringlichkeit für feine botanifchen Arbeiten Blumenbilder gefchaffen hat, konftatiert dann aber noch eine neue Phafe, in der fich die Pflanzendarftellung von dem Nützlichkeitsftandpunkt des Apothekers und der Augenbefriedigung des Blumenfreundes befreit hat: in der wiffenfchaftlichen Betrachtung, die »über Unendlichkeiten herrfcht«. Der moderne Künftler muß nicht nur den inneren Sinn haben, der die großen holländifchen Maler befeelte, er hat nicht nur den Blumenfreund, fondern auch den Blumenkenner zu befriedigen, er foll »im Wahren und durch das Wahre das Schöne geben«. »Nun verlangt die Kunft, daß er feine Blumen nach Form und Farbe glücklich zufammenftelle, feine Gruppen gegen das Licht zu erhöhe, gegen die Seiten fchattend und halbfchattig abrunde, die Blüten erft in voller Anficht, fodann von der Seite, auch nach dem Hintergrund zu fliehend, fehen laffe und fich dabei dergeftalt bewähre, daß Blatt und Blättchen, Kelch und Anthere eine Spezialkritik aushalte und er zugleich im Ganzen Künftler und Kunftkenner zu befriedigen, den unerläßlichen Effekt dargeben und leiften foll«.

Das Ideal der Blumenmalerei, das der Dichter hier aufgeftellt hat, gewinnt heut wieder neue Bedeutung. Nicht als ob wir die wiffenfchaftliche Exaktheit fo ftark betonen wollten wie der Pflanzenforfcher und Pflanzenzeichner Goethe, aber feine Forderung, »im Wahren und durch das Wahre das Schöne zu geben«, befeelt auch die junge Künftlergeneration, die nach der Apotheofe des Augenblicks im Impreffionismus und der Naturverneinung der abftrakten Stile zu einer »neuen Sachlichkeit« zurückgefunden hat. Alle Kunft kann ja nur dann ihr Höchftes bieten, wenn fie im Einzelwefen den Sinn der Welt fpiegelt, und nicht umfonft ift die Zeit der holländifchen Blumenmalerei, in der das Stilleben als Gipfel der Schönheit gepriefen wurde, zugleich die Epoche Spinozas, der in jedem Ding die Seele des Alls erblickte, und die Jakob Böhmes, deffen myftifche Vifionen ihm aus einem Zinnteller entgegenftrahlten. Auch die Romantik eines Philipp Otto Runge erfchaute in feinen wunderbaren Blumenftücken eine ganze Philofophie des Werdens und Vergehens, der Tages- und Jahreszeiten. Der Impreffionismus hat demgegenüber gerade das »Gegenftandslofe« des Stillebens betont, wie dies der bekannte Ausfpruch Liebermanns zeigt: »Die fpezififch malerifche Phantafie kann fich in einem Stilleben gerade deshalb ftärker zeigen als in der Darftellung des Menfchen, weil das Bund Spargel nur durch die künftlerifche Auffaffung intereffiert, am Menfchen, am Kopf oder an einem fchönen Frauenkörper — namentlich an letzterem — intereffiert uns auch noch der dargeftellte Gegenftand«. So wird das impreffioniftifche Stilleben, feitdem Manets letzte Reife feine Blumen mit einem glanzumflirrten Duft verklärte, zu einer virtuofen, bezaubernden Belebung der Oberfläche in Lichtreflexen und Farbenvaleurs, die entweder den Strauß zu einem Feuerwerk fprühender Sonnenfunken und bunter Töne machen oder die Pflanzen

Die moderne Malerei bevorzugt wieder die Darstellung größerer Blumenarangements, wie dies in der klassischen Zeit der Holländer üblich war. Ein Reichtum von Farben und Formen soll zur Einheit gestaltet werden. In dem hier abgebildeten Stilleben von Wilhelm Schmid ist eine solche geschlossene Komposition trotz scheinbarer Wirrnis und Unregelmäßigkeit durch eine sichere koloristische Behandlung durchgeführt.

Das zweite Blumenstilleben Wilhelm Schmids ist ein bezeichnendes Beispiel für die „neue Sachlichkeit", mit der die heutige Kunst der Natur gegenüber steht. Die Blumen sind mit großer Genauigkeit wiedergegeben, zugleich aber waltet ein erlesener Formensinn im Aufbau des Werkes und der symmetrischen Anordnung. So verbinden sich Vase und Strauß zu einer harmonischen Wirkung.

mit einem Schleier von Luft und Licht umhüllen. Jene Gesetze des Aufbaues, die Goethe in der Pflanzendarstellung hervorgehoben sehen wollte, der tiefere Zusammenhang des einzelnen Gewächses mit der Gesamtheit des organischen Lebens wurde vernachlässigt. Die innere Beseelung trat hinter dem Schwelgen in den Reizen der Epidermis zurück. Erst van Gogh sprengte diesen Bann, indem er aus seinen Sonnenblumen und Iris die ganze Glut seines Gefühls herauslodern ließ, und die Expressionisten, ein Nolde, Rohlfs, Pechstein, folgten ihm darin nach. Nun wurde die Blume so ausschließlich Symbol des Inneren, wie sie vorher eine Verherrlichung des Äußeren gewesen war. Diese Entwicklung des Blumenstillebens in der modernen Malerei mußte kurz skizziert werden, um die Situation zu bezeichnen, die die junge Generation vorfand. Diese Künstler unserer Gegenwart wollen die Innerlichkeit nicht aufgeben, aber zugleich sich demütig in die Wirklichkeit versenken und recht sachlich, recht schlicht sein. Sie wollen nichts in die Natur hineinlegen, aber möglichst viel von dem, was in ihr steckt, herausholen, wie es Dürer fordert. So sind sie ganz von selbst dazu gekommen, das Gesetzmäßige in der organischen Welt stärker zu betonen und nach dem Goetheschen Ideal durch das Wahre zum Harmonischen und Schönen zu gelangen. Auch *Wilhelm Schmid*, der tüchtige kraftvolle Schweizer, in dessen selbständig-eigenartiger Entwicklung die Tendenzen des neuen Stils doch so klar ausgeprägt sind, ist diesen Weg gegangen, in seiner ganzen Kunst und besonders in seinen Stilleben, von denen hier einige als Beispiele moderner Blumenmalerei abgebildet werden. Schmid hat als Expressionist, ja Futurist begonnen, dessen bizarre Traumvisionen durch eine musikalische Farbigkeit geläutert waren. Dann wurden seine Lehrer, die alten deutschen Meister, denen sich der auf der Grenzscheide germanischen und romanischen Wesens geborene Alemanne verwandt fühlte, ein Konrad Witz, ein Nikolaus Manuel Deutsch oder Holbein, und die italienische Landschaft, die ihm die Schönheit organischen Aufbaus, gesetzmäßiger Harmonik offenbarte. Die Natur wurde wieder seine Führerin, und an ihrer Hand versenkte er sich auch in die schweigende und doch so eindringlich redende Welt des Stillebens.

Die großen bunten Blumensträuße, die Schmid zuerst in den von ihm so sehr geliebten und eifrig gesammelten Majolika- und Fayence-Gefäßen arrangierte, haben etwas von der nervösen Unruhe, dem leidenschaftlich zupackenden Farben- und Formenrausch des Expressio-

nismus. Die ſchweren Blumenkelche ſcheinen vor Üppigkeit zu berſten, neigen ſich wie trunken hernieder, Zweige, Rispen und Blätterbäumen ſich, ſchnellen empor, ſind wie von einem inneren Sturm durchwühlt. Dieſe Erregung, die ſich in einer Häufung der Mittel und in einem Drang nach Bändigung der wuchernden Triebe kundtut, wird — zuerſt in den ſchönen Aquarellen — durch ein ſicher wägendes Formgefühl und eine ſubtile Nüancierung gedämpft. Der Künſtler weiß die Maſſen immer ſichrer zur Einheit zu fügen, immer reicher zu gliedern, immer mehr von dem Subjektiven ſeiner Anordnung und Auswahl zu befreien, durch ihre eigne Geſetzmäßigkeit wirken zu laſſen. So entſtehen jene wundervollen Blumenſtilleben, an denen die delikate Anordnung, die zarte Verteilung und Gruppierung im Raum, die Verfolgung des Details bis in die feinſten Verzweigungen einer Ranke und die leiſeſte Blattſchattierung entzückt und doch die Maſſe der blühenden Dinge durch eine einheitliche Auffaſſung geformt iſt. Aber Schmid vertieft ſich dann mehr und mehr in das Einzelne, gibt ſich einer Fein- und Kleinmalerei hin, die ans Miniaturenhafte grenzt. Er kann ſich garnicht genug tun im Durchleben und Durchformen jener winzigen Dinge, in denen ſich die Größte des Schöpfers am ſtärkſten offenbart, und es kommt etwas über ihn von der frommen Demut, mit der die Zeichner der alten deutſchen Kräuterbücher jedem Würzelchen und jedem Blatthärchen nachſpürten. Auch die Farbe entfaltet nun nicht mehr eine brauſende Orcheſterfülle, ſondern ſchlägt Töne der feinſten Kammermuſik an, ſo zum Beiſpiel in ſeinen Kakteen-Bildern, auf denen die kleinen Blütchen der ſtachligen Geſellen mit minutiöſen Strichen aufgeſetzt ſind und die rötlichgrünen Töpfe mit dem blauen Schatten ſich doch faſt grandios von dem grünlichen Hintergrund abheben. In den neueſten Blumenſtilleben Schmids iſt eine Art Syntheſe erreicht, wie ſie Goethe vorſchwebte. Die einzelne Blüte wird in ihrer organiſchen Geſetzmäßigkeit und zugleich in ihren Details ſouverän erfaßt; durch das tiefe Gefühl für das Weſentliche und Typiſche iſt aber jede Kleinlichkeit und naturaliſtiſche Häufung vermieden. Die liebevollſte Behandlung der Geſtalt paart ſich mit einer hohen inneren Wahrheit der Blume zu einer geradezu monumentalen Wirkung, die ebenſo in dem ruhigen, ſchlichten Aufbau des Ganzen zum Ausdruck kommt. Geboren iſt dieſe Blumendarſtellung aus jenem Gefühl heraus, das Schwind einmal in die Worte faßte: »Wenn man ſo ein Pflänzle nur recht mit Liebe und Andacht abzeichnet, dann kann man aus ihm das ganze All herausholen!«

W. VON ROEDER / WEISSE KAKTEEN

Cephalocereus senilis

Es liegt tief im menſchlichen Weſen begründet, ſich ſtets mit beſonderer Vorliebe dem Fremdartigen, von der Regel Abweichenden zu widmen. Wo auch nur immer neuartige, nicht in allen Fällen ſchönere Formen auftreten, ſei es in der Tierzucht, in der freien Natur oder in der Gartenkunſt, ſofort zeigt ſich beim Herrn der Schöpfung der Wille, das Neue dauernd zu erhalten! Bei den Haustieren entſtanden ſo die buntgefleckten oder rotäugigen Raſſen, bei den Pflanzen wurden durch dieſe Vorliebe die weißbunten Varietäten und andere Zierformen erhalten. Das Auftreten der weißen Farbe iſt alſo meiſt das Kennzeichen einer abſonderlichen Bildung. Auch im Reiche der Kakteen finden wir dieſe Erſcheinung, man denke nur an die bekannte Opuntia variegata, oder an den hellgelb getuſchten, gewöhnlich grünen Cereus triangularis! Ich möchte heute aber nicht auf jene Abarten eingehen. Die Natur iſt eifrig bemüht, dieſen Fremdlingen das Leben ſo ſchwer wie möglich zu machen und deshalb ſeien in dieſem Auffatze nur jene weißen Formen erwähnt, die ſich als beſtändig im Kampfe ums Daſein erwieſen. In der Tierwelt finden wir völlig weiße Tiere wie die Eisbären oder Schneeziegen, die aber trotzdem dunkles Hautpigment beſitzen. Von Entartungsformen darf alſo hier nicht geſprochen werden! In gleicher Weiſe treten auch bei den Kakteen weiße Arten auf, die naturbedingt ſind, alſo einen völlig normalen Ablauf ihrer Lebensfunktionen aufweiſen. In dieſen Fällen liegen die Gründe für das rein äußerliche Weißwerden in Anpaſſungserſcheinungen begründet, ohne die gerade ein Ausſterben dieſer Formen herbeigeführt worden wäre!

Wenn alſo der Kakteenfreund eine beſondere Vorliebe, und das mit Recht, für die »Weißen« beſitzt, ſo hat er es nicht mit einer mehr oder weniger ſtarken Entartungserſcheinung zu tun, ſondern er darf ſich freuen, eine wenn auch ſeltene, ſo doch völlig naturbedingte Pflanzenart vor ſich zu haben. Weshalb lege ich aber darauf ſo ſtarken Nachdruck? Weil wir in der Pflege unſerer weißen Kakteen mit ihrer biologiſchen Eigenart in weitgehendem Maße zu rechnen haben.

In der Natur iſt nichts zwecklos, alſo muß auch die weiße Stachelfarbe wohlbegründet ſein; ſo erblicken wir auch in dieſem ſo hellfarbenen Kleide nichts weiter als eine beſondere Art des Lichtſchutzes, vielleicht auch des Wärme- und Waſſerhaushaltes. Ich kann hierauf nicht näher eingehen (hiervon handelt mein im Kosmos-Verlag erſchienenes Büchlein »Wege zur Praxis«), es ſei jedoch nur das Eine geſagt: Kaum eine Pflanzenfamilie zeigt uns derartig ausgebaute Vorrichtungen, um ſich vor der Sonne zu ſchützen. Es wäre aber gänzlich falſch, wollten wir daraus den Schluß ziehen, die Kakteen wollten nur mäßige Sonne. Nein im Gegenteil, wir entnehmen den mächtigen Lichtſchutzanlagen, daß die Kaktee ganz beſonders viel Sonne aushält und verlangt, denn wozu gebrauchte ſie denn ſonſt den Schutz? Die weißen Arten nehmen in dieſer Beziehung aber wieder eine Sonderſtellung ein, da bei ihnen die Lichtſchutzanlagen in außerordentlich eigenartiger Weiſe ausgebildet

ſind. Weiterhin beobachten wir, daß nicht alle weißen Arten in derſelben Form dies Ziel zu erreichen ſuchen. Die eine bilden helle Stacheln aus, die anderen entſenden lange derbe Haare, wieder andere ſchützen ſich durch flaumfederartige Härchen, wie wir ſie bei Mamillaria plumosa (die fedrige!) finden. Bei Aſtrophytum bildet ſich ein ganz feiner, zarter, ſchuppenförmiger Wachsüberzug, der demſelben Zwecke dienen muß.

Echinocactus scopa candida cristata

Die Wirkung dieſes Stachelkleides kommt nun darin zum Ausdrucke, daß die Sonnenſtrahlen in ſehr ſtarkem Maße reflektiert werden, während bei vielen Mamillarien beiſpielsweiſe das enganſchließende Stachelkleid als Mantel wirkt. Dieſe Umhüllung können wir mit dem äußeren Glasgehäuſe einer Thermosflaſche recht wohl vergleichen, es hält die umgebende Luft möglichſt lange feſt und damit auch etwaige Tauniederſchläge; andererſeits läßt dieſer Luftmantel aber auch keine raſche, plötzliche Erwärmung zu, verhindert alſo eine Verſengung. Andere Kakteen brauchen dieſen Schutz ebenſo ſehr, aber wir finden ſie niemals, oder nur mit Ausnahmen, die wieder beſondere Vorrichtungen beſitzen, ſo außerordentlich alleinſtehend, wie gerade die Weißen. Um bei unſerem Beiſpiel zu bleiben, ſeien wieder die weißen Mamillarien erwähnt, die wir geradezu als Stoßtrupps gegen pflanzenleere Gebiete bezeichnen dürfen. Ich denke dabei etwa an die Arten aus Mexiko oder Arizona, die ihre Vorpoſtenſtellung allein durch ihr weißes Stachelkleid halten können. Wenn wir aus den Forſchungen Wilhelm Weingarts entnehmen, daß Kakteen auch fähig ſind, durch ihre Stacheln Waſſer aufzunehmen, ſo gewinnt dies merkwürdige Stachelkleid beſondere Bedeutung. Bei der Feuchtigkeitsarmut der genannten Gebiete iſt es daher nicht verwunderlich, wenn die Kakteenfreunde die Wahrnehmung machen mußten, daß weiße Arten faſt allein durch Nebeln (Waſſerzerſtäuber) ihr Feuchtigkeitsbedürfnis befriedigen können. Altmeiſter O. W. Rother, der Begründer der heutigen Pflegeſchule, wies als erſter mit allem Nachdruck auf dieſe Beobachtung hin in ſeinem Buch: Anzucht und Pflege der Kakteen. Sicher iſt, daß alle weißen Arten, beſonders ſolche mit feinem Kleide oder mit Wollſchopf nicht geſpritzt ſein wollen, ſondern das Waſſer ſoll in feinen, glitzernden Tautröpfchen an der Oberfläche des Mantels hängen bleiben.

Wenn man mich fragt, welche der weißen Kakteen am ſchönſten ſei, ich würde ſagen, dies ſei Mamillaria micromeris, Echinocactus senilis, auch die Mam. plumosa, und ſchon ſtiegen mir die Zweifel auf. Faſt möchte ich behaupten, wer die Wahl hat, hat die Qual! Unter den Cereen iſt das allbekannte Greiſenhaupt vielbeliebt. Cephalocereus senilis, aus den heißen Schluchten Mexikos, gehört zu den Prunkſtücken jeder Sammlung. Er iſt jedoch für den Anfänger meiſt ein rechtes Schmerzenskind, da er in falſcher Pflege viel von ſeiner eigenartigen Schönheit einbüßt, inſoferne als ſeine Haare nur kümmerlich gebildet werden.

Wahre Zierſtücke einer Sammlung ſind auch die weißſchopfigen »Pilos«! Pilocereus leucocephalus (früher Houlettii), ſei als erſter genannt, doch ſteht ihm Cereus (Espostoa) lanatus (früher P. Dautwitzii) mit ſeinen weißen Haaren in keiner Weiſe nach! Im Olivenklima Südeuropas wird C. (Oreocereus) Celsianus ſogar im Freien gehalten, dürfte auch bei uns zu den härteren Arten gehören. Seine Heimat

Mamillaria plumosa

ſind die braſilianiſchen und chileniſchen Hochflächen. Die Varietät Bruennowii zeichnet ſich durch bräunlichere Stacheln aus, während die Varietät lanuginosior wolliger in der Behaarung iſt.
Ein herrlicher weißer Cereus iſt C. Strausii, der ſich nicht allein durch ſeine Tracht, ſondern beſonders auch durch ſeine dunkel karminvioletten Blüten auszeichnet. In der Pflege iſt er dankbarer als die erſtgenannten, aber anſpruchsvoller als Celsianus, alle zuſammen verlangen aber im Winter mindeſtens Staubſchutz unter Glas.
Bei den Echinocacteen ſteht der weiße E. senilis mit Abſtand an der Spitze, wenn wir die Behaarung als Maßſtab nehmen. Nach ihm möchte ich *scopa* var. *candida* folgen laſſen, die nicht nur in ihrer *cristata*-Form von entzückender Schönheit iſt. Echinocactus Lenninghausii und Haselbergii mögen den Übergang zu den halbweißen Arten bilden, ihr Kleid iſt von reizender Zartheit, kommt aber nur zur Geltung, wenn die Pflege eine recht üppige Ausbildung geſtattet.
Auch die Echinocereen liefern uns eine Anzahl weißer Vertreter. Leider ſind die Echinocereen nicht beſonders beliebt, was weniger auf ihren Habitus zurückfällt, als auf eine ſcheinbare Widerſpenſtigkeit in der Pflege! Der »weißeſte« iſt wiederum das Greiſenhaupt, aber diesmal das »falſche« Greiſenhaupt: Ecer. De Laeti. Trotz ſeiner Falſchheit iſt er doch leichter zu behandeln, als der vornehme, ehrwürdige *Cephalocereus senilis.* Wunderſchön ſind auch die weißen pectinati in verſchiedenen Abſchattierungen von gelbweiß bis orangegelb. Auch cinerascens, enneacanthus, Leonensis und Ehrenbergii aus der Gruppe der Leucacanthi ſind von gewinnender Schönheit. Das Schönſte an einem Echinocereus, mag er heißen wie er will, ſind aber ſeine hauchzarten leuchtenden Blüten!
Am verbreiteſten von allen weißen Kakteen ſind die weißen Mamillarien, an deren Spitze die *M. plumosa* ſteht. Von ebenſo feiner Schönheit iſt die Mamillaria micromeris, die weniger wegen der Farbe, als vielmehr durch das wundervolle Ebenmaß ihrer Beſtachelung auffällt. M. bocasana wie leona gibt in ſchöngewachſenen Exemplaren den genannten nicht viel nach und kann an Zartheit, Flaumigkeit ruhig ihresgleichen ſuchen. Weitere ſehr ſchöne Vertreter ſind die rein weiße Parkinsonii, ferner bicolor in Varietäten, Schelhasei wie auch elegans candida rosea, Mühlenpfordtii, bombycina und spinosissima, vielleicht auch noch *pusilla* und *Schiedeana* können in dieſer Schönheitskonkurrenz angeführt werden. Bezüglich der Pflege ſei erwähnt, daß alle dieſe Arten kalkreiche Erde lieben. *Opuntia leucotricha* möge als letzte »Weißheit« den Reigen ſchließen. Sie iſt für große Sammlungen geeignet

ÁRPÁD MÜHLE / BOUGAINVILLEEN-ERINNERUNGEN

IN dem leider durch die Kriegsnöte dahingegangenen großen Bougainvilleenhaus in der Rothſchildſchen Gärtnerei auf der Hohen Warte in Wien iſt wohl manchem der vielen Großſtadtbeſucher zum erſten Male die ganze, zügelloſe Pracht der Tropen aufgegangen. Es hatte ſich dort ein in dem freien Glashausgrund ausgepflanztes Exemplar zu einer Rieſenpflanze entwickelt. Man entſchloß ſich, über dieſes vielbewunderte Schauſtück ein neues Haus auszuführen. Auf einem enormen halbkugelförmigen Geſtell, daß ſich durch die ganze Länge des etwa 30 Meter langen Hauſes hinzog, waren die Triebe dieſer mächtigen Bougainvillea fein ſäuberlich geleitet und aufgebunden. Die jungen Seitentriebe endigten alle in wundervollen großen, hellila Blütenähren und bedeckten bis zur Erde hinab buchſtäblich jeden Zoll mit den alles überflutenden Blütenwogen. Jahre hindurch war im Mai bis Juni die unbeſchreibliche Pracht dieſer einzigen Pflanze der Magnet aller Blumen- und Pflanzenfreunde der ehemaligen Monarchie. Man kann ſich kaum einen Begriff von dieſen Blütenmengen machen, und wer die Pflanze kannte, betrauert mit Wehmut ihren Hingang. Als Wien damals Tauſende von hungernden und frierenden Menſchen in Not und Mühſeligkeit beherbergte, mußten auch die herrlichen Rothſchildgärten ihren Kriegstribut zollen, und ſo fiel auch dieſes Unikum von einer Bougainvillea der Kohlennot zum Opfer. Man hat jetzt nach dem Kriege einen Nachfahren an die alte Stelle gepflanzt, und da es an Pflege für das Gedeihen dieſer Pflanze nicht fehlt, ſo wird dereinſt wohl wieder die alte Pracht zu ſchauen ſein. Allerdings werden zwei Jahrzehnte vergehen müſſen, um das ehemalige Bild wieder erſtehen zu laſſen.
Man hat vor dem Kriege auf der Hohen Warte — angeregt durch dieſe glabra-Pracht — auch mit anderen Formen wie spectabilis, Sanderiana, Cypherii und Charlesworthii Verſuche angeſtellt, aber keine konnte es der typiſchen B. glabra gleich tun! Ihre locker gebauten, vollen und doch ungemein graziöſen Blütenähren von nahezu dreißig Centimeter Länge blieben unerreicht, und jeder Blütenzweig für ſich war ein Gedicht an Anmut und Liebreiz.
Im Freien bekommt der Bougainvilleenflor ein ganz anderes Colorit. Das unter Glas ſo ungemein noble Amethystlila verwandelt ſich an der Sonne, im Freien, bis zum tiefen Violettrot. Unvergeßlich wird mir der Bougainvilleen-Anblick bleiben, den ich vor Jahren in Tunis genoß. Der Regierungspalaſt des Bey von Tunis, der maleriſch auf ſtolzer Bergeshöhe tront und auf das Gewimmel der vielen Schiffe, die die azurblaue Mittelmeerfläche durchkreuzen, niederſchaut, iſt auf ſeiner Nordſeite vollkommen mit einer Bougainvilleenwand bis zum Firſt hinauf überſponnen. Meines Dafürhaltens war es B. spectabilis mit ziemlich derbem Laub und von einer wahren Orgie glühend violetter Blüten überſchüttet. Ein märchenhafter Anblick und eine jedenfalls ungemein repräſentable, fürſtliche Pflanzenzierde für ſolch feudales Herrſcherhaus. Auch in Algier und Palermo trifft man auf Bougainvilleen, die in ungebundener Freiheit in die Baumkronen hinaufklettern und von dieſer Höhe ihre violetten Blütenraketen in die Tiefe ſenden.
Die Liebe zu den Bougainvilleen läßt mich auch heute noch ein Dutzend zwanzigjähriger Kübelpflanzen der Sanderiana-Varietät kultivieren. Sie bilden in ungezwungener, lockerer Strauchform mächtige Büſche, werden im Frühjahre etwas angetrieben und entfalten im Mai ihren, alle Beſucher bezwingenden Flor. Sie haben mir alljährlich ſehr viel Freude gebracht.

KARL FOERSTER / REISE NACH KORSIKA

Garten- und Pflanzenerlebniſſe

WAS? Ihr wollt im Auguſt nach Korſika — in die Hitze hinein, das iſt ja wie ein umgekehrt laufender Film, wo die Leute in ein brennendes Haus hineinklettern!«
Wir alle ſind eben angefüllt mit falſchen und weſenloſen Vorſtellungen, ſind voll lächerlicher innerer Ablehnung eines Weltinhalts, den wir gar nicht kennen.

Um zwei nachmittags fährt man in Berlin ab und badet ſchon am Spätnachmittag des Tages drauf im Genueſer Mittelmeerwaſſer; mit ſo wenig Zeitaufwand ſchwebt man faſt in die Welt eines anderen Sterns hinüber. Die Uferſtrecke von Genua über St. Margerita nach Livorno, woſelbſt das Schiff nach Korſika abfährt, gehört in den erſten Stunden zu den ſchönſten Italiens. St. Margerita und Portofino übertrifft an intimer großartiger Schönheit und an reiner Lieblichkeit eigentlich die ganze Weſtriviera. Was hier an phantaſtiſchen, japaniſch bewaldeten Landzungen, Trauminſeln und Traumgärten in kurzer Land- und Waſſerfahrt auf uns eindringt, weckt den Wunſch, die Landſchaften und Gärten wochenlang zu durchſuchen. Homeriſche Felſenküſten ſteigen mit ſammetgrünen ſturmverkämpften Pinienwäldern aus ſchaumgeſäumten Türkiswaſſern, in denen Herden kleiner, lapislazuliblauer Fiſche ſchwimmen. Alle Gärten bis in die kleinen Bahnhofumgebungen hinein ſtecken voll kleiner, reizvoll gärtneriſcher Gedanken. Unglaublich leichte Erfindungskraft iſt dort überall am Werke. Man könnte ein rieſiges Bilderbuch machen unter dem Titel: »Kleine Gartenanregungen des Südens für den Norden«.

Es handelt ſich hier keineswegs um bloße, nette Naivitäten, ſondern auch um mannigfachſte kühne künſtleriſche Ausmünzung unſeres heutigen Zeitgefühls. Daneben werden uns auf Schritt und Tritt uralte Gartenahnungen erfüllt. Die Vegetation beſorgt das ſchon auf eigene Hand, ſie ſteht ja doch dem Weſen des Gartens viel näher als unſere Gartenpflanzenwelt.

Erſt im Schiff in Livorno glaubten wir wirklich, daß wir den ſagenhaften Inſelboden betreten würden. Die Bergketten der italieniſchen Küſte leuchteten dem Schiff noch ſtundenlang nach, während ſchon bekannte und unbekannte Inſeln wie Felſenträume aus dem Nachmittagsglanz des Himmels klar hervortraten, darunter auch Elba. Das Meer auf den Schattenſeiten des Schiffes lag in einer mit Schaum geſchmückten Bläue, die dem Auge völlig neu war. Man ſchwebte über dieſe heiligen Urwaſſer, wie über ein unirdiſches ſternenhaftes Fluidum. Die Waſſer waren raſtlos bewegt ſeit Homers Zeiten, und die koſtbare urweltliche Schönheit lag friſch und neu vor dem Blick des heutigen Auges. Das mythiſche Spiel der Delphine, nie geglaubt, eh' unſer Auge es ſelber erſchaut, tauchte in der Ferne auf — fliegende Fiſche ſchnellten aus dem Meere, ſpannten gläſerne blaue Flügel und flogen in ſtarrem, zauberiſchem Fluge über die Waſſerfläche und tauchten wieder ein. Unfaßbarer Anblick, der uns ſprachlos macht. Die Luft war von einer Sanftheit und von einem Meeresaroma bei wohltätigſter Sonnenbeſtrahlung, daß die wunderbare Körperfriſche jedes Gefühl durchdrang.

Hoch am Weſthorizonte erſchienen nach ſechsſtündiger Fahrt in blauweißem blendendem Himmelsglanz hohe Umriſſe der gewaltigen Berginſel Korſika. Aus der Kajüte vorn am Schiff kam etwas Geſang und Klaviermuſik, geboren aus der traumhaften Stunde. Plötzlich floß alles in ein zeitloſes Gefühl des ſchon einmal Erlebten hinüber, darin alle Meeresträume und Reiſebücher bis zur Kindheit hinab zuſammengefaßt waren.

Der Glanz war ſo groß, daß wir beim Näherkommen die Hafengelände und Vegetationsformen nur erkennen konnten, wenn mit der einen Hand die Sonne und mit der anderen Hand ihre Widerſcheine auf dem Waſſer abgeblendet wurden, um zwiſchen beiden hindurchzuſehen.

Gynerium argenteum,
Pampasgras

Am frühen Morgen nach der Ankunft in Baſtia, dem Nordoſten der Inſel, fuhr unſer Auto aus dem mit fremder Vegetation erfüllten Hotelgarten ab. Man kennt nur Bergſtraßen oder Meeresuferſtraßen in Korſika, andere Straßen gibt es nicht.

Das Staunen über die Kraft und Seltſamkeit der korſiſchen Pflanzenwelt begann ſchon nach ein paar Minuten in den Berggärten der Stadtumgebung. Ungeheure Pinienkronen wölbten ihre grünen Schirme über die Straße in den blendenden Himmel. Kein Baum der Welt baut ſolche wundervollen Räume in die Luft der Gärten hinauf. An Feigengeſträuchen und Edelkaſtanien vorbei, an den agavenüberwucherten Mauern vorüber lief die Straße nun aus den Gartenquartieren in die Wildnis hinauf. Die ungeheure Bergwelt der ganzen nördlichen Hälfte der Inſel iſt von heroiſcher Kargheit. Monatelang fällt hier kein Regen. Dennoch ſieht man all den Pflanzen, Büſchen und Bäumen und immergrünen Teppichen nichts von Trockenheitsleiden an. Sechs Stunden lang im Auto,

geſpannt um uns blickend, fuhren wir durch ſolchen Wechſel der Vegetation und des nahen und fernen Landſchaftsbildes, daß wir faſt ſprachlos ſaßen. Hundertfältiges graues, friſches oder dunkles Grün von prachtvollem ſonorem Geſamtklange erfüllte eine ſilbergraue Felſenwelt, die überall unerwartete Fernblicke auf blaue Meeresweiten mit hohen weiten Horizonten öffnete, oder auf die ungeheuren Bergzüge des Inſelinnern, deren anſteigende Vorberge und Gipfelreihen, durch hundert Fernblaus voneinander geſondert, unwahrſcheinlich hoch in den heißen blauen Himmel aufſtiegen. Vom gleichen Platz aus ſah man dann wieder Gebirgsküſten in gewaltigem Halbrund glühend blaue Buchtwaſſer umkränzen.

Manche ſolcher völlig unbewohnten Buchten, auf deren Felſenflanken Mittagsſonne glühte, lagen in einer Menſchenferne und Abgeſchiedenheit ſtumm im großen Mittagslicht, lagen da wandellos vom Mittelalter her und tranken mit ihren ſchaurigen Einſamkeiten die Jahrtauſende, unbekümmert um alle Europa-Nähe. Die Bergſtraße ſenkte ſich zum Meere. Nie im Leben ſah ich ſo unermeßliche Landſchaftsräume ſich die Hände reichen. Plötzlich tat ſich eine neue kleine türkisfarbene Traumbucht im Rahmen elfenbeinerner Sandküſten vor uns auf — es war nicht möglich, dies unbegreifliche Gefilde, welches das innere Auge kaum dem äußeren glaubte, vorbeizulaſſen, ohne mit ihm durch ein Bad zu verſchmelzen. Das flüſſige blaue Edelgeſtein trägt die Körper ſo leicht, daß man ganz ohne Bewegung und Zwang im Waſſer wie über tiefen blauen Ätherabgründen ſchwebt.

Durchbadet von milder Friſche, angeſtrahlt von kerniger Sonne und von ſammetweichen aromatiſchen Düften gefächelt, fuhren wir im Rauſche weiter, blickten noch lange in die Bucht zurück, verwundert, daß in fremdeſter Ferne Landſchaften ſo nah an unſer Inneres herantreten und uralte Ahnungen und Vorgefühle weckten und erfüllten, welche die Heimat in uns ſchlummern ließ.

Die Welt iſt ſo, wie unſere Träume ſind. Unſere Phantaſie iſt auf wunderbar richtigem Wege. Korſika iſt ein Weltſchlüſſel und ermutigt unſere Phantaſie in unerhörter Weiſe.

Immer wieder vor den abenteuerlichen befeſtigten Hafenſtädten aus Mittelalter und Altertum, üppigen Palmengärten oder homeriſchen Küſten dieſer Inſel denken wir: Wenn es dies gibt, dann gibt es überhaupt nichts, was es nicht gibt. Die korſiſche Auguſtmittagshitze ward ſtärker und blieb ſehr ertragbar, die Luft nahm zu an unglaublichen Würzen, die Bäume wurden größer, manche Baumgruppen ſtrömten Düfte aus wie ein ganzer Apothekerladen, immer ſtieg irgendwo Rauch eines Heidefeuers auf, Mittagshitze entzündet — an fernen Höhen raucht es wie Vulkane, nachts ſchwelt es wie glühende Lava, ſo brennt es durch die Jahrtauſende. Die Korſen laſſen es ruhig brennen, es wird doch nie ernſtlich und in der ungeheuren Einöde ſind keine Hände zum Löſchen. Vegetationen von mannshohen Heidekräutern, niedrigem Lorbeer, Wolfsmilch und hundert ſtachligen, ſtumpfgrünen oder tief dunkelgrünen Geſträuchen und Kräutern bekamen immer fremdartigere Züge, blühende und fruchtende Feigenkaktusdickichte grenzten alle Gehöfte ein, große Feigenbäume würzten unſere Luft im Vorbeifahren, alles Grün ſchien ſtärker als Dürre und Sonne, rieſenhafte Ölbäume kletterten an ſteilen Berghängen und ſtanden in tauſendjähriger Größe. Mächtige Edelkaſtanienbäume ſtiegen in leuchtender Grüne mit jungen, ſammetgrünen Stachelfrüchten aus der Dürre hoch empor und ließen durch dunkle Schattengeäſte ferne Lande und Buchten blauen. Fortwährend verſuchte ſich Niegeſehenes am Auge und ward in uralter Verbundenheit mit unſerem innerſten Traumzentrum wiedererkannt.

Dieſe ganze eherne, leidensloſe Pflanzenwelt, die hier ſtark und freudig vor unſeren Blicken liegt nach ſechsmonatlichem, regenloſem Sonnenbrand, ſcheint auf eine ganz andersartige Anpaſſung an ihre Umwelt gebaut. Es iſt, als ob ſie Wunderkräfte aus Luft und Licht und Meer bezieht. Die Siegerkraft dieſer Pflanzenwelt iſt ganz auf den Kampf gegen die Front der Dürre gerichtet, während unſere Pflanzenwelt den Kampf mit drei Fronten zu beſtehen hat. Man glaubt hier alsbald, körperlich an irgendeinem Segen teilzunehmen, der die Pflanzenwelt ſo friſch hält, denn man fühlt ſich von einer immerwährenden, unglaublich ſanften Kraft erfüllt, die uns die Hitze ſpielend leicht ertragen läßt. Die Einwohner ſcheinen uns auch unzähligen Arten von Leidensfähigkeit entrückt, ſie muten uns wie eingeſtimmte Naturweſen an, an denen wir beſtändig etwas anſtaunen, was ſie von unſerer ſchrecklich wachen Welt trennt.

Arundo Donax, Pfahlrohr

Aus Furcht vor Seeräubern liegen die kleinen Ortſchaften ſehr hoch an den Hügellehnen.

Auf wieviel ſchöne, helle kultivierte Geſichter trifft man überall beim Vorbeifahren durch Dörfer und Städtchen dieſer angeblich kulturfernen Welt. Unſer Gruß vom Auto wurde überall von jung und alt durch hocherhobene Hände und Aufleuchten der Geſichter mit ſolchem Temperamente und ſolchem Reize der Gebärde erwidert, wie ſonſt kaum erlebt.

Felsgetragene Städtlein nah am Meere ſind mit rieſigen Feſtungswällen umgeben, denen Felſeninſeln mit Türmen vorgelagert ſind. Die Stadt Kalvi iſt ſolch ein toller Traum, daß man ſich anſtrengen muß, Menſchen und Tiere darin als volle Wirklichkeit anzunehmen. Das gigantiſche, überweite Landſchaftsrund dieſes Städtchens mit unentwirrbarem Reichtum von Vorbergen, Tälern und ſeltſam gelagerten Terraſſen voll Ölbäumen, Steineichen und Eucalyptus, umrahmt von zwei- bis dreitauſend Meter hohen Bergzügen, iſt in ſeinem Adel und ſeiner Klaſſizität mit Worten nicht nachzubauen. Die ganze Inſel iſt ein Rieſenparadies von einer ſolchen Fülle tiefen Wechſels, wie man ihn nicht leicht auf ſo verhältnismäßig kurzen Fernen beiſammen hat.

Man muß ſich erſt an dieſe Verſchwendung von Raum gewöhnen; hier werden Landſchaftsgefühle in uns aufgerufen, die etwas in uns Verborgenes entknittern und entfalten, was ſelbſt Schweiz und Italien in uns ſchlummern ließ. Und jeder Landſchaftseindruck iſt erfüllt von der Freude an der Sonnenkraft und der balſamiſchen Schönheit der Luft. Luftwürze und Strahlung erfüllen uns mit beſtändigem geiſtig körperlichem Kraft- und Glücksgefühl. Man ſagt das Wort »Korſika« leiſe und zärtlich vor ſich hin und atmet tief die Heilatmoſphäre.

Von Staub war wenig zu leiden. Sehr gut iſt überall Unterkommen und Verpflegung, Sauberkeit und Ordnung, keine Rede von Ungeziefer,

Phoenix = Palmen

kaum je von Mücke oder Fliege, und wie waren wir doch vorher gewarnt worden vor all dieſen Unbequemlichkeiten.

Man kann eigentlich überhaupt nichts tun, wovon uns nicht irgendwoher dringend abgeraten wird, aber die Fehler des Tuns ſind fruchtbarer als die des Laſſens, nur muß man dann auch im Weitertun nicht in Fehler des Laſſens verfallen.

Die Hotels und Penſionen haben wie ſo viele ſchöne Dinge im Süden äußerlich Traumcharakter, innerlich den bekannten heiteren ſüdlichen Operettencharakter. Zu eſſen gab es franzöſiſche Küche mit kinderleichten ſüdlichen Weinen, Melonen und Tomaten, grobem Weißbrot und vielen Fiſchen und Krebſen.

Nun kommt etwas ſehr Seltſames, noch nie hatte ich davon gehört. Von dem Ort Isle de Ruſſe, tief in der Weſtküſte der Inſel, fuhren wir in achtſtündiger Autofahrt, die Inſel in der Mitte durchquerend, herunter nach Ajaccio. An der Küſte war morgens noch heißes Sonnenwetter des Südens, oben in den Bergen ſchleppten Wolken in die Wälder, ſolch raſenden Wechſel von Vegetationsbildern, Süd und Nord umfaſſend, wie dieſe kurze Tagesreiſe kann man ſchwerlich an anderer Stelle Europas erleben.

Man wird in Korſika ein außereuropäiſches Gefühl nie los. Dies Gefilde ruht in irgend einer Abgerücktheit von allem Gewohnten, — der Faden unſeres bisherigen Lebens ſcheint abgeriſſen, ſeine Wiederanknüpfung und Fortführung undenklich, ein Zwiſchenſtock zwiſchen Himmel und Erde erreicht.

Die Muſik der Bodengewächſe in ihrer edlen Gedämpftheit flocht bei jeder großen Wegbiegung ganz neue unerwartete Lebensgeſtalten in ihre von Schwermut und Freudigkeit gleich weit entfernte Grundmelodie. Wieder erſchienen neue Wolfsmilchgewächſe, die einzelnen großen Heidekrautbüſche wurden mehr als mannshoch. Stundenlang war kein Augenblick ohne den Wegrandanblick großer dunkelgrüner korſiſcher Schneeroſenbüſche. Dieſe üppigen Staudenbüſche ſtanden nie in größeren Horſten zuſammen, ſondern nur in einzelnen wuchtigen Büſchen von Meterbreite und 80 Centimeter Höhe. Berge reckten ſich anſcheinend zu Dolomitenhöhen, der gleiche Blick umfaßte Nordgebirge unter ſchleppenden Wolken und vor ihnen ſteil aufſteigende Hänge mit Hainen uralter Ölbaumrieſen. Die Bergſtraße kletterte 1200 Meter hoch, die Luft war ein wenig kühler und wieder an allen möglichen Stellen weithin mit kraftvollen herben Heidegerüchen erfüllt. »Apotheke in Wolken« lachten wir vor uns hin und folgten geſpannt den Entfaltungen des Landſchaftsgeiſtes. Stundenlang führte der Weg durch düſtere Gefilde, wie aus der Unterwelt, über deren jedem ein beſonderer Fluch zu liegen ſchien. Wilde Spitzpappeln und wilde Nußbäume ſäumten vertrocknete Bäche und wirkten Stimmungskräfte aus, die wir den gepflanzten nie wieder vergeſſen können. Adlerfarne und Pfefferminz, wilde Clematis und Weißdorn können es nicht laſſen, ſich überall in dieſe fremde Geſellſchaft zu miſchen und bis in den oft faſt tropiſch wirkenden Süden der Inſel, Napoleons Heimat, hinunterzuwuchern. Plötzlich fand man ſich aus dieſen Berghöllen und brandigen Einöden in eine Großſtadtſtraße zwiſchen hohen Mietskaſernen und elegant flanierendem Südpublikum verſetzt und fuhr nach ein paar Minuten auf der anderen Seite dieſer Stadt Korte wieder hinaus in die Wildnis, etwas ſprachlos über das Geſehene, aber mit herrlichen fremdartigen Südfrüchten der Läden beladen. Die Bergſtraße ſtieg nun in feuchte grüne Welt empor den erſten Buchen entgegen, es fing an zu regnen und alles wurde nordiſch. Plötzlich ſaßen wir im Berghotel zwiſchen Nadelholz- und Buchenwald und fanden die eingeborenen Südländer zwiſchen Buchen und Tannen ſo ſeltſam wie Eskimos unter Palmen. Dann begann ein ſtundenlanges Herabrollen des Wagens aus der Nordbergwelt in den üppigen Süden von Ajaccio. Es war irgendwie, als käme man zum erſtenmal nach dem Süden. Die himmelhohen Schründe der zackigen Bergweltfelſen ſtiegen jetzt über Maſſen von Wäldern aus Edelkaſtanien auf. Die Schauer, mit denen uns dieſe glutumdrohte, hohe Felſenwelt des Südens erfüllt, kommen aus ihrem einſamen wehrloſen Verkehr mit dem ungeheuren Sonnenfeuer und haben eine ganz andere Natur, als unſere kälte- und wetterumtobten Nordberge. An Stellen hoch oben, an denen gar kein Leben mehr möglich ſchien, kletterten noch Bataillone von Tannen, die ähnlich märchenhafte Anpaſſung an Dürre beſitzen müſſen wie die Blautannen Arizonas. Der graugrüne Geſamtton der nördlichen Inſelhälfte verwandelt ſich in einen üppig dunkelgrünen Teppich, der über alle Täler und Berge ging und nur die oberſten Felſengegenden frei ließ, und der große, antik wirkende Menſchenſchlag der Nordhälfte verwandelt ſich unvermerkt aus großen römiſchen Frauengeſtalten und aus panhaften Hirtenerſcheinungen der Männer in eine kleine und zierliche ſüdländiſche Raſſe. Schwarz iſt auch hier die Lieblingsfarbe der Frauen, die Mädchen in ihren ſchwarzen Kleidern wirken auffallend klein und zierlich. »Trauergazellen« tauften wir ſie.

Hohe Eucalyptusbäume flogen erſt einzeln vorüber, von einer Wolke ſtreng mediziniſcher Gerüche umgeben, wurden dann zu imponierenden Alleen, immer mehr Südgewächſe tauchten in üppigſter Entfaltung auf, und es begann nun ein ſo herrliches Spiel der edel fremdartigen Pflanzengeſtalten mit den Zufällen der Landſchaftshintergründe, der goldroten Abendgewölke und des tiefblauen Fernduftes, das ſo reich und unerwartet war, als habe man noch niemals eine künſtleriſche Spiegelung dieſer Naturdinge erlebt. Plötzlich ſahen wir, in unermeßlicher Ferne und Tiefe die herrliche Bucht von Ajaccio in heiterem Abendlicht unter blauem Himmel liegen. Bei der nächſten Wegbiegung ragte ein Horſt fünfmeterhohen Rieſenſchilfes in dieſen Fernblick und hinter mächtigen Pinienſchirmen baute ſich eine der ſtolzeſten und perſönlichſten Berglinien der Erde vor, nämlich einer der ungeheuren Eckpfeiler, mit denen die Berge vom Inſelinnern zu denen der Bucht hinüberleiteten. Schon regte ſich abgrundtiefe Magie der Verbundenheit von Landſchaft und Weltgeſchichte im Herzen. Man fühlt dem Berge an, daß Napoleons Jugendblicke auf ihm geruht haben. Die ganze Welt ringsum ſchien plötzlich durchbeizt und erfüllt von dem Geheimnis Napoleons. Und wieder ſchien auch dieſe erhabene Weltenſchwelle mit dem majeſtätiſchen Felſenrund um den Hafen und dem prachtvollen Meeresblick zwiſchen Felſeninſeln und Leuchtturmbergen mit Notwendigkeit der Ausgangspunkt irgendeines weltbewegenden Weſens. Die ganze Gefühlswelle ſchäumte hoch auf vor dem palmenflankierten Napoleonsdenkmal, das auf die glänzende Meeresweite gerichtet iſt. Er reitet von vier Frauengeſtalten geleitet der palmengerahmten Meeresweite entgegen, der offenen Weite, welche die Felſenarme der Rieſenbucht und die Küſteninſeln freilaſſen. Das Denkmal iſt wundervoll kühn placiert, ſteht nicht etwa in der Mitte eines Platzes. Es muß von der Rückſeite aus mit dem Meeresblick geſehen werden, keiner hat es richtig photographiert; die vier anſcheinenden Frauengeſtalten ſind übrigens ſeine vier Brüder.

Den erſten Tag beherrſchte der große Schatten, alle Straßen und Palmen waren in ſeiner Macht; jede Hafenwelle brandete in ſeinem Bann, alsbald aber brach ſich ſeine Gewalt an Blumen und Blütenbüſchen, an tiefroten und ſchneeweißen Oleander-Dickichten, zwiſchen denen die Zypreſſen dunkelten und die glühend blauen Farben der unwirklichen Meeresbucht leuchteten. Viele Gärten ſtrömten über von einem Blumenleben und großen Blütengeſträuchen, von denen Napoleon nichts ahnte, von erſchreckend blauen Windengehängen neben Bäumen mit großen knallroten Trichterblüten, Maſſen von Canna und den großen weißen Blütengehängen der Daturabüſche. Abermals nach einem Menſchenalter wird man Korſika und ſeine Gärten noch viel reicher und tiefer verzaubert ſehen.

Wir fürchteten uns ſchon vor einem Stadthotel in dem engen Ajaccio, fanden aber draußen auf einer felſigen Landzunge zwiſchen uralten Kaktusfeigenbüſchen und Feigendickichten eine kleine oleandervergrabene Traumpenſion, gingen ungläubig hinein, wurden freundlich dabehalten und lebten unſer Daſein und unſere Mahlzeiten unter einem alten Olivenbaum im bunten Blumengarten, dicht über der Felsbrandung, auf die eine eingelaſſene Gittertür der Gartenbrüſtungsmauer hinabging.

Der Menſch lebt ſehr vom Vordergrunde. Dieſer blumenerfüllte Strandgarten ſchloß wunderbar die fremde Welt auf. Wie ſehr ſind wir doch in allen Schickſalen zu Hauſe und auf Reiſen von allernächſter Haus- und Gartenumgebung abhängig! Wieviel Raum beanſprucht dies Schickſal unſerer Augen in unſerem übrigen Schickſal und welche Kraft, alle Ferne und Weite zu beleuchten, geht von der Nähe aus. Das Auge wandert vom Garten über flammende Canna und heimatliche Sommerblumen-Beete, über duftende Datura- und über duftende Oleanderbüſche hinweg in die gewaltigen Weiten der Ufergebirge und läßt bald ab davon, alles in einigen Tagen ſehen zu wollen, was von einem Punkte aus ſichtbar iſt. Dieſe unendlichen reichgegliederten Felſengebirge, auf die ſeit April kein Regen fiel, ſind bis zu den Gipfeln alle begrünt, nur einige wenige recken ſich in kahle Felſenhöhen, die von Wolkengeſtalten und blauenden Wolkenſchatten verworren umlagert werden. Jch habe nie in meinem Leben unabſehbar reich geſtaltete bewaldete und begrünte Berghänge und Terraſſen ſo wunderbar in ſtillem Nachmittagslichte ſchwelgen ſehen. Die Landſchaft genoß ſich ſelber, als ob ſie Tag und Nacht vor ſich hin tönte. Sie war ſich ſelbſt genug — der Menſch durfte an ihrer Schönheit nippen, und dieſe Schönheit ſchien keinen Augenblick zu ruhen, ſondern wanderte in ſtändigem Wechſel der Atmoſphären und Wolkenbilder durch Verwandlungen hindurch, denen die Seele nie ganz folgen konnte, obgleich ein blauer heiterer Tag dem anderen folgte. Die gigantiſchen Maße dieſer Paradieſeslandſchaft ließen zu, daß über der Schönheit ſtändig etwas dramatiſch Bewegtes lag, was in dieſer ſüdlichen Landſchaft überraſchend war. Man braucht wohl Jahre, um die Ajacciolandſchaft innerlich zu erobern. Faſt unüberſchaubar war ſchon in ihrer unbezeichenbaren Verwandlung die Reihe von drei bis vier Tagen, die wir hier zubrachten. Das große Schönheitsrund arbeitete ſich durch den Wechſel hindurch wie eine weite Seele durch Schickſal und Stimmung. Nachts hing der Himmel zum Platzen voll Sterne, der Silberflor der Milchſtraße zipfelte bis zum Südhorizont herab, an dem ſchon ungewohnte Sterne ihr Weſen trieben. Große aromatiſche Kräuter dufteten nachts zwiſchen den noch ſonnenwarmen Strandſteinen, und man ſah ihre Umriſſe ſich deutlich gegen die milde Sternhelle des Himmels und des Meeres abzeichnen. Der Klang dieſer ganzen Landſchaftsmuſik iſt Geige — wie der Klang deutſcher Landſchaft Orgelmuſik iſt.

Irgendwie zu den beſonderen Reizen des Südens gehören immer wieder unerwartete Entdeckungen wundervoller Gärten oder Landſchaftswinkel in überraſchender Nähe. Hinter unſerem Hauſe fanden wir plötzlich einen ungeheuren, am Hang aufſteigenden Terraſſengarten mit Waſſerbaſſins und rieſigen Palmen und Cedern. Die Schönheit der Palmen ging in Korſika ſchon über alle Begriffe, man ſieht hier bereits, daß es der fürſtlichſte Baum der Erde iſt. Am ſchönſten wirkt er in architektoniſcher regelmäßiger Pflanzung. So wird ſeine Pracht am tiefſten aufgeſchloſſen, und ſo ſchließt er auch den blauen Abgrund der Buchtlandſchaften am tiefſten auf. Der Adel der Linien und Verhältniſſe, der Verjüngungen und Verſtärkungen des Palmenſtammes vom Erdboden bis zur Krone geht über alle Begriffe, die ſchönſten griechiſchen Säulen können ſich davor verkriechen. Die Palme iſt ſo voll von unbefungener Schönheit, weil ihre wunderbarſten Reize erſt etwas höherem Alter angehören, und gar ſo lange wird ſie ja in europäiſchen Ländern noch nicht gepflanzt. Wo ſie dicht ſtehen, auch in trockenſten Berggärten, bilden ihre Kronen prachtvolle düſter imponierende Schattendächer, die von zauberhaften Säulen getragen werden. Die Schnelligkeit des Wachstums der Bäume im Süden iſt uns zu wenig bekannt. Fünfzehnjährige Bäume ſcheinen fünfzigjährig, ich fragte einen Apotheker nach der alten ſchönen Palme in ſeinem Garten: die habe ich erſt vor 12 Jahren geflanzt, war ſeine Antwort! Pampasgras wucherte im Berggarten in fünfmeterhohen Rieſenbüſchen, als Maßſtab habe ich vor die Pflanze eine normale Gärtnerkanne geſetzt. Die Dürre, in der Cedern bei vielmonatlichem Regenmangel üppig wachſen, giebt uns Begriffe, was aus dieſer ungepflegten verwahrloſten Korſikanatur an ergreifender Vegetationsſchönheit zu erzielen wäre. Es gilt eben vom ganzen Süden der Mittelmeerländer bis auf große und kleine Oaſen genau das gleiche wie von der nordiſchen Welt. Das was ſie durch Pflanzung der richtigen Gehölze und Pflanzen überall werden könnte, verhält ſich zu dem jetzigen Zuſtande, wie ein großartiges reiches Bild zu ſeiner kümmerlichen, ſchüchternen Untermalung. Derjenige, der weiß, welche grandioſe, alles verwandelnde Naturfülle neuer großer und kleiner Pflanzen auf alle Himmelsſtriche Italiens und Deutſchlands wartet, der wandelt überall wie in einem vermeintlich trockenen, aber überall im Verborgenen von unterirdiſchen Waſſern und Strömungen unterfloſſenem Gelände, in welchem wir mit Leichtigkeit durch arteſiſche Brunnen Überfluß an Waſſer und Fruchtbarkeit erſchließen könnten! Wie leicht ſprudelt der arteſiſche Schönheitsbrunnen der Pflanze. Wir leben alle in Landen kläglich unbenutzter Möglichkeiten.

Unter dem Olivenbaum am Felſenſtrande gabs noch ein anderes Pflanzenerlebnis. Wie das Meeresbad in den nordiſchen Meeren durch Kälte oder ſelbſt im wärmſten Sommer durch nicht genügende Wärme verhindert wird, ſeine allerfeinſten Kräfte an unſerm Körper auszuwirken, ſo werden durch verhältnismäßig primitive Alkoholformen all unſere nordiſchen Weine um ihre feinſten Wirkungen auf Geiſt und Körper gebracht. Die großen Zauberer unter den ganz leichten Südweinen verſchonen uns mit allen Beneblungen und faſſen unſer Leben zu ganz neuen Formen geiſtig körperlichen Bewußtſeins zuſammen, ganz und gar abgerückt von den Einflüſſen nordiſcher Weine. Jeder hat eine beſondere Seele, viel verſchiedener vom andern, als die Nordweine unter ſich ſind. Der Korſeer Wein, der nicht auf der Karte ſteht, ſondern meiſt nur auf beſonderes Verlangen herausgerückt wird, iſt eine Krone aller Südweine und baut ſich in ſeiner Wirkung auch bei verhältnismäßig kleinen Mengen über zwei bis drei Stunden lang aus. Er verſetzt uns ohne die leiſeſte Belaſtung in einen goldenen Traumzuſtand, deſſen Trunkenheit in einer ganz unbegreiflichen Weiſe alles Leben und Erleben zu einem großen geiſtig körperlichen Geſamtgefühl zuſammenfaßt. Dieſe olympiſchen Getränke haben gar nichts mehr mit der Erdgebundenheit und verhältnismäßigen Grobheit unſerer überſchätzten nördlichen Weine zu tun. Unter ihrer vollen Einwirkung

GARTENAUFGABEN / ALTE UND NEUE LÖSUNGEN

Ein umgeſtalteter Hausgarten

DER Garten wurde im Auftrage von T. Thalhammer im Herbſt 1924 dem Plan gemäß bis auf das Gartenhaus, das ſpäter gebaut werden ſollte, ausgeführt. Aus dem Grundriß ſind alle Einzelheiten und auch die Vorgeſchichte zu erſehen. Das Haus iſt im »Jugendſtil« völlig verbaut, wie ſchon aus den Grundrißlinien hervorgeht. Eine beſondere Bezugnahme darauf war alſo nicht erwünſcht, auch ſollte der Nebeneingang an der Gartenfront (2) verdeckt werden; nur ſo iſt die abſichtliche Nichtbeachtung dieſer Hausſeite verſtändlich. Im Garten fanden ſich aber ein paar wundervoll gewachſene Koniferen, die die Geſtaltung des Gartens beſtimmten. Es ſollte gezeigt werden, wie man unter größter Schonung vorhandener Pflanzen doch einen architektoniſch locker gefaßten Gartenraum ſchaffen kann, dem zur Seite als luſtiges Intermezzo ein maleriſch-romantiſches Motiv ohne Sorgen gedeihen kann. Gerade der kleine Pfad, der ſich zwiſchen allerlei Koniferen, Cotoneaster, Rhododendron, Efeubüſchen, Wildroſen und Stauden hindurchſchlängelt, iſt ſehr reizvoll geworden und machte das Gärtchen zum Garten. Der Beſitzer wollte den Park en miniature nicht ganz miſſen. Schließlich bliebe noch die ſtrenge Trennung zwiſchen Zier- und Nutz- beziehungsweiſe Wirtſchaftsgarten zu erwähnen, vor allem aber die achſiale Verbindung von Vorgarten und dem Staudenkabinett mit Brunnen.

H. Fr. Pohlenz

GARTEN WOLFF +

1 HAUPTEINGANG ·
2 NEBENEINGÄNGE ·
3 SOMMERBLUMEN ·
4 PLASTIK. BUXUSKUGELN. ROSEN ·
5 HOCHSTAMM UND NIEDR. ROSEN ·
6 LIGUSTER OVALIFOLIUM HECKE ·
7 RHODOD. NIEDR. KONIFEREN ETC. ·
8 VORH. CHAMAEC. LAWS. ALUMII ·
9 OFFENES GARTEN-HÄUSCHEN ·
10 STAUDENRABATTEN ·
11 SPIRAEA V. HOUTTEI ·
12 BRUNNEN. STEINPLATTEN ·
13 VORH. PICEA PUNG. GL. K. ·
14 VORHAND. PICEA EXCELSA ·
15 HECKENTORE ·
16 HIMBEEREN ·
17 SENKR. OBSTCORD. KÜCHENKR. ·
18 BEERENOBSTHOCHST. SPALIER ·
19 GARAGENNEUBAU ·
20 SITZPLATZ F. D. ANGEST. ·
21 HAINBUCHENHECKEN ·
22 PICEA ORIENTALIS ·

MASSTAB

NORD

VORGEFUNDENE SITUATION

konnte man zum Beispiel noch ohne die leiseste Anstrengung eine Stunde lang Jean Paul aus Reclambänden vorlesen.
Ich habe solche Zustände körperlichen Wohlseins, wie auf dieser Insel, noch im heißen Sommer, bei viermaligem täglichen Baden, überhaupt nicht für möglich gehalten. Das erste Bad morgens bei erblassendem Morgenstern fand das Wasser schon lau und wunderbar sammetweich, mittags in flacher Brandung fühlte es sich fast heiß an. Man saß oft im Olivenschatten über der Brandung stundenlang vor lauter Wohlsein und Neugeborenheit wie in einer süßen Erstarrung und konnte sich garnicht an der paradiesischen Wirkung des beständigen sammetweichen Luftfächelns ersättigen. In diesen Zustand fiel dann mittags der Korseer Wein oder seine Genossen. Zwei bis drei Gläser genügten. Nachmittags begannen Gebirgswanderungen und Gartenentdekkungen. Erstaunlich war, auf wie wenig Essen und Schlafen man allmählich verfiel.
Zuletzt unternahmen wir eine Tagesautofahrt zum Südpunkt der Insel, St. Bonifazio. Der Weg führt durch endlosen neuen Wechsel der ganzen Pflanzen- und Gesteinwelt. Die Insel ist aus fabelhaft vielen geologischen Formationen und Gesteinsarten zusammengebacken! Vergebliches Bemühen, mit Worten diese Welten von Ufer- und Berglandschaften, Bergnestern und Hafenstädten anzufunken, die blauen Riesenweiten der Land- und Meeresfernen, die sich bis zu den in einer wahren Weißglut von Glanz und Duft verdämmernden Bergen der Insel Sardinien hinausschwangen! Man mußte sehr früh aufbrechen, um abends wieder in Ajaccio zu sein. Noch Morgenbadfrische in allen Gliedern, froren wir durch ungeheure Eucalyptus-Alleen und Olivenwälder bis zu Berghöhen hinauf, in denen die Morgensonne uns packte.
Von morgens bis abends wieder kein Ende der Pflanzenüberraschungen, an Plätzen von ungeheuerster Dürre fanden sich plötzlich Friedhöfe von einer Üppigkeit der Cypressenhaine, die man nie vergessen kann. Merkwürdigerweise sieht man dann in solchen Landschaftsgegenden und Gärten, genau wie in Italien selber, die Cypresse nur ganz sparsam angewendet, ohne das der leiseste Grund hierfür besteht. Florenz wimmelt von Hunderttausenden von Cypressen, in Rom herrscht offenbare Cypressenarmut. Irgend ein sinnvoller Anlaß hierfür liegt nicht vor.
Abends nach sechzehnstündiger Autofahrt wurden wir denn doch etwas müde, legten uns weit im Auto wie zum Schlafen zurück und staunten halb träumend die gespenstischen, vom Autolicht aufgeschreckten silbernen Olivenwälder an, die endlos unter dem Silberdach der Milchstraße auftauchten. Wieder gings durch vergessene Welten, durch glühend schwelende Heidebrände, die schon am Morgen gebrannt hatten.
Wie einen Traum aus einer anderen Welt trägt man das Erlebnis Bonifazio mit seinem Hafenstädtchen aus dem Altertum und den gewaltigen ultrahomerischen Felsenküsten im Herzen. Vom blauen Licht erfüllte Höhlen öffneten sich in diesen Steilküsten gegen das Meer hin! Am nächsten Tag abends führte uns das Schiff die ganze Nacht durch von Ajaccio über spiegelglatte, im grünen Feuer des Meerleuchtens leise schäumende Wasser nach Marseille.
Korsika verwöhnt das Auge so, daß es von der ganzen Fahrt durch Südfrankreich enttäuscht blieb. Bei der Rückfahrt über Genf und die Alpen wiederholte sich mir wieder der Eindruck, daß die eigentliche Schönheit des blauen Himmels und des Lichtes in unsern großen europäischen Alpengegenden an heiteren Tagen noch schöner ist als im Süden. Ohne das Regenübermaß wären die Alpen doch wohl mehr noch als Süd und Nord als unsere eigentliche Seelenheimat zu bezeichnen.
Seltsam fremd mutete uns bei der Rückkehr die erhabene Einförmigkeit der nordischen Pflanzenwelt an. Froh und staunend begrüßen wir das Hochragende der Wälder und den wundervollen Wechsel der Wetter und Atmosphären nach all der erhabenen Einförmigkeit südlicher Himmel. Hohe, schwarze, dichte Nadelholzwälder sind dem südgewohnten Auge zunächst ganz unwahrscheinlich und nordisch märchenhaft.
Das allerstärkste Gefühl aber, das der um die Zukunft unserer Gärten und Wälder Wissende von solcher Reise mitbringt, ist das Erstaunen, warum wir unsere nordische Welt nicht schon längst von ihrer erhabenen Einförmigkeit erlöst haben und ihr den ihr gebührenden ungeheuren Naturreichtum einpflanzten, der uns bei der Rückkehr aus südlichen Ländern einen so völlig anderen Empfang im Norden bereiten würde. Wenn dereinst die von der Naturmöglichkeit unserem Land und Klima zugedachte Fülle von Gehölzen und Blütengewächsen den ihnen zukommenden Besitz von Gärten, Alleen und Siedlungen ergriffen haben wird und die deutschen Wälder wieder in Form von Dauermischwäldern anstelle jener Nutzwüsten, die man Forsten nennt, getreten sein werden, dann erst wird die Musik des nordischen Wetter- und Jahrzeiten-Wechsels mit dem vollen Widerspiel einer reicheren Erde zusammenklingen. Dann erst wird das Erlebnis des Südens und des Nordens zur vollen Herrlichkeit seiner Wechselwirkungen emporwachsen.

Aus dem Blumengarten der Literatur

Lycas, oder die Erfindung der Gärten

Jetzt schließt uns der stürmende Winter ins Zimmer, und Wirbelwinde durchwühlen den silbernen Regen der Flocken: jetzt soll mir die Einbildungskraft den Schatz von Bildern öffnen, die sie in dem blumichten Lenz und in dem schwülen Sommer und in dem bunten Herbst sich gesammelt; aus ihnen will ich jetzt die schönsten wählen und für dich, schöne Daphne! in Gedichte sie ordnen. So wählt ein Hirt seinem Mädchen zum Kranz nur die schönsten Blumen. O daß es dir gefalle! wenn meine Muse dir singt, wie in der Jugend der Tage ein Hirt der Gärten Kunst erfand.
Das ist der Ort, sprach Lycas, der schöne Hirt, hier unter diesem Ulmbaum ist's, wo gestern, als die Sonne wich, die schöne Chloe mir die ersten Küsse gab; hier standst du und seufztest, als meine zitternden Arme dich umschlangen, als meine stockende Stimme meine Liebe dir sagte und mein pochendes Herz und meine Tränen im Auge. O da, Chloe! da entsank dein Hirtenstab der zitternden Hand, da sankst du an meine bebende Brust; Lycas! so stammeltest du, o Lycas! ich liebe dich! Ihr stillen Büsche, ihr einsamen Quellen seit Zeugen, euch hab' ich meine Liebe geklagt, und ihr, ihr Blumen, ihr tranket meine Tränen wie Tau!
O Chloe, wie bin ich entzückt! welch unaussprechliches Glück ist die Liebe! hier dieser Ort sei der Liebe geheiligt! Ich will um die Ulme her Rosenstauden pflanzen, und die schlanke Waldwinde soll sich an ihrem Stamm hoch hinauf schlingen, mit den weißen purpurgestreiften Blumen geschmückt; ich will hierher den ganzen Frühling sammeln; die schöne Saatrose will ich hier bei der Lilie pflanzen. Ich will auf die Wiesen und auf die Hügel gehen und will ihnen die blumichten Pflanzen rauben; die Viole und die Nelke und die blaue Glockenblume und die braune Scabiose, alles, alles will ich sammeln; dann soll es sein wie ein Hain voll süßer Gerüche, und dann will ich um den Blumenhain her die nahe Quelle leiten, daß er zur kleinen Insel wird, und ringsumher will ich einen Zaun von Dornbüschen pflanzen, daß die Ziegen und die Schafe ihn nicht verwüsten. O dann kommet, ihr, die ihr der Liebe lebt, seufzende Turteltauben! kommt dann im Wipfel der Ulme zu klagen, und ihr, ihr Sperlinge, verfolgt euch durchs Rosengebüsch und singt von wiegenden Ästen, und ihr, ihr bunten Schmetterlinge, haschet euch im Blumenhain und paart euch auf wankenden Lilien.
Dann sagt der Hirt, der vorübergeht, wenn ihm die Zephyre die Gerüche weither entgegentragen, welcher Gottheit ist dieser Ort heilig? Gehört er der Venus oder hat ihn Diana so schön geschmückt, um müd, von der Jagd hier zu schlummern?

Aus: Salomon Geßners „Idyllen" (1754)

Gartenarbeit und Blumenpflege

ALEXANDER STEFFEN / DIE HACKE UND IHR GEBRAUCH

DIE Hacke wird benutzt für schon bestelltes Kulturland zur Arbeit zwischen den Pflanzen, zur Flacharbeit, im Gegensatz zum Spaten, der vorwiegend *vor* der Bestellung arbeitet. Der Spaten ist das Gerät des Frühjahrs und des Herbstes; die Hacke schwingen wir im Sommer, sie findet im Frühjahr noch nichts und im Herbst nichts mehr zu tun. Die Arbeitsrichtungen sind folgende:

1. Bernburger Hacke, 2. Frankf. Hacke, 3. Querschnitt der Tigerhacke, 4. Tigerhacke, 5. Schürfhacke.

1. Flaches Hacken zum leichten Schürfen der Oberfläche, dabei vertilgt die Schneide kleines Unkraut, sie lockert flach, durchbricht eigentlich nur die Verkrustung. Für solche Zwecke brauchen wir Hacken mit schmalem Blatt von etwa 4 Centimeter Blatthöhe.

2. Tiefere Bodenlockerung zwischen Pflanzen. Hierzu dürfen die Hacken nicht zu leicht sein und müssen eine Blatthöhe von 8 bis 10 Centimeter haben; das etwas höhere Gewicht erleichtert das Eindringen und fordert weniger Druck von Seiten des Arbeiters.

3. Zum Anhäufeln im Kleinbetrieb von Bohnen, Kartoffeln, Kohl. Dazu gehört eine hohe schwere Hacke; schwer wegen des nötigen tieferen Nachfallens der Erde, hoch, damit die herangezogene Erde nicht über das Blatt zurückfällt; eine Arbeitsbreite von 20 bis 22 Centimeter und Blatthöhe von 4 Centimter sind richtig. Wir haben eine museumsreife Riesenhacke alter Art von einer Blattgröße 16 × 20 Centimeter. Damit kann gute Arbeit nicht geleistet werden. Man muß glauben, daß unsere Urgroßeltern stärkere Muskeln hatten.

Aus dieser kurzen Übersicht ergibt sich, daß mit einer Normalhacke nicht auszukommen ist. Der Boden bedingt außerdem noch Unterschiede. Für schweren Boden müssen die Hacken schwerer sein, damit sie durch ihr Eigengewicht in den Boden eindringen und die Muskelleistung entlastet wird. Mit meinen leichten Hacken, die ich von Sand mitbrachte, kann ich hier auf Lehm wenig anfangen, weil sie einfach die Bodenfläche nicht genügend anfassen, wenn ich nicht entsprechend verstärkten Druck einsetze. In Süddeutschland trifft man Hacken, die einer breitschneidigen Rodehacke ähneln und auch ähnliches Gewicht aufweisen; das wird durch die Schwere des Bodens erklärt.

Über Form des Blattes läßt sich nicht viel sagen. Meist laufen die Längskanten parallel. Wir haben seit einigen Jahren eine Hacke in Gebrauch, die ich die Bernburger nenne, weil sie dorther stammt. Bei ihr ist die Oberkante ausgeschweift. Diese Hacke bewährte sich gut. Sie wird in drei Größen geliefert:

Größe I Arbeitsbreite 20,5 Centimeter, Höhe 11 Centimeter, Gewicht 1050 Gramm, Größe II Arbeitsbreite 17 Centimeter, Höhe 8 Centimeter, Gewicht 870 Gramm, Größe III Arbeitsbreite 11 Centimeter, Höhe 7,5 Centimeter, Gewicht 700 Gramm. Die Hacken schaffen bei unserm Lehmboden gut, vorwiegend kommt Größe I in Gebrauch.

Der Stielbefestigung dient der Hals, eine Art Schwanenhals, der schlank und dünn sein muß, damit er dem Übergleiten der Erde und besonders der Unkräuter möglichst wenig Hindernis bereitet. Die Befestigung geschieht meist durch Nieten, doch besser ist es, wenn Blatt und Hals aus einem Stück gearbeitet sind. Bei Hacken mit auswechselbarem Blatt geht das natürlich nicht. Die Nietstellen bedeuten aber immer Bruch-, Rost- und Lockerungsgefahr.

Es kann gefragt werden, ob es nicht besser wäre, die Stielbefestigung mit Hilfe des Schwanenhalses nicht an zwei Stellen vorzunehmen, um die Hacke besser in Gewalt zu haben, nämlich ein Schwanken der Fläche zu verhindern und einen gleichmäßigeren Einsatz der beiden Ecken zu begünstigen. Die Frage bejahe ich für größere Arbeitsbreiten, also Arbeitsbreiten von 24 Centimeter und darüber, wie sie gelegentlich auf leichten Böden vorkommen und wie man sie vorteilhaft verwendet, wenn ein ganz leichtes Aufhacken, ein Rühren der an sich mürben Oberkrume, beabsichtigt wird. Aus gleichem Grunde und mit gleicher Bestimmung hat man in vielen Gegenden die Stoßeisen mit langem Stiel und einer Arbeitsbreite von 35 Centimeter. Solch Gerät balanziert besser, wenn es mittels einer Gabel an zwei Stellen mit dem Stiel Verbindung erhält.

Wichtig ist die gute technische Herstellung des Blattes. Wenn das Eisen nicht genügend in Weißglut durchgearbeitet wurde, hält die Hacke keine Schärfe, und eine stumpfe Hacke ist noch schlimmer als ein stumpfer Spaten. Für Hackkolonnen sollten geschärfte Hacken ständig zum Austausch bereit gehalten werden. Besonders gut hält alter Sensenstahl die Schärfe; daher finden wir aus ihm oft selbsthergestellte Hacken oder Schürf- und Stoßeisen in Kleinbetrieben. Ich meine, auch Fabriken würden sich gut stehen, wenn sie wirklich hochwertigen Stahl für Hacken und Hackmaschinen verwenden würden. Die Befestigung des Stiels erfolgt mit Hilfe einer Tülle, die nicht zu kurz sein sollte, am besten so, daß nicht nur eine, sondern zwei Nieten oder Nägel eingeschlagen werden können. Die meisten Bruchstellen kommen an der Hacke dort vor, wo der Stiel in die Tülle mündet. Dort liegt die Stelle, welche den meisten Druck auszuhalten hat.

Eine Hacke soll gut stehen, gut in der Hand liegen und den richtigen Winkel einerseits zur Arbeitsfläche andererseits zum Stiel bilden. Ist der letztgenannte Winkel zu groß, so steht das Blatt zu steil, ist er zu klein, so berührt nicht nur die Schneide den Boden, sondern die ganze Blattfläche. Das soll aber nicht sein und macht das Hacken schwer. Den richtigen Winkel zu ermitteln, bleibt noch der Arbeitslehre vorbehalten: ich selbst schätze ihn auf etwa 40° (Fig. 3), doch fehlen mir genaue Feststellungen; ich kann nur gefühlsmäßig sagen, ob die Hacke gut oder schlecht steht.

Der Stiel hat keinen Griff, wie beim Spaten, weil die Arbeitsrichtung, die Kraftsendung, der Druck nicht in der Richtung der Stielachse verläuft, sondern im Winkel zu ihr. Wir drücken die Hacke nach unten und ziehen sie an uns, stoßen sie nicht vorwärts.

Die Stiellänge richtet sich nach der Körpergröße. Da kleine Personen nötigenfalls den Stiel etwas kürzer fassen können, ist es ratsam, den Stiel nicht zu kurz zu wählen. Da das Hacken, wenn kein Unkraut ausgelesen werden braucht, in nur wenig vorgeneigter Haltung erfolgt, so darf der Stiel ziemlich lang sein, 1,25 – 1,35 m; man kann dann, ohne oft den Stand zu wechseln, ziemlich weit um sich reichen. Der Aktionsradius für planmäßige Arbeit beträgt dann 1,60 Meter und demgemäß der Anstellungsabstand für die Leute 1,50 Meter.

Genügende Stieldicke muß gefordert werden, um die Ermüdung der Hand zu vermeiden. Dünne Stiele von nur zwei Centimeter Stärke nötigen eine starke Hand zu krampfartigem Umspannen, für kleine Hände genügt sie.

Anwendung

IM Gegensatz zum Spaten, der mit Stoß betrieben wird, kommt bei der Hacke Schlag und Zug in Anwendung. Bei leichtem Schürfen der Oberkrume und bei unbedeutendem Unkrautbestand schwacher Kruste ist die Schlagleistung zur Einführung des Hackenblattes in die Erde eine ganz geringe, der flachstreichende Zug setzt mit Berühren der

Erde eigentlich schon einen Gedanken früher ein und wird als Zug kurzerwärts zu Ende geführt. Die Breite der durchfahrenen Oberfläche wechselt je nach Unkrautmenge und Verkrustung, sind beide schwach, so kann die Hacke auf etwa 40 Centimeter Hackflächenstrich angesetzt werden, bei dem flachen Durchziehen fällt alle Erde über das Blatt zurück, so daß es zu keinem Zusammenziehen von Erde kommt, die einen unbehackten Streifen dem Arbeiter zunächst zudecken könnte. Anders bei tieferem, durch Unkraut und Verkrustung bedingtem Hacken. Da wird Erde zusammengezogen, sie könnte Unbehacktes bedecken, und dem vorzubeugen wird der Hackstrich schmal angesetzt, etwa 10 Centimeter. Zwischen beiden Grenzen gibt es verschiedene nach Bodenzustand und anderem zu bemessende Abstufungen. Es wird Hackstrich neben Hackstrich gesetzt, so daß Leerstellen nicht verbleiben.

Bei Pflanzenbestand wird reihenweise gehackt und so dicht wie möglich an die Einzelpflanze heran, so daß keine Handjäte-Nacharbeit verbleibt. Bei guter Hackeleistung ist das möglich. Eine Ausnahme machen tief wurzelnde Unkräuter, die müssen auch während des Hackens herausgezogen werden unter tieferer Lockerungsnachhilfe.

Steht viel Unkraut, so wird es nach dem Loshacken mit der Hacke einige Male kurz hin und her gestoßen, damit die Erde abfällt und das Vertrocknen erleichtert wird. Das Wiederfesttreten solcher größeren Unkrautstauden wird möglichst vermieden, wie überhaupt das viele Hin- und Hertreten. Der Hacker soll seinen Standplatz möglichst lange inne behalten und mit möglichst großen und wenig Schritten vorwärts gehen, damit das gelockerte Erdreich nicht zum großen Teil festgetreten wird.

Graben kann man auf leichtem Boden fast bei jedem Wetter, Frost ausgenommen, beim Hacken ist man viel mehr vom Wetter abhängig. Schwerer Boden darf bei Nässe überhaupt nicht betreten werden, wenn er nicht zur Tenne werden soll. Aber auch auf leichtem Boden bei Regen oder feuchtem Wetter zu hacken, ist zwecklos. Das eben ab- oder losgehackte Unkraut würde wieder festgeschwemmt und wüchse fröhlich weiter, die Verkrustung würde baldigst wieder da sein. Geeignetes Hackwetter bedeutet Hitze und Sonne, alles losgelöste Unkraut soll sofort verderben. Geschieht das, so ist das im Kleinbetrieb oft vorgenommene Ausrechen des gehackten Unkrauts entbehrlich, es sei denn, daß Regen droht oder daß das Unkraut schon sehr hoch war, so daß es nun dem Ordnungsinn beleidigt, spätere Hackbarbeit hindert und den Kulturpflanzenbestand beeinträchtigt.

Das heiße Hackwetter trocknet auch den durchhackten Boden ab, er zerkrümelt und dient dann als Schutz gegen weitere Verdunstungsverluste aus tieferen Schichten, weil die Haarröhrchenleitung nicht mehr bis zur Oberfläche geht. Hacken erhält also die Bodenfeuchtigkeit, die Bodentätigkeit der Bakterien, welche durch die luftabfließende Verkrustungsschicht beeinträchtigt wird. Eine alte Erfahrung sagt: Fleißiges Hacken erspart das Gießen.

Im Frühjahr bei drohenden kalten Nächten ist Vorsicht geboten. Ein anderer alter Erfahrungs-Spruch bezieht sich hierauf: Hacken bei Kälte schadet. Das erklärt sich so: die durch das Hacken vergrößerte Oberfläche verdunstet mehr Wasser, kühlt sich dadurch mehr ab, gibt auch mehr Wärme ab, so daß ein schädliches Minus zu Ungunsten der Pflanze eintreten kann. Gefährdet sind dann besonders solche Pflanzen, die sowieso leicht einem Nachtfrost zum Opfer fallen: Kartoffel, Bohnen, Gurken.

Über die Hackeleistungen in der Gärtnerei liegen keinerlei zuverläßige Aufzeichnungen vor. Das erklärt sich aus der Abhängigkeit des Ergebnisses von sehr vielen Umständen:

Verkrustungsstärke des Bodens,
Bodenwert und Kulturzustand,
Unkrautstärke,
Güte der Hacke,
Leistungsfähigkeit, Geschick und Arbeitswillen des Arbeiters,
Schürfen oder tief Hacken,
Pflanzenbestand, ob dicht oder weit, hoch oder klein.

Nehmen wir günstige Umstände an, lockeren Boden, wenig Unkraut, gute Hacke, geschickten Arbeiter, flache Hackleistung, mittleren, nicht hindernden Pflanzenbestand, so könnten in achtstündiger Arbeitszeit 1200 Geviertmeter, rund ein achtel Hektar, geleistet werden. Für Bearbeitung von größeren Flächen ist die Handhacke heute stark in den Hintergrund gedrängt. Im Großbetrieb hat man für Getreide, Gemüse mit Pferden bespannte Hackmaschinen oder Pferderadhacken oder Bodenfraisen, im Mittelbetrieb, der nicht über Pferde verfügt, ist an Stelle der Handhacke die Radhacke getreten, die bei richtiger Arbeit und Einstellung der Kulturen auf ihre Benutzung eben das Doppelte an Fläche leistet. Sie bedarf freilich meist eines Nachputzens mit der Handhacke. Doch bin ich der Meinung, daß schon kleine Gärten mit einer bestellten Fläche von 1200 Quadratmeter sich mit Nutzen einer Radhacke bedienen können. So bestrebt man sich, die Handhacke durch die Maschinenarbeit auszuschalten. Immerhin verbleibt ihr noch ein weites Anwendungsfeld, so wird sie bei der Reinigung und Lockerung eng gestellter Reihensaaten (Saatzwiebeln) nicht entbehrt werden können.

PAUL KACHE / IMMERGRÜNE TOPF- UND KÜBELPFLANZEN IM WINTER

LIEBHABER immergrüner Topfgewächse, wie sie die Myrte, die Eugenie oder als Kübelpflanze der Lorbeer darstellen, sehen oft eine Schwierigkeit in deren Überwinterung. Solange diese Pflanzen klein sind, geht es noch an. Anders verhält es sich bei großen Exemplaren. Man findet oft nicht den passenden Raum dafür oder glaubt ihn nicht zu finden, weil man nicht weiß, wie anspruchslos derartige Gewächse in der Überwinterung sind. Eine Folge davon ist die Ausschaltung solcher Pflanzen aus dem Garten, was sehr zu bedauern ist.

Räume, die zu ihrer Überwinterung brauchbar sind, findet man in jedem Hause, zu dem ein Garten gehört, es bedarf dazu keines Gewächshauses. Sind doch ihre Ansprüche an Licht im Winter sehr gering. Und das ist der wichtigste Punkt. Hat der fragliche Raum nur etwas Licht, so ist das genug. Doch soll er gut lüftbar sein und möglichst frostfrei bleiben. Auch darf er nicht allzu feucht sein, obwohl schließlich durch gute Lüftung hierin ein genügender Ausgleich geschaffen werden kann. Kellerräume werden am ehesten diesen Anforderungen entsprechen. Auch Veranden, die geschlossen werden können, sind oft recht brauchbar, ebenso größere Vorräume beim Hauseingang. Kleinere Pflanzen finden sehr oft den besten Stand am Treppenfenster. Selbst manche Bodenräume lassen sich dazu herrichten. Nicht geheizte Zimmer geben für viele, besonders kleinere Pflanzen einen vorzüglichen Standort über Winter.

Ein zu frühes Einstellen ins Winterquartier ist zu vermeiden. Am frühesten seien noch Eugenien, Myrten, Granatäpfel in Sicherheit gebracht. Ihnen könnten stärkere Frühfröste gefährlich werden. Doch der Lorbeer, der immergrüne japanische Evonymus, die gelegentlich vorhandene Eriobotrya vertragen einige Frostgrade ohne jede Gefahr. Selbst einige Palmen wie die kanarische Dattelpalme, Phoenix canariensis, dann die Zwergpalmen, Chamaerops excelsa und humilis, sind ebenso hart, auch Thormium tenax mit dem kraftvollen schwertförmigen Laub. Diese Pflanzen können bis in den November im Freien bleiben. Droht wirklich einmal ein stärkerer Frost, so stelle man sie zunächst aus Vorsorge abends an einen geschützten Ort, am besten an die schützende Mauer eines Gebäudes. Hier ist schließlich noch durch eine schwache, vorübergehende Decke etwas Schutz möglich. Denn allzu oft tritt nach einigen Tagen Frühfrost wieder wochenlanges, mildes Wetter ein. In dieser Zeit stehen diese Pflanzen besser noch im Freien.

Vor dem Einbringen in den Überwinterungsraum sind die Gefäße, in denen sie stehen, gut zu säubern. Dann sind die Erdballen durch ein richtiges Wässern wohl gut zu durchfeuchten, jedoch nicht allzu naß zu halten. Es ist selbstverständlich, daß die feinblättrigen Myrten, auch die Eugenien den lichtesten Standort erhalten, während die anderen mit weniger lichtem Stand vorlieb nehmen müssen. Bei Raummangel sind erst die großen Stücke gut verteilt, nicht zu dicht aufzustellen. Der unter und zwischen ihnen verbleibende Raum wird dann ausgefüllt mit den noch jüngeren, kleineren Pflanzen. Man kann ohne Schaden diese Gewächse verhältnismäßig eng zusammenstellen. Doch sollten sie so gestellt werden, daß schmale Gänge verbleiben, damit ein Beobachten möglich ist, denn eine gewisse Pflege muß ihnen im Verlauf des Winters doch zukommen. Bei einem geschickten Verteilen der großen und guten Zwischenstellen kleinerer Pflanzen läßt sich in einem nicht allzu großen Kellerraum eine reichliche Anzahl Pflanzen unterbringen. Schwierigkeiten könnten schließlich hohe Lorbeerpyramiden machen, für die der Keller zu niedrig ist. Doch wird sich auch für sie ein passender Platz finden, am ehesten im luftigen Vorraum am Hauseingang. Bei Neubauten sollte viel mehr Rücksicht auf eine Möglichkeit zur Überwinterung solcher Pflanzen genommen werden.

Da die in Frage kommenden Pflanzen im Verlauf des Winters nicht wachſen, ja nicht wachſen ſollen, muß die Pflege vor allem das Geſunderhalten bezwecken. Es iſt möglichſt viel zu lüften, am Tage wie in der Nacht, ſolange die Außentemperatur über dem Nullpunkt liegt. Gerade die ſo erzeugte friſche, kühle Luft iſt für die Pflanzen von großer Wichtigkeit. Das iſt vor allem im Nachwinter zu beachten, ſobald allmählich die Außentemperatur langſam ſteigt. Dann wird es bald ratſam, nur nachts zu lüften, wenn die Wärme ein wenig über dem Nullpunkt liegt. Dagegen muß am Tage, wenn außen die Temperatur ſteigt, der Raum geſchloſſen bleiben. Je länger man im Überwinterungsraum eine möglichſt friſche, aber kühle Luft hält, umſo ſicherer läßt ſich der Beginn des jungen Austriebes hinaus ſchieben. Das iſt aber unbedingt wichtig, denn in dem lichtarmen Raum käme doch nur ein Vergeilen des Jungtriebes in Frage. Es ſiedeln ſich dann auch leicht die ſchädlichen Blattläuſe an, die dieſen völlig verkümmern laſſen. Daß in der Zeit ſtarker Fröſte das Lüften unterbleibt, iſt wohl jedem verſtändlich; während ſolcher Zeiten muß der Raum froſtfrei gehalten werden. Allerdings iſt ein vorübergehendes Eindringen ſchwachen Froſtes im allgemeinen ohne Belang. Wo der Froſt zu gefährlich werden könnte, iſt durch die gelegentliche Aufſtellung eines Petroleum- oder Spiritusofens der Froſtgefahr leicht entgegenzutreten.

Infolge der kühlen Luft und des abſoluten Fehlens des Wachstums iſt auch das Gießen dieſer Pflanzen im Winter recht ſparſam auszuführen. Nur in größeren Zwiſchenzeiten wird einmal eine Wäſſerung erforderlich ſein. Es iſt wohl ſelbſtverſtändlich, daß die Ballen aber auch nicht durch zu geringe Bewäſſerung zum Austrocknen gebracht werden dürfen. Ein Vertrocknen oder Abſtoßen des Blätter wäre unweigerlich die Folge. Selbſt die jungen Triebe würden eintrocknen. Richtig iſt es, durch gelegentliches, geringes Wäſſern ſtets einen mäßig feuchten Erdballen zu halten. Dieſe Gleichmäßigkeit iſt für die Pflanzen der beſte Zuſtand. Nur im ſpäteren Winter, nach dem Frühjahr zu wird wieder allmählich reichlicher gegoſſen. Das iſt ſchon bedingt durch die trockener werdende Luft, die das Verdunſten immer mehr fördert; von der Einwirkung ſolcher allgemeiner Verhältniſſe iſt das Befinden ja abhängig.

Es mag bisweilen vorkommen, daß im Winterquartier, beſonders wenn in ihm etwas höhere Temperatur herrſchen ſollte, auch einmal Schädlinge auftreten, ja überhand nehmen. Beſonders ſolche aus der recht zahlreichen Sippe der Pflanzenläuſe, als da ſind allerlei Blattläuſe, Schildläuſe, Wolllaus und dergleichen. Da iſt gerade in der ſo langen Winterzeit die beſte Gelegenheit, einmal gründlich mit dieſem Schädlingszeug aufräumen. Es muß Pflanze für Pflanze vorgenommen, und einer durchgreifenden Säuberung unterzogen werden. Ein vollkommenes Abwaſchen gibt die ſicherſte Gewähr für wirklichen Erfolg. Dazu iſt warmes Waſſer erforderlich, das durch Zuſatz guter Schmierſeife etwas ſchaumig gemacht wird. Auch ein Abſud von Quaſſia ſollte hinzugegeben werden. Mit nicht zu hartem Schwamm werden die Blätter beiderſeits völlig geſäubert. Stamm und Äſte werden mit einer Handbürſte gereinigt. So iſt es möglich, alle auf der Pflanze befindlichen Schmarotzer auch wirklich zu entfernen, zu vernichten. Dabei geht natürlich auch der auf den Blättern befindliche Staub oder Ruß mit herunter. Wo beides ſich ſtark vorfindet, iſt es ratſam, durch kräftiges, unter Umſtänden wiederholtes Überbrauſen der Kronen dieſe gewöhnlich feſt ans Blatt angetrockneten Maſſen genügend aufzuweichen. Ebenſo iſt nach beendetem Waſchen und Reinigen ein ſehr ſcharfes Abbrauſen oder Abſpülen der ganzen Pflanze erforderlich, um den letzten Reſt von Schmutz oder Schädlingen herunterzuholen. Man wird oft finden, daß nach einer ſo gründlich durchgeführten Reinigung die Pflanzen ein ganz anderes Ausſehen zeigen. Selbſtverſtändlich iſt die ganze Arbeit mit einer beſonderen Sorgfalt auszuführen, damit kein Schaden am Laub oder Holz der Pflanzen entſteht.

Unter Glas

Oncidium sphacelatum

EINE der anſpruchsloſeſten, in Braſilien beheimateten Orchideen iſt Oncidium sphacelatum. Sie iſt verſchrieen als unwillige Blüherin, was aber durchaus nicht der Fall iſt. Es kann dies nur an Unkenntnis der Kultur liegen. Daß ſie bei richtiger Behandlung willig blüht, zeigt die abgebildete Pflanze. An Wachstum übertrifft dieſe keine andere Orchidee, denn das aufgenommene Exemplar iſt ſogar nur die Hälfte von drei Bulben, die ich mir vor elf Jahren in einer Handelsgärtnerei geben ließ.

Oncidium sphacelatum pflanzt man am beſten in Körbe, wegen ſeines raſchen Wachstums. Als Pflanzmaterial nehme ich nur Sphagnum.

Ein ſchöner Anblick iſt es, wenn die langen, weißen Wurzeln von den Bulben wie ein Schleier herunterhängen.

Im Winter ſoll die Temperatur 10—12° R. nicht überſteigen.

Sind die neuen Bulben annähernd ausgereift, ſo iſt mit dem Gießen nachzulaſſen; es wird auch nicht mehr geſpritzt, denn nun iſt der Zeitpunkt gekommen, da die Knoſpen erſcheinen. Die Geduld darf man allerdings nicht verlieren, denn die Knoſpen erſcheinen ſchon im Dezember und kommen erſt im Mai zur Blüte. Ein herrlicher Anblick iſt es dann, wenn die $1^1/_2$ Meter langen Blütenſtengel mit vielen gelb und braungefleckten Blumen beſetzt ſind.

Eine voll erblühte Pflanze iſt ein Schmuckſtück für Schauhäuſer und die Blumen ſind für die Binderei ſehr wertvoll.

Oncidium sphacelatum ſollte deshalb in keiner Orchideenſammlung fehlen.

J. Scherer

Auf dem Balkon

Balkonschmuck im Winter

WIR haben im Laufe des Frühjahrs und Sommers versucht, Winke zu geben, wie man die Fenster und Balkons auf die praktischste Weise abwechslungsreich schmücken kann. Je nach den verwendeten Pflanzen, der mehr oder weniger sorgfältigen Pflege dürfte auch das Gelingen der Anpflanzungen geraten sein und seinen Pflegern die Mühe gelohnt haben.

Die besten Überwinterungsmethoden für unsere Balkonpflanzen wurden ebenfalls (Band VI, Seite 63 von Gartenarbeit und Blumenpflege) behandelt, auch Fingerzeige gegeben, wie die Fenster und Balkons auch über den Winter zwar nicht mit blühenden Pflanzen, wohl aber mit Immergrünen anheimelnd gemacht werden können.

Außer den hier empfohlenen kleinen Fichten können auch mit bestem Erfolg andere kleine Coniferen oder Buchs verwendet werden. An Coniferen eignen sich vorzüglich manche kleine Abies, wie A. concolor, die Blautanne, verschiedene Chamoecyparis-Arten, Juniperus, kleine Lärchen, Kiefern und Taxus. Die Pflanzen können mit guten Erdballen oder mit den Töpfen in die Balkonkästen gepflanzt werden, um im Frühjahr, wenn die Kästen wieder mit blühenden Pflanzen bestellt werden sollen, auf ein Beet im Garten ausgepflanzt oder mit den Töpfen eingegraben zu werden; sie werden sich im Laufe des Sommers erholen und können im darauffolgenden Herbst wieder verwendet werden.

Leider nehmen unsere Architekten in den allerwenigsten Fällen beim Bau der Häuser darauf Rücksicht, die Fenstergesimse so breit zu machen, daß beim Anbringen der Vorfenster genügend Zwischenraum zwischen den Fenstern bleibt, um hier blühende Pflanzen aufstellen zu können. Es gibt eine ganze Anzahl blühender Pflanzen, wie Primeln, Alpenveilchen, Tulpen, Hyazinthen, kleine Hortensien und andere, die im Winter blühen und gerade zwischen den Fenstern sich viel länger halten als im warmen Zimmer.

Natürlich müssen sie bei einsetzendem starkem Frost herausgenommen und vor dem Erfrieren geschützt werden. Oft genügt aber ein Öffnen der inneren Fenster. *H. Gehringer*

Handwerkliches

Harnstoff-Düngung bei Dahlien

Durch das Zusammenwirken mancherlei ungünstiger Umstände blieben meine Dahlien im letzten Jahre in der Entwiklung bedenklich zurück. Besonders hemmend wirkte dabei die große Trockenheit bis in den Juni hinein und ein armer, in schlechter Kultur stehender Sandboden. Noch bis weit in den Juni hinein boten die Dahlienpflanzungen daher ein wenig erfreuliches Bild, das keine frohen Hoffnungen erweckte.

Da griff ich zur Düngung mit Harnstoff, nachdem die Pflanzen etwas herangewachsen waren. Er erwieß sich als ein wahrer Retter in der Not. Seine Wirkung zeigte sich rasch, das ganze Aussehen der Pflanzen veränderte sich. Es setzte ein rasches Wachstum ohne abzusetzen ein; damit wurde das sogenannte Überwachsen vermieden, und ohne daß sie übermäßig ins Kraut schossen, wie es sonst so gern vorkommt bei einseitiger Stickstoffdüngung, wurde das Laub üppig und dunkelgrün, wie die Pflanzen überhaupt vor Gesundheit strozten.

Was aber die Hauptsache war, auch die Blüte ließ nicht auf sich warten und in Menge, Güte und Ausdauer nichts zu wünschen übrig. Im Juli langsam einsetzend, nahm sie rasch zu und steigerte sich zu unübertrefflicher Fülle, auf diesem Höhepunkt nicht nur Wochen, sondern Monate lang verharrend. Die Einzelblumen waren gut im Bau und straff in der Haltung, ausgeprägt in der Farbe, sodaß sie selbst die kritischsten Beurteiler voll befriedigten. Sorten, an denen man wochenlang in ununterbrochener Folge 25 bis 35 offene Blumen zählen konnte, waren keine Seltenheit. Durchschlagend ist die Gartenwirkung solch reicher Dauerblüher. Es wurde dabei nicht durch Ausbrechen der Nebenknospen auf Schaublumen hingearbeitet. Danach werte man die Größenangaben in Centimetern einiger Blumendurchmesser, die ich folgen lasse: Ave Maria und Menny Carlée sowie Adler 17 bis 18, Amun 23, Ehrliche Arbeit, die ich besonders in der Gartenwirkung der letzten weit vorziehe, da sie reich und frei blüht und nur gut entwickelte Blumen bringt, was alles von der Amun Ra nicht gesagt werden kann, erreicht bis zu 20 Centimetern. Willkommen, eine weitere ganz hervorragende Gartendahlie, brachte Blumen in verschwenderischer Fülle mit einem Durchmesser von 19 bis 21, Farbenkönigin (Engelhardt), die nebenbei bemerkt, eine recht schöne Sorte ist, brachte es auf 19, ebenso Bagdad, Poinsettia, Gustel von Blasewitz, Für Dich, Insulinde und Nagels Wunder. Letzte ist zwar eine Farbenschönheit, auch ansprechend in der Form, aber sie blüht nicht frei genug, und es fehlt ihr an der notwendigen Nackenstärke. Es brachten ferner Vaterland und Hohes Licht Blumen bis zu 20 Centimeter Durchmesser, während Hessenland diese Zahl noch übertraf. Die herrliche Dichtertraum erreichte 18 Centimeter.

Seit jeher zog ich gern Dahlien in Töpfen, die mir dann zu mancherlei Zwecken vorzügliche Dienste taten, denn gut gehaltene Topf-Dahlien, deren Kultur wirklich nicht schwierig ist, sind kostbare Schmuckstücke. Meine diesjährigen machten mir zunächst keine Freude. Es waren hinter der Zeit bedenklich einher hinkende Schwächlinge, da mir keine gute Erde zur Verfügung stand. Jch erhoffte daher wenig von ihnen und hatte auch ihre Zahl sehr eingeschränkt.

Das wenig erfreuliche Bild änderte sich jedoch bald, nachdem mit Harnstoff nachgeholfen wurde. Rasch schritt nun das Wachstum vorwärts; dunkelgrüne Belaubung gab nach außen Zeugnis, daß die Pflanzen, die in verhältnißmäßig kleinen Töpfen standen, sich wohlfühlten. Das zeigte auch auf das beste die bald einsetzende Blüte in ihrer Güte, Menge und Dauer. Mit bis zu zwanzig und auch noch mehr offenen Blumen waren die Pflanzen monatelang überschüttet, entboten einen köstlichen Anblick, der den Topf-Dahlien manch neuen Freund warb. Es wurden als Topf-Dahlien nicht nur niedrig bleibende, sondern auch Sorten von mittelhohem Wuchs genommen. Aber alle trugen sich ohne Stab vorzüglich, ein Zeichen daß in diesem Falle der Harnstoff nicht einseitig nur auf üppige Laubbildung gewirkt hat, wofür ja auch schon die überreiche Blüte das beste Zeugnis abgab. Auffällig war mir die Bildung vieler bunter Blumen, selbst an Sorten, die für gewöhnlich nicht dazu neigen. Ob dieses auf die Wirkung der Düngung zurückzuführen ist, steht natürlich nicht fest, ebenso wenig, ob diese Düngung in allen Fällen derartigen Erfolg zeitigt.

Der Harnstoff wurde nur in flüssiger Form gegeben, und zwar wöchentlich einmal. So lange die Pflanzen noch in der Entwicklung zurückstanden, wurde dabei auf ein Liter Wasser einhalb Gramm Harnstoff genommen, während die Harnstoffgabe später auf ein Gramm erhöht wurde.

Dahlien unter Glas

BEIM Bezug neuer Dahlien in jungen Stecklingspflanzen, die oft recht spät eintreffen, kommt es besonders in ungünstigen Jahren öfter vor, daß man seinen Zweck nicht erreicht, da die Sorten nicht mehr zur Blüte kommen. Das ist doppelt unangenehm, kann man sich doch dann kein rechtes Bild von ihrem Wert machen, weiß demnach nicht, wie man es mit der Vermehrung und nächstjährigen Verwendung halten soll. Derartige Pflanzen sind auch wenig vorbereitet für die Überwinterung, da sie nicht ausgereift sind, und gehen daher leicht zu Grunde. Um diesen Übelständen abzuhelfen, pflanze ich, sobald die vorgeschrittene Zeit erkennen läßt, daß die Gefahr der vorzeitigen Vernichtung durch Frost besteht, derartige Sorten in Töpfe, stelle sie hell im Kalthause auf, wo sie dann ruhig weiter wachsen und blühen, auch langsam ausreifen können.

Auffallend leicht vertragen die Dahlien dieses Einpflanzen, ohne Schaden zu erleiden, wenn man beim Ausheben nur einige Vorsicht walten läßt und sie nachher etwa zwei Tage lang kräftig überspritzt und beschattet hält, wie ja die Dahlien überhaupt auch im vollem Wachstum ein Verpflanzen im freien Lande gut überstehen können. Wo kein Kalthaus zur Verfügung steht, tut auch jeder andere kühle, helle Raum dieselben Dienste. Ähnlich kann man auch mit Canna verfahren, die aber größerer Wärme bedürfen und dann noch lange blühen, wie für diese ja in unsern Breitengraden das Ideal eine Kultur unter Glas wäre. *M. Geier*

Gartenrundſchau

NEUES AUS ALLER WELT

Eine Gefahr für den Weltgarten

WAS gab es noch in Deutſchland an unzähligen Stellen auch nahe den großen Weltſtädten an Koſtbarkeiten edler Wildpflanzen! Eine Stunde vom Dönhoffplatz blühte Gentiana verna zu Tauſenden nordöſtlich von Berlin. Nun iſt längſt alles aus Pflanzen- und Gartenfreude wegbotaniſiert. Der Garten ganz beſonders mit ſeiner ſonſt ſo ſehr zu begrüßenden Entwicklung des Steingartens iſt eine große Gefahr geworden für das, was uns Gartenfreunden ja im Grunde mindeſtens ebenſo am Herzen liegt wie unſer Garten, der Schmelz der Wälder, Berge, Gebirge und Strande aus edlem Wildpflanzenleben. Wo ſitzt jetzt die Hauptgefahr? Ich glaube, in den Gärtnereien, die Wildpflanzen aus den Gebirgen ſammeln und verſchicken.

Die Geſetze, welche das Sammeln von Pflanzen beſtimmter edler wilder Arten verbieten, müſſen durchaus verſchärft werden. Wenn hier nicht empfindliche Strafen einſetzen, ſo wird unſer Naturhaushalt ſchließlich beſtimmt einen Schaden erleiden, der durch geheimnisvolle Verknüpfung ſich auch in Wirtſchaftsſchädigungen umſetzen wird. Selbſtverſtändlich haben die Pflanzenzüchter auch ein wirtſchaftliches Intereſſe daran, daß das Wildpflanzenſammeln aufhört; aber der Schutz produzierender Gärtnereien kann für Gemeinſchaftsaktionen gegen das Wildpflanzenſammeln kein genügender Beweggrund ſein, ſondern es handelt ſich um dringende Schutzmaßregeln gegen die Verarmung des Weltgartens, den uns aufzuſchließen doch der Sinn des Gartens und ganz beſonders der des Natur- und Steingartens iſt.

Hand in Hand mit Schutzmaßregeln gegen die Wildnisräubereien muß natürlich die Ausbreitung der Naturſchutzbeſtrebung gehen, die überall Oaſen unantaſtbaren wilden Naturlebens ſchafft. Der Beſuch ſolcher Oaſen durch Schulen, ebenſo wie der Beſuch ſchöner Gärten, wird erſt den botaniſchen Unterricht vor ſeinen gefährlichen ſteriliſierenden Wirkungen ſchützen.

Die Zukunft gehört eher der Neuanſiedlung edler Wildpflanzen in den Wildniſſen als dem umgekehrten Vorgange. Wie wenig hört man noch in der Welt von nachhaltigen Verſuchen, wegbotaniſierte Wildnisſchätze in Gegenden, in denen ſie früher blühten und gediehen, wieder anzuſiedeln. Es werden alſo Zukunftsaufgaben in der wirkſamen Anſiedlung edler wilder Blütengewächſe in deutſchen Wildniſſen liegen.

Wie ſoll ſich denn nun der einzelne private Bergſteiger und Naturfreund zu der ſehr natürlichen Verſuchung ſtellen, für ſeinen Steingarten zu Hauſe dieſe oder jene Pflanze auszugraben und mitzunehmen? Wenn er genügend Organ für die Reinheit einer Freude hat, die doch wohl das Weſentliche aller Freude iſt, wird er ſeltene oder gefährdete Pflanzen ſtehen laſſen und nicht mitnehmen, ſo ſehr gerade dies auch dazu lockt, ſondern er wird nur beſcheiden vom wirklichen Überfluß nehmen.

Wir leben in einem Zeitalter, in dem immer mehr Menſchen aufzugehen beginnt, was man die Rentabilität der Romantik nennen könnte. Mangel an Sinn für Romantik iſt Mangel an Wirklichkeitsſinn. *K. F.*

Der Urſprung der Roſe Gruß an Teplitz.

DIE dankbarſte Roſe in dieſem Herbſtwetter war die Gruß an Teplitz. Sie hat die Näſſe und die kalten Nächte, die oft ſo unvermittelt mit der ganz unerklärlichen Wärme und Milde des Wetters wechſelte, ganz einzigartig hingenommen. Es gibt keine Roſe im Garten, die im Augenblick mit ihr wetteifern könnte, obwohl die Malmaiſon und die La France auch noch ſchön ſind. Gerade hier in der Niederung bei Oranienburg mit den ſtarken Tauniederſchlägen ſind die Herbſtroſen ſelten ſchön; ſie gehen nicht mehr in einen nennenswerten Flor, es ſind nur einzelne Blumen, die ſie zeigen. Die Teplitz iſt ja an und für ſich ein Rätſel. Wie hat ſie Geſchwind gewonnen? Das iſt eine Frage, die ſo oft erörtert wurde. Ob Geſchwind die Eltern genannt hat, iſt mir nicht bekannt, wohl aber ſteht es auch ſo außer Zweifel, daß die hechtblaue Roſe, *Roſa rubrifolia* und die *Cramoisi supérieur,* möglicherweiſe die *Fellemberg* ſtatt der letzten ihre Eltern ſind. Gerade im Spätherbſt zeigte ſich der Einfluß der hechtblauen Roſe ſehr bedeutend. Neben ganz typiſchen Trieben der Roſa ſemperflorens ſtehen oft die eigenartig dünnen, drahtartigen der Roſa rubrifolia, und dieſe ſind dann faſt immer hell im Laube und hechtblau überlaufen. Auch in den Blüten finden wir ſtarke Anklänge an die hechtblaue Roſe. Wohl entwickelt die Teplitz im Spätherbſt die charakteriſtiſchen Sträuße in doldenartiger Stellung, die ein Hauptmerkmal der Semperflorens-Roſen ſind, aber ſie bringt auch kleine, merkwürdig flach geſtaltete Blumen, die wir zunächſt für verkümmert halten. Dieſe Blumen ſind immer blaß fleiſchfarben und zeigen in jedem einzelnen Kronblatt genau den Farbenton der hechtblauen Roſe.

Es iſt eine ganz merkwürdige Erſcheinung bei Roſen, daß ſie in der Kreuzung ſo ſehr ihre eigenen Wege gehen. Wir werden eben die Roſe nie auskennen, immer wieder wird ſie uns vor neue Rätſel ſtellen. Die Gruß an Teplitz iſt eine Roſe, die überall um den Erdball zu den allererſten Roſen gerechnet wird, und wir ſehen, wie einfach die Dinge liegen, wirklich neue Möglichkeiten zu ſchaffen, die uns dem Ziele nahebringen. Kerngeſunde Roſen müſſen immer mehr erſtehen, die auch im Norden jeder Witterung trotzen und uns überſchütten mit edelſten Blumen. Aus der *Roſa dumetorum* iſt nicht viel gezogen. Mit einer alten Centifolie ſchenkte ſie uns den lieblichen Roſier de Mai, das Mairöschen, eine ſehr reichblühende niedrige Centifolie, die ſchon im Mai blüht. So wird noch manche gute Wildroſe uns gewiß Überraſchungen bringen, wenn wir ſie in unſere züchteriſche Arbeit hineinnehmen. Es iſt ja bekannt, daß die alten Semperflorens-Sorten beſonders geneigt ſind, Kreuzungen mit fernerſtehenden Roſen einzugehen; das ſollten wir nicht vergeſſen. *Wilhelm Mütze*

Gute neue Roſen

UNTER den neuen Roſen, die in England während der letzten vier Jahre geprüft worden ſind, werden in *The Garden* folgende zwölf als ſchmuckvoll, wuchskräftig und widerſtandsfähig gegen Krankheiten hervorgehoben. Es ſind: Marcia Stanhope, weiß, duftend; Betty Uprichard, lachs mit karminroſa; Lady Inchiquin, kirſchorangerot; Bedford Crimson, tief ſamtig karmeſin, von echtem Roſenduft; Scarlet Glory, karmeſin mit ſcharlach, duftend; Arthur Cook, karmeſin; Dainty Bess, einfache Teehybride, krebsbroſa; Dame Edith Helen, lebhaft rein roſa; Mrs. Beatty, hellgelb; Roſelandia, gelb; Kirſten Paulſen, orangeſcharlach, Polyantha; Allan Chandler, lebhaft ſcharlach, Kletterroſe. *C. S.*

Chronik

TOTE DES JAHRES. Die Zahl der um den Gartenbau verdienten Männer, die uns der Tod im Laufe dieſes Jahres entriſſen hat, iſt glücklicherweiſe ſehr klein. Da wir hier nur auf Perſönlichkeiten hinweiſen können, deren Wirken über den engeren Rahmen des Erwerbsgartenbaues hinaus von Bedeutung war, ſo wollen wir nur des Roſenzüchters *Robert Türke* gedenken. Er ſtarb am 22. Juli in Meißen, der Stätte ſeiner Tätigkeit, im Alter von 68 Jahren. Hier war er als Blumenmaler in der bekannten ſtaatlichen Porzellanmanufaktur tätig und betrieb die Roſenzucht als ernſter Liebhaber Zu ſeinen erſten Züchtungen gehörte die Teehybride Richard Wagner. Sehr bekannt ſind ſeine Sorten Leuchtfeuer und Charlotte Klemm. Über ſeine Arbeiten an den Lutea-Hybriden hat Türke ſelbſt noch an dieſer Stelle im Aprilheft berichtet. Seine letzte Neuheit war eine Kreuzung der Rugoſa-Sorte Conſtance mit Golden Emblem zur Erzielung einer gelben Rugoſa-Form. Sein Wirken vollzog ſich immer in der Stille, er iſt nie hervorgetreten. Jeder Roſenfreund wird ihm ein warmes Gedenken bewahren.

Eines anderen Liebhabers müſſen wir heute noch gedenken, deſſen jähen Tod am 1. Dezember 1925 wir bereits kurz im Januarheft anzeigten. Es iſt der Weit über die Grenzen ſeiner engliſchen Heimat hinaus bekannte Iris-Forſcher *William Rickatson Dykes.* Er wurde am 4. November 1877 geboren und war zuletzt Generalſekretär der Royal Horticultural Society. Bereits 1907 erſchienen ſeine erſten Artikel über Iris in The Gardeners Chronicle. 1914 trat er mit ſeiner Iris-Monographie hervor, die ſeinen Namen mit einem Schlage berühmt machte. Sie iſt heute noch immer das grundlegende Werk für die Iris-Kunde. 1924 folgte das »Handbook of Garden Irises«. Auch als Züchter trat Dykes hervor mit Sorten wie Aphrodite, Richard II., Sapphire oder Gold Creſt. Obwohl er ein ſehr reſervierter typiſcher Engländer war, ſo habe ich doch immer, wenn ich ihn aufſuchte oder mich mit Fragen an ihn wandte, ein freundliches Entgegenkommen gefunden. Jedenfalls bedeutete ſein früher Tod einen empfindlichen Verluſt für den engliſchen Garten, deſſen hoher Stand in erſter Linie der Tätigkeit ſolcher ernſter Liebhabern zu danken iſt. *C. S.*

Neue Bücher

GRÜNANLAGEN DER STADT KÖLN. Wir haben bereits (Band VI, Seite 167) darauf hingewiesen, wie außerordentlich bedeutsam gerade die Kölner öffentlichen Anlagen sind. Es ist zu begrüßen, daß Gartendirektor *Fritz Encke* bei seinem Scheiden aus seiner vieljährigen überaus erfolgreichen Tätigkeit noch in einer vom Kölner Verkehrsamt herausgegebenen kleinen Schrift wenigstens einen flüchtigen Überblick über die städtischen Grünanlagen, die er zum großen Teil geschaffen hat, geben konnte. Diese Schrift sollte andere Städte zur Nachahmung anregen. Eine Inhaltsübersicht wäre allerdings erwünscht.

PFLANZENZÜCHTUNGS-INSTITUT ZU EISGRUB. Zum Studium der Vererbungslehre wurde 1912 auf Veranlassung von Gartendirektor W. Lauche in Eisgrub, dem weltbekannten Sitze der Fürsten zu Liechtenstein, ein Pflanzeninstitut gegründet, für das der als Förderer des Gartenbaues und der Wissenschaft so hoch verdiente regierende Fürst Johann II. Grund und Mittel zur Verfügung stellte. Es unterstand zunächst dem bekannten Mendelforscher Professor E. von Tschermak, Wien, bis nach dem Kriege die Leitung in die Hände von Dr. F. Frimmel überging. Dieser hat die bisherige Tätigkeit des dem Fürsten Liechtenstein zu Ehren benannten Pflanzenzüchtungs-Institutes in einer hübschen Denkchrift geschildert. Sie zeigt, daß sich das Institut außer mit Blumen auch mit Obst und Gemüse beschäftigt. Leider ist aber die Lage des Institutes heute eine recht schwierige geworden. Es wäre sehr zu wünschen, daß ein Modus gefunden werden könnte, die so verdienstvolle Tätigkeit dauernd zu sichern und alles auf eine breitere Basis zu stellen. Wir sind in Mitteleuropa arm an solchen Versuchsstätten.

EIN ALTER FRIEDHOF. Immer wieder zieht es den Menschen hin zu den Stätten, wo seine Vorfahren ruhen. Alten Friedhöfen wohnt nun aber meist ein ganz anderer Stimmungsreiz inne als den modernen Massengrabstätten. Zumal wenn die Friedhöfe Denkmäler einer Zeit darstellen, die künstlerisch ihr eigenes Gepräge trug. Dies zeigt auch die Schilderung *Joseph Dillmanns* »Der alte Friedhof in Sachsenhausen mit seinen heimat- und kulturkundlichen Wahrzeichen«, die 1926 im Verlage von Englert & Schlosser, Frankfurt a. M., erschien. Sie bringt eine Reihe hübscher Bilder von Grabstätten und ist namentlich von lokalhistorischem Interesse.

DEUTSCHER GARTENKALENDER. Auch in diesem Jahre stellt sich aus dem Verlage von Paul Parey, Berlin, dieser jetzt von *J. Saathoff* herausgegebene Kalender in gewohnter Form pünktlich ein. Hervorgehoben seien Artikel von B. Voigtländer über Steingartenstauden und Zwerggehölze für Steingärten. Ferner stellt C. Rimann eine »Umfrage zur Ermittlung einer Zeitleistungs-Tabelle für Arbeiten der Landschaftgärtnerei« an, die hoffentlich beachtet wird.

WACHSENDE HÄUSER. Der Naturbau-Ingenieur *Arthur Wiechula* veröffentlicht im Verlag Naturbau-Gesellschaft m. b. H., Berlin-Friedenau, unter dem Titel »Wachsende Häuser aus lebenden Bäumen entstehend« eine mit vielen Zeichnungen ausgestattete Schrift, worin er ausführlich die Möglichkeit erörtert, Bauwerke aller Art im wahren Sinne des Wortes aus der Erde wachsen lassen. Er sucht zu beweisen, daß ihm dies schon in vielen Fällen gelungen sei. Dem meisten muß man zunächst recht skeptisch gegenüber stehen, ganz abgesehen davon, daß von ästhetischen Standpunkte teilweise wahre Monstra zustandekommen dürften.

AMERIKANISCHE DAHLIEN-GESELLSCHAFT. Die zumeist mit Ausstellungs- und Vereinsnotizen gefüllte Nr. 37 der 7. Serie des Bulletin of the American Dahlia Society bringt unter anderem auch einen populären Artikel über die Dahlie und ihre Kultur, sowie eine Betrachtung über relative Feuchtigkeit und aufbewahrte Dahlienknollen.

AMERIKANISCHE IRIS-GESELLSCHAFT. Die bereits im April erschienene Nr. 19 vom *Bulletin of the American Iris Society* ist vor allem dem Andenken des hervorragenden Iriskenners W. R. Dykes gewidmet und bringt auch ein Verzeichnis von dessen meist im Gardeners' Chronicle erschienenen Schriften. Nr. 20 vom Juli beginnt mit einem Aufsatz über die Iris in »Gerard's Herball« von 1597, mit Wiedergabe der Bilder. J. Marion Shull behandelt die Probleme der Iris-Entwicklung.

MASSACHUSETTS HORTICULTURAL SOCIETY. Unter den amerikanischen Gartenbaugesellschaften ist die des Staates Massachusetts in Boston eine der tätigsten. Dies zeigt auch das Jahrbuch 1926, das die Jahresübersicht für 1925 gibt. Es enthält außer den Vereinsmitteilungen einige interessante Vorträge, wie »Narzissen im Hausgarten«, »Zeitgemäße Dahlienkultur«, »Zimmerpflanzen« und andere. *C. S.*

Zeitschriften

BELGIEN

Im Oktoberheft von *Le Jardin d'Agrément* setzt E. Michel seine Betrachtungen über Obstbaumkultur fort. — In no. 519 von *La Tribune Horticole* wird der Tod von Dr. Arthur de Smet angezeigt. Leon Dumas setzt seine meteorologischen Beobachtungen fort; ebenso in no. 520. Hier finden wir eine Skizze des Lebenslaufes von Oswald de Kerchove de Dentergehm. No. 522 bringt eine sehr lesenswerte Betrachtung über den Wert oder Unwert von »Diplomen«.

DÄNEMARK

No. 9 von *Havekunst* enthält eine hübsche illustrierte Abhandlung über dänische Gartenhäuser.

ENGLAND

The Orchid Revue bringt im November wieder viele gute Einzelheiten. Darunter über Anpassungen der Lippe bei Dendrobium-Arten; Dendrobium Farmeri, mit Bild; Saccolabium bellinum, mit Bild, und Ausstellungsberichte. — No. 2865 von *The Garden* bringt Rosengarten-Notizen; auch über die Anlage eines kleinen Rosengartens. In no. 2866 finden wir Betrachtungen über Stadt-Vorgärten, und Miß Jekyll setzt ihre Artikelreihe über Anlage kleiner Gärten fort. Chrysanthemum indicum-Formen werden im Bilde gezeigt. Fliederformen für einen kleinen Garten werden in no. 2867 besprochen. Ferner eine Liste harter Pflanzen für kleine Gärten mit Bildern. Auch ein Artikel über Holzgitter mit Bildern, wie man sie herstellt, ist lesenswert. In no. 2868 findet sich wieder ein Artikel von Miß Jekyll, ferner eingehende Notizen über den Blütengarten mit Bildern. Ein bebilderter Artikel über die Herstellung von Bögen im Garten ist anzumerken. — In no. 2079 von *The Gardeners' Chronicle* ist ein Bild der Gesneracee Chirita Marcanii aus Siam. H. C. Long beginnt eine Aufsatzreihe über den Gartenbau auf den Guernsey-Inseln. H. Friend setzt seine Artikel über klassische und legendäre Gärten fort. Die Beilage in no. 2080 zeigt eine Szenerie aus The Domes Gardens in Brighton. Hübsch scheint die abgebildete Oenothera trichocalyx zu sein. Aus no. 2081 sei das Bild der neuen riesigen Brasso-Laelio-Cattleya Margery erwähnt. Die Beilage in no. 2082 stellt eine schöne alte Abies cephalonica dar. F. K. Ward setzt seine Reiseberichte fort und gibt eine Karte der Region am oberen Irrawaddi, wo er sammelte. Auch ein Aufsatz über den Kirschenkultus in Japan ist sehr lesenswert und vermittelt uns eine gute Anschauung davon, wie dessen Stand zur Zeit ist.

FRANKREICH

Im Novemberheft von *Revue Horticole* wird Mesembrianthemum angulatum als neue Topfpflanze behandelt. Die Farbentafel zeigt Malus floribunda aldenhamensis, und S. Mottet bespricht Lysichitum camtschatcense. — In der Novembernummer von *Jardinage* finden wir Notizen über die Ilex im Garten und über Kletterpflanzen mit Bildern.

HOLLAND

In no. 18 von *Onze Tuinen* gilt der Hauptartikel den Chrysanthemen, während no. 19 Kakteen und Orchideen gewidmet ist, und no. 20 Farnbilder aus dem Freilande zeigt. — No. 43 der *Floralia* ist eine »Speciale Bessen-Nummer« mit einem Farbenbilde der Johannisbeere Fay's New Prolific und der Stachelbeere Winham's Industrie. Dem nächsten Hefte liegt eine schwarze Tafel von Zephyranthes candida bei. Aus no. 46 sei ein Artikel über die Blumenbinderei der Renaissance, des Barock und Rokoko hervorgehoben.

NORDAMERIKA

Das Oktoberheft von *Horticulture* enthält unter anderem Betrachtungen über Lilien im Garten. Im November findet sich eine von Dr. Macoun, dem Leiter der Versuchsstation in Ottawa, Canada, aufgestellte Liste der 75 besten Iris. Diese Station gehört zu den bestgeleiteten, die wir überhaupt besitzen.

ÖSTERREICH

Das Oktoberheft der *Gartenzeitung* gibt bekannt, daß der weitbekannte Botaniker Professor Wettstein zum Ehrenpräsidenten der österreichischen Gartenbaugesellschaft gewählt wurde. Er war vorher lange Jahre der leitende Präsident. *C. S.*

VERLAG DER GARTENSCHÖNHEIT G. m. b. H. in Berlin-Westend / Verantwortlich für die Schriftleitung OSKAR KÜHL in Berlin-Westend, für den Anzeigenteil DOROTHEA KLETT, Berlin-Lichterfelde / Druck von W. SOMMER, Buch- und Kunstdruckerei in Berlin - Schöneberg.

Sammelmappe

BLUMENSCHMUCK IM ALTEN ÄGYPTEN

SAURE Tage, heit're Feste! Dies Wort drängt sich uns, so führt Franz Woenig in seinem Buche über die Pflanzen im alten Aegypten aus, unwillkürlich auf die Lippen, wenn wir uns in den altägyptischen Bilderschmuck versenken und das Leben der Nilbewohner in und außer dem Hause, bei ihrer Arbeit in Feld und Garten, auf dem Fluß, am Weiher, in Gesellschaft bei Spiel und Tanz, auf den Marktplätzen und auf der Straße belauschen. Es ist merkwürdig, wie sich trotz des ureigenen Vermächtnisses die Ansicht von dem tiefen an Asketismus streifenden Ernst des altägyptischen Wesens entwickeln und festnisten konnte. Ja, wahrlich, kein heitreres Volk als das der alten Aegypter! Was uns von den Wänden in lichten Farben entgegenstrahlt, spiegelt das angenehme Wohlbehagen an rastloser emsiger Arbeit, die Freude an allem Schönen und Imposanten und die Lust am fröhlichen Genießen der flüchtigen Spanne Zeit, die ihnen der Götter Huld auf Erden beschieden.

Leben, Licht und Farbe ist der Grundakkord aller Malereien; er durchklingt auch harmonisch das Dasein des alten Aegypters. Alles Düstere ist in ihm ausgeschlossen. Er liebt die Gesellschaft, das Spiel, den Tanz, ist ein Freund

der gymnastischen Künste; die Kleidung muß bunt, recht bunt sein, und weil ihn alles Freudige anzieht, ist er ein Freund der Blumen. Ein Fest ohne Blumenschmuck, ohne Kranz ist etwas Undenkbares. Blüten oder Kränze im Haar, Blumengewinde um Hals und Brust und Blumensträuße in den Händen sind die ersten Erfordernisse für Feste und Gelage. Ohne sie kann und darf man nicht erscheinen, und es wäre eine tötliche Schmach, würden sie dem Geladenen bei seinem Eintritte an festlicher Stätte nicht noch besonders vom Gastgeber selbst oder durch dessen Diener oder Dienerinnen gereicht. Eine Korridor-Inschrift zu Denderah, welche die bacchanale Techufeier zu Ehren der Hathor zum Gegenstand hat, bringt

folgenden dithyrambischen Erguß: »Die Erde ist in Freude. Die Einwohner von Denderah sind trunken von Wein, ein Kranz von Blumen ist auf ihren Häuptern.« So sollen ferner an der dem Totenkultus geweihten Neteri-Panegyrie (25. Choiak = 22. Dezember) dem Osiris Kränze dargebracht werden und die Festgenossen sollen in der Nacht des Festes mit dem Blumenschmuck am Halse erscheinen.

Daher ist das Kranzwinden eine geachtete Kunst und die Kranzwinder im Pharaonenlande wohl geachtetere Leute, als später irgendwo im prachtliebenden Hellas und Rom. Fehlen uns auch definitive Nachrichten über das Vorhandensein von Kunstgärtnereien im alten Aegypten, so haben sie doch, in anbetracht des starken Verbrauchs von Blumen zu Kränzen, Sträußen, Guirlanden und Blumengewinden zur Schmückung der Götterbilder, Opferaltäre, Opfertischchen, Tempelsäulen und Mumien zweifellos existiert. Plinius gedenkt häufig der Pflanzen, welche die ägyptischen Kranzwinder mit Vorliebe benutzen. So erwähnt er den alexandrinischen Amarant, vielleicht den gemeinen Hahnenkamm, Celosia cristata. Er bewundert das brennende Rot der Blüten dieses Ziergewächses, dessen eigenartige schöne Farbe in Kleiderstoffen noch nicht erreicht sei und weiß zu berichten, daß abgeschnittene welk gewordene Blütenstengel wieder frisch werden, sobald man sie in Wasser legt, weshalb sie sich auch zur Aufbewahrung behufs späte-

Von unserer neuen Sammlung „Der Weltgarten" liegen drei Bände vor:

Karl Foerster,
Unendliche Heimat

Anna Kappstein schreibt in der *Hartungschen Zeitung:* »In allerhand unvermeidlicher Alltagswidrigkeit traf mich ein Buch, das den Titel trägt »Unendliche Heimat«. Ich blätterte und las mich fest und versank in dieses Buch, wie man in eine Heimat versinkt — oder wie wenn man sich auf eine vergessene Heimat wieder besinnt. Dort im »Unendlichen« liegen die Werte, um die zu leben es sich verlohnt, im Unendlichen der Schöpfung dieser Erde, die unausschöpfbar ist an Schönheitswonnen. Der armselige Alltag macht unsere Sinne blind und taub und stumpf — und dennoch: stelle nur eine Blume vor dich hin oder schau eine ziehende Wolke an — und es kommt wie ein Erwachen über dich; fortgeblasen ist die Unlust. Karl Foerster, der Sohn des Astronomen, — ein Gärtner von Beruf, in seinem Beruf ein Künstler und ein Wissenschaftler, ein Dichter in der Naturbetrachtung, lehrt uns in seiner »Unendlichen Heimat« jenes beseligende Weltgefühl, das in ewigem Kreislauf von den Gezeiten des Jahres immer neu erweckt wird. So sieht er allenthalben »Neuen Weg« und »Entfaltung«; der Lenz wird ihm zum »Frühlingsneuland«, der Werktag zum »Sankt Alltag«. Und er überzeugt uns, daß die Erde unter der Industrialisierung nicht verödet, wie es im Maschinenzeitalter erscheinen will.«

In Pappe 3 RM. / In Ganzleinen 4 RM.

Fritz von Oheimb,
Gartenglück von heute

Mit 17 Bildern

Die *Frankfurter Zeitung* schreibt: »Wer von unmittelbarer Freude an allem, was draußen grünt und blüht, herkommt, tiefer eindringen möchte und im stillen Zimmer einen Nachklang seiner Freuden genießen will, der greife zu dem Buch von Oheimb. Aus jedem Wort des kleinen Buches klingt eine tiefe Liebe zu den Schönheiten unserer Erde, die das etwas abgegriffene Wort »Natur« zusammenfaßt. Die Erfahrungen und Beobachtungen eines langen Lebens auf seinem schlesischen Gute, die jahrelange Arbeit an der Verschönerung und Veredlung seines alten Parkes dort erfüllen diese Aufsatzsammlung mit dem frischen Leben des tatsächlichen Geschauten, und allerlei praktische Winke und Ratschläge werden dem Gartenbesitzer willkommen sein. Ein abgeklärter Frieden spricht aus den Zeiten des alten Landedelmannes und ist der beste Beweis für die ausgleichende innere Ruhe und unangreifbares Glück gewährende Wirkung eines naturgebundenen Lebens. Sehr hübsch ist es, den alten Herrn auf seinem Gang durch den Park zu begleiten, den er durch das Sichversetzen in die Heimat all seiner Pflanzen zu einer Gedankenreise in entlegenste Gegenden des Erdballs werden läßt, oder mit ihm in einer Sommernacht alles Getier seines Gartens zu belauschen.«

In Pappe 3 RM. / In Ganzleinen 4 RM.

Paul Landau,
Gartenglück von einst

Mit 16 Bildern

Börries, Freiherr von Münchhausen schreibt über das Buch: »Wer sich Paul Landau anvertraut, der faßt die Hand eines lieben stillen Gelehrten, dessen bescheidener Plauderton nur dem Wissenden verrät, daß hinter ihm ein ungemeines Wissen, eine verblüffende Belesenheit, ein fabelhafter zusammenschauender Blick steht. Das Büchlein, das er soeben unter dem schlichten Titel »Gartenglück von einst« herausgegeben hat, ist weit mehr als sein Name erraten läßt: Eine Geschichte des Gartens. Mit Persern und Aegyptern geht es los, mit Bibel, Griechen und Römern fährt es fort, mit dem Fürsten Pückler hört es auf. Und was er auch anführt, alles ist in freundlicher Lässigkeit, gelegentlich mit Humor, hingeplaudert und voll feinsten Reizes. Ein Büchlein, um es Frauen zu schenken, die es auf der Gartenbank lesen mögen, ein Büchlein ebenso für den Mann, der die Geschichte des Gartens wissenschaftlich durchleben will. Vor allem der Aufsatz über Pückler ist ganz meisterhaft und zeichnet den genialen Aristokraten mit wenigen Strichen in seiner ganzen Vielseitigkeit und Geschmackskultur. Landau gliedert sein Werk wie einen Park in größere und kleinere Gruppen, die doch immer eine biologische, geschichtliche und geschmackvolle Zusammengehörigkeit zeigen.«

In Pappe 3 RM. / In Ganzleinen 4 RM.

rer Benutzung zu Kränzen vortrefflich eignen. In der Tat mußte die hahnenkammartig ausgebreitete Blumenähre der Pflanze eine prächtige Zierde für Kränze abgeben.
Plinius, der sich über den Luxus, der mit den Kränzen getrieben wird, und über das Kranzwinden und die verschiedenen Kranzarten eingehend verbreitet, beklagt, daß man zu den Kränzen zu stark riechende Blumen verwende, deren betäubender Duft die Laune des Festes störe und wie ein schleichendes Gift der Gesundheit schade. Er fügt hieran die kleine Episode aus dem Leben der Kleopatra und des Markus Antonius: Als sich Markus Antonius zu dem Treffen von Actium rüstete, mißtraute er den Liebkosungen der Kleopatra und vermied jede Speise, die ihm nicht vorgekostet wurde. Um ihm nun zu beweisen, daß sein Leben trotz der gepflogenen Vorsicht in ihren Händen liege, bestrich sie die äußeren Blumen eines Kranzes mit Gift, drückte sich das Gewinde ins Haar, und nachdem die Fröhlichkeit hoch gestiegen war, schlug sie dem Antonius vor, ihre Kränze zu zerpflücken, die Blätter in den Becher zu werfen und dann auf gute Gesundheit von dem Weine zu trinken. Arglos folgte Antonius ihrem Vorschlag, aber indem er den Becher an die Lippen setzen wollte, ward er ihm von Kleopatras Hand plötzlich entrissen. »Ich bin es, Markus Antonius,« sagte

sie, »die du so ängstlich fürchtest, daß du anfängst, dir die Speisen sorgfältig kredenzen zu lassen, aber siehe, so wenig fehlt es mir an Gelegenheit und an Anschlägen dich zu töten, wenn ich sonst ohne dich leben könnte.« Sie ließ hierauf einen Gefangenen hereinführen und befahl ihm aus dem Becher zu trinken. Der Sklave stürzte augenblicklich tot zu Boden.
An einer anderen Stelle erfahren wir durch Plinius, daß zu den Zierden der ägyptischen

Siegeskränze auch Narzissen und Granatblüten gehörten.
Die Rose hat unbedingt bis zum Jahre 631 v. Chr. im Pharaonenlande gefehlt. Griechische Einwanderer, die in Verbindung mit Römern und Juden in Nordafrika das schnell erblühende Kyrene gründeten, haben sie zweifellos aus ihrer Heimat mit herübergebracht, denn erst die Schriftsteller einer späteren Zeit gedenken ihrer, wenn sie von der paradiesischen Herrlichkeit der Landschaft Arsinoe, den heutigen Fajum, mit enthusiastischem Lobe berichten. Schon zur Zeit der Ptolemäer und unter der Herrschaft der Römer war die Landschaft Arsinoe wegen ihrer Wein- und Rosengärten berühmt und bei allen Völkern des Mittelmeerbeckens bekannt. Die schönsten und edelsten Rosensorten gediehen in diesem Wundergarten Unterägyptens am besten und wurden weithin verschickt; auch verstand man aus ihnen köstliches Rosenwasser und Rosenbalsam zu bereiten. Als Kleopatra dem Markus Antonius bis nach Cilicien entgegenzog, ließ sie die Speisezimmer eine Elle hoch mit Rosenblüten dekken und diese mit feinen Netzen überziehen. Die Kosten für diese kleine Ueberraschung betrugen ein Talent (4500 Mark). Wohlerhaltene Blumensträuße sind in reicher Zahl unter den Katakomben - Funden mit entdeckt worden. Sie lagen in den Sarkophagen an den Seiten der Mumie, zwischen dieser und der inneren Sargwand eingezwängt. Sträuße gehörten im alten Aegypten zu den Zierden der Opfertischchen und Opferaltäre. Auf bemalten Opferstellen oder auf Wandgemälden, welche Opferszenen zum Gegenstand haben, findet sich je rechts und links ein Strauß aufgestellt. Sind die Sträuße den Opfer - Altären als Schmuck beigegeben, so umgeben sie eine riesige Lotosblume, die sich auf einem langen künstlichen Stiel oder auf einem besonderen Gestell erhebt. Die Lotosblumen sind in dieser Verwendung durchgängig von so enormer Größe, daß wir sie unbedingt für künstliche symbolische Zierden halten müssen.